

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY



3 1924 098 508 256

5-  
NK  
CB  
1869

ANNEX  
LIBRARY

C

022049



New York  
State College of Agriculture  
At Cornell University  
Ithaca, N. Y.

Library







# Die Natur.

Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

Herausgegeben

von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

Mit xylographischen Illustrationen.

Achtzehnter Band.

(Jahrgang 1869.)

Halle,

G. Schwetschke'scher Verlag.

Q  
43  
N2  
4.18  
1869

33993

# Inhalt.

## Größere Aufsätze.

Ein Wiedersehen nach dem Tode, von Otto Me . . .	S. 1
Der Sampter, von Pfarer Karl Müller von Alfeld . . .	3
Das Migrationsgesetz der Organismen, von Karl Müller . . .	6
Die Ziergärten Europa's, von K. Müller . . .	9
Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen, von G. Bänig . . .	
1. Einleitende Bemerkungen . . .	12
2. Der in Zukunft stehende Bernstein-Bergbau im Innern des Samlandes . . .	14
3. Das Vaterland des Bernsteins . . .	19
4. Die Braunkohlenformation und die geologische Karte der Provinz Preußen . . .	27
Erster Artikel . . .	27
Zweiter Artikel . . .	46
5. Die marine Diluvialfauna in Westpreußen . . .	84
6. Die Sammlungen der physik.-ökonomischen Gesellschaft . . .	92
Gesunde Luft, von D. Me . . .	
Erster Artikel . . .	17
Zweiter Artikel . . .	25
Dritter Artikel . . .	49
Vierter Artikel . . .	57
Fünfter Artikel . . .	73
Sechster Artikel . . .	94
Ein unscheinbarer Fossilgehäuse, von Paul Kummer . . .	28
Der Sand und dessen Herkunft, von Heinrich Gitzard . . .	
Erster Artikel . . .	31
Zweiter Artikel . . .	44
Dritter Artikel . . .	62
Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, von K. Müller . . .	
Erster Artikel . . .	33
Zweiter Artikel . . .	41
Dritter Artikel . . .	59
Vierter Artikel . . .	75
Fünfter Artikel . . .	81
Was man von der Sonne weiß. Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Beobachtungen während der totalen Sonnenfinsternis am 18. Aug. 1808, von Herrn. J. Klein . . .	
Erster Artikel . . .	36
Zweiter Artikel . . .	55
Dritter Artikel . . .	65
Vierter Artikel . . .	78

Fünfter Artikel . . .	S. 102
Sechster Artikel . . .	118
Der Wassereinsbruch von Biellegla, von Franz Adler v. Widenot . . .	51
Vergleichung des Sommers von 1808 mit den Sommern von 1842, 1846, 1857, 1859, 1865 in Berlin, von Ph. Wolfer . . .	69
Bakers Reisebericht, von K. Müller . . .	
Erster Artikel . . .	89
Zweiter Artikel . . .	97
Dritter Artikel . . .	110
Vierter Artikel . . .	113
Die Entdeckung Grönlands, von D. Me . . .	
Erster Artikel . . .	100
Zweiter Artikel . . .	105
Auch ein Frühlingsbote, naturgeschichtliche Skizze, von B. Hausmann . . .	108
Kalium und seine Feste, von B. Waldbrühl . . .	
Erster Artikel . . .	116
Zweiter Artikel . . .	123
Die Leuchtstärke der Gesteine, von D. Me . . .	121
Die Elfen, von Ph. Wittgen . . .	
Erster Artikel . . .	129
Zweiter Artikel . . .	134
Dritter Artikel . . .	158
Vierter Artikel . . .	164
Fünfter Artikel . . .	182
Der Schlaf, von K. Müller . . .	129
Beiträge zur Naturgeschichte des Rothbühlchens, von B. Hausmann . . .	132
Ziff. Cullen's Regel im Pflanzenreiche. Eine Skizze nach alten Quellen, von Ernst Krause . . .	
Erster Artikel . . .	137
Zweiter Artikel . . .	148
Die zweite deutsche Nordfahrt, von D. Me . . .	140
Der Elton-See in Rußland, von G. Schmölling . . .	142
Das deutsche Salzland, von K. Müller . . .	
1. Allgemeine Charakteristik des Salzlandes . . .	145
2. Die Einzelpunkte des Salzlandes . . .	153
3. Die Grundbestandtheile der Salzkör . . .	161
4. Geschichte und Leben der Salzkör . . .	177
5. Vergleichende Phytognomik der Salzpflanzen . . .	196
Die Thranen, von D. Me . . .	156
Ueber die Natur der Arbeit. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Menschen, von M. G. Granjean . . .	
Erster Artikel . . .	107
Zweiter Artikel . . .	174

Der hundertjährige Geburtstag Al. v. Humboldt's, von D. Ull.	S. 169
Die Kahlmeise, von Harrer A. Müller von Alföld	— 171
Die Erdbeben, ihre Erscheinungen und ihre Erklärungsversuche, von D. Wälschli.	
Erster Artikel	— 180
Zweiter Artikel	— 189
Dritter Artikel	— 207
Vierter Artikel	— 214
Die Ausrüstung der zweiten deutschen Nordpolar-expedition, von D. Ull.	
Erster Artikel	— 185
Zweiter Artikel	— 193
Die Wildkatze, von Harrer A. Müller von Alföld.	
Erster Artikel	— 187
Zweiter Artikel	— 198
Die Wachspflanzen, von A. Müller.	
Erster Artikel	— 201
Zweiter Artikel	— 209
Dritter Artikel	— 220
Karl Klaus v. D. Dedens Reisen in Ostafrika, von D. Ull.	— 204
Die Schädeltheorie, von Rich. Kugel.	
Erster Artikel	— 212
Zweiter Artikel	— 227
Dritter Artikel	— 236
Die eldenburgischen Dreihäulen, von G. Hnab.	
Erster Artikel	— 217
Zweiter Artikel	— 230
Dritter Artikel	— 239
Bilder am Nordpol, von Otto Ull.	
Erster Artikel	— 225
Zweiter Artikel	— 344
Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller.	
1. Pflanzenformen der arktischen Zone	— 233
2. Die arktische und die alpine Flor	— 249
3. Die Wälder bildenden Holzgewächse	— 260
4. Die Solzpflanzen der baumlosen Flächen	— 273
5. Die arktischen Steppen	— 290
6. Die Gras- und Kräuterbede.	
Erster Artikel	— 297
Zweiter Artikel	— 306
7. Die Moos- und Flechtensteppe	— 318
8. Das Grieschen des Pflanzenlebens in senkrechter Richtung	— 329
9. Die Charakterveränderungen im Pflanzenreich.	
Erster Artikel	— 337
Zweiter Artikel	— 345
10. Der arktische Sommer	— 353
11. Die arktischen Kugelpflanzen	— 363
12. Die arktischen Kulturpflanzen	— 369
13. Der arktische Mensch	— 385
Die Farbe des Wassers. Nach dem Holländischen des Dr. Hedderman, von Hermann Meier	— 241
Das Kleid der Helsen, von Paul Sumner.	
Erster Artikel	— 217
Zweiter Artikel	— 252
Das Klima Nordamerikas mit dem Europa's verglichen, von Wolf Ull.	
Erster Artikel	— 254
Zweiter Artikel	— 265
Dritter Artikel	— 281

Dem Montefosa zum Rentkianc, von D. Ull.	
1. Aus der Wogelschau	S. 258
2. Vom Bodenfer zum Ballis	— 268
3. Ballis und das Stöpsel	— 276
4. Jernatt	— 284
5. Uebergang über den St. Theodorvoss	— 300
6. Das Thal von Balleurmande	— 316
7. Das Kollatol	— 324
8. Den Gollatol zum Fuß des Rentkianc	— 339
9. Die Rentkianc-Gruppe	— 356
10. Der Rent Fretts	— 371
11. Der Gel du Gant und seine Schneefelder	— 380
12. Giescher, Firm und Fodell	— 401
13. Eine Wanderung durch die Seracs des Mer de Glace	— 412
Ein Liebling der Heinschneider, von Georg Stier.	
Erster Artikel	— 271
Zweiter Artikel	— 287
Die Befruchtung der Blüten unter Vermittelung der Insekten, von Ludwig Meier	— 293
Der Farbenwechsel bei den Pflanzen, von G. Meier	— 303
Salzmaß und Urie, von G. Meier	— 308
Die nassauische Dillgegend, von A. Kub	— 311
Eine wunderliche Verbstiller, von Paul Sumner.	
Erster Artikel	— 313
Zweiter Artikel	— 325
Die Kugeltier der Thiere, von A. Schmelting.	
Erster Artikel	— 321
Zweiter Artikel	— 333
Dritter Artikel	— 342
Bilder aus Griechenland, von D. Kund.	
Die Insel Rhodene	— 335
Meinien.	
Erster Artikel	— 351
Zweiter Artikel	— 359
Geschichte der Steinkohlen, von Rudolph Rühner.	
Erster Artikel	— 347
Zweiter Artikel	— 366
Das „Wellend“ vom Standpunkt der Naturwissenschaft, von Aug. Bödel	— 349
Beitrag zur Quellenkunde, von M. G. Grandjean.	
Erster Artikel	— 391
Zweiter Artikel	— 399
Dritter Artikel	— 388
Das Gärtingen, nach dem Dänischen des Axel Ved, von Hermann Meier.	
Erster Artikel	— 374
Zweiter Artikel	— 382
Meine Schilferente, von Michael Schäfer	— 390
Die Hügelplanzung, von A. Müller	— 393
Der erste Schmerzentag, von Harrer A. Müller von Alföld	— 395
Nicolaus Gusanov, von M. G. Grandjean	— 398
Der Vulkan von Gelima in Mexico, von E. Hahn	— 404
Auch eine Plage, von Paul Sumner	— 406
Ein rechter Bitterungs-Kalender, von Heinrich Feder	— 409
Einladung, gerichtet an die Lehrer der Mathematik und Naturwissenschaften etc.	S. 145
Am hundertjährigen Geburtstage Alexanders. Humboldt's	— 289
Humboldtverein für Volkshilf.	— 296

## Kleinere Mittheilungen

Kater und Sperling . . . . .	S. 24
Verbrauch von Streichgünderbüchern . . . . .	— 24
Das Erdbeben am 13. Jan. d. J. . . . .	— 47
Luther und Copernicus . . . . .	— 48
Giftigkeit des Feuerfalamanders . . . . .	— 64
Können Regier weiß werden? . . . . .	— 72
Muthmaßungen über die Entstehung von Ringwällen an Basaltbergen . . . . .	— 88
Ein zweites Erdbeben in Darmstadt . . . . .	— 88
Der Blumenmarkt des Grevengartens im Winter . . . . .	— 145
Schwarze Ameisen in Afrika . . . . .	— 232
Stendensierte Milch . . . . .	— 232
Die Literatur auf zoologischem Gebiete . . . . .	— 375
Zwei Sonntage in einer Woche . . . . .	— 376

## Literaturberichte.

Germania von Cornelius, übersetzt von H. Bac- meister . . . . .	S. 96
Die Notabilitäten der Thierwelt, von B. Ahlers . . . . .	— 104
Jahrbuch des Österreichischen Alpenvereins, 4. Bd. . . . .	— 136
Jahresbericht über die Fortschritte der gesamm- ten Landwirthschaft u. des J. 1867, von Dr. Wiliam Roede . . . . .	— 152

Der Weltverkehr und seine Mittel, im Verlag von Otto Spamer . . . . .	S. 192
Excursionsflora für das südwestliche Deutsch- land, von Dr. Moritz Seubert . . . . .	— 200
Taschenflora von Leipzig, von Otto Kunze . . . . .	— 200
Flora von Berlin, bearbeitet von B. Ledebur . . . . .	— 200
Anleitung zum rationalen Anbau der Han- delsgewächse, von B. Roede . . . . .	— 223
Der rationelle Betrieb der Milchwirthschaft mit Einfluß der Butter- und Käsefabrikation, von Max Böttger . . . . .	— 224
Naturgeschichte der einheimischen Käfer, von Wilhelm v. Freiden . . . . .	— 224
Reisen in den schindischen Archipel in den Jahren 1865 und 1866 von Albert S. Salmore . . . . .	— 279
Alexander von Humboldt, Biographie für alle Völ- ker der Erde, von Otto Ale . . . . .	— 280
Der naturwissenschaftliche Unterricht in Bürger-, Mittels- und höheren Lehrerschulen, von G. Baerniz . . . . .	— 295
Aus allen Welttheilen. Illustriertes Familienblatt für Kinder- und Volkserkunde, redigirt von Dr. Otto Delitzsch . . . . .	— 392

Literarische Anzeigen S. 16, 40, 64, 96, 120, 136, 176,  
192, 218, 264, 295, 336, 344, 376, 384, 400.



## Verzeichniß der größeren Illustrationen.

Der Hamster ( <i>Cricetus frumentarius</i> ) . . . . .	S. 5	Die Bildhage . . . . .	S. 188
Querschnitte des Bergbau's auf Bernsteinspinner in der Braunkohlenformation des Samlandes . . . . .	— 13	Strandbild von der Insel Langibar . . . . .	— 205
Karte der Verbreitung des Tertiärgebirges in der Provinz Preußen . . . . .	— 28	Die Wachspalme ( <i>Ceroxylon andicola</i> ) . . . . .	— 221
Karten für die Sichtbarkeit des Venusdurchganges in den Jahren 1874 und 1882 . . . . .	— 37	Durchschnitt eines menschlichen Schädels . . . . .	— 229
Geologische Skizze des Mont Salsève . . . . .	— 52	Durchschnitt eines Biberhäutels . . . . .	— 229
Profil der Salzablagerung bei Mielitzka . . . . .	— 53	Siegelbäume (Sigillarien) und Schuppenbäume (Pecopteriden) der Steinkohlenzeit . . . . .	— 245
Graphische Darstellung des Verlaufes der Temperatur wäh- rend der Sommer von 1842, 1846, 1857, 1859, 1865 und 1868 . . . . .	— 69	Flechten . . . . .	— 253
Recessionspilen des Diluviums in Westpreußen . . . . .	— 85 u. 87	Der Montrose, von Gressoney aus gesehen . . . . .	— 285
Karte der Hunderte der Diluvialfauna Westpreußens . . . . .	— 87	Das Thal von Valtournanche und das Matterhorn . . . . .	— 301
Der Pirol oder die Goldamsel ( <i>Oriolus galbula</i> ) . . . . .	— 108	Blüthen und Früchte des Haselstrauchs . . . . .	— 309
Die Wollen- oder Blutlaus . . . . .	— 125	Der Wasserfall der Doire bei Pré-Saint-Dizier . . . . .	— 325
Der Rothfußfalk ( <i>Falco rustipes</i> ) . . . . .	— 123	Die Montblanc-Kette, von Pré-Saint-Dizier aus gesehen . . . . .	— 341
Grundriß des Dampfers „Germania“, des Schiffes der zweiten deutschen Nordfahrt . . . . .	— 141	Karte des Mer de glace und der Hirnmulden auf der Höhe des Montblanc . . . . .	— 357
Die Augenlider mit der Thränenendrüse . . . . .	— 157	Querschnitt des Uebergangs über den Col du Géant und das Mer de glace . . . . .	— 372
Die Thränenwege des Auges . . . . .	— 157	Die Waldschnepfe ( <i>Scolopax rusticola</i> ) . . . . .	— 397
Die Fint- oder Rohlmeise ( <i>Parus major</i> ) . . . . .	— 173	Der Vulkan von Colima in Mexico während seines Aus- bruchs im Sommer d. J. . . . .	— 405
		Serac des Glacier du Géant . . . . .	— 413



# Die Natur

Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Bereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ue und Dr. Karl Müller von Halle.

**M 1.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, S. Schwesche'scher Verlag.

**6. Januar 1869.**

**Inhalt:** Ein Wiederaufleben nach dem Tode, von Otto Ue. — Der Hamster, von Pfarrer Karl Müller. — Das Migrations-Gesetz der Organismen, von Karl Müller.

## Ein Wiederaufleben nach dem Tode.

Von Otto Ue.

Leben und Tod! Das sind die alltäglichsten und doch auch die furchtbarsten aller Gegenstände, welche uns die Erscheinungswelt überhaupt bietet. Die ganze Welt baut sich aus ihnen auf, jeden Tag und jede Stunde führt uns die Natur ihre Kämpfe vor Augen; die reinste Freude und der tiefste Schmerz entquillt uns aus ihrem ungelösten Widerspruch. Sie sind so furchtbar, daß, wenn nicht die Erfahrung uns mit ihnen so vertraut gemacht hätte, wie sie nimmermehr glauben würden. Das Kind faßt sie in der That noch nicht. Wenn es zum ersten Male einen lebenden Menschen von der Hand des Todes getroffen sieht, da meint es, er schlafe nur ruhig. Es kann nicht glauben, daß der Mensch, der noch ebenso von Liebe, von Hoffnung, von Streben erfüllt war, nun eine träge, unempfindliche, unbesetzte Masse sein solle, es will nicht glauben, daß dies Herz nun für ewig still stehen solle. Es ist gewiß die gewaltigste Erschütterung, die der Mensch in seinem ganzen Leben er-

fährt, wenn er zum ersten Mal an ein Todtenbett tritt. Wie das Kind, sträubt sich auch die Menschheit vor der Anerkennung jener furchtbaren Gegenstände. Um ihre Schrecken zu mildern oder ganz zu verschuchen, erfindet sich das einfache Naturvolk kindliche Träume von einem jenseitigen Leben, in welchem es ihm gestattet sei, die Kämpfe und Gesnisse des irdischen Lebens fortzusetzen; und um wenigstens sein geistiges Ich aus diesem Kampfe zu retten, schafft sich der denkwohnende Philosoph eine Unsterblichkeitslehre, für die er die Beweise doch nirgendwo als in der eignen Brust findet.

Tod und Leben sind aber nicht bloß furchtbare Gegenstände, sie sind auch die tiefsten Mysterien der Natur. Wer vermöchte die Grenze zwischen ihnen zu ziehen, wer zu sagen: hier endet das Eine, und hier beginnt der Andere? Nicht einmal das Aufhören aller Lebensthätigkeiten kann immer als sicheres Zeichen des Todes gelten. Es gibt bei-

kanntlich ein Mittel, Menschen in einen todesähnlichen Schlaf zu versetzen, in dem sie nicht bloß aller Bewinnung, sondern auch aller Empfindung beraubt sind. Es ist das bekannte Chloroform, eine durch Destillation von Alkohol mit Chlorkalk und Wasser gewonnene, farblose, leichtbewegliche und obstrakt riechende Flüssigkeit, die schon bei geringer Temperatur verdunstet. Die Einathmung weniger Tropfen dieser Flüssigkeit, die auf einem vor den Mund gehaltenen Tuche oder Schwamme verduftet, genügt, das noch eben vom wildesten Schmerz krampfhaft aufgeschüttelte Leben zu einer Ruhe herabzukommen, die dem Tode gleicht, und die dem Arzte gestattet, Operationen an dem Schlafenden auszuführen, von dem derselbe so wenig empfindet, wie der Leichnam von dem Messer des Anatomen. Aber gerade die täuschende Aehnlichkeit dieses Zustandes mit dem Tode war in der ersten Zeit, wo man noch wenig Erfahrungen über den Gebrauch dieses Mittels besaß, die Veranlassung, daß gar manchem Patienten der Chloroformschlaf zum ewigen wurde, und Mancher auch ohne die Operation von allen irdischen Leiden befreit wurde. Es gibt noch einen andern Zustand, in welchem das Leben vollkommen den Schein des Todes angenommen hat, das ist der Scheintode. Bis in die neueste Zeit hat es nicht an Fällen gefehlt, wo Menschen lebendig begraben wurden, weil sie durchaus kein Zeichen des Lebens mehr gaben. So ungewisshalt fest steht, daß wenigstens bei Menschen und höheren Thieren ein wirkliches Aufhören der Circulation, wenn es länger an dauert, als Zeichen des Todes betrachtet werden muß, so lassen uns doch dem Scheintode gegenüber alle gewöhnlichen Mittel, um festzustellen, ob das Herz wirklich aufgehört hat zu schlagen und die Lungen zu athmen, im Stich. Nicht der schwächste Puls ist am Handgelenk, am Schläfe oder an der Brust zu entdecken. Wir können einen blanken Spiegel vor den Mund halten, und er wird nicht anlaufen; wir können eine Flamme davor halten, sie wird nicht flackern; wir können leichte Fäden oder Flaumfedern auf die Lippen legen, sie werden sich nicht bewegen; und doch ist der Patient noch am Leben. Nur mit Hilfe des Stethoskops kann man die Circulation noch hören, wenn sie durch kein anderes Mittel mehr nachgewiesen werden kann. Die Auscultation also in Verbindung mit der Todtenstarre dürfte das einzige untrügliche Zeichen des vorhandenen Todes sein, und wo diese nicht angewandt werden kann, da wird man den Tod erst zu erkennen vermögen, wenn sein Werk der Zerkörung, die Fäulniß, begonnen hat.

So wenig aber immer das Leben wirklich erloschen sein muß, wo die äußeren Lebensthätigkeiten fehlen, ebenso wenig tritt der Tod immer nothwendig ein, wenn einem lebenden Wesen die Bedingungen des Lebens, die Athemluft, die Wärme oder die Nahrung, entzogen werden. Allerdings stirbt der Mensch, der nicht mehr zu athmen vermag; er erstickt im Kohlendampf, wie im Wasser. Auch der Fisch stirbt, plötzlich oder nach längerer Zeit, wenn er aus dem

Wasser gezogen wird. Aber es gibt Wesen, die unter ähnlichen Umständen zwar den Schein des Todes annehmen, aber zum Leben wieder erweckt werden können, wenn man ihnen die Bedingungen des Lebens wieder zurückgibt. Ob Kröten, bittiger Kälte ausgesetzt, vollständig gefrieren und trotz der Erstickung aller ihrer Säfte doch nicht todt sein, sondern bei vorsichtiger Erwärmung wieder zum Leben zurückkehren können, wie noch neuerdings die Berichte der Pariser Academie behaupten, wollen wir dahingestellt sein lassen. Daß Kröten im Innern von Steinen Jahrhunderte lang lebensfähig bleiben sollen, mag zu den Fabeln der wunderthätigen Vorzeit geworfen werden. Auch das Weizenkörner, die in den ägyptischen Gräbern gefunden wurden, nach dreitausend Jahren noch in dem Boden Frankreichs keimten und zu lustigen Pflanzungen emporwuchsen, mag glauben, wer Lust hat. Wunderbar genug ist es schon, daß die Samen mancher Pflanzen, trocken aufbewahrt, 20 Jahre und länger ihre Keimkraft behaupten können. Die merkwürdigsten Thatfachen aber liefert uns die Lebenswelt des Unsichtbarkeinen. Hier gibt es eine ganze Reihe von Geschöpfen, die nicht einmal zu den niedrigsten gehören, die, ihres Lebenselements beraubt, scheinbar wie alle andern dem Tode verfallen, aus diesem Tode aber gleichwohl selbst nach Jahren noch wieder auferstehen können.

Die mikroskopische Lebenswelt ist, seit das Mikroskop fast zu einem Kinderpielzeug geworden, Niemandem mehr verschlossen. Jeder wird darum auch die kleinen Wesen aufsuchen können, die in der Dachrinne seines Hauses ihr leid- und freudereiches Leben führen. Das unbewaffnete Auge wird freilich im Staube dieser Dachrinnen nicht das geringste Zeichen von Leben wahrnehmen. Aber wenn man diesen Staub in ein Schälchen mit Wasser schüttet und einige Stunden später einen Tropfen dieses Wassers unter dem Mikroskop betrachtet, so wird man sehr bald einige durchscheinende, gallertartige Wesen erblicken, die sich auf eine eigenthümliche Weise fortbewegen. Das eine dieser Thierchen, das einen schwachgestreiften, spinselförmigen Körper hat, hält sich mittelst eines kleinen Dreijacks fest und schiebt sich wie ein Blutegel vorwärts, indem es sich abwechselnd zusammenzieht und wieder ausstreckt. Es führt diese Bewegungen mit solcher Schnelligkeit aus, daß es in kurzer Zeit das ganze Gesichtsfeld des Mikroskops durchläuft. Jetzt sehen wir es sich wieder mit seinem dreispaltigen Schwefel festhalten und nun den Kopf rechts und links wenden, sich ausdehnen und zusammenziehen, ohne sich von der Stelle zu bewegen, als ob es noch überlege, wohin es sich wenden soll. Da spaltet sich plötzlich vor unsern Augen der vordere Theil des Körpers in zwei Lappen, die mit ganzem Wimpernfaden besetzt sind, welche bald eingezogen, bald zu einem festsamen Spiele entfaltet werden können. Die Bewegung dieser bewimperten Lappen gleicht nämlich fast der von zwei gegabten Rädern und erzeugt eine beständige Strömung in dem Wasser, die das Thierchen dahin führt.

wohin es gelangen will. Jetzt erst enthüllt sich der wahre Charakter dieses Thieres als eines der furchtbarsten Raubthiere in der kleinen Welt des Wassertropfens. Wild schießt es nach allen Seiten umher; plötzlich macht es Halt und verschlingt nun eine Menge von kleinen Insekten, die man bei der Durchsichtigkeit seines glasheilen Körpers bis in die Magenöhle verfolgen kann.

Diese merkwürdigen Thierchen, die von ihren eigenrühmlichen Käderorganen den Namen der Käderthierchen (Kolatoria) erhalten haben, wurden gegen das Ende des 17. Jahrhunderts zuerst von dem berühmten *Leuwenhoek* entdeckt. Jetzt kennt man bereits gegen 180 verschiedene Arten derselben, die außer im Staube der Dachrinnen auch in der feuchten Gartenerde und in den Mooskissen am Fuße der Bäume leben. Sie sind es nun, welche und die interessante Erscheinung eines Wiederauflebens nach dem Tode bieten. Wenn das Wasser verdunstet ist, sehen wir das Thierchen wie jedes andre zusammenzutrocknen. Es runzelt sich, verliert seine Gestalt und sieht nun wie eine kleine vertrocknete Blase oder Hautschuppe aus. Man sollte es in der That für todt halten. Aber schon der erste Entdecker sah dieses eingetrocknete Thierchen nach 2 Jahren wiederaufleben, wenn er es befeuchtete. *Spallanzani* hat neuerdings diese Wiederbelebungsversuche wiederholt. Ihm ist es gelungen, selbst nach 4 Jahren noch eingetrocknete Käderthierchen wieder zu beleben, besonders wenn außer dem Wasser auch Sand zugegen war. Er hat sogar an einem und demselben Thiere das Austrocknen und Wiederaufleben 16 Mal wiederholt. Manche Thierchen erwachten schon wenige Minuten nach der Befeuchtung des Sandes wieder zum Leben, andre brauchten dazu mehr als eine Stunde.

Aber nicht der einzige Bewohner jenes Dachrinnenflaubes ist dieses Käderthierchen, noch andre wird auch das Mikroskop kennen lehren. Unser besondere Aufmerksamkeit wird ein gelbliches, dickleibiges Thier erregen, das sogar 3—4 Mal das Käderthierchen an Größe übertrefft, und dessen 8 kurze Beine mit kleinen, krummen und wie Eisenbleim glänzenden Krallen besetzt sind. Es hat keine Käder wie das Käderthierchen, benutzt auch nicht einmal seine Krallen um sich festzuhalten, schwimmt auch nicht, sondern schleppt sich träge und schwerfällig wie ein Bär oder eine Schildkröte auf dem Sande fort. Man hat es darum Rangsamerkreiter oder Wasserdräcker (*Tardigradus*) genannt. Trotzdem dieses

Thier zu einer ziemlich hoch organisirten Gruppe der Thierwelt, nämlich zu der der Spinnenthiere gehört, zeigt es doch ebenso wie das kleine Käderthierchen die Erscheinung eines Wiederauflebens nach scheinbarem Tode. Wenn das Wasser verdunstet, werden wir seine Bewegungen langsamer werden und allmählig ganz aufhören sehen. Die Beine gleiten sich in den Körper zurück, das Thier trocknet aus und gleicht nun fast einer unbeweglichen, zu einer Kugel zusammengekrüppelten Kellerschale. Aber das Leben ist in dem Thiere nicht erloschen, es erwacht, sobald wir es wieder befeuchten. In der Natur wiederholt sich sogar, wenigstens in der schönen Jahreszeit, an diesem Thiere allmählig dieser Wechsel von Tod und Leben. Der Thau des Morgens erweckt es aus seiner Todesstarre, und lange vor dem Abend ist es schon wieder in sein Staugrab in der Dachrinne zurückgekehrt.

Nach einem dritten seltsamen Bewohner jenes Staubes zeigt uns wiederum das Wassertropfen unter dem Mikroskop. Es ist ein kleines langgestrecktes Wesen mit durchsichtigem, faserartig glänzendem Leibe und gekrümmtem, mit scharfer Spitze endendem Schwanz, das sich schlängelt und windet wie ein Kal. Dieses Thierchen, das von seiner schlängelnden Bewegung den Namen Nälchen (*Anguillula*) erhalten hat, und das sich übrigens auch im Brände des Getreides und der Karbe, im Eßig und im Brodtzigen, können wir ebenfalls beliebig sterben und wiederaufleben lassen. Im völlig ausgetrockneten Sande sieht man die Thierchen spiralförmig nach Art der Schlangen zusammengekrüppelt. Befeuchtet man den Sand, so fangen sie langsam an zuerst den Schwanz, dann den Kopf, endlich den übrigen Leib zu bewegen. Das Leben hat seine Herrschaft wieder gewonnen.

Allerdings ist in allen diesen Fällen der Tod, aus dem ein Erwachen stattfindet, nur ein scheinbarer. Aber wo ist hier die Grenze zwischen Leben und Tod? Der Körper dieser Thiere war zur Mumie vertrocknet, Zerknähung ruhten alle Lebensthätigkeiten, und doch vermochten Jahre das Leben nicht zu vernichten, es kehrte zurück mit den Lebensbedingungen. Das Ueberwakt war gleichsam nur abgelaufen, es konnte wieder aufgezogen werden. Aber ein weiteres Jahr, ein weiteres Tag, eine weitere Stunde vielleicht nur, und es gibt kein Wiederaufleben mehr! Der Tod hat seine Herrschaft angetreten. In der That, das Leben ist das tiefste Mysterium der Natur; geheimnißvoll wie sein Ursprung ist auch sein Ende!

## Der Spinner.

Von *Placcr* *Karl Müller*.

Die Margsonne scheint klar und warm auf das Feld, und unter ihrer belebenden Wirkung weben Tausende von Spinnen jene feinen Fäden über das Land, die unser Nestbaukünstler Erdspinne in den Gärten in so reichem Maße zum Bauen verwenden. Die Lerchenmännchen schweben zum Theil unter dem blauen Himmelsgewölbe und wetteifern

stöhnend, trillernd und wirbelnd im Gesang, zum Theil schäkern sie mit den Weibchen oder zanken mit den Nebenbuhlern. Eben kehrt eine singende Lerche von ihrer Himmlerei zurück und kürzt sich in das zarte Grün der aufstrebenden Saat. Auf einem Hügel frischer Erde hat sie sich niedergesetzt; im Feuer der Lust und Liebe sträubt sie


die Tolle, und beim Anblick des in ihrer Nähe weilenden piependen Weibchens hält sie die Schwingen vom Leibe und richtet die stolz gewölbte Brust empor. Pöflich erschreckt sie, flattert ein wenig in die Höhe und setzt sich einige Fuß weiter mit glatt angelegtem Schieber und hochgehobenem Köpfchen seitwärts auf eine Scholle. Am Hügel regt sich's, und siehe, immer deutlicher tritt der Kopf eines Hamsters hervor, der die Umgebung witternd prüft und endlich ganz aus der Tiefe heraussteigt, sich mehrmals den Pelz derb schütternd. Doch fühlt sich der erst gefressen an die Oberwelt emporgebrungene Winterschläfer noch keineswegs vollkommen sicher. Die neugierig und raubbogelartig über ihm flatternde Lerche ist ihm keine willkommenen Erscheinung, weil er lieber unbemerkt die sich verjüngende Oberwelt betreten möchte. Deshalb hebt er sich, auf die Hinterterschenkel gestützt, mit ziemlich krumm gehaltenem Rücken und lose herabhängenden Vorderfüßen, von denen der eine merklich höher aufgerichtet ist, als der andere, und prüft nochmals die Umgebung in weiterem Umkreis. Kein Feind läßt sich hören und sehen. Unser Hamster fühlt sich nun sicher und behaglich. Wie mag die milde, frische Luft ihm so wohl thun, nachdem er monatelang der Ketterluft in der Tiefe geathmet, wie zwinkert und blinzelt er mit den Augen, in die der grelle Schein der Sonne vom Himmel und der blendende Glanz der beleuchteten Erdoberfläche fällt! Dieser schöne, helle, jedes Fledchen am sonst so fäuerlich gehaltenen Pelz zeigende Tag lobet den eigenfinnigen, Ordnung und Reinlichkeit liebenden Nager zum beliebten Puzgeschäfte ein. Die Vorderpfoten greifen bis zu den Muschelohren zurück und fahren von da mehrmals über das Gesicht hin, und nachdem dieses gehörig durchgeseigt und geglättet worden, übernimmt die Zunge die Reinigung der reichbaren Pelztheile, ja selbst die Zähne dienen an wirren Stellen als Kamm. Nach vollzogener Reinigung wird nochmals scharf geschert, dann sinkt der Vorderleib langsam zur Erde herab, auf welcher der Bauch schlappend niederbängt und das kurze, kegelförmig zugespitzte Schwänzchen nachschleift. So schreitet der dreck und plump gebaute Bewohner der Flur dahin, die übrigen gieriichen Füße in regelmäßigem Schritt vor einander legend. Mit süßlichem Wohlgeschmack verzehrt er junge Pflänzchen, benagt er die junge Saat; oder er durchwandert die Furchen der frisch besäten Acker und leift die Körner sorgfältig auf, um sie in den Backentaschen anzusammeln und in den Bau zu tragen, in welchem er schon seit mehreren Wochen von den im Herbst aufgespeicherten Vorräthen gehebt hat. Zufällig kommt ihm eine Maus in die Quere. Schneller, als man seinem Körperbau und Gang nach vermuten sollte, fährt er hüpfend darauf los und greifeft der quickenden Beute den Kopf. Elegante sind freilich diese Sprünge nicht; wie wäre das auch möglich bei so kurzen Beinen und soich schlottendem Leibe? Seine träge Natur läßt ihn den Mäusefang auch gerade nicht häufig betreiben. Kommt ihm ja

doch hier ein Amphibium, dort eine glatte Raupe, da ein Käfer, anderswo ein hüßloser Vogel in den Weg, die er ohne besondere Mühe und List sich aneignen kann, ist ihm doch der Fisch den ganzen Sommer hindurch mit den mannigfaltigen Früchten des Feldes gedeckt!

Mitten in der Mählgelt hat der Behagliche doch seine Vorlicht nicht vergessen. Sein misstrauischer Sinn ist auf den ersten Ausgängen weit reger, als auf späteren, wenn die Saat emporgeschossen ist, und das Dunkel der beragenden Feldgewächse in vielen Fällen Schutz und Zuflucht gewährt. Regungslos hat er sich in der Saat hinter eine Scholle gedrückt, denn dort fliegt in mäßiger Höhe über dem Felde ein Bussard daher, einer seiner gefährlichsten Feinde. Doch glücklich geht die Gefahr vorüber. Sie soll indessen nicht die einzige sein, die ihm auf seinem Frühlingsgange begegnet. Wir wissen nicht, was dem großen Wiesel in den Sinn gekommen, das es ihm drunten im Kanal seine Ruhe ließ, den es sonst nur selten am Tage verläßt. Was treibt das gewandte, geschmeidige, in flinken Bogensätzen längs dem Raine dahineilende Räuberchen an? Jetzt stutzt es und macht ein „Männchen“, dann setzt es die niedlichen Vorderfüßchen auf einen Stein und redt den Hals aus. Flug springt es vom Raine weg in eine Furche gerade dem Bau des Hamsters zu. Auf demselben angekommen, untersucht es mit dem feinen Näschen den Ort, guckt in gestreckter Stellung in den Bau, springt sehr erregt rings um die Röhre herum, verläßt dann eilend wieder die Stätte und verfolgt den Pfad, auf welchem der Hamster vorhin in das Feld gegangen. In der Hast rennt es dicht gegen den Hamster an. Mit hohem Saß prallt es zurück. Der Hamster springt sauchend ebenfalls nahezu zwei Fuß hoch — und nun stehen sich die Todfeinde kampfbereit gegenüber, das Wiesel angriffsflüchtig, der Hamster zur Vertheidigung bis aufs Aeußerste gerüstet. Das Wiesel springt zur Rechten und Linken oder gerade über den Hamster weg, um ihn seitwärts oder von hinten anzufallen; dieser dagegen richtet seine Zähne und Krallen je nach den Wendungen des Feindes und sucht das Hintertbeil möglichst dicht unter den Leib zu schieben, um eine kleinee Angelische zu bieten und um so schneller mit dem Vordertheil herumfahren zu können. Der viel gewandtere und ausdauerndere Räuber ermüdet durch seine Kreuz- und Querfrünge den plumpen Nager nach und nach, daß der Sprung in den Nacken oder an den Hals gelingt, und der Hamster, wenn auch nicht ohne manchen abwehrenden Biß angebracht zu haben, unter dem blutdürstigen Wiesel verendet. Kürzere Zeit währt der Kampf, wenn ein solches altes, großes Wiesel einen weiblichen Hamster angreift, der länger im Winterbau als der männliche verweilt und erst zu Anfang des April sein Fallloch öffnet. Aber nicht bloß im Freien stellen ihm dieser Räuber und dessen Vetter, der stärkere Jüde, nach, sondern sie folgen ihm auch unter die Erde, um ihn da zu erwürgen. Zur Zeit der Paarung,

gegen Ende April, nehmen die Vertheidigungskämpfe des Hamsters einen viel hartnäckigeren Charakter an, weil da das Paar ganz friedlich vereinigt ist und ächt gattungspflichtmäßig sich in der Bebrängniß befindet. Aber nur die Liebe ist es, unter deren beherrschender Wirkung der Unfriede der Hamster unter einander schwindet und an die Stelle der bis zum Auffressen sich steigenden Einzel- und Massenraufereien das innigste und zärtlichste Familienleben tritt, welches in seinem harmlosen Fortgang nicht selten nur durch männliche Nebenbuhler unterbrochen wird, die des Gatten Bos-

und knurret die im Herzen erkaltenbe Hausmutter und stößt ihre Kinder von sich, versperrt ihnen den Zugang zur Geburtsstätte und zwingt sie so, auf die Oberwelt verwiesen, dem angeborenen Triebe des Grabens Genüge zu thun und jedes für sich seinen eignen Bau auszuführen. Im Graben aber find schon diese Kleinen rüstig; wie viel mehr noch sind es die Ältern! Die Krallen der Vorderfüße scharren eilig, bei erhöhtem Eifer sogar in raschem Wirbel. Was sich an losgescharrter Erde zwischen Vorder- und Hinterfüßen anhäuft, schleudern letztere weit hinter sich. Ist der



Der Hamster (*Cricetus cramentarius*).

heit und Nordluft wecken. Nach einigen Tagen des friedlichen Verkehrs im Bau des Weibchens tritt der besänftigende Trieb wieder zurück, und der gegenseitige Haß bemächtigt sich beider Geschlechter, ein Haß, der im wahren Sinne des Wortes tödtlich ist, indem das schwächere Weibchen oft unter den Reißhandlungen des Männchens trotz aller heftigen Gegenwehr Leib und Leben lassen muß. Aber auch das Weibchen trägt sich seinerseits zänkisch und herrisch. Anfänglich begt und pflegt es zwar die Jungen mit mütterlicher Sorgfalt; nur darf keine ernstliche Gefahr der Behausung nahen, kein mörderischer Feind in dieselbe eindringen, sonst verläßt es die Kleinen niederträchtig feige, um selbst mit heiler Haut davon zu kommen. Jene Mutterliebe aber währt nicht lange, und wenn einmal die jungen Rager nach Verlauf weniger Wochen die Fruchtbehälter fertig genug zwischen die Pfoten nehmen und zum Wälzchen führen und Löcher in die Erde wühlen können, dann murret

Hamster tiefer in die Erde eingedrungen, so schiebt er das Losgescharrte hausenweise im Rückwärtsgehen heraus. Er arbeitet nach einem gewissen Plane, der von einigem Kunstsinne zeugt und von Zweckmäßigkeitserwägungen in Ausführung gebracht wird. Da ist das Schlupfloch, welches in eine nach der Wohnkammer schräg hinablaufende Röhre führt und dem Hamster nicht nur einen bequemen Ausgang gewährt, sondern auch ein allmähliges vorsichtiges Hervorkommen des Thieres gestattet; 6—9 Fuß davon entfernt ist das Falloch angebracht, das zuerst von oben senkrecht hinabgeht, dann schräge und zuletzt bis zur wahren rechten Richtung verläuft. Bei plötzlicher Ueberraschung durch feindliche Angriffe läßt er sich da hineinfallen, wenn er keine Zeit gewinnen kann, das Schlupfloch zu erreichen. In der Tiefe liegt die Wohnkammer, deren Wände geglättet sind, und deren Boden mit feinem Stroh ausgepolstert ist. Hier ruht und schläft der Befruchtete. Eine oder mehr



rene Fruchtkammern von eirunder Gestalt stehen durch Röhren mit der Wohnkammer in Verbindung. Sie sind jene Diebstahlschächel, in welchen jenes vorsehlische Thier den Winter vorrath aufspeichert und ihn nicht selten bis zu 60 und mehr Pfunden anhäuft. In der Nähe des Baues zeigt sich der Hamster gewöhnlich mutthiger und angriffslustiger als von ihm entfernt. Beim Anblick verdächtiger Erscheinungen läßt er sich zwar eilig in das Fall- oder Schlupfloch nieder; aber es kommt auch öfters vor, daß er sich vor der Röhre fauchend gegen Menschen und Hunde zur Wehre setzt. Als Knaben sind uns die Hamster in Feldgärten unserer Heimat wüthend nach den Brinen gefahren, wenn wir uns ihren Bauren näherten. Sie marschirten uns gerade entgegen und waren gewohnt, uns in die Flucht zu schlagen. Großer Schrecken ergriß sie aber stets, wenn sich ein Raubvogel zeigte oder von den lärmenden Bachstelzen in der Luft und den sich in die Hecken stürzenden Sperlingen angezeigt wurde. Entweder eilten sie unter die Erde oder sie verbarren sich irgendwo über der Erde.

Die Gleichwege, welche durch das Getreide, den Flach und die Erbsen sich hinfchlingen und immer breiter erweiterten werden, sind Zeugnisse der täglich sich wiederholenden Diebstehlen. Bis zu 6 Loth Gewicht vermag der Hamster den Vorrath in seinen Baustellen anzuhäufen. Die Aebere oder Schote gleitet, von den Pfoten zum Munde geführt, durch die Zähne, wird ein paar Mal hin und her gedreht und allemal in die Tasche zur Rechten oder Linken ausgelieert.

## Das Migrations-Gesetz der Organismen.

Von Karl Müller.

Unter dem Namen der Ueberschrift hat kürzlich Moritz Wagner, der bekannte Münchner Reisende, in einer eianen Schrift ein Gesetz zu begründen gesucht, welches, nach den Intentionen des Urhebers, eine wesentliche Lücke der Darwin'schen Schöpfungstheorie ausfüllen soll. Wagner sagt mit Recht von derselben, daß sie weder die äußeren noch innern Ursachen erkläre, nach denen eine Art variirte und die gewonnenen neuen Eigenschaften dauernd festhalte. Diese Ursachen glaubt er nun darin gefunden zu haben, daß die Art auszuwandere und durch Auswahl einer geeigneten Heimat, in welcher sie isolirte Colonien bilde, sich für immer die Mittel zur Abart und zur Entwicklung derselben sichere. Doch ist er ebrlich genug zu sagen, daß bezüglich selbst Darwin in diesem Punkte von ihm abweiche, obson derselbe viele Schwierigkeiten und Einwürfe gegen seine Transmutationslehre durch das sogenannte Migrations-Gesetz beseitigt glaube. Da dieses Gesetz sich auf eine große Reihe von theilweise höchst interessanten Thatsachen stützt, so wiew es nicht verfehlen, den Anhängern Darwin's — und die Beweise liegen schon vor — einen

Schwer beladen wandelt er dann seinem Bau zu, den er den ganzen Sommer über mit Erbsen, Leinsamen, Korn, Weizen und andern Hülsen- und Getreidefrüchten versieht, während das Weibchen erst nach dem zweiten „Wurf“ sich bereit, den nöthigen Vorrath einzutragen. So geht es fort bis zum October. Die Felder stehen leer, und der Wind segt rauh über die Stoppeln. Die Zeit der Einkehr in die Winterbehausung ist gekommen. Eines Tages nimmt der Hamster für dieses Jahr Abschied von der Oberwelt. Er verschließt den Eingang zu seiner Behausung mit Erde, welche er von der Kammer aus in dichten Massen bis zum Rande des Loches anhäuft, und verammelt den Zugang durch das Fallloch auf gleiche Weise, jedoch von innen. In der Vorrathskammer fällt er sich noch gehörig den Bauch, und in der Schlafkammer legt er sich auf seinem Polster auf die Seite, rollt sich zusammen, so daß der Kopf zwischen den Hinterbeinen ruht und verfällt nun dem Winterschlaf. Doch wird aus manchem kaum begonnenen Winterschlaf ein ewiger, denn der erzürnte Bauer zieht mit Hacke und Schaufel zu Felde und bricht in die Räuberhöhle ein, wo er die Früchte seines Fleißes je nach der Zeit des Einsammelns an einander gereiht und auf dem Fußtritt den wohlthätigen Räuber selbst findet. Einige Schläge auf die Stirn tödten den Schläfer und rächen an ihm die Unthaten des Sommers. Die Schaufel aber hebt gefächelt die unterirdischen Schätze heraus und fülle den Sack des pfiffigen Bäuerleins, das zuletzt dem getödteten Hamster auch noch den brennen Rock auszieht, um ihn zu vermerthen.

neuen Anhalt zu bieten. Ich halte es darum für geboten, auch unsern Lesern kurz und bündig mitzutheilen, was an diesem Migrations-Gesetze sei.

Schon in den Jahren 1836—1838 beobachtete Wagner auf seiner Reise in Nordafrika eine Menge von Erscheinungen in der Verbreitung der Organismen, welche in auffallender Weise ganz bestimmte Grenzen derselben andeuteten. Einmal darauf aufmerksam geworden, was heutzutage jedem Geographen hinlänglich bekannt ist, fand er, daß eine Menge Käserarten und Schnecken in ihrer Verbreitung scharf durch Flüsse von andern verwandten Arten geschieden werden. In diesem Falle sind es Thiere ohne großes Bewegungsvermögen, und das erklärt hinlänglich die Schroffheit ihrer Grenzen. Das Auffallendste dabei ist, daß die durch Flußthäler getrennten Arten einer und derselben Gattung in der Regel eine große Aehnlichkeit unter sich haben, so daß sie sich an den betreffenden Wohnorten gleichsam vertreten, weshalb man sie auch vicariirende Arten, besser correspondirende genannt hat. Nach solchen Ursachen ist es kein Wunder, wenn ähnliche Erscheinungen

überall vorkommen, wo man darauf geachtet hat. So scheitert die untere Donau eine Menge von Käfern, welche theils nur in der Balachel, theils nur in Bulgarien auftreten; ebenso der Kur, Araxes und Euphrat, besonders auffallend der Asik-Zemal in Kleinasien, und zwar um so mehr, als dieser Fluss ein überaus tiefer und reißender ist. Denn je breiter und reißender ein Strom ist, desto häufiger zeigen sich die Schroffen Grenzen. Diese Schroffenheit bezieht sich aber nur auf die Arten, nicht auf die Gattungen. An beiden Ufern des Missouri, Mississippi und St. Lorenz in Canada tritt eine etwas veränderte Fauna für Krepilien, Spinnen, Käfer und Land Schnecken auf. Es ist bekannt, daß dieses Gesetz auch für die Pflanzen gilt, und auch hier könnte man es von der schwereren Beweglichkeit der sprossenden Organe, der Samen, herleiten, wenn man Wagner in den Ursachen bestimmen will. Nach Sendtner setzt die Donau in Baiern 15 Pflanzenarten eine Nordgrenze, der Lech 7 Arten eine Südgrenze und 7 Arten eine Westgrenze; die Isar bildet die Südgrenze für 1 Art, die Weßgare für 5 Arten; die Traun zieht eine Südgrenze für 5, die Saalach eine Westgrenze für 16 Arten.

Noch viel trennender sind Hochgebirge, und um so mehr, je Schroffer sie sind, je weniger sich ihre Pässe thalgleich einsenken. Darum trennen auch die Pyrenäen schärfer, als die Alpen, wie der Kaukasus mit seiner höheren Kammlinie schärfer trennt, als die Pyrenäen. Es verhält sich aber auch hier, wie an beiden Ufern eines trennenden Stromes; die Organismen welchen an den entgegengesetzten Abhängen des Bergwalles durch vicarierende Arten von einander ab. So erinnert fast jeder Carabus in den Wäldern Grusien am südlichen Fuße des Kaukasus an eine ähnliche Form der Nordseite dieses Gebirges, und diese Arten stehen sich näher, als andere derselben Gattung aus entfernteren Gegenden. Auch die Pflanzen schließen sich diesem Gesetze an. Anderwärts, z. B. im Osten und Westen der Anden von Ecuador, drückt sich dasselbe noch viel schärfer aus, als am Kaukasus. Sobald jedoch der große Gebirgswall Südamerikas an der Landenge von Darien eine so tiefe Einsenkung erreicht, daß die Isthmuscorbiller gänzlich verschwinden, wie das auf der Landenge von Panama der Fall ist, so tauchen im Osten wie im Westen derselben, d. h. sowohl am Atlantischen wie am Stillen Ocean, dieselben Organismen auf. Es ist eben keine Scheidewand da, welche beide entgegengesetzte Punkte der Schöpfung aufeinander zu halten vermöchte.

In dieser Beziehung liefern diejenigen Inseln, welche einem Festlande näher oder ferner liegen, höchst bemerkenswerthe Erscheinungen in der Verbreitung der Organismen. Die Insel Goiba, nur durch einen schmalen Meeresarm vom mittelamerikanischen Isthmus getrennt, zeigt die gleichen Arten, wie dieser, manche aber in auffallenden Spielarten. Umgekehrt überbergen die Galapagosinseln, die

160 geographische Meilen vom amerikanischen Festlande getrennt sind, mit Ausnahme weniger Vögel, fast nur eigenthümliche Thierarten, deren *Opus* aber mit dem amerikanischen, besonders dem chileischen zusammenfällt. Die Inseln, unter sich selbst verglichen, besitzen zwar dieselben Gattungen von Vögeln, Insekten und Land Schnecken, aber in verschiedenen Arten, und diese Arten haben unter sich eine nähere Verwandtschaft, als mit Arten gleicher Gattungen in Chile. Besonders merkwürdig ist das Vorkommen von 13 Finkenarten auf den einzelnen Inseln; denn diese liefern hinsichtlich des Gefieders, sowie der Gestalt und Größe des Schnabels eine ganze Stufenfolge, und diese ist es wahrscheinlich gewesen, die Darwin auf den Gedanken seiner Transmutationslehre brachte. Sicher ist, daß Darwin, nach seinem eignen Geständnisse, den Gedanken der natürlichen Zuchtwahl durch die Betrachtung der Galapagos-Schöpfung gewann, nachdem er dieselbe mehrere Jahre zuvor an Ort und Stelle kennen gelernt hatte. Ebenso besitzt jede der drei Hauptinseln ihre eigenthümliche Spottvögel. Ueberhaupt ist die Galapagos-Archipel einer der interessantesten Schöpfungsheerde, die wir gegenwärtig kennen, und groß würde die Zahl der Beispielen aus beiden Reichen der Natur sein, wenn wir uns hier verführen lassen dürften, die Eigenthümlichkeiten jeder der 10 Inseln besonders auszuwählen.

Ganz ähnliche Erscheinungen beobachtet man auch in der senkrechten Verbreitung der Organismen. Es trifft sich nicht selten, daß in mehreren Regionen aufwärts einzelne Arten sich gegenseitig vertreten. Abgesehen von den Käfern, die Wagner am liebsten zu Beispielen auswählt, bemerkt man dieses Gesetz auch in den höheren Thierklassen. So wohnt z. B. auf den brennend heißen Savannen der Tiefregionen von Nicaragua und Guanacaste eine große Kraitschlange (*Crotalus horridus*), während auf dem Plateau von Cosbarica bei 4000 F. Höhe eine ihr ganz ähnliche, aber kleinere Art erscheint, die hier ihre Vertreterin ist. Für die Alpen könnte man eine Menge derartiger Vertretungen auf den verschiedenen Abflusungen der Gebirge nachweisen. Die einzelnen Regionen verhalten sich darin wie Inseln, die nur durch schmale Meeresarme von dem Festlande getrennt werden. Nirgends scheint das auffallender hervorzutreten, als auf der Doppelreihe der Andeskegel und Vulkane von Quito. Hier, wo dieselben, in Zwischenräumen von 1 bis 4 geogr. Meilen von einander entfernt, als 4 bis 5000 F. hohe Kegele der Hochebene aufgesetzt sind, hier bildet fast jeder dieser Riesenskegel eine Schöpfung für sich; nämlich so, daß, wie auf den Galapagos, jede einzelne Kegelfeile ihre eigenen Arten und Abarten überbergt, die man auf andern Kegeln nicht findet. So wohnen z. B. für die Pflanzenwelt unter den hier gänzlich alpinen *Enzianen* *Geniliana rupicola* und *cespitosa* auf dem Kegele des Antifana und Cotopaxi, fehlen aber dem Chimborazo, der an ihrer Stelle die eigenthümliche dunkel purpurothe

G. cernua besitzt. Diese fehlt wiederum dem benachbarten Vulkan Tuguragua, der seinerseits dafür in gleicher Höhe die blaugroenrothe G. gracilis hat. In derselben Region erscheint auf dem Pichincha eine blaue (G. diffusa). Ebenso ist es mit den Steinbrecharten. Während der Chimborazo über der Schneelinie die Saxifraga Boussingaulti ernährt, tritt auf dem Pichincha in der alpinen Region S. andicola auf. Am häufigsten scheinen diese Vertretungen der Arten in den Felsen der erloschenen oder schwach thätigen Krater stattzufinden.

Ganz analoge Thatsachen beobachtet der Zoolog. Abgesehen von den Insekten und Süßwasserfischen, für welche Wagner Beispiele beibringt, macht sich die Erscheinung höchst bemerkenswerth in der Vogelwelt geltend. Fast jeder der Andeskegel hat seinen eigenthümlichen Kolibri; in jeder Region der Anden treten andere eigenthümliche Gattungen und Arten der Trochiliden auf, welche sich auf eine gewisse Höhenstufe ausschließlich beschränken. So bewohnt Eugenia imperatrix nur die Westseite des Pichincha in der Waldregion von 6000 bis 8000 Pariser Fuß. Einige andere Arten (Lesbia amaryllis, Eriocnemis luciani, Docimastes ensiferus) erscheinen auf demselben Vulkan zwischen 9000 bis 11,000 Fuß. Von 11,500 Fuß tritt eine neue, höchst eigenthümliche Art (Patasophora annas) auf, die bei 13,000 F. verschwindet, um hier dem Oreotrochilus Pichinchae Platz zu machen, der, auf eine Composita des Pichincha (Joannea insignis) angewiesen, bis an die Schneelinie (14,200') reicht. In derselben Region kommt auf dem Chimborazo eine eigenthümliche lokale Abart desselben Kolibri vor, die man von anderer Seite als eigene Art (Oreotrochilus Chimborazo Gouldi) betrachtet.

Im armenischen Hochgebirge, das so viele Verwandtschaft mit den Anden von Quito zeigt, wiederholt sich Aehnliches. So auf dem großen und kleinen Ararat, auf dem Aragbós und auf der vulkanischen Berggruppe am Goktschal-Seu. Jede dieser isolirten Berggruppen besitzt eine oder mehrere Arten von Pflanzen und Thieren, welche ihr eigenthümlich zugehören, während diese auf den benachbarten Vulkanen durch ähnliche Arten ersetzt sind. Wir verzichten auf die weiteren Ausführungen Wagner's, da sie mehr oder minder in allen von ihm bereisten Ländern Gleiches oder Aehnliches vorführen.

Er hat daraus den Schluß gezogen, daß alle diese sich gegenseitig ersetzenden Arten nur durch Auswanderung aus einer Region in die andere entstanden, folglich nur Formen einer und derselben Art sind. In vielen Fällen mag das auch ganz richtig sein; denn die Art hat die Fähigkeit, ihr Gebiet auszudehnen, und muß sie auch haben, wenn sie im Stande sein soll, sich zu erhalten. Aber diese Accommodation an die gegebenen Verhältnisse wird gleichzeitig eine Variation der Form hervorrufen, die um so größer sein muß, je größer die Verschiedenheit des neuen Wohnortes

mit seinen Ernährungsbedingungen ist. So beobachtet wir in der That von der Ebene bis zu den alpinen Regionen einzelne Arten, die in jeder der verschiedenen Höhenstufen einen eignen Formenkreis zu bilden streben. Das steht fest. Nicht fest aber steht selbst bei den Gegnern der Darwin'schen Schöpfungstheorie, ob auch in allen Fällen das, was Einzelne eine gute Art nennen, das im exacten Sinne des Beweises auch ist. Man hat sich darum wohl zu hüten, Alles in Einen Topf zu werfen und nun zu dem Sprungschlusse überzugehen, daß folglich auch die sogenannten guten Arten nur durch Auswanderung entstanden sind. Freilich sind sie so gut, wie die nachweisbaren Spielarten, nur Ausdruck und Folge der gegebenen Schöpfungsbedingungen; allein das ist auch Alles, was sich behaupten läßt. Bei guten Arten finden sich eben keine Uebergänge, bei Spielarten finden sie sich; und das ist wiederum Alles, was letztere von den ersteren unterscheidet. Freilich ist es nun leicht, auf's Neue zu behaupten, daß in den Fällen, wo keine Uebergänge mehr gefunden werden, die Zwischenformen durch die Folgen der natürlichen Zuchtwahl, d. h. durch Mangel innerer Kraft und Fortpflanzungsfähigkeit, ausgestorben sind; allein das bleibt eben eine Annahme, die sich nicht beweisen läßt oder Hypothesen auf Hypothesen baut. Gegner wie Anhänger des Darwinismus können nur in der Behauptung einig sein, daß, wo Uebergänge gefunden werden, keine gute Art vorhanden ist. Es ist einfacher und verständlicher zu sagen, eine gute Art sei ursprünglich und Folge der Schöpfungsbedingungen ihres Wohnortes, als Alles auf wenige Grundformen zurückzuführen, aus denen alle Organismen hervorgegangen sein sollen. Der Schöpfungsgact selbst ist weder auf die eine, noch auf die andere Art zu erklären. Gegner wie Anhänger können nur darin übereinstimmen, daß der Stoff und die ihm immanente Kraft die Ueberder der Organismen-Verschiedenheit sind. Allein, da jede Art heutzutage ihr Maximum und ihr Minimum der Verbreitung besitzt, aus denen sie nicht, ohne sich zu Grunde zu richten, heraus kann, so fällt damit auch die Wichtigkeit des Migrations-Gesetzes als Beweismittel für die Transmutationslehre. Denn dieses setzt Schlechterdings voraus, daß die Art früher eine unbeschränkte Verbreitungsfähigkeit besessen haben müsse. Das anzunehmen, verhinert uns diejenige exacte Methode der Naturforschung, welche die Vergangenheit aus den Gesetzen der Gegenwart, nicht umgekehrt zu erklären strebt. Damit hat sie denselben Halt, wie der Astronom, der es sich gar nicht einfallen läßt, daß zu legendarischer Zeit einmal andere physikalische Gesehe im unendlichen Sternerraume geherrscht haben könnten, wie heute; auf diese Annahme gestützt, rechnet er Jahrtausende rückwärts mit einer Sicherheit, die, wo auch die Ergebnisse für ihn einzutreten vermögen, von dieser allemal bestätigt wird. Es muß uns schließlich freuen, daß selbst Darwin nicht die klünnen Hoffnungen Wagner's theilt. Das zeigt wenigstens, daß er sich noch nicht ganz von dem gesunden Boden entfernt hat, welchen er ehemals so erfolgreich einnahm.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 25 Sgr. (1 fl. 30 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Verleger nehmen Bestellungen an.

Verleger: J. B. Neumann, Neudammstr. 10, Berlin.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 2.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwesche'scher Verlag.

**13. Januar 1869.**

**Inhalt:** Die Thiergärten Europa's, von Karl Müller. — Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen, von C. Bünke. — Literarische Anzeigen.

## Die Thiergärten Europa's.

Von Karl Müller.

Zu allen Zeiten, in denen sich die Kenntniss des Erdbereichs auffallend erweiterte, sehen wir in Europa die Wälder sich regen, eine tiefer gehende Anschauung der neu entdeckten oder aufgeschlossenen Länder zu gewinnen. Es ist darum nur der alte Zug der Menschheit, der in den Wäldern der Neuzeit erwacht, wenn sie mit der wunderbar zunehmenden Entwicklung der Verkehrsverhältnisse unseres Zeitalters ein Streben nach Anschauung äußern, welches im genauen Verhältniss zu der Grösse der Ausdehnung unseres heutigen Weltverkehrs stehen mag. Botanische Gärten und Gewächshäuser waren, ihrer inneren Natur nach, selbstverständlich die ersten Anstalten, um die Organismen fernher Jonen im lebenden Zustande zu veranschaulichen. Stehende Thiergärten folgten ihnen zwar schon in sehr frühen Zeitaltern, doch nur als Versuch und in wenig planvoller Weise. Die Kostspieligkeit ihrer Errichtung und Erhaltung liegt so auf der Hand, dass man sich nur mit einzelnen

Charakterthieren begnügte; Sammlungen, aus denen später stehende Menagerien da hervorgingen, wo der Sinn mächtiger Herrscherhäuser dafür empfänglich war. Abgesehen von den Menagerien des Alterthums, entstanden in Europa dergleichen vereinzelte Versuche erst unter den Habsburgern zu Ebersdorf, Neugebau und Belvedere, und zwar schon um das Jahr 1552. Zwei Jahrhunderte später, 1752, entwickelte sich aus ihnen die Menagerie zu Schönbrunn unter Maria Theresia. Auch die Herrscher Grossbritanniens zeigten einen ähnlichen Sinn und unterhielten im Tower längere Zeit eine solche Menagerie, wie die Bourbonen seit Ludwig XIV. zu Versailles gehalten hatten. Letztere kam nach der Revolution in den Pflanzengärten zu Paris, wo sie vermehrt noch heute befindlich ist.

Es fehlt jedoch allen diesen Versuchen der wissenschaftliche Charakter; sie alle erinnern mehr oder weniger an die Löwengärten, die Schiller so plastisch behandelte. Nach

Dr. Franz Schlegel, welcher als Director des Thiergartens zu Breslau eine vortreffliche Ueberschau der wichtigsten in unsern Thiergärten vorhandenen Thiere und zugleich eine tuzer statistische Uebersicht der europäischen Thiergärten lieferte, muß die „Knoestep-Menagerie“ des Carl of Derby zu Knoestep als die Musteranstalt aller heutigen zoologischen Gärten betrachtet werden. Großartig für einen Privatmann angelegt, — denn ihre jährlichen Unterhaltungskosten sollen mehr als 60,000 Thlr. betragen haben, — gab sie Veranlassung zur Gründung eines noch bedeutenderen Thiergartens, und dieser ist kein anderer, als der zu London im Regentpark gegründete, der erste der Welt.

Durch die zoologische Gesellschaft Londons seit 1828 gestiftet, erhielt dieser zuerst und leider den Namen eines zoologischen Gartens. Sticht dem Pflanzengarten zu Kew bei London, repräsentirt er, obwohl sein Umfang nur 28 Preuß. Morgen, das Eintrittsgeld nur 1 Schilling beträgt, die tiefsten Verhältnisse der Hauptstadt in weitausfassender Art, und vermag das auch durch den ungeheuren Zubrang von Einheimischen und Fremden, welche ihm eine jährliche Einnahme von 200,000 Thln. zuführen. Mehr als eine halbe Million Menschen drängen sich jährlich zu seinen Sehenswürdigkeiten heran, an einzelnen Tagen über 30,000! Gegen 1700 Thiere, unter ihnen gegen 600 Säugthiere, 1000 Vögel und 100 Reptilien, welche einen Werth von 150,000 Thalern vertreten, bevölkern den Garten. Aber trotzdem spielt auch das Neue und Seltsame eine große Rolle in den weiten Räumen. So z. B. stieg die Zahl der nicht abonnirten Besucher im J. 1850, als das Nilpferd in den Garten kam, auf 360,402, während 1849 nur 169,000 gezählt wurden. Straffe und Paradiesvögel hatten Keinliches bewirkt.

Diesen Verhältnissen gegenüber verschwinden alle andern Thiergärten Europa's. Nach vielfach ähnlichen Vorläufern, wie wir sie in England fanden, trat der Thiergarten zu Amsterdam in's Leben. Er ist das Werk eines einzelnen, aber thatkräftigen Mannes, des Buchhändlers S. F. W. Westermann, der auch noch heute die Seele des Werkes ist. Unerschrocken sein Ziel verfolgend, ließ er sich weder durch die Abweisung des Magistrates, noch durch die Abweisung der Regierung in seinem Plane hindern, sondern verstand es, durch Gründung einer zoologischen Gesellschaft sowohl, als auch durch Gewinnung einiger gleichgesinnten Freunde ein Grundstück zu erwerben und darin einen Thiergarten vorzubereiten. Erst hierauf gelang es ihm im Jahre 1838, eine größere Anzahl von Bürgern an einer Anleihe zu betheiligen, die, so klein sie auch noch war, doch im folgenden Jahre den Ankauf der ehemals so berühmten van Aken'schen Menagerie ermöglichte. Erst im Jahre 1840 konnte dieselbe in den Garten wandern, nachdem sie in einer städtischen Kaserne bis dahin hatte untergebracht werden müssen. Von da ab erst datirt jene allgemeine Theilnahme, welche diesen Thiergarten allmählig zu einem

der ersten auf dem Continente gemacht hat. Sein Areal beträgt 28 Morgen, seine Einnahme bei  $\frac{1}{4}$  Fl. Eintrittsgeld 150,000 Fl.

Der Garten zu Rotterdam umfaßt zwar 42 Preuß. Morgen, steigert aber seine Einnahme bei gleichen Preisen nur bis 50,000 Fl. Auch er ging aus Privatansängen hervor, die bis in das Jahr 1834 zurückdatiren. Doch hatte er vor Amsterdam das Glück voraus, daß, als sich diese Ansätze günstig anließen, sogleich ein Aktienkapital von 300,000 Fl. zusammenkam, mit dem sich sofort ein größeres Grundstück nicht allein erwerben, sondern auch zweckmäßiger und schöner einrichten ließ. Man schätzte den Grundbesitz gegenwärtig auf  $\frac{1}{4}$  Mill. Gulden; eine Thatfache, die sich nur aus der außerordentlichen Liberalität erklären läßt, mit welcher einflußreiche Mitbürger und holländische Schiffscapitäne befaßt sind, dem Garten fort und fort neue Thiere gratis zuzuführen.

Seit 1863 besitzet selbst der Haag im Schrevinger Busche seinen Thiergarten, der freilich vorläufig nur noch Acclimatisationsgarten zur Züchtung von Hausvögeln und botanischer Garten zugleich ist. Angeregt durch die zoologisch-botanische Gesellschaft daselbst, beträgt das Anlagekapital 150,000 Fl., das Eintrittsgeld  $\frac{1}{4}$  Fl.

Durch herrliche Anlagen und landschaftliche Schönheit zeichnen sich die belgischen Thiergärten aus. Der Garten zu Antwerpen kostete bei einem Umfange von 35 Preuß. Morgen 400,000 Francs und wurde im J. 1843 begründet. Er vorzüglich ist es, durch dessen herrliche Verlegrungen die deutschen Thiergärten ihre Lüden ergötzen. Eintrittsgeld 1 Franc. — Erst 8 Jahre später trat der Garten von Brüssel in's Leben, und zwar mit einem Umfange von 47 Preuß. Morgen. Schlegel rühmt ihn als den in ächterer Beziehung schönsten aller Thiergärten; eine Eigenschaft, die er bei der bekannten großen Blumenpflege der Belgier um so leichter erwarb. Dies hat ihn auch zum Mittelpunkt aller städtischen Geselligkeit gemacht, wodurch seine Einnahme bei 1 Franc. Eintrittsgeld auf 150,000 Fl. stieg. — Ähnliches ist auch von dem Thiergarten zu Gent zu sagen. Da derselbe jedoch mehr Acclimatisationsgarten ist, und da er überdies wenig von sich nehmen macht, so ist er noch wenig aus seinem Dunkel hervorgerufen, obgleich seine Anlagen als sehr anmuthig gerühmt werden.

In Deutschland gab im J. 1844 erst der verdorbene Professor Lichtenstein zu Berlin das Signal zur Anlage von Thiergärten. Ihm verdankt es die Hauptstadt, daß der König ein Areal von 86 Preuß. Morgen im „Thiergarten“ anwies, damit zugleich ein unverzinsliches Darlehen, sowie die auf der Pauseninsel bei Potsdam bis dahin gepflegten Thiere verbindend. Doch haben mehrere Uebelstände hemmend auf seine Entwicklung bis heute eingewirkt: die große Entfernung von der Stadt, die weitläufigen Anlagen in einem mehr wald- als parkartigen Areal,

wodurch den einzelnen Gruppen Licht, Luft und Sonne nicht immer in hinreichendem Maße gewährt werden können.

Es dauerte jedoch noch 14 Jahre, ehe der zweite deutsche Thiergarten, welcher anfangs nur ein Acclimationsgarten sein wollte, am 8. August 1858 nachfolgte. Frankfurt a. M. hat sich dieses Verdienst gesichert und damit das noch viel größere verbunden, daß von da aus (zuerst durch Dr. Weinland, dann durch Dr. Bruch und jetzt durch Dr. Wall) die erste Zeitschrift für zoologische Gärten, d. h. für Beobachtung der Thiere im Freien und für die Interessen der Gärten, gegründet wurde. Sie hat sich dieses Verdienst bereits bis zum Anfange des zweiten Decenniums zu erhalten verstanden und wesentlich zur Beförderung der Thierkunde in Deutschland beigetragen. Ein unverzinsliches Darlehen von 200,000 Gl. und eine Ueberweisung von 50 Morgen Areal von Seiten der Stadt haben der zoologischen Gesellschaft ihr Werk, das sie auf einem gemieteten Boden unternehmen mußte, für die Dauer gesichert. — Erst zwei Jahre später (1860) folgte Geln, dessen Garten sich schnell auf eine Einnahme von 50,000 Gl. bei  $\frac{1}{4}$  Gl. Eintrittsgeld erhöhte. Dies und ein stattliches Anlagekapital haben das Institut unter vortheilhafter Leitung ebenso rasch zu einer wahren Musteranstalt für Deutschland erhoben. — Am 9. Mai 1861 folgte Dresden mit dem dritten Thiergarten, nachdem ihm seit 1858 die sogenannte „Hühnerologie“ in der Allee vorangegangen war. Er hatte von Haus aus den außerordentlichen Vorzug, seine bleibende Stätte in dem „Großen Garten“ voll herrlicher Anlagen und Bäume aufschlagen zu dürfen, wodurch er von vornherein zu einem Lieblingsaufenthalte der Dresdner und ihrer Fremden für den Sommer bestimmt war. Bei einem Aktienkapitale von 500,000 Thlr. war dieses königliche Geschenk um so bedeutsamer, als es der Gesellschaft gestattete, bis Ende März 1864 allein gegen 92,749 Thlr. in theilweis höchst brillanten Thierzwingen und anderen Bauteilen anzulegen. Der Garten an sich, getrennt vom königl. Park, umfaßt ein Areal von 36 Morgen, um selbst bei einem Eintrittspreise von 5 Sgr. hat er sich die Mittel verschafft, bis heute seinen rasch erworbenen Ruf zu erhalten. — Noch später, am 16. Mai 1863, wurde der vierte Thiergarten zu Hamburg eröffnet. Wie der Londoner, repräsentirt auch er die reichen Mittel der Weltstadt in würdigster Weise. Denn bei einem Areal von 50 Morgen, die ihm der Senat schenkte, standen ihm sogleich 300,000 Thlr. zur Verfügung, so daß er sich sofort zu dem ersten Range aller Thiergärten des Continents erhob; um so mehr, als er zugleich ein kostbares Aquarium erhielt, dessen Besuch und Verwaltung von ihm getrennt ist. Schon im folgenden Jahre stieg die Summe seiner Besucher, bei einem Eintrittsgelde von 9 Sgr., auf 227,872, und ebenso hat es einzelne Tage seit dieser Zeit gegeben, wo gegen 38,000 Personen den Garten besuchten!

Zu gleicher Zeit, im Mai 1863, wurde der Wiener Thiergarten, und zwar unter den ungünstigsten Umständen eröffnet. Denn um nahe dem Prater zu sein, sah sich die Gesellschaft genöthigt, ein 15 Morgen großes Stück für den enormen Preis von jährlich 20,000 Gl. von einem Herrn Hofnauer zu pachten, bis ihr der Kaiser ein 59 Morgen großes Areal dicht neben dem alten schenkte und auch die Commune helfend eintrat. Trotzdem und trotz der hohen Einnahmen, die man schon im J. 1865 bei einem Eintrittsgelde von  $\frac{1}{4}$  Gl. auf 120,000 Gl. schätzte, kämpfte der Garten lange um seine Existenz, und das um so mehr, als er eben zuvor auf fremdem Grund und Boden hatte bauen müssen. Erst nach einer furchtbaren Katastrophe im J. 1865, die des Schmerzlidenen zu viel enthält, um es hier zu erzählen, hat er sie errettet, ohne jedoch damit die Schönheit des vorvorzigen erreicht zu haben, wie mit Wiener Naturforscher zu Dresden gefunden.

Nur 2 Monate später (23. Juli 1863) wurde der 7. deutsche Thiergarten zu München eröffnet. Er ist das Werk eines einzelnen Mannes, des Kaufmanns H. Benedikt und steht als solches in ganz Europa als bewundernswürdige Ausnahme da: um so mehr, als der Begründer auch Alles, selbst das 15 Morgen große Areal aus eigenen Mitteln zu beschaffen hatte. Doch hindert der geringe Eintrittspreis (12 Kr. für Erwachsene, an 3 Tagen der Woche 18 Kr., Kinder die Hälfte, Familienkarten für das Jahr 5 Gl., Pensionkarten 2 Gl.) an größerer Erweiterung und an denjenigen Prunkbauten, die man nun einmal an solchen Anstalten gewohnt ist und für die bessere Erhaltung der Thiere auch wünschen muß. Denn während im 1. Jahre 1209 Thiere vorhanden waren, sank die Zahl im 2. Jahre bei diesen Einrichtungen und dem Münchner Klima auf 1099 herab, ein Verlust, der sich auf 38 Proc. beläuft. Im 2. Jahre erreichte er 34 Proc.

Anfang Mai 1865 folgte der 8. deutsche Thiergarten zu Hannover mit einem Areal von 12 hannov. Morgen, welches die naturhistorische Gesellschaft in dem prächtigen Hochwalde Eilenriede von der Stadt zum Geschenk erhielt. Dies und ein Anlagekapital von 50,000 Thlr. setzten die Gründer schon von vornherein in den Stand, durch eine Verwendung von 33,286 Thlr. zweckmäßige und künstlerische Bauten für die Unterbringung der Thiere unternehmen zu können. Nur tabelt man die zu große Nähe der einzelnen Zwingen; ein Umsand, welcher durch den beschränkten Raum veranlaßt wurde. In Folge dessen hat die Stadt auf's Neue 15 Morgen Areal überwiesen und damit für das glückliche Gelingen des Institutes sehr liberal geforgt. Eintrittspreis 5 Sgr.

Schon am 10. Juli 1865 reichte sich der 9. deutsche Thiergarten zu Breslau an. Er umfaßt ein Areal von 40 Morgen, welches die Stadt der Aktiengesellschaft zum größten Theile schenkte, während sich die ganze Provinz in gewohnter patriotischer Weise an dem Anlagekapitale von



100,000 Thlr. theilte, wofür auch der Eintrittspreis auf 5 Sgr. gestellt werden konnte. Sein Stützpunkt ist sein Weiber, der durch passende Vorrichtungen mit der Ober in Verbindung steht und theilweis auch in harten Wintern nicht friert.

Endlich sind noch 2 deutsche Thiergärten zu erwähnen, die, wenn auch noch in der Entwicklung begriffen, doch ihren Städten ein neues Leben verliehen haben: der Stuttgarter und Karlsruher. Dem ersteren ging die Menagerie des Kaffeter Werner voraus; der letztere ist ursprünglicher Art und entspricht den kleineren Verhältnissen der Residenz. Aber wie auch die einzelnen Thiergärten unseres Vaterlandes beschaffen sein mögen, wir dürfen mit Stolz auf sie blicken. Denn wenn man sie alle in Einen zusammen-schmelzen könnte, würde sein Areal wohl über 400 Morgen, sein Anlagekapital wenigstens 1 Mill. Thlr. betragen; Verhältnisse, die, abgesehen von der Zahl der unterhaltenen Thiere, des größten Volkes würdig sind.

In der neuesten Zeit, seit 1866, ist auch in Pesth ein Thiergarten mit einem Areal von 53 Preuß. Morgen und einem Anlagekapital von 150,000 Fl. eröffnet worden, von dem man hofft, daß er seiner östlichen Lage wegen für die Gärten Westeuropas von besonderer Wichtigkeit sein werde. Das Gleiche gilt von dem Moskauer. Italien beginnt erst sich uns anzunähern und hat in Florenz einen Thiergarten eröffnet. Selbst das große Frankreich steht hinter uns zurück und besitzt nur 3 Gärten zu Paris, Lyon und Marseille. Doch hat der erstere mehr den Charakter eines Acclimatationsgartens; der zweite ist nur ein reizender Park, in welchem wenig kostspielige Thiere unterhalten werden; der dritte ging im J. 1865 wegen Mangel an Theilnahme ein, obgleich der Park auf einem der reizendsten Punkte

der Stadt angelegt ist und man daselbst mehr als im Binnenlande Gelegenheit hätte, auf wenig kostspielige Weise die seltensten Thierarten, namentlich Afrika's und des gesammten Mittelmeergebietes, zu erhalten. Auch Spanien ist noch weit zurück. Nur Madrid hat einen Thiergarten, der aber wenig leistet und noch weniger Kenntnisse verbreitet. Um so mehr ist anzuerkennen, daß eine reiche Dame zu Krems, Madame Julia Pémartin, über 2 Mill. Realen zur Gründung eines zoologisch-botanischen Gartens aufwendete und durch ihre Schiffskapitäne aus allen Welttheilen seltene Thiere und Pflanzen sammeln läßt.

Das ist, in kurzen Zügen, die Geschichte unserer heutigen Thiergärten, von denen wir die Aquarien als selbstständige Institute ausgeschlossen haben. Groß sind die Schwierigkeiten für alle gewesen, in die Höhe zu kommen; groß sind und bleiben sie, diese Höhe zu behaupten. Um so ehrenvollere Denkmale unseres Zeitalters sind sie aber auch, und wenn sich irgendwo der heutige Zeitgeist ausdrückt, so ist es hier, wo es galt, mit vereinten Kräften zu wirken und auf den äußeren Lohn zu verzichten. Dafür dürfen sie aber auch mit Genugthuung einen inneren empfinden. Denn was diese Gärten durch Verbreitung nützlicher Kenntnisse zur Erkenntnis unseres Planeten, zur Unterhaltung und Vertiefung des Volkes täglich beitragen, muß man in ihnen selbst beobachten, wenn man es der greiflich finden will, daß ich sie für den idealsten Pflegern nationaler Phantasie zähle. Sicher tragen sie wesentlich zur Erfrischung dieser Phantasie bei und legen damit zugleich einen Grund, die Völker für die Ausbildung des großen Weltverkehrs immer günstiger zu stimmen. Mögen aber auch die Völker das erkennen und die edle Aufgabe nachhaltig durch ihre Theilnahme unterstützen!

## Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen<sup>1)</sup>.

Von C. Bönig.

### I. Einleitende Bemerkungen.

Noch vor wenigen Jahren schrieb ein deutscher Geologe, Bernhard Cotta, in seinem Werke: „Deutschlands Boden“ (S. 62) über die Provinz Preußen: Zu wenig bekannt mit dem Lande jenseits der Weichsel, wo die Lithauer ihre kleinen Pferde züchten, die Wästen in Erdböhlen leben, die „Kräutereßer“ den sonderbaren schmalen Damm (kurische Mehrung) bewohnen, welcher das kurische Haff von der Ostsee scheidet, weder mit der geologischen

Natur der „Wildnis“ um „Johannisburg“ noch des „Paradieses“ bei Fischhausen oder des „Goldenen Bodens“ bei Elbing bekannt, muß ich das große, zum Theil erhöhte und von zahlreichen Seen durchschnittene Diluvialgebiet Ostpreußens unbeschrieben lassen.“ — B. Cotta hatte nicht ganz Unrecht; die Provinz Preußen war in geologischer Hinsicht unbekannter, als die meisten Theile der Erde; dieselbe Provinz, welche schon im Mittelalter unter der Regierung des deutschen Ordens durch ihre geordneten politischen und bürgerlichen Verhältnisse, wie durch ihre geistige Bildung fast allen Staaten Europas überlegen war, hatte bis auf die jetzige Zeit für die Untersuchung ihrer Bodenverhältnisse Nichts gethan, obgleich dieselben in vieler Beziehung außerordentlich interessant sind.

Aus diesem Grunde wandte sich im October 1864 die Kgl. physikalisch-ökonomische Gesellschaft in Königsberg i. Pr.

1) Nach den Schriften der Königl. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in Königsberg in Preußen 1865—67 und besonders den Arbeiten von Verend und Jaddach. Die nachfolgenden Abbildungen, von Dr. C. Verendt gezeichnet, werden mit seiner und der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft freundlichen Einwilligung hier mitgeteilt.





Fig. 1. Bergbau auf Versteinschiefer in der Braunkohlenformation bei Stolpshäusern (1780). Fig. 2. Tagebau auf der primären Lagerstätte des Versteins (Blauen Erde); A weggelassene Erde. Fig. 3. Entwurf eines bergmännischen Abbaues der Blauen Erde unter Ausnutzung der Versteinschiefer. I Versteinschiefer; I a versteinerte Schicht bei gelbem Sande (Blauer Sand); I b durch Eisenoxydhydrat verfestigte gelbe Sande; g Abtragung wasserführender Schichten; f Schicht; g Abtragung; h Sandsteine. II Braunkohlenformation; II a Versteinschiefer im Braunkohlensande; II b Kalkstein. III Tertiärformation; III a Tertiärsand; III b oberer Tertiärsand.

an den Landtag der Provinz Preußen mit der Bitte, ihr die Mittel zur Ausführung einer geognostischen Untersuchung und zur Anlage einer dahin gehörigen Sammlung (hauptsächlich von Bernsteineinschlüssen) zu gewähren und stellte, nachdem im October 1864 die ersten 5000 Thlr. bewilligt worden waren, folgendes Programm auf:

1. Die geologischen Verhältnisse der Provinz sollen untersucht und eine geognostische Karte derselben soll angefertigt werden;
2. Die bernsteinführenden Tertiärschichten, deren Bearbeitung schon früher von der Gesellschaft mit Erfolg betrieben war, soll wiederum einer Untersuchung unterworfen, und die in ihnen befindlichen organischen Einschlüsse sollen gesammelt und bearbeitet werden;
3. Die geognostischen Sammlungen der Gesellschaft sollen vergrößert, namentlich Bernsteineinschlüsse angekauft, entsprechend präparirt und wissenschaftlich bearbeitet werden.

Daß dieses umfangreiche Programm nur durch große Geldopfer durchzuführen sei, war vorauszusehen, und so hat denn der Landtag der Provinz Preußen im vorigen Jahre zum dritten Male 5000 Thlr., (im Ganzen bereits 15,000 Thlr.), zur Fortsetzung der Arbeiten bewilligt. Mit Recht dürfen wir auf diese hochherzige Hülfe des Landtages stolz sein, der dadurch nicht nur der Wissenschaft einen wesentlichen Dienst leistet, sondern auch die Produktionsfähigkeit der so hart heimgesuchten Provinz um ein Bedeutendes erhöht hat. Flora und Fauna der Provinz Preußen liegen in ganz ausgezeichneten Bearbeitungen aus älterer und neuerer Zeit vor; wir erinnern nur an die „Pflanzen Preußens von Hagen“, „Kord's Flora und Fauna“, „Pape, Meyer und Eskin's Flora“, „v. Klinggräff's Vegetationsverhältnisse der Provinz Preußen“ u. s. w. So wird nun auch die bisher vernachlässigte Geognosie und Geologie unserer Provinz diesen Werken bald würdig zur Seite stehen.

Zur Ausführung des ersten Theils des Programms hat die Gesellschaft den Königl. Bergassessor Dr. G. Brendt engagirt, der, praktischer Bergmann und gelehrter Geologe, bereits eine sehr werthvolle Arbeit über die geologischen Verhältnisse der Gegend von Potsdam schrieb. Die Wahl hierfür war eine um so schwieriger, weil die Geologie sich durchschnittlich wenig mit den diluvialen Schichten, welche in der Provinz fast ausschließlich vorkommen, beschäftigt. — Für den zweiten Theil des Programms wurde der Prof. Zaddach und für den dritten Dr. Henske gewonnen. Welche Ergebnisse diese Arbeiten bisher zu Tage gefördert haben, soll im Folgenden gezeigt werden.

## 2. Der in Aussicht stehende Bernstein-Bergbau im Innern des Samlandes.

Indem wir in Bezug auf das Samland auf Dr. Dettl's Arbeit: „Das preussische Bernsteinland“ im Jahre

gang 1861 dieser Zeitschrift verweisen, bemerken wir kurz, daß das Samland im Westen von der Döfse, im Norden von derselben Reere, der kurischen Hebrung und dem kurischen Haffe, im Osten von der Deime, im Süden von dem Pregel und dem frischen Haffe begrenzt wird. — Schon im vorigen Jahrhundert wurde bei Groß-Buttniken — auf der Westküste Samlands, südlich von Brästerort — 24 Jahre lang der Bernstein auf bergmännische Art gewonnen, d. h. man drang bis zu den Bernsteineffern der Braunkohlenformation vor (s. Fig. 1). Während dieser ganzen Periode blieb nur in 2 Jahren der Gewinn aus, in der Regel betrug der Reingewinn mehr als die Ausgabe Summe. Nach dem Tode des Majors v. Taubenheim, der Seele des ganzen Unternehmens, wurde bald der Bergbau eingestellt. Erst dieses Jahrhunderts führte zur Entdeckung der primären Lagerstätte des Bernsteins, der „blauen Erde“, und es findet bis zum heutigen Tage an der Nord- und Westküste Samlands ein ziemlich großartiger Bau in offenen Gräberlein auf die eigentliche Bernsteinerde statt, welche durch die eben erwähnte Arbeit hier als bekannt vorausgesetzt wird. Fig. 2 stellt einen Tagebau dar, in dem A die Erdmasse bezeichnet, welche weggeräumt werden muß, ehe die Bernsteinschicht bloßgelegt wird. — Während man die Gewinnung des noch stets von der Döfse ausgeworfenen Bernsteins ziemlich systematisch durch Fischen, Keschern, Stechen und durch Ausbaggerung des Meeresgrundes\*) betreibt, liegt die Gewinnung derselben in seinen festen Ablagerungen, wenigstens so weit sie die primäre und der Natur der Sache nach reichste und lohnendste Ablagerung betrifft, trotz aller Mühe und Arbeit, die man reichlich darauf verwendet, noch gar sehr im Argen. Wer die offenen Gräberlein in den samländischen Strandbergen beobachtet (Fig. 2 A) und die kolossalen Massen des bewegten Abbaues überschlägt, muß erkaunten, daß der Ertrag aus der dadurch entblößten Schicht nicht nur hinreicht, die Kosten einer solchen Arbeit zu decken, sondern sogar noch einen Gewinn zu erzielen, ohne welchen die Gräberlein doch schon längst eingestellt sein würden. Bedeutet man nun, daß durch eine so kolossale Massenbewegung, wie sie in jedem der Tagebaue stattfindet, nur ein verhältnißmäßig kleines Stück der Bernsteinschicht bloßgelegt wird, so muß auch der Laxe einsehen, daß durch einen rationell geführten Tagebau die ganze Schicht aufgeschlossen wird, und daß bei gleichem Gewinn, wie bei den Gräberlein, unverhältnißmäßig Summen für Anlage und Betriebskosten verbleiben. Es war also der Wissenschaft die Aufgabe gestellt, die richtigen Orte aufzufinden, an welchen die Bernsteinerde zu ers-

\*) Auf der kurischen Hebrung bei Schwarzerz. Die Baggerungen ergaben im J. 1865 mittelft 10 Sand- und 2 Tag und Nacht arbeitenden Dampf-Bagger bei einem Aufwande von 72,000 Thlr. eine Ausbeute von 53,000 Pfd. Bernstein gegen 17,000 Pfd. im J. 1864.

warten ist, und sie hat diese Aufgabe schnell, mit Sicherheit und mit praktischem Erfolge gelöst.

Durch die Untersuchungen des Herren Dr. Verendt und Prof. Zaddach ist nun endgültig festgestellt, daß die „Bernstein- oder blaue Erde“ den größten Theil, vielleicht die ganze Ausdehnung des Samlandes unterliegt. Man ist nämlich bei der geringen Größe des Samlandes wohl zu der Annahme berechtigt, daß in diesem Lande überall da, wo Schichten der Braunkohlenformation anstehen, in der Tiefe nicht nur die Formation der grünen oder glaukonitischen Sande (Glaukonitformation), sondern in ihr auch die Bernsteinschicht vorkomme. Es würde also hier, um über das Vorkommen der Letzteren Aufschlüsse zu erlangen, nur darauf ankommen, die Erstere nachzuweisen. Aus der Natur der anstehenden Schichten und ihrer höheren oder tieferen Lage würde man dann mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Tiefe schließen können, in der die blaue Erde mit dem Bernstein zu finden wäre. Dieser Schluß würde aber für entferntere Gegenden unserer Provinz nicht gelten; denn obgleich es sehr wahrscheinlich ist, daß die Glaukonitformation eine weite Verbreitung hat, so ist die Bernsteinschicht eine Klüftbildung. Der Bernstein ist ein Fremdling in der Formation, der zwar in ihr Aufnahme gefunden hat, aber kein notwendiges Glied derselben ist. Wöllig bewiesen ist seine Unterlagerung durch das Auftreten der Bernsteinschichten an der Nord- und Westküste Samlandes innerhalb des die Nord-Westküste überragenden großen Dreiecks, welches durch die Lette Krastepellen (Westküste), Neukuhnen (Nordküste) und Weiserort bezeichnet wird. Ebenso ungewisshaft ist es, daß ein größerer oder geringerer Theil Landes und somit auch die Bernsteinschicht nach Westen und Norden zu durch die Flucten der Elster, wie durch die älteren Diluvial- und Tertiar-Ablagerungen schon fortgerissen ist, dessen Bernstein uns jedoch, zum größten Theil wenigstens, nicht verloren gegangen, sondern in den Alluvial-, Diluvial- und Tertiar-Ablagerungen erhalten ist. — Die Bernsteinschicht innerhalb dieses Dreiecks findet sich nicht mehr in ihrer ursprünglichen horizontalen Lagerung; vielmehr zeigt sie sich mit ihrer obersten Grenze (der Grenze zwischen dem grünen Sande (Glaukonit) und dem schon der darüber liegenden Braunkohlenformation angehörenden weißen Sande) bei Cassau und Rappöden in 54 F. Höhe über dem Meerespiegel. Sie erscheint nach kurzen Unterbrechungen, während welcher sie über dem Meerespiegel gar nicht vorhanden ist, bei Georgenwalde und Warnicken nur bis wenige Fuß über genanntem Niveau und erhebt sich bei Groß- und Klein-Kuhnen sodann wieder zu einer Höhe von 57 resp. 65 Fuß. Diese Beobachtung bezog Prof. Zaddach schon im J. 1860 zu der Annahme einer Mulde, deren östlicher Rand in der Nähe des Dorfes Cassau, deren westlicher in der Gegend von Groß- und Klein-Kuhnen zu suchen sei. Die Richtigkeit dieser Beobachtung beweisen die Aufschlüsse der jetzt

in die Untersuchung mit hineingezogenen Westküste, ja dieselben ermöglichen sogar die annähernd sichere Angabe des Hauptstreichens dieser Mulde von SW. nach ND.

Man findet nämlich von Kreisladen bis Krastepellen (Westküste, von Norden nach Süden) die dem Westflügel der Mulde an der Nordküste zwischen Kleinkuhnen und Warnicken entsprechende Fortsetzung desselben nach SW. Der Ostflügel (zwischen Georgenwalde und Cassau auf der Nordseite) der Mulde setzt sich weiter nördlich fort, etwa von Sorgenau nach Rodems und Rothenen. Diese Richtung der Mulde findet man auch ihre Bestätigung im Innern des Landes. Hier zeigt sich nämlich eine durch das Auftreten des Braunkohlenlandes zwischen Schloß Thierenberg und Krissau einerseits, auf der Höhe des Kauffer-Berges bei Seibau andererseits unverkennbar bezeichnete Hebungslinie. Sie kann für eine im vollkommenen Parallelismus mit der Hauptmuldenlinie des Nordwestens verlaufende Hauptfaltenlinie des im Uebrigen tiefer gesunkenen Süds ostens des Samlandes angesprochen werden. Sodann fällt auch die Hauptrichtung sämtlicher größeren Wasserläufe und Thalbildungen mit der bezeichneten Streichrichtung zusammen, und endlich können selbst die Haupthöhenpunkte des Samlandes mit wenigen Ausnahmen umgewungen zu einem der genannten Richtung parallel streichenden Systeme verbunden werden<sup>3)</sup>.

Hieraus ergeben sich die für den bergmännischen Abbau der „blauen Erde“ geeigneten Striche von selbst. In erster Reihe würden sich die Versuche auf die Gegenden von Kreisladen, Krastepellen, Warnicken, Warnicker-Forst, auf das Thal des Kaufferer Mühlbaches, in zweiter auf den Kauffer-Berg erstrecken müssen. Natürlich müßte bei dem unterirdischen Bergbau von den Strandbergen abgesehen werden, da die blaue Erde hier in, unter oder dicht über dem Meerespiegel liegt. (Ein Eintreiben von Stollen<sup>4)</sup> oder Auffahren von Strecken wird also hier der eindringenden Wasser halber gar nicht angehen. Ganz unbedenklich würde dagegen ein Abteufen von Schächten<sup>5)</sup> im Innern des Landes, ziemlich weit ab von der Küste, zum Ziele führen, wie dies in Fig. 3 dargestellt wird. Die Tiefe, in welcher innerhalb der obengenannten Districte die blaue Erde selbst anzutreffen sein würde, läßt sich in dem von der Braunkohlenformation in ihrer ganzen Mächtigkeit gegenwärtig noch überlagerten Landschaft mit Genauigkeit angeben. Dieselbe schwankt von den Rändern der vorhin beschriebenen Mulde nach dem Innern zu zwischen 6 und 40 F.

3) Sie verweisen hierbei auf die einem der nächsten Artikel beigegebene Karte des Litterärbirgels, auf welcher in Section II die beiden Flügel der Mulde durch d und ee, der Braunkohlenland durch f bezeichnet wurde.

4) Horizontal, gleichzeitig zur Förderung und zum Abfließen des Wassers bestimmte Gänge.

5) Ein senkrechter, nach der Art der Brunnen in die Tiefe gehender Bau.

unter dem Hfnerspiegel. Bei einer durchschnittlichen Gesamthöhe West-Samlandes von 100—130 Fuß wäre die Bernsteinschicht also innerhalb dieser Districte in 100—170 Fuß Gesamttiefe — in einer also für bergmännische Baurer äußerst geringen Tiefe — anzutreffen.

Was nun die Rentabilität des ganzen Unternehmens anbetrifft, so ist auch diese durch Dr. B. Verendt nachgewiesen worden. Der geordnetste und regelrechteste Bernsteintagebau zwischen Kratzeppen und Groß-Hubnicken zage bei 8500 Thlr. Anlagekapital einen Flächenraum von 8700 □Fuß blauer Erde bloß. Demnach kostet der □Fuß bloßgelegter Bernsteinerde noch nicht 1 Thlr.

Ein Scheffel Steinfoblen ( $= 1,5$  Kubikfuß des Flözes) wird ohne Vortheil zu  $2\frac{1}{2}$  Sgr. gewonnen. Bei einer Mächtigkeit des Flözes von  $\frac{1}{2}$  Fuß, was etwa der durchschnittlichen Mächtigkeit des an Bernstein reichen Theiles der blauen Erde entspräche, würde der □Fuß des Flözes ( $= 4,5$  Kubikfuß  $= 3$  Scheffel) ohne Vortheil zu  $3 \times 2\frac{1}{2} = 7$  Sgr. gewonnen werden, während also der □Fuß der blauen Erde jetzt in den Tagebauen noch mit Vortheil zu beinahe 1 Thlr., also zur vierfachen Höhe dieses Preises gewonnen wird. — Außerdem ist aber auch keineswegs der Umstand gering anzuschlagen, daß mittelst eines solchen Bergbaus alle etwa zu wenig reichhaltig sich zeigenden Stellen der Schicht ungebaut liegen gelassen werden können, während der jetzige Tagebau nicht gestattet, sich vorher über den Bernsteingehalt der abgedeckten Stelle zu unterrichten, und man also stets der Möglichkeit ausgesetzt ist, Arbeit und Kosten vergeblich aufgewendet zu haben. Betrachtet man außerdem den durch den Tagebau dem Lande zugefügten Schaden, so ist dies ein zweites, gar nicht so gering anzuschlagendes Moment für die Wahl einer andern Art des Abbaus. Was es nämlich im Vergleich zu dem Gesamtertrag des Samlandes noch so gering sein, immerhin geht alljährlich ein Strich Landes verloren, der nicht etwa, wie bei andern Arten von Tagebauen, nur eine Zeit lang für die Cultur undbraubar gemacht, sondern zum größten Theile in den folgenden Wintern unwiderruflich von den Wellen verschlungen wird. Der Umstand, daß auch ohne dies die See alljährlich an so manchen Stellen des trübsüchtigen Landraubs verübt, kann nicht als Entschuldigung benutzt werden. Der Bernsteinsbau vermehrt unbedingt diesen Verlust und bahnt sogar den andringenden Wellen, namentlich an den Stellen, wo, wie z. B. bei Groß-Hubnicken und Kratzeppen, der Bau die 30 und 40 Fuß unter dem Meeresspiegel hinaufgeführt werden muß, auf höchst verberbliche Weise immer neue und wirksame Wege. — Wo ferner die Gräberien alljährlich die Bildung einer Grasnarbe an den Abhängen der Strandberge verhindern, kann, noch besser als an den Stellen, wo die See über die Lage

wasser dieselben stets neu abbrechen, der Wind ungehindert mit den bloßgelegten Sandmassen spielen und die Küstenbänke auf der Höhe weithin versanden.

Dem Dr. B. Verendt gebührt das nicht hoch genug zu schätzen Verdienst, die Möglichkeit, Rentabilität und Nützlichkeit eines unterirdischen Bergbaus auf Bernstein zuerst nachgewiesen zu haben. Andere praktische Bergmänner haben seine oben auseinander gesetzten Vorschläge und Ideen geprüft und sich in jeder Beziehung mit ihm einverstanden erklärt. Auch der ministerielle Commisär, Oberbergath Runge aus Breslau, der vor 2 Jahren das Samland bereiste, hält den unterirdischen Bernsteinsbergbau nicht nur für ausführbar, sondern empfiehlt ihn in Hinsicht auf den bedeutenden, dabei in Aussicht stehenden Gewinn der Königl. Regierung zur eignen Inangriffnahme. Die Verhandlungen über die Frage, ob der Staat einen solchen Bergbau im Innern des Samlandes im eignen Interesse zunächst selbst in die Hand nehmen oder denselben, ähnlich wie die offenen Gräberien, direct der Privatindustrie überlassen soll, befindet sich augenblicklich noch in der Schwelbe. Der auf die eine oder andere Weise somit jetzt wirklich in Aussicht stehende Bernsteinsbergbau bietet aber dem Samland eine bedeutende Zukunft und darf, weil er in Folge des Nachweises der Bernsteinschicht auch weit ab von der Küste im Innern des Landes möglich ist, als eine der ersten Ertrugenschaften der begonnenen geognostischen Kartenaufnahme begrüßt werden. Auch die schon jetzt sich zeigende großartigere Entwicklung der Gräberien an der Seeküste, die als Arbeitsstellen für die Arbeit suchende Bevölkerung des westlichen Samlandes ausreichen, haben sogar den großen Nothstand des letzten Winters weit weniger fühlbar gemacht.

## Literarische Anzeige.

Durch alle Buchhandlungen ist zu erhalten:

### Verthold Auerbach's Deutscher Volkskalender für 1869.

Mit 24 Holzschnitten. Preis 12 ¼ Sgr.

Außer den zwei neuen Verlagsheften des Herausgebers, die von Paul Neberlein meisterhaft illustriert sind, seien für die Leser dieses Blattes noch folgende drei Beiträge hier hervorgehoben: Aufsatz von Liebig, Ueber den Ernährungswerth der Speisen, Dr. Georg Briel, Zur Geschichte der Kartoffel, und Dr. Adolph Meißlinger, Hundert Jahre nach der Geburt Alexanders von Humboldt.

Das vollständige Calendarium ist von einem Humboldt-Kalender begleitet.

Fred. Dümmler's Verlagsbuchhandlung in Berlin.  
(Gartwich und Hofmann.)

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Sgr. (à 1 fl. 30 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verleger: Schwelbische Buchdruckerei in Göttingen.



# Die Natur

Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

N 3.

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

20. Januar 1869.

Inhalt: Gesunde Luft, von Otto Ule. Gräter Artikel. Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen, von C. Bönig. — Ein unscheinbarer Fossilgehäuse. — Kleinere Mittheilungen.

## Gesunde Luft.

Von OTTO ULE.

Gräter Artikel.

In civilisirten Ländern gibt es kaum noch irgend Etwas, auf das nicht ein Besitztitel erworben wäre. Der Boden ist oft ein sehr kostbares Eigenthum, und es muß eine recht erbärmliche Pflanze oder ein recht unnützes Thierchen sein, auf das Niemand Anspruch macht. Selbst das Wasser unserer Quellen und Bäche und Flüsse ist nicht ganz frei. Nur die Luft ist Niemandes Eigenthum; sie ist ja so allverbreitet, so unverwundlich, daß sie — so meint man wenigstens — Jedem in gleichem Maße zu Gute kommt. Die Luft allein ist unter civilisirten Menschen nichts werth. Das ist jedoch ein Irrthum, den die civilisirte Welt oft entsetzlich büßen muß. Wozu anders hat denn Napoleon III. jene kostspieligen Bauten in Paris vorgenommen und die Stadt so schwer mit Schulden belastet, als um ihr Luft zu schaffen? Wie viel Millionen hat diese Luft gekostet, wie viele

Millionen werden alljährlich von unsern großen und kleinen Städten aufgewendet, weil die unsinnige Bauart früherer Zeiten die unentbehrliche Luft aus ihren Straßen und Häusern ausgeschlossen hatte! Es sieht zwar mit der Unreinlichkeit und Luftverderbnis unserer Städte nicht mehr ganz so schlimm aus, als in früheren Jahrhunderten, und selbst Paris gilt vor seinem großartigen Umbau noch bei weitem nicht einer der orientalischen Städte, so wenig die Wohnung des ärmsten Arbeiters in Europa mit der schmutzigen, dunkeln Lehmhütte eines Sudannegers verglichen werden kann. Die Zimmer unserer Häuser sind namentlich in neuerer Zeit größer, höher und heller geworden; die Städte haben sich ausgedehnt, im Innern mit weiten, freien Plätzen und Promenaden, nach Außen mit Gärten und Parkanlagen geschmückt. Aber eine reine und gesunde



Luft haben wir darum noch keineswegs, und die Atmosphäre unserer großen Städte namentlich ist noch immer aus ziemlich weite Strecken hin sichtbar und riechbar. Was gesunde Luft ist, empfindet der am besten, der Jahr aus Jahr ein in die engen Räume des Stubierrimmers, des Gemseis, der Berkstätte gebannt ist, und der dann einmal auf einige Wochen sich löst, um die kostbare Luft der Berge in vollen Zügen zu schürfen. Also man kennt den köstlichen Genuß gesunder Luft und begehrt ihn gern für wenige Tage oder Wochen theuer genug, aber man denkt nicht daran, ihn sich dauernd zu verschaffen. Man ist aufgetaucht genug, um die Luft als reißer und wichtigstes Lebensbedürfnis zu erkennen, aber während man sich sonst keine Bequemlichkeit versagt und für Speise und Trank mehr als nöthig und nöthigendwerth sorgt, darbt man ohne alles Bedenken an dieser unentbehrlichsten Lebensnahrung.

Die Luft, die wir athmen, strömt uns zwar aus einem ungeheuren Ocean zu, aber die Mengen, deren wir bedürfen, sind auch nicht unbedeutend. Die Zahl der Athemzüge eines Menschen beträgt je nach Alter, Körperkonstitution und Thätigkeit 15 bis 20 in der Minute, und mit jedem Athemzuge werden den Lungen 20—25 Kubikfuß Luft zugeführt. Ohne die künstliche Einengung unserer Athemwerkzeuge durch unsere Kleidung würde diese Luftmenge sogar noch weit größer sein. Selbst die weite männliche Kleidung behindert das Athmen in dem Maße, daß derselbe Mann, der nackt 190 Kubikfuß einathmet, bekleidet nur 130 Kubikfuß einathmen vermag. Die enge weibliche Kleidung, namentlich das Schnürkleid, beeinträchtigt die Athmung natürlich in noch weit schlimmerem Grade. Im Allgemeinen nimmt ein unthätiger Mensch durch die Thätigkeit seiner Lungen in 24 Stunden etwa 468 Kubikfuß Luft auf. Bei einem thätigen Menschen steigt sich diese Luftmenge auf 620, bei einem angestrengt arbeitenden sogar auf 800—1000 Kubikfuß. Diese eingeathmete Luft geht aber bekanntlich nicht unverändert wieder aus den Lungen hervor. Während die gewöhnliche atmosphärische Luft in 100 Theilen 20,9 Raumtheile Sauerstoff enthält, finden wir in der ausgeathmeten Luft nur noch 14—16 Raumtheile Sauerstoff. 4—6 Procent Sauerstoff sind also beim Athmen verloren gegangen oder vielmehr verbraucht worden. Die abgenutzten Theile unseres Körpers haben sich mit diesem Sauerstoff verbunden, und daraus ist die Kohlenäure entstanden, die wir in der ausgeathmeten Luft finden. Von der Anwesenheit dieser Kohlenäure kann man sich sehr leicht überzeugen, wenn man zwei offene Gläser mit Kaltwasser füllt, das eine ruhig stehen läßt, in das andere aber eine Zeitlang durch eine Glasröhre Luft aus den Lungen bläst. Während in jenen das Wasser klar bleibt, wird es sich in diesem bald milchig trüben und allmählig ein weißes Pulver zu Boden senken, das nichts anderes als kohlenäurehaltige Kalk ist. Bei der ungeheuren Menge athmender Menschen und Thiere und

da auch bei jeder Verbrennung kohlenstoffhaltiger Körper, bei jeder Gährung und Gärung Kohlenäure erzeugt wird, enthält natürlich die ganze atmosphärische Luft dieses Gas beständig. Aber die Natur sorgt dafür, daß sich dieses Gas gleichmäßig durch den ganzen ungeheuren Raum verbreitet und nirgends eine bedeutliche Anhäufung desselben stattfinden kann. Ganz besonders ist es die Vegetation, welche durch ihre Lebensthätigkeit die Atmosphäre beständig von dieser schädlichen Luftart reinigt. Denn die Kohlenäure ist für Menschen und Thiere ein Gift, sie ist ebenso ungeeignet, das Leben, wie die Flamme zu erhalten. Für die Pflanze dagegen ist sie eine Nahrungsquelle. Jedes ihrer grünen Blätter saugt Kohlenäure aus der Luft ein, und unter dem Einfluß des Lichts wird diese in der Pflanze in ihre Bestandtheile zerlegt. Der abgeschiedene Kohlenstoff wird aufgespeichert, um zu mancherlei Gebilden verwendet zu werden, der freigesetzte Sauerstoff entwickelt wieder in die Luft.

Während also in der freien Natur für eine beständige Erneuerung der notwendigen Lebensluft gesorgt ist, steht es anders in abgeschlossenen Räumen. Hier wird die Luft in doppelter Weise verschlechtert. Sie wird einmal durch die Athmung ihres Sauerstoffs beraubt und verarmt mit jedem Augenblicke mehr an diesem wichtigen Bestandtheil, während andererseits die durch die Athmung erzeugte Kohlenäure sich anhäuft und die Luft in jedem Augenblicke zur Athmung untauglicher macht. Ein Zimmer von 12  $\frac{1}{2}$  im Geviert und gleicher Höhe enthält 1728 Kubikfuß Luft. Nehmen wir an, daß nur 25 Kubikfuß Luft in jeder Stunde durch die Lungen eines Menschen passiren, und daß 10 Menschen in diesem Zimmer athmen sollen, so wird schon nach 7 Stunden die gesammte Zimmerluft durch die Lungen der Menschen gegangen sein. Allerdings wird nicht aller Sauerstoff der eingeathmeten Luft in den Lungen verbraucht. Von den  $\frac{5}{6}$  Kubikfuß Sauerstoff, welche in den 25 Kubikfuß Luft enthalten sind, die jede Stunde die Lunge eines Menschen passiren, werden nur etwa  $\frac{1}{6}$  Kubikfuß verbraucht. Die 10 Bewohner des Zimmers werden also in jeder Stunde etwa  $\frac{12}{6}$  Kubikfuß Sauerstoff verbrauchen, und es wird etwa 29 Stunden dauern, bis sämtliche 361 Kubikfuß Sauerstoff, die in der Luft des Zimmers enthalten waren, verzehrt sind. Aber diese Rechnung ist nicht einmal ganz richtig. Allerdings kann die Luft, die einmal durch die Lungen eines Menschen gegangen ist, wieder eingeathmet werden; aber sie wird, wie die Erfahrung gelehrt hat, bei ihrem zweiten Eintritt in die Lungen nur noch einen kleinen Theil des ihr übrig gebliebenen Sauerstoffs abgeben. Wenn sie aber immer und immer wieder geathmet wird, so tritt sehr bald das Gefühl der Erstickung ein und zwar schon, wenn sie noch 10 Procent Sauerstoff enthält, also etwa die Hälfte der ursprünglich in gesunder, frischer Luft enthaltenen Menge. Bei einem Sauerstoffgehalt von 4—5 Proc. würde der Erstickungstod unvermeidlich eintreten.

ten. Dazu kommt nun noch die Beeinträchtigung des Athmens durch die sich in dem geschlossenen Raum anhäufende Kohlenäure. Für gewöhnlich enthält unsere atmosphärische Luft in 10,000 Raumtheilen nur 4 Raumtheile Kohlenäure. Da aber ein Mensch für jeden Raumtheil eingeathmeten Sauerstoffs etwa  $\frac{1}{10}$  Raumtheile Kohlenäure ausathmet, so wird jeder Mensch durchschnittlich 1 Kubikfuß Kohlenäure in der Stunde durch die Athmung erzeugen. In jenem geschlossenen Räume von 1728 Kubikfuß wird also von 10 athmenden Menschen bereits nach etwa 8 Minuten der Kohlenäuregehalt der Luft verdoppelt sein.

Dabei ist gar nicht einmal berücksichtigt, daß unter Umständen weit beträchtlichere Kohlenäuremengen ausgehaucht werden können. Nach der Mähleitz enthält die von uns ausgeathmete Luft 8 bis 9 Proc. Kohlenäure, und bei einer Temperatur von 0° athmen wir doppelt so viel Kohlenäure aus als bei 28 oder 30°. Angelegente Arbeit kann sogar die Kohlenäureausscheidung auf das 5fache des gewöhnlichen Verhältnisses steigern. Endlich sind es die Lungen nicht allein, welche Kohlenäure ausbilden, sondern die ganze äußere Haut unseres Körpers nimmt daran Theil. Man kann sich also denken, in welchem Maße sich in der Luft geschlossener, von Menschen erfüllter Räume allmählig die Kohlenäure anhäufen muß. In der freien Atmosphäre kann die ganze athmende Thier- und Menschenwelt keine irgend erhebliche Veränderung des Kohlenäuregehalts erzeugen. Mehr als 4 Raumtheile Kohlenäure in 10,000 Raumtheilen Luft sind hier selten vorhanden. Selbst in volkreichen Städten ist die Annahme der Kohlenäure in der Luft nur sehr gering. In Manchester hat man  $4\frac{1}{4}$  bis 5 Raumtheile Kohlenäure, bei sehr ruhigem Wetter wohl auch einmal 10 bis 12 in 10,000 Raumtheilen Luft gefunden. Schlimmer sieht es in unsern Wohnräumen, Ballsälen, Theatern u. s. w. aus. Pettenkofer fand<sup>1)</sup> in Sälen, wo viele Menschen versammelt waren, 30—70 Th. Kohlenäure auf 10,000 Th. Luft. Nach Dalton enthielt die Luft eines Saals, in welchem 2 Stunden lang 50 Lichter gebrannt und 500 Menschen geathmet hatten, 100 Th. Kohlenäure auf 10,000 Th. Luft, und Leblanc fand sogar in der Luft eines Theaters in Paris nach beendeteter Vorstellung 400 Th. Kohlenäure auf 10,000 Th. Luft, also einen Kohlenäuregehalt von 4 Proc. Daß eine solche Luft nicht gesund sein kann, wird Niemand bezweifeln. Kohlenäure ist zwar nicht geradezu ein Gift; sie ist sogar

beständig im Blute vorhanden, und auf ihrem Austausch gegen den Sauerstoff der Luft beruht das Leben. Aber die Anwesenheit einer gewissen Menge von Kohlenäure in der Luft verhindert die Ausscheidung von Kohlenäure aus dem Blute, und das Blut, das seine Kohlenäure nicht abgeben kann, vermag sich auch des lebendbringenden Sauerstoffs, der in der eingeathmeten Luft noch vorhanden ist, nicht mehr zu bemächtigen. Das Athmen in so verderbter Luft muß allmählig aufhören, Ersticken tritt ein, gerade so als ob die Kehle zugeschnürt würde.

Verminderung des Sauerstoffs und Anhäufung von Kohlenäure sind allerdings die Hauptgründe der Verfalls- und Vergiftung der Luft in geschlossenen Räumen. Aber es kommt noch eine andere Verderbnis hinzu, die sich uns sogar gewöhnlich am auffallendsten bemerkt. In Folge der Athmung und der Hautausscheidung verbreiten sich nämlich aus unserm Körper gewisse Stoffe, wie Ammoniak, Butteräure, Baldrianäure u. s. w., in die Luft, die einen höchst unangenehmen Geruch besitzen. Die Luft wird von diesen flüchtigen Stoffen bald genug gesättigt; aber die Bildung derselben in unserm Körper dauert fort, und da sie nun nicht mehr verdunstet können, so häufen sie sich in dem Körper an und veranlassen Störungen in seinen regelmäßigen Funktionen, die uns das Gefühl des Unwohlseins erzeugen. Allerdings könnte dieser üble Geruch uns und das sicherste Kennzeichen einer verderbten Luft abgeben. Aber leider stopft sich unsere Nase bei längerem Aufenthalt in solcher Luft sehr bald gegen üblen Geruch ab, und gerade dadurch kommt es, daß wir wohl gar meinen, man könne sich allmählig auch an die schlechte Luft gewöhnen. Allerdings verbinden trotz unsrer vielgerühmten Civilisation Tausende und Millionen von Menschen ihr Leben in Räumen, die von verpesteter Luft erfüllt sind; aber daß sie darunter leiden, daß Siechthum und vorzeitigster Tod die unausbleibliche Folge dieser Lebensweise ist, beweist die Statistik der Waisen-, Kranken- und Gefangenhäuser, wie die Erfahrung großer Städte, namentlich der englischen Fabrikstädte, nur zu unwiderleglich. Gesunde Luft zu schaffen, ist eine der wichtigsten Aufgaben unser Zeit, und wie merkwürdig leben, daß unsere heutige Wissenschaft nicht bloß die Uebel aufzusuchen, sondern auch zu heilen, daß sie nicht bloß durch den Nachweis ungesunder Luft in unsern Wohnungen uns zu erschrecken, sondern auch durch die Aufsuchung ungesunder Luft uns wieder zu erfreuen weiß.

## Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen.

Von A. P a n i g.

### 3. Das Vaterland des Bernstein's).

Daß das Samland nicht das Vaterland des Bernstein's sein kann, daß er hier nicht in seiner ursprünglichen Lager-

1) Wir verweisen zur eingehenderen Orientirung über das Letztstärgebirge Samland: 1) auf Dr. Ule's Arbeit im Jahrg. 1861

stätte ruht, geht schon aus der von den glauconitischen Sanden eingeschlossenen fossilen Fauna hervor. Aukern

dieser Zeitstufe und 2) auf Prof. Zaddach's größern Auffatz, der im 8. Bande der Schriften der geologischen ökonomischen Gesellschaft 1867 abgedruckt wurde. Derselbe enthält nicht nur eine genaue

(*Ostrea Ventilabrum* Goldf.), Herzmuscheln (*Cardium vulgatissimum* Mayer), Seeigel und Krabben geben den nicht zu bezweifelnden Beweis, daß die gesammte Bernsteinsablagerung eine Meeressablagerung ist. Der Bernstein wurde aus dem Hohen des Balbes, in dem er sich gebildet hatte, mit den glaukonitischen Sanden nach dem Samlande geschwemmt, wo wir ihn jetzt mit den Stoffen zugleich finden, welche den glaukonitischen Sand zusammensetzen. Deshalb richtete Professor Zaddach vom Beginn seiner Untersuchungen besondere Aufmerksamkeit auf alle füßlichen Einschlüsse, die sich in der Bernsteinerde und allgemeiner in der Glaukonitformation fanden, um aus ihnen wenn möglich die Richtung des Weges zu finden, den der Bernstein zurückgelegt hatte. Denn wenn auch größere Steine in der Tertiarformation nicht vorzukommen pflegen, so war es doch bekannt, daß zuweilen in der Bernsteinerde kleine Geschiebe flurischen Kalkes gefunden worden waren. Von den 16 Nummern, die Prof. Zaddach als fremde Einschlüsse der blauen Erde in seiner Arbeit aufzählt, erwähnen wir nur zwei (Nr. 11 u. 15); es sind dies 1) 2 Stücke flurischen Kalkes (Beyrichienkalkes) und 2) der „graue oder graulich-weiße Kalkmergel“ nach F. Römer.

Der Beyrichienkalk wurde in zwei Stücken in Faustgröße mit zahlreichen Vertiefungen im sogenannten Keant bei Warniden gefunden. Die darin enthaltenen Thiere sind: *Chonetes striatella* Dalman, *Tentaculites annulatus* Schilth., *Rhynchonella nucula* Murch., *Beyrichia Buchiana* Jon. und *B. tuberculata* Boll., *Laperdilla baltica* His. u. f. w. Diese Stücke stimmen nun in ihrer Zusammensetzung vollkommen mit denjenigen Geschieben überein, welche sich an der turischen Westküste zwischen Winbau und Eibau finden. Außerdem zeigen sie die größte Verwandtschaft einerseits mit Stücken von Döbbsaare-Pant auf Dösel, stimmen aber mit beiden nicht vollkommen überein, da z. B. am letztgenannten Orte die *Beyrichia Buchiana* noch nicht aufgefunden ist. Es ist daher höchst wahrscheinlich, daß jene Stücke aus dem oberflurischen Lande stammen, welches einst Dösel mit Gottland verband und vom Diluvialmeere ausgewaschen wurde.

Darstellung der Lagerung und Verbreitung der Bernsteinischeit im Samlande, sondern auch einen auf sichere Thatfachen gestützten Nachweis der Entstehung und Herkunft des Bernsteins. Der Arbeit sind 12 Tafeln beigegeben; die erste bringt die Küste der nordwestlichen Ecke Samlands und eine Durchschnittszeichnung derselben Küstenstraße; die 9 folgenden geben in 17 Abtheilungen ein vollständiges Bild der ganzen etwa 4 Meilen langen Küstenstraße von Rantau bis Brösterret auf der Nordseite Samlands und von Brösterret bis Palmaniden auf der Westseite. Jede dieser Abtheilungen zeigt den im Ganzen zwar regelmäßigen und doch an entfernten Punkten recht verschieden erscheinenden Bau des Landes, an dem sich die 3 Formationen: die Formation der grünen Sande (Glaukonitformation), die Braunkalkformation und das Diluvium, betheiligen. Die beiden letzten Tafeln stellen in einem größeren Maßstabe die Durchschnitte von 18 verschiedenen Punkten dieser Küste dar.

Der von den Arbeitern als Mergelsteine bezeichnete graue oder graulich-weiße Kalkmergel stimmt genau mit den im Diluvium vielfach verbreiteten Kreidegeschieben überein. Diese Steine sind im Innern grau, fest, spröde, mit saft muscheligem Bruche, dem Hornstein oder selbst dem Feuerstein ähnlich und außen gewöhnlich mit einer mehr oder weniger breiten Verwitterungsrinde versehen, die gelblich-weiß, weich, erdig und abkörnig ist. Ihr Kalkgehalt ist indessen nur gering. Die feinen Glaukonitkörner und Stimmerchuppen sind in diesen Steinen zahlreich vorhanden. Charakteristisch für das Gestein sind die häufig darin vorkommenden Vertiefungen: *Ostrea vesicularis* Lamk. und *O. lateralis* Nils., *Terebratulina carnea* v. Buch., *Belomnitella mucronata* D'Orb., *Scaphites* und Fischschuppen. Die Färbung dieser Mergelsteine ist Bornholm, wo sie in der dortigen Grünfandformation der Kreide vorkommen. Es ist somit erwiesen, daß das Material, aus dem sich die tertiäre Glaukonitformation des Samlands aufgebaut hat, unmittelbar aus den mergeligen Sandsteinen der Grünfandgruppe hergenommen ist.

Besonders interessant sind aber außerdem die beiden Stücke des Beyrichienkalkes, da sich durch die in ihnen enthaltenen Vertiefungen die Gegend, aus der sie herstammen, genauer bestimmen läßt. Es ist dies, wie oben erwähnt, die Gegend zwischen Gottland und Dösel. Diese beiden aus den jüngeren flurischen Schichten gebildeten Inseln waren zur Tertiarzeit mit einander und wahrscheinlich mit Bornholm verbunden, wo im südlichen Theile der Insel dieselben Schichten auftraten. Die flurischen Geschiebe sind daher nur in dem nördlichen Theile der samländischen Glaukonitformation gefunden worden. Der Umstand, daß sie dort mit Grünfandgeschieben<sup>2)</sup> zusammen vorkommen, beweist, daß zur Tertiarzeit auch im Norden Samlands und in der Gegend von Gottland und Dösel die älteren Schichten der Kreideformation entwickelt waren. Es bildeten also wahrscheinlich einen breiten Gürtel um das aus fossilischen Gesteinen und flurischen Schichten bestehende norduropäische Festland. Erst zur Diluvialzeit wurden sie zerstört und zwar so gründlich, daß jetzt nur noch geringe Ueberreste auf Bornholm und in Schonen oberhalb des Meeresspiegels erhalten sind. In Bornholm hat man ihre untere Grenze in 170 Fuß Tiefe noch nicht erreicht, und man kann daraus auf die Größe und den Umfang der Massen schließen, welche das Diluvialmeer zertrümmerte.

Mit dem Vortrage der samländischen glaukonitischen Sande ist auch das Vaterland des Bernsteins nachgewiesen. Auf den Grünfandfandschichten der Kreideformation, welche

2) Die Grünfandgeschiebe finden sich besonders häufig bei Bangor und bestehen aus zahlreichen Stücken von Erbsen bis Ballaungröße, die durch ein reichliches Sandmittel von gelblich-weißem Mergel mit groben Quarzforrern und ziemlich großen Glaukonitkörnern von milchweißer, bläulicher oder grünlicher Farbe und von abgerundeter Gestalt zusammengeklebt werden.

einfällt im Bereiche der jetzigen Ostsee lagen, muß die ursprüngliche Lagerstätte desselben gewesen sein. Dort müssen mit vielen Laubbäumen (Buchen, Birken, Eichen, Kampferbäumen, Eichen- und Weidenarten) und andern Nadelbäumen die Bernsteinsäulen gewachsen sein. Sie mögen, wie die Krebsschichten, eine recht weite Verbreitung an den Küsten des alten nordeuropäischen Festlandes gehabt haben. Das samländische Tertiärmeer aber erhielt den Bernstein von dem Lande, welches sich zwischen den jetzigen Küsten Samlands und den Inseln Bornholm, Gotland und Oesel ausbreitete, vielleicht auch nur von einem schmalen Striche dieses schon sehr weiten Landes. Aus der Form der Bernsteinsäulen in der blauen Erde kann man sogar schließen, daß die Ufer jenes alten Meeres nicht sehr weit von der jetzigen samländischen Küste entfernt gewesen sein müssen; denn die Bernsteinsäulen der blauen Erde sind sämtlich an den Ecken und Kanten etwas abgerundet und zeigen dadurch, daß sie von den Meereswogen einige Zeit umgeworfen wurden, ehe sie an der Stelle, wo wir sie jetzt finden, zur Ruhe kamen. Die weißen Bernsteinsäulen finden sich in Formen erhalten, die das flüssige Harz in den Bäumen annehmen konnte. Es sind Tropfen und Zapfen, schalige Stücke mit hohlen Flächen und vorspringenden Kanten, die einst einem Baum-

zweige anhaften, platte Stücke, die sich zwischen Rinde und Holz bildeten, und die bald sehr unregelmäßige bald ebene Oberfläche läßt oft eine Menge feiner Eindrücke und Abdrücke erkennen. Da die Bernsteinsäulen bei der geringen Härte des Minerals diese mannigfaltigen Formen bewahrt haben, so läßt sich nicht annehmen, daß sie lange Zeit am Boden des Meeres umgeworfen oder durch Wähe und Flüsse von weiter herangeschwemmt wurden. Hieraus ist man wohl zu dem Schlusse berechtigt, daß die Bernsteinsäulen den größten Theil des Weges, den sie machten, von den Wellen getragen zurücklegten. Der Bernstein selbst lag höchst wahrscheinlich nur auf den Krebsschichten, die, in großer Ausdehnung ausgebreitet und zertrümmert, das Material zum tertiären Glaukonitfand hergaben.

Da der Glaukonit im samländischen Tertiärgebirge eine so wichtige Rolle spielt, so dürfte zur näheren Charakterisirung desselben eine Analyse um so mehr von allgemeinem Interesse sein, als wir der letzteren gleichzeitig die Analyse des Glaukonits anderer Gegenden beifügen können<sup>3)</sup>.

3) Die Analysen wurden von Berthier, Hauschke und Grewing! ausgeführt.

Glaukonit						
	von Benedictowen, wahrscheinlich aus der Kreide	aus der Kreide von Rönning in der Oberpfalz	= Mergel aus der Kummeltens- formation des Krei- senberges bei Trautstein	von Kratzpehlen im Samlande	aus dem glaukonitischen Sande von Antila in Upland	aus dem Glauko- nitfand von Ballis- port in Upland
Kieselsäure .	47,6	50,2	49,5	50,23	51,83	50,24
Eisenoxyd .	21,6	28,1	22,2	25,66	15,93	16,21
Eisenoxydul .	3,0	4,2	6,8		4,73	4,80
Thonerde .	4,2	1,5	3,2	—	9,20	9,76
Bittererde .	1,4	—	—	0,69	3,79	3,62
Kalk . . .	2,4	—	—	0,93	0,30	0,30
Kali . . .	4,6	5,9	8,0	7,53	8,02	8,09
Natron . .	—	—	—	—	0,02	0,14
Wasser . .	14,7	8,6	9,52	14,88	6,52	6,48

Das schon oben erwähnte nordeuropäische Festland wurde im Süden von dem Tertiärmeer begrenzt, das schon Beplich im J. 1855 in seinen Grenzen darzustellen versuchte. Da wir die Ausdehnung der Glaukonitformation in Preußen nicht kennen, wohl aber wissen, daß auf sie sich in unmittelbarer Folge die Braunkohlenschichten abgelagerten, so werden durch letztere die Grenzen des Tertiärmeeres in unser Provinz ungefähr bestimmt. Wir nehmen also an, daß ganz Westpreußen, ein angrenzender Theil Pommerns und etwa die östliche Hälfte Ostpreußens den

Boden eines Meerbusens bildeten, der im SW. mit dem großen Tertiärmeer zusammenhing. Seine Ufer umjog in einiger Entfernung das Samland, setzten sich im Westen mit einigen Biegungen fort bis Rückhöft in Westpreußen und zogen dann südwestlich durch Pommern (Rütow, Tretow und Rühr). Im Norden reichte ein Zipfel des Meerbusens bis Memel hinauf, wo Dr. G. Verbrant neuerdings Braunkohle entdeckte, und sein östliches Ufer lag etwa an der Dignisse Samlands und wandte sich bei Allenstein und Hohenstein ebenfalls nach SW. Dieser ganze

Meerbusen war ein Becken in der Kreideformation, die wieder auf Juragesteinen oder flurischen Gebirgsarten ruhte.

Das nordeuropäische Festland war ein großes und zum Theil uraltas Land, dessen Kern aus den kristallinen Gesteinen Finnlands und Skandinavien's zusammengesetzt wurde. Es hatte sich von N.W. nach S.D. allmählig in den ältesten Zeiten aus dem Wasser erhoben; das immer mehr nach S.D. zurücktretende Meer ließ immer neue Niederschläge zurück und bildete so die verschiedenen Stufen der flurischen und devonischen Formation (in den russischen Ostseeprovinzen). Während der Jurazeformation wurde dieses Land wahrscheinlich im Süden von einem großen Meere bespült, dessen Grenzen unbestimmbar sind, weil seine Niederschläge von jüngeren Gebirgsarten verdeckt oder vom Disjunktivmeere gestört wurden. Später veranlaßte sich das Jurameer mit mehrfacher Veränderung seiner Ufer in ein Kreidemeer, das in weiter Ausdehnung von West nach Ost Nordeuropa von Südeuropa trennte. Bedeckt wurden davon England, Frankreich, ein Theil Norddeutschlands, Jütland, die Südspitze Schwedens und Dänemark; im Norden bespülte es wahrscheinlich das flurische Gebiet und bedeckte Preußen bis zum Niemen. Die Ablagerungen dieses Meeres müssen ungemein bedeutend gewesen sein, denn in einem Brunnen bei Thora hat man sie über 300 f. mächtig gefunden (Grünland, Kreidemergel und weiße Kreide). Dieselben Ablagerungen finden sich im südlichen Schweden und Dänemark. Von dem großen Kreidemeere blieb gegen das Ende der Kreidezeit nur der eben beschriebene Meerbusen übrig, und von den mächtigen Niederschlägen wurden weite Strecken trocken gelegt. Neben dem flurischen Lande lag nun der neue Kreideboden wie ein breites Band da, welcher die Ausdehnung des nordeuropäischen Festlandes um ein Bedeutendes nach Süden erweiterte. Wahrscheinlich senkte sich das im Ganzen nur flache Land in mehreren Stufen nach dem Meere. Von denselben strömten mit nur geringem Falle viele Bäche und Flüsse in den Meerbusen. In den nördlichen Theil desselben aber ergoß sich von N.W. der ein größerer Fluß, der aus dem südlichen Theil des Kreidelandes kam. Seine Strömung setzte sich meilenweit in das Meer fort (wo jetzt Groß-Hubnicken an der Westküste Samlands liegt); wo sie schwächer wurde, entstand am Meeresgrunde eine Sandbank, die allmählig ein eigenes Becken für die Ablagerungen der vom Fluße herabgeführten Stoffe bildete. So waren wahrscheinlich in dem Meerbusen in unmittelbarer Folge auf die Kreideschichten die ältesten Tertiärschichten entstanden. Ob die Bernsteinschicht wirklich die älteste Tertiärablagerung ist, und wie tief sie hinabreicht, sind noch Fragen, welche ihrer Beantwortung harren. Ihr Abfall hat sicher eine sehr lange Zeit in Anspruch genommen.

Die neuen Landstrecken bedeckten sich allmählig mit Pflanzen. Auf den flachen und sumpfigen Küstenrändern erhob sich ein dichter Wald, dessen Schilderung wir hier übergehen, da eine farbenreichere, als wir sie zu sehen im Stande sind, bereits Dr. R. Müller in seinem „Pflanzenstaat“ (S. 180—184) niederlegte. Es vereinigten sich hier nicht nur Pflanzen der gemäßigten mit denen der kalten Zone, sondern wir finden auch die Kämpferbäume, deren lebende Verwandte jetzt nur noch in Japan und China gedeihen. Die zum Wachsthum dieser Pflanzen notwendige höhere Temperatur des nordeuropäischen Festlandes erklärt sich dadurch, daß seine Südküste von einem mittels europäischen Meere bespült und jedenfalls durch warme Meeresströmungen noch erwärmt wurden.

Viele Jahrhunderte mochte der Wald bestanden haben, Laufende von harzreichen Bernsteinschichten waren zu Boden gesunken und durch neue Generationen ersetzt worden. Das Holz vermoderte, das erhärtete Harz oder häufte sich in Stümpfen, Ser'n und im Boden des Waldes zu großen Massen an. — Während der Glaukonitformation aber war das Land im Niedersinken, wie auch ein Ueberrest jenes Landes, das jegige Skandinavien, noch deutlicher zur Ruhe gekommen ist. Wenn sich die Küste während der Bernsteinschicht auch nur langsam senkte, so konnte doch im Laufe der Jahrhunderte ein großer Theil einer flachen Küstenterrasse vom Meere bedeckt werden. Der aufgelockerte Waldboden wurde von den Wogen fortgeschwemmt und der darin befindliche Bernstein in's Meer geführt. Der Wald selbst wurde natürlich niedergeworfen, und die in's offene Meer geschwemmten Stämme gestreut sich. Vielleicht erhielten sich in den höher gelegenen Theilen des nordeuropäischen Festlandes die Wälder noch lange Zeit.

Die Ablagerung des grünen Sandes dauerte noch fort und fort; neue Bernsteinschichten legten sich auf den Meeressoden, und im Umfange der Anschwemmungen des Flusses, der vielleicht in höher gelegenen Gegenden noch unversetzte Wälder oder bernsteinschichtige Ser'n durchströmte, wurde mit thönigen Anschwemmungen zugleich Bernstein in größerer Menge abgelagert. Das Ende der glaukonitischen Ablagerungen wurde jedenfalls durch die tiefe Senkung des Landes hervorgerufen, so daß die tiefsten Schichten der Kreideformation (Grünland und Sandstein), die bisher das Material für die Tertiärbildungen geliefert hatten, vom Meere verdeckt und dadurch dem Ungemüth der Wogen entzogen waren.

4) Der Pflanzenstaat oder Entwurf einer Entwickelungsgeschichte des Pflanzenreichs. Eine allgemeine Botanik für Schulen und Naturforscher von Dr. R. Müller von Galle. Leipzig, Buchhandlung. Preis 2 $\frac{1}{2}$  Thlr.

## Ein unscheinbarer Fortgeschülfe.

Von Paul Kummer.

„Küßen hat herrliche Buchenwälder“, — einfach so oder mit dem Zusatz, daß dieselben die berühmte Stubbenbühnen ausmachen, weiß das jeder Deutsche, der sich um die Herrlichkeit seines weiteren Vaterlandes kümmert.

Warum sollten sie auch nicht herrlich sein! Die Buche ist an sich schon ein majestätisch prächtiger Baum. Durch die ganze Stubbenbühnen bin, meilenweit Stamm an Stamm gereiht, weiß ihre Großartigkeit ganz besonders zu imponieren, wenn der Sonnenschein friedlich auf sie niederseht, wie wenn ihre Kronen im Sturme rauschen. Und die Kreideseiten von Stubbenkammern sammt dem blauen Meer der meilenumrauschten Götterinsel geben den Küßen'schen Buchenwäldern eine ganz besonders prächtige Randverzierung.

Aber diese Waldungen sind doch nicht immer schön. So waren sie es z. B. nicht im J. 1868. Die Schönheit eines Baumes ist seine grünläufige Krone, und wenn dieser Kronenschmuck fehlt, so ist selbst der Königin der Bäume ihre Herrlichkeit genommen, und sie steht elender da als die gemeine Fichte, die niemals ein Laubblatt getragen hat. Solchen schönen Anblick haben im Jahr 1868 und auch schon 1866 die prächtigen Stubbenbühnen geboten; es gilt eben auch in der Natur der zu Zeiten geschichtlich anerkannte Grundsatz: die Höfen sollen gedemüthigt werden! Nackte Ruthenkronen starrten in den blauen Himmel auf; meilenweit konnte man wandern, überall fehlte das Laub, und wo sonst der prächtige Buchenschatten erquickte, da brannte die Sonnengluth dreißig hindurch. Welche Verwüstung, welches sommerliche Elend, welche Verunsaltung des herrlichen Eilandes! Nur wer im Boote den Strand entlang fuhr, sah auf den kreidigen Uferhöhen noch leidlich unversehrte Gruppen stehen.

Der Urheber dieser Daten ist weder Sturm noch Frost, auf welche der Sommer des J. 1868 ein Spott gewesen, sondern ein lebendiger Feind in der Gestalt einer ansehnlichen gelbhaarigen Würstchenraupe. Ihre schrotende Verästeltheit ließ überall sich hören, an allen Stämmen kroch sie, und auf allen Blättern saß sie rittlings und ließ ihren Koth aus der Höhe sichtbar und hörbar zur Erde fallen. Ein weißlicher Schmetterling, der, träge umherflatternd, wie über die Verwüstung staunend, träumerisch an den Stämmen hing, war vor Allem Anfang August reichlich vorhanden und setzte seine Eier schon wieder ab, damit das traurige Waldbewüchsergeschlecht auch in kommenden Jahren nicht fehle. So richtete er es ein, — sofern Wind und Wetter, Frost und Nässe, anstehende Injuncturen und die eier- und raupenvertheilende Vogelwelt die sorgliche Rechnung des heutigen Valters nicht durchkreuzten.

Aber es gibt noch andere Striche, die durch die Rechnung gemacht werden können.

Bei meinem Aufenthalte auf Küßen im J. 1867 bin ich in der Lage gewesen, den aller schlimmsten Feind des schlimmen Raupenvolkes kennen zu lernen. Was mir da aber, wo der Buchenwald mit üppiger Krone leuchtete wie aus Schöpfershand eben hervorgegangen da stand, nur nebenbei interessant vorkam, erscheint mir nach der Kenntnisnahme von der Waldbewüstung in einem ganz neuen, hochbedeutsamen Lichte, als eine Illustration zu dem Ausgleichungskampfe in der Natur und zwar zu einem Kampfe, wo der Schwache den Starken überwindet, ja, wo auch einmal das stille Pflanzenreich die widerbäufte Thierwelt gewinnt.

Der ganze Stubbenbühnengrund hat den weichsten, üppigsten Moosgrund, der nur die und da von Waldblumen, Erdbeeren und Farnkräutern durchbrochen ist. Auf dieser moosigen Bodenbede fiel mir das reichliche Vorkommen eines orangegelben, aufrecht wurmförmigen Pilzes auf, den ich anfangs nicht beachtete, indem ich ihn für den älteren in Wäldern gemeinen gelben Keulenpilz, vom Walke Ziegenbart genannt, hielt. Aus dem grünen Waldrunde schaute er in einer noch nicht vorgekommenen Anzahl zu Tausenden und aber Tausenden hervor. Bei einer genaueren Betrachtung erkannte ich in ihm bald einen Pilz ganz anderen Kalibers und zwar von sonst ziemlich seltener Art. Es war eine sogenannte Keulenphäre (Cordyceps militaris). Er gehört zu den schönsten Arten, welche die Familie der sonst unscheinlichen Kernpilze, jener schwärzlichen Pusteln am Holze, zu der er zählt, enthält. Straff militärisch, woher sein Beiname, streckt er sich als eine federleichte, unten verdünnte, bis 2 Linien hohe Krone aus der moosigen Erde hervor und leuchtet durch seine gelbe Drangenfarbe dem Auge unwillkürlich entgegen. Sein Kernpilzcharakter besteht darin, daß das Keulchen oberhalb ein von Perithecien durchsetzte Dberhaut hat, welche ein Conglomerat von mikroskopisch kleinen Schläuchen sind; in diesen Schläuchen sind die Samen, Sporen genannt, welche zur Keiszeit ausgestreut werden.

Ich nahm mich der Waldesgrundschönen an und hob den schlanken Pilz nach Gewohnheit vollständig bis auf den gallistig in der Erde gelegenen Grund aus. Siehe aber, am Grunde hing ein großer Cocon, aus dem, die Coconschale durchbrechend, der Pilz herausgewachsen war. Beim Aufbrechen zeigte sich der Cocon als völlig erfüllt von Moeslummasse, der schimmelartigen Grundlage aller Pilze. Unzählige Cordyceps hob ich nun aus, — bei allen dieselbe Erscheinung: Immer hing an ihrem Ende der befruchtete Cocon, und selbiger war immer durchwachsen von der Grundausbreitung des Pilzes; von dem thierischen Inhalte war nirgend eine Spur mehr, derselbe war gänzlich aufgebraucht. Die Geburtsstätte und Wiege des Valters war so

demselben zum Gorge geordnet, und doch, wie die Natur es allenthalben liebt und übt, wiederum zur Geburtsstätte eines andern fröhlich zum Lichte eintretenden Wesens.

So war unzähligen Festschmetterlingen der Lebensfaden durchschnitten, ehe sie noch wurden, was sie werden sollten. Sie kamen gar nicht dazu, das grüne Buchenlaub nur zu schauen, geschweige denn für kriechende Nachkommenschaft zu sorgen, die es gernage. Vielleicht war das ein vornehmlicher Grund, daß die Buchen im J. 1887 unversehrt standen. Der Schmetterling hat eben mehrere Generationen im Jahre, und da die ersten Cocons am Ankommen verhindert waren, so war der Vermehrung von Anfang an ein Damm gesetzt; die wenigen ausgekommenen Schmetterlinge waren nicht im Stande, durch ihre Eierlage einer waldbewerkenden Menge von Raupen das Leben zu geben.

Wie der Pilz in den Cocon komme, ist damit freilich noch nicht gesagt. Man möchte an eine Urzeugung denken, so daß etwa durch bloße Fäulnis des durch Bodenrässe abgeforderten Coconinhaltes pilgiges Leben von selber entsünde. Aber von selber entsteht so etwas nicht, sofern nicht Keime bestimmter Organismen vorhanden sind. *Omne vivum ex ovo*, das ist nicht ein Glaubenssatz, sondern ein durch hinreichende Experimente evident gewordener Wissens-

satz der heutigen Naturwissenschaft. Aber die Keime können eben von Menschenaugen ungesehen reichlich vorhanden sein, denn zu ihrer Wahrnehmung gehört schon ein gutes Mikroskop. Und wer will sie nachweisen oder leugnen in einem meilenlangen Walde? Die Bedingung zur Entwicklung vieler Pilzkeime ist aber die Berührung mit insektischen Leibern. Da haften sie; sie wuchsen daran aus zu einem schimmelfähigen Mycelium, und nach vielleicht erst längerer Zeit erhebt sich der augenfällige ausgebildete Pilz daraus. — Nach der Analogie von bekannten Seidenraupenkrankheiten dürfen wir auch hier annehmen, daß die Raupe schon angefallen wurde von den Pilzsporen und diese schon in der Raupe sich leise entwickelten. Das hindert: die Raupe aber nicht sich einzuspinnen. In der Puppe aber erst schritt das Myceliumwachsthum energischer fort; es erstickte das insektische Leben darin und versetzte zu feiner Bildung den ganzen Inbalt. Zuletzt wurde selbst die hornige Coconschale gesprengt und durchbrochen, — und der schlanke Cordocrepilz sproßte heraus.

Daß dieser aber legionenweise gebeide und ein geheimes Segen des Buchenwaldes werde, dazu gehört wie bei allen Pilzen eine besondere, vor Allem eine anhaltend feuchte Witterung. In solchem Jahre, wie in dem nassen 1887, wird darum die Bedingungen solcher pflanzlichen Kämpfe geben eine überschwängliche Insektenwelt gegeben.

## Kleinere Mittheilungen.

### Kater und Sperling.

Der alte Rentier C. in Cottbus hielt sich einen Kater und einen Sperling, die er an sich und an einander so gewöhnt hatte, daß die drei ein unzerrenliches Aleeblatt bildeten. Es suchte aber jedes lebende Wesen seine Herrschaft so weit geltend zu machen, als dies irgend möglich ist, und nicht immer liegt der Stärkere, sondern zuweilen auch der Weichere oder sogar der Dreistere und Fickere. Wenn die beiden Thiere zusammen fragten, so überließ der Kater seinem Freunde geduldig das Auskuchen der besten Bissen. Nachher lag der Kater lang gestreckt, und der Sperling lag auf ihm. Der Sperling liebte den Sonnenschein, der Kater die Ruhe. Wenn nun der Kater seinen Ruheplatz nicht in der Sonne genommen hatte, oder wenn der Sonnenschein abgewichen war und der Kater wieder im Schatten lag, so hüpfte der Sperling herunter, suchte den Kater am Schnurrbart und ließ ihm nicht eher Ruhe, als bis er aufstand und sich wieder in die Sonne legte. Oftmals schnarrte er dabei verächtlich nach dem Sperling, dieser aber hüpfte nur drei seiner Schritte zurück und begann furchtlos seine Redereien von Neuem, bis er seinen Zweck erreicht hatte, woraus herorgeht, daß ein Sperling mehr ist, als ein Kater.

Q. Solge.

### Verbrauch von Streichzündhölzern.

Es gibt gewisse kleine Dinge, die einzeln ohne Werth der allgemeinen Verachtung anheimfallen, die aber in ihrer Gesamtheit

einen sehr achtbaren Werth repräsentiren, der sogar in dem großen Haushalt der Völler einige Bedeutung erlangt. Eine der verachtetensten dieser Kleinigkeiten ist wohl ein Streichholz, und selbst jener arme Knabe, der durch das Aufheben einer Streichnadel den Grund zu seiner späteren glänzenden Laufbahn als Banquier und Staatsmann legte, würde heute scheinbar einem Schwefelholz dieselbe Aufmerksamkeit schenken. Gleichwohl geht in dieser Kleinigkeit Alljährlich ein ganz ansehnliches Kapital in Rauch und Flammen auf. Man hat berechnet, daß in Frankreich 6, in England 8, in Belgien 9 Streichzündhölzer pro Kopf und Tag verbraucht werden, und in dem rauchenden Deutschland dürfte die Zahl leicht noch größer sein. Nehmen wir indeß nur die kleinste Zahl als Durchschnitt an, so ergäben wir doch für ganz Europa einen täglichen Verbrauch von 2 Millionen, und diese repräsentiren mindestens 400,000 Pfd. Holz. Der jährliche Verbrauch würde also etwa 145 Mill. Pfd. Holz betragen. Von dem leichtesten Holzarten (Eiche und Buche), die gewöhnlich dazu verwendet werden, wiegt der Kubfuß nicht mehr als etwa 13 Pfd. Danach würden in Europa allein jährlich gegen 10 Mill. Kubfuß oder 90,000 Alaster Holz in den verachteten Zündhölzern vernichtet werden. Rechnen wir dazu den Verbrauch von Phosphor, der ungefähr 420,000 Pfd. jährlich beträgt, und den Lohn der Arbeiter, deren Zahl man auf 30,000 schätzt, so ergibt sich ein Gesamtwert der jährlichen Zündholzfabrikation in Europa von mindestens 65 Mill. Thaler.

D. H.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 25 Sgr. (1 fl. 30 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verleger: Scherzelsche Buchdruckerei in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 4.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

**27. Januar 1869.**

**Inhalt:** Gesunde Luft, von Otto Me. Zweiter Artikel. — Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen, von G. Düp. 4. Die Braunkohlenformation und die geologische Karte der Provinz Preußen. Fester Artikel. — Der Sand und dessen Herkunft, von Heinrich Wirth. Fester Artikel.

## Gesunde Luft.

Von Otto Me.

Zweiter Artikel.

Leider ist es eine Thatsache, daß trotz unser vielge-  
rühmten Civilisation die meisten Menschen den größten  
Theil ihres Lebens in Räumen zubringen, deren Luft ge-  
radzu als schädlich für die Gesundheit bezeichnet werden  
muß. Wir wollen ganz außer Acht lassen, daß in den  
meisten Städten es noch enge, finstere Straßen, Gassen  
und Höfe in Menge gibt, die nicht einmal im Freien eine  
völlig reine Luft zu athmen gestatten. Aber wir wollen  
nur einige Räume durchwandern, in denen sich Menschen  
längere Zeit aufzuhalten pflegen. Treten wir zunächst in  
die Schulen ein, in denen unsere Kinder einen großen Theil  
ihrer schönsten Lebensjahre verbringen, die Zeit ihrer kräf-  
tigste Entwicklung, in der sie des raschesten Stoffwechsels  
bedürfen und durch eine Stockung in der Erneuerung der  
Organe am leichtesten der Grund zu bauerndem Siechthum

oder frühzeitigem Tode gelegt wird. Wie oft kommt es vor,  
daß Klassen so überfüllt sind, daß auf jeden Schüler kaum  
150 Kubikfuß Luft kommen, trotzdem, wie wir sehen wer-  
den, 2400 Kubikfuß Luft in jeder Stunde für jeden ath-  
menden Menschen erforderlich sind, wenn die Luft eines ge-  
schlossenen Raumes nicht verdrängt werden soll? Wie mag  
da in der dritten oder gar vierten Unterrichtsstunde die Luft  
beschaffen sein, da ja bekanntlich Kinder, weil sie schneller  
athmen, trotz ihrer geringeren Körpergröße fast gerade so viel Luft  
verbrauchen, als Erwachsene? Pectenlofer, der Unter-  
suchungen über die Luft verschiedener Lokalitäten angestellt  
hat, fand in einem schönen, geräumigen Schulzimmer von  
29 1/2 F. Länge, 23 1/2 F. Tiefe und 15 F. Höhe, also  
von 10,400 Kubikfuß Inhalt, das mit 3 hohen Fenstern  
versehen war, und in welchem sich 70 Schülerinnen von



9—10 Jäten befanden, am Schlusse des zweifünftigen Nachmittagsunterrichts nicht weniger als 72 Theile Kohlenfäure auf 10,000 Theile Luft. Also die Luft dieses Schulzimmers, das man gewiß zu den besten rechnen und schwerlich für überfüllt halten wird, enthielt die 18fache Kohlenfäuremenge, welche der gewöhnlichen gefundenen Luft zukommt, und in demselben Maße hatten sich darin natürlich auch die schädlichen und überdrückenden Gase und der Wasserdampf angehäu't. In einem andern Münchner Schulhause betrug in einer Klasse von gleichem Rauminhalte, die mit 54 Schülern besetzt war, der Kohlenfäuregehalt der Luft nach zweifünftigem Unterricht 61 auf 10,000 Theile. In einer Gymnasialklasse von nur 8025 Kubikfuß Inhalt, die mit 66 Schülern von 10—12 Jahren besetzt war, stieg der Kohlenfäuregehalt der Luft nach 2 1/2 Stunden sogar auf 94 in 10,000 Theilen, also fast auf das 24fache des normalen Gehaltes reiner Luft.

Nicht besser, zum Theil sogar schlimmer sieht es in den Räumen aus, in die wir uns zur Erholung und zur Pflege leichterer und geistlicher Genüsse zu begeben pflegen. Es ist schon erwähnt, daß in Concertsälen der Kohlenfäuregehalt zu 30—70, in einem Pariser Theater sogar einmal zu 400 (!) auf 10,000 Theile Luft gefunden wurde. Sogar in dem schönen Saale des Münchener Laboratoriums, der nicht weniger als 46,000 Kubikfuß Inhalt hat, und in welchem sich zu Lieblich's Vorlesungen oft 3000 Personen versammeln, fand Pettenkofer eine halbe Stunde nach Beginn der Vorlesung einen Kohlenfäuregehalt von 11, eine halbe Stunde später von 23, abermals eine halbe Stunde später von 32 Zehntausendtheilen. In einem Bierlocal von 6000 Kubikfuß Inhalt fanden sich bei einer Anwesenheit von 21 Personen, von denen 16 rauchten, trotz des häufigen Öffnens der Thür und des vielen Hinz- und Hergehens um 10 Uhr Abends 38, an einem Abende sogar 40 Zehntausendtheile Kohlenfäure. Besonders schlimm sieht es mit der Luft der Schlaffäle in Kaskinen und Gefängniszellen aus. Selbst in dem großen Wachlocal der Münchener Hauptwache, das nicht weniger als 15,524 Kubikfuß Raum umfaßt, in welchem aber täglich 3 große Gasflammen die ganze Nacht hindurch brennen, betrug der Kohlenfäuregehalt an einem Morgen nach einem wechsellnden Aufenthalt von 36 bis 40 Mann 53 Zehntausendtheile. In dem Schlaffale der Jägercaserne, der 65,000 Kubikfuß umfaßt, und in welchem 92 Mann und hinter einem Verschlage noch 2 Frauen mit 4 Kindern schliefen, ergab sich ein Kohlenfäuregehalt von 36 Zehntausendtheilen. In 3 Schlaffälen der Gürtlercaserne, die von 10,100—11,400 Kubikfuß umfassen, und von denen der erste mit 19, der andere mit 10, der dritte mit 23 Mann belegt war, fand Pettenkofer in der Luft des ersten 46, im zweiten 34, im dritten 58 Zehntausendtheile Kohlenfäure. In einem Schlaffale der Sträflinge auf der Thurmshöhe bei München, der 14,432 Kubikfuß Raum enthält, fand er, nachdem 57 Mann

bei verschlossenen Fenstern und Thüren die Nacht darin zugebracht hatten, einen Kohlenfäuregehalt von 99 Zehntausendtheilen. Die Luft war drückend und fast unatmbar, so daß es beim Eintritte aus dem Freien erst einiger Zeit bedurfte, um darin athmen zu können; aber doch war der Kohlenfäuregehalt kaum viel höher, als ihn Pettenkofer in der Klasse eines Münchener Gymnasiums gefunden hatte.

Die schlechte Beschaffenheit der Luft in solchen Räumen ist natürlich sehr häufig die Ursache von ersten Krankheiten. Die Ueberfüllung der Gefängnisse macht sich in den Sterblichkeitsverhältnissen in der Regel nur zu deutlich bemerkbar, und man kann es als feststehend ansehen, daß der Procentsatz der Todten mit der Zunahme der Züchtlinge wächst. Auch die Beobachtung, die man gemacht haben will, daß in der Eingekerkerten, obgleich diese als schwerere Strafe gilt, weniger Menschen sterben, als in der gemeinsamen Haft, scheint für den Einfluß der verderbten Luft in überfüllten Gefängnissen zu sprechen. Auf Auswanderer- und Transportschiffen sind schon zahllose Opfer diesem Mangel an gesunder, atmbarer Luft gefallen. Von den nach Australien deportirten englischen Sträflingen starb früher auf der Ueberfahrt regelmäßig fast ein Drittel in Folge der verderbten Luft in den unteren Schiffsräumen. Entsetzlich ist das Ereigniß, das sich im J. 1848 auf einem englischen Auswanderungsschiffe zutrug, welches 200 Passagiere von Genua nach Liverpool überführen sollte. Während eines kurz nach der Abfahrt ausgebrochenen Sturmes hatte der Kapitän sämtliche Passagiere in die für Hinterdeckspassagiere bestimmte Kajüte einsperren lassen. Der Raum dieser Kajüte betrug nicht mehr als 1386 Kubikfuß, so daß also nicht einmal 7 Kubikfuß Luft auf jeden Mann kamen. Luken und Eingang waren geschlossen, über letzteren sogar noch ein Gummimantel geworfen, so daß also der frischen Luft jeder Zutritt verschlossen war. Die Folgen blieben nicht aus; die Luft war bald unatmbar, und die zum Wahn sinn gesteigerte Angst der Ersticken den veranlaßte einen furchtbaren Kampf. Als es endlich einem der Eingekerkerten gelang, sich gewaltsam den Weg zum Verdeck zu bahnen und den ersten Steuermann herbeizurufen, bot sich ein entsetzliches Schauspiel dar. 72 waren bereits erlegen; Viele wanden sich im Todeskrampfe, und das Blut quoll ihnen aus Augen, Nasen und Ohren.

Zu einem solchen Grade der Luftvergiftung kommt es zum Glück nur in seltenen Fällen; aber gerade die furchtbaren Folgen derselben sollten uns mahnen, daß unsere Gesundheit stets leiden müsse, wenn wir wieder und wieder dieselbe Luft einathmen. Aber weder durch das Unwohlsein, das uns so oft an Orten überfällt, wo viele Menschen versammelt sind, noch durch das Glücken und trübe Brennen der Gassen, deren die Luft ebenso wenig Nahrung zu bieten vermag, als unseren Lungen, lassen wir uns warnen. Wir Deutsche namentlich sitzen stundenlang in niedrigen,

von Menschen überfüllten Zimmern, die so trüb von Lackschmutz sind, daß man beim Eintreten seine Gründe nicht erkennen kann. Es scheint fast unmöglich, nur zehn Minuten in dieser Luft auszuhalten, und doch findet man es bald erträglich, endlich wohl gar bequäulich. Nur wenn man einmal das Zimmer auf ein paar Minuten verlassen hat und, nachdem man so eben draußen frische Luft athmete, wieder dahin zurückkehrt, bemerkt man wieder die giftige Beschaffenheit dieser Atmosphäre. Daß man sich an eine solche verderbte Luft gewöhnen könne, darin findet man gern den Beweis, daß sie überhaupt nicht schade. Das ist aber eine Täuschung. Diese Gewöhnung wird nur ermöglicht durch eine allmähliche Herabstimmung aller Funktionen der Ernährung und Ausscheidung. Die Luft ist erfüllt von den flüchtigen Produkten der Lungenathmung und der Hautausbünstung, und wenn sich diese auch noch eine Zeit lang fortbilden, so können sie den Körper doch nicht mehr verlassen, da sie nicht mehr verdunstet können. In einem solchen herabgestimmten Zustande wird natürlich weniger Sauerstoff verbraucht, also auch weniger von der Atmosphäre gefordert. Es mag ein glücklicher Umstand für diejenigen sein, die eine solche Luft athmen müssen, daß der Organismus schnell bis zu einem solchen Grade herabgestimmt wird, daß die schlechte Luft für seine Athmung noch hinreicht; aber Niemand wird leugnen wollen, daß eine solche häufig wiederkehrende Herabstimmung der Lebensthätigkeiten nachtheilig wirken müsse, und daß eine Verlängerung derselben sogar tödlich wirken könne.

Gerade aus diesem Grunde dürfen wir auch die Luft unserer gewöhnlichen Wohn- und Schlafräume nicht unberücksichtigt lassen. Mag auch die Luft in den Wohnungen bei weitem nicht immer so kohlenstoffreich sein, wie die Luft der Bierstuben, der Tanzlocale, Theater u. s. w., so wirkt sie doch nachtheiliger, weil sie dauern, von den arbeitenden Klassen oft Tage und Wochen lang ohne Unterbrechung eingeathmet wird. Uebrigens kommt die Luftverderbnis der Schlafzimmern oft den schlimmsten der obenangeführten Fälle sehr nahe. Selbst im Kreise der Wohlhabenderen pflegt man zu Schlafzimmern selten die besten, hellsten und größten Räume des Hauses zu wählen, sondern enge, nach dem

kein Höfen hinaus gelegene Kammern oder gar fensterlose Alkoven, zu denen überhaupt keine frische Luft Zutritt hat. Dazu werden so viel Schlafende, als nur irgend möglich, in diesen Räumen untergebracht, und ich habe es sogar gesehen, daß man, um am Tage Platz zu gewinnen, Betten stellen eingerichtet hatte, die unter andere Möbel untergeschoben werden konnten. Der Dunst, der aus solchen Schlafhöhlen am Morgen aufsteigt, ist unerträglich, und doch wundern man sich, daß Krankheiten eine solche Familie bei all ihrem sonstigen Wohlleben nicht verlassen wollen. Am schlimmsten sieht es freilich mit der ärmeren Bevölkerung der großen Städte aus. Die Errichtung neuer Wohnstätten schreitet in der Regel nicht in gleichem Maße mit der wachsenden Einwohnerzahl fort. Die Miethepreise steigen, und die Armen sehen sich genöthigt, kleinere oder gar mit mehreren Familien gemeinschaftliche Wohnungen zu beziehen. Auch die Vermehrung der Familie hält selten Schritt mit der Vermehrung der Mittel und gestattet keine entsprechende Ausdehnung der Wohnräume. So tritt eine Ueberfüllung dieser Wohnungen ein, die sie zu einem Herde der schlimmsten menschlichen Gebrechen und zu einer Stätte des trostlosesten Elends macht. Was da der Hunger nicht thut, das vollendet der Mangel gesunder, athmungsfähiger Luft. Denn das Einathmen einer kohlenstoffreichen, feuchten, durch organische Ausdünstungen verdorbenen Luft hindert, wie wir gesehen haben, nicht bloß die volle Thätigkeit der Athmungsorgane, sondern unterbrückt auch die Verdauung. Wenn aber dadurch schon die Wirkungen einer kräftigen Nahrung völlig vernichtet werden können, so muß der zerstörende Einfluß ungesunder Luft da geradezu furchtbar sein, wo die Nahrung an sich schon kraftlos ist und auch die Kleidung nur unzureichenden Schutz gewährt. Man geht schwerlich zu weit, wenn man in dem Mangel an frischer Luft, der in der Mehrzahl unserer Wohnungen herrscht, vorzugsweise die Quelle des „scrophulösen Gesindels“ unserer Gegenwart sieht. Ist es darum möglich, gesunde Luft in den Wohnungen zu schaffen, so wird man dadurch nicht bloß die physische, sondern auch die moralische Gesundheit des Volkes fördern. Wir werden sehen, daß es möglich ist, und daß uns sogar die Natur bereits darin vortrefflich vorarbeitet.

## Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen.

Von C. Häntz.

### 4. Die Braunkohlenformation und die geologische Karte der Provinz Preußen.

Erster Artikel.

Unsere Provinz ist noch, — trotz der großen Bemühungen, welche die Monnettaupe in den vergangenen vor einigen Jahren anrichtete, — ein waldreiches Land, in dem die Holzpreise meist noch so niedrig sind, daß der Berg-

bau auf Braunkohle sich gar nicht lohnen würde. Somit ist die Aufspinnung dauerhafter Braunkohle für die Provinz Preußen noch keine Lebensfrage. Im Hinblick auf das große Eisenbahnnetz, das schon lange projectirt, durch den

Nochstand des vorigen Winters endlich zur Ausführung gebracht ist, glauben wir mit Recht annehmen zu dürfen, daß sich auch gleichzeitig die Industrie in erhöhter Weise steigern wird. Hiermit steht aber in enger Verbindung der

Flußthaler die tiefsten Einschnitte gemacht und daher am besten die Diluvialschichten in ihrer ganzen Mächtigkeit durchschnitten haben. Erstere findet an der Elbestäße westlich von Danzig und im Samlande, letzteres in dem tiefen

östlich 37° von Ferro.



Verbreitung des Tertiärgebirges im Bereiche der Provinz Preußen, entworfen von Dr. G. Berendt.

Die eingeschriebenen Namen und Zahlen betreffen die Sectionsnamen und Nummern der in Aufnahme befindlichen geologischen Karte der Provinz Preußen.

Wehrverbrauch des Feuerungsmaterials und mit letzterem auch die Nothwendigkeit, aus der Erde die Kohlenzüge zu fördern, die, wenn auch nur von mittelmäßiger Güte, dem Bedürfnis der Fabriken abtellen können.

Das Vorkommen der Braunkohle in der Provinz ist im Ganzen ein nur sehr spärliches zu nennen, nicht etwa, weil die Verbreitung des Braunkohlengebirges eine zu geringe Ausdehnung hätte, sondern weil das den Tertiärschichten aufliegende Diluvium eine große Mächtigkeit zeigt und meistens einen äußerst regelmäßigen Zusammenhang bildet.

Die besten Aufschlüsse zeigen sich daher da, wo durch spätere Zerreißung und Abspaltung die See oder größere

Einschnitte des Weichselthales, sowie seiner früheren Fortsetzung im heutigen unteren Brahe- und Regenthal statt. Ein bedeutender Theil der bekannt gewordenen Tertiärpunkte gehört in die That diesen meist über 100 Fuß hohen Thäl- oder Küstenträndern an, von denen aus das Plateau selbst vielfach in kurzer Entfernung zur doppelten und dreifachen Höhe ansteigt. Pregel- und Memelthal, die demnach größten Thaleinschnitte, durchfurchen nur ein 100 Fuß im Mittel kaum erreichendes Plateau mit 50 Fuß selten übersteigenden Stellrändern und haben daher, so weit bis jetzt bekannt, ältere als Diluvialschichten nirgend aufgedeckt. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, der uns die Di-

Diluvialbede in einer durchschnittlichen Mächtigkeit von jedenfalls über 100 Fuß erkennen läßt, ist die geringe Anzahl und zum Theil Unscheinbarkeit der Tertiäraufschlüsse in der gesammten Provinz weniger auffallend.

Aber auch die erstgenannten tiefsen Einschnitte zeigen in ihren Steilgehängen nur auf kurze Erstreckung Schichten des Braunkohlens<sup>1)</sup> oder Tertiärgebirges; zum größten Theile reichen die Diluvialschichten noch bis unter das Niveau der Elbe oder die Sohle des betreffenden Thales hinab. Wir haben es somit wirklich nur mit inselartigen Erhöhungen, mit den Berggruppen des Tertiärgebirges zu thun, und hierdurch erklärt sich zugleich wieder, woher wir eben außerhalb des Weichselthales und der Elbstäufen der Elbe, überhaupt außerhalb tiefer Thaleinschnitte im Innern der Provinz unerwarteter Weise dennoch Tertiärpunkte aufzuzählen haben.

Die Weichsel schneidet nicht oberhalb Thorn auf kurze Strecken c. 25 F. tief in Kettenschichten des Tertiärgebirges ein, zeigt dann unter dem Jacobssort von Thorn unmerkenswerthe Diluvialmergel bis zum, ja so weit man sich überzeugen kann, bis unter den Wasserspiegel hinab und durchsichert darauf unterhalb der Stadt abermals c. 20 F. tief den Tertiärthon. Nachdem meilenlang die Ufer sodann wieder Diluvialgebirge bloßgelegt haben, erhebt sich plötzlich in der alten Fortsetzung des Weichselthales, dem unteren Grabenthal bei Bromberg, das Tertiärgebirge bis 60 und 70 Fuß über den Weichsel, also c. 130 F. über den Weichselspiegel. Ingleichen tritt die Fortsetzung dieser Tertiärbedeckung in dem heutigen Verlaufe des Weichselthales, von dem Städtchen Jordan bis Topolino und Brugno, Culm gegenüber, jedoch nur auf dem linken Ufer und wieder mit mehrfacher Unterbrechung, c. 50 F. über den Wasserspiegel empor. Bei dem Städtchen Schweg zeigen die c. 120 F. hohen Ufergehänge bereits wieder bis zur Thalsole herab Diluvialgebirge, und auf ihrem ganzen weiteren, sich tiefer und tiefer einschneidenden Laufe läßt die Weichsel von hier an, trotz ihrer 100 F. hohen Steilflur bei Grauburg, Neuenburg, Marienwerder und Wernitz, nirgends mehr andere, als Diluvialschichten auf beiden Ufern finden.

Gleiches Verhalten zeigen die Elbstäufen. Noch auffälliger zeigt sich das Vorkommen der Braunkohle an der Älste im Westen der Danziger Bucht als verlingelte Höhengipfel des Tertiärgebirges. Dieselben haben hier zu völligen Vergleichen Veranlassung gegeben, die einerseits von der See, andererseits von weiten Bruchflächen oder doch nur wenige Fuß über der See erhabenen Niederungen begrenzt werden. So tritt das Braunkohlen-Vorkommen von Rixhöft unter der rings her abfallenden, in ihren höchsten Punkten 200 F. überseigenden Schwarzsauer Kämme hervor. Vergleichend zeigen die von Zoppot aus viel besuchten, bei dem belichteten Aldersdorff beginnenden Steilgehänge der völlig isolirten Berge von Hocherblau, streckenweise emporgetretenes Braunkohlengebirge.

Wenden wir uns nun zum Hervortreten der tertiären Höhen innerhalb der Plateauflächen im Innern der Provinz. Bei Zeitzberg findet man im romantischen Simferthal von diesem durchschnittene Tertiärschichten, die sogar auch auf dem 100 F. über der Elbe liegenden Kreuzberg jäh und scharf, mit daneben liegenden Diluvialgebirgen wechselnd, zum Vorschein kommen. Ebenso findet sich unterhalb Allenstein am reizenden Wadanaflusse ein völlig vereinzelter Punkt des Braunkohlengebirges. Endlich ragt schon nahe der Aliequelle und noch näher dem Ursprung der Passarge (unweit Hohenstein) eine von Seen und Thälern umgebene isolirte Bergkuppe hervor; dieselbe zeigt unter ihrer leichten Diluvialbedeckung die eigentliche Ursache ihrer Erhebung, das Tertiärgebirge.

Auf gleiche Weise zeigen die Ufergehänge bei Schweg an der Weichsel bis zur Thalsole Diluvialmergel und Schichten nordischen Sandes und Gerölles, während erst der kleine Nebenfluß, das Schwarzwasser, anderthalb Meilen aufwärts bei Dulzig die von Bromberg her sich hinüberziehende Erhebung des Tertiärgebirges trifft. Auf's Schlaendliche aber beweist dieses plötzliche Emporsteigen des Tertiärgebirges der Abhang des in seinen südlichsten Theilen schon zur Provinz Posen gehörigen west-preussischen Plateaus zum Nepthtale. Letzteres selbst halt sich ziemlich gleichmäßig über 300 F. Meereshöhe. (Schneidemühl, Rasfel, Wirsig.)

Der scharfe Steilabhang, dessen Fuß die Elbahn meilenweit folgt, läßt nun in schönen Abfällen horizontal gelagerte Schichten des Diluviums erblicken, und dennoch haben wir kaum den östlichen Rand der Höhe bei Białołime (190 F.) erreicht, so finden wir mehrere Biegeleien, in deren mehrläufigen Fuß tiefen Graberellen der Posener Septarienthon aufgeschlossen liegt. Letzterer ist die oberste Schichtenfolge des Tertiärgebirges, und erst unter diesem folgt die Braunkohlenformation. Verschieden gefärbte Thone, graue, gelbe, braune, gellgelackte oder gekammte und in der Tiefe meist lebhaft ins Hellblau spielende treten hier, wie überhaupt in der Provinz Posen, in einer bis 100 F. gebenden Mächtigkeit auf. Speciell als „Posener Septarienthon“ müssen diese Thone unterschieden werden, weil der zwischen Elbe und Oder bekannte Septarienthon von Stettin, Berlin, Magdeburg sich durch seinen Reichthum an fossilen Schalthesen, die hier völlig zu fehlen scheinen, unterscheidet. Bezüglich<sup>1)</sup> spricht deshalb mit Recht die Vermuthung aus, daß man es hier wohl noch mit einem zur Braunkohlenformation selbst in engerer Verbindung stehenden Formationsgliede als der eigentliche Septarienthon ist, zu thun haben könne. Gypsstränge in den bekannten Formen und Anhäufungen sind in beiden Arten von Septarienthon reichlich vorhanden und ebenso die charakteristischsten Septarien<sup>2)</sup> in besonderer Größe (2 bis 3 F. Durchmesser).

1) Zusammenhang der norddeutschen Tertiärbildungen S. 16.

2) Ihnig's seltige Augelaufscheidungen von großer Härte, in

Derartige Empor treten isolirter Höhen des Tertiäres bieses kann auf zweierlei Weise erklärt werden; entweder waren beträchtliche Höhen bereits vorhanden und wurden von den Diluvialfluthen nicht verflacht oder gar gebohrt oder dieselben entstanden erst später, etwa bei Beginn der Diluvialzeit, durch allmähliche Senkung des norddeutschen Tertiärlandes, in Folge deren nicht gleichmäßig sinkende Schollen des Landes vielfach zerbarsten, und hier und da größere und kleinere Partien inmitten der sich ablagernden oder bereits zum Abfließen gekommenen Einflüsse des Diluviums zurückblieben.

Es bleibt noch die bei den meisten der Tertiärerhebungen der Provinz beobachtete übereinstimmende Längserstreckung zu erwähnen, welche nicht wenig für die Richtigkeit der Annahme spricht, daß dieselben und die einflüßigen Aufbruchslinien flachgehauener Erhebungen oder Senkungen bezeichnen. Bei der schon erwähnten Beschreibung der Tertiärlager des Samlandes<sup>3)</sup> ist für jene Gegend die Erstreckung derartiger Erhebungslinien und zwar in südwestlicher bis nordöstlicher Richtung bewiesen. Um so mehr können wir uns also hier darauf beschränken, die zerstreuten Tertiärpunkte der ganzen Provinz in dieser Beziehung nur im Allgemeinen zu betrachten. Auch hier tritt eine südwestliche bis nordöstliche Richtung auffallend genug hervor, und das dieselbe, von der charakteristischen Erhebungsrichtung in den westlichen Gegenden des norddeutschen Tieflandes um gerade 90 Grad abweichende Verlauf solcher Linien um so weniger auffallen, als auch die Oberflächengestaltung und der Lauf der Gewässer Abweichungen in gleichem Sinne zeigt.

Das mächtige Auftreten tertiärer Thones bei Miasteczko setzt sich vom steilen Rande des Nebelthales in einem etwa  $\frac{1}{2}$  Meile breiten Streifen c. 3  $\frac{1}{2}$  M. in nordnordöstlicher Richtung bis in die Nähe von Lobenz fort. Die genaue Verlängerung der hierdurch angedeuteten Erhebungslinie trifft, gewiß nicht zufällig, die höchste Erhebung des pommerisch-preussischen Höhenzugs, den Schönenberg (Traumburg) zwischen Behrendt und Carthaus, und noch weiter das Braunkohlengebirge von Pirowoschin am Danziger Strande.

Die an der Brabe, der Weichsel und dem Schwarzwasser aufgeschlossene Erhebung des Braunkohlengebirges zeigt eine ausgeprägte Längserstreckung in gleicher Richtung und trifft verlängert den Rand des Weichselthales erst wieder in der Gegend von Dirschau, wo die Braunkohle eben-

wendig durch Strünge, gerade wie die kleinen, als Kippuppen bekannten Bergaushebungen, nach allen Richtungen zerfällt und mit frontalanerballigen gelben Kalkbathyrhellen auf den Erzruge fließen.

3) E., „Natur“ Jahrg. 1860 Nr. 2 S. 14, „Der in Ausicht stehende Bernsteinbergbau im Inneren Samlandes.“

falls vorkommt. Die von der Weichsel und Drewenz in der Gegend von Thorn durchschnittenen Septarienthons gebirgen mit dem Empor treten des Braunkohlengebirges im Samlande, durch Linien verbunden, einen Streifen, in dessen Bereich die Tertiäre Vorkommen in der Gegend von Heiligenbeil, von Braunsberg, von Preuß. Holland, sowie bis jetzt noch unentschiedene Anhebungen aus der Elbinger Gegend eingeschlossen sind, und treffen verlängert das erst jüngst entdeckte Braunkohlengelager von Putzallen halbwegs zwischen Memel und Ertzingen. Das Braunkohlengebirge bei Heilsberg, in Verbindung mit den die ganze schluchtentreiche Oberflächengestaltung einer Braunkohlengegend zeigenden bedeutenden Höhen des benachbarten Liebenberg, Süßenberg und Sternberg, gibt abermals die südwestliche Richtung durch seine Längserstreckung an, die gleichermäßen sich bei Verbindung der gleichen Punkte bei Allenstein und Hohenstein herausstellt.

Die gegebenen Andeutungen, wie sie auch das beigegebene Uebersichtskärtchen graphisch darstellen versucht, mögen genügen. Der praktische Nutzen derartiger Folgerungen liegt auf der Hand; denn sind dieselben richtig, so sind gleichzeitig die Landstriche bezeichnet, in denen, sobald die Zukunft Auffindung von Braunkohle zum Bedürfnis macht, gründliche Nachforschungen am ehesten auf Erfolg rechnen dürfen. Das kuppennartige und plöpliche Empor treten des Tertiärgelages innerhalb dieser Striche aber berechtigt vollkommen zu der Hoffnung, daß noch an vielen Punkten unserer Provinz das Braunkohlengelager bis nahe unter die Tagesoberfläche tritt und sich nur unter der losen Decke des Diluviums ebenso der Beobachtung bisher entzogen dat, wie sich ein großer Theil der bereits zufällig bekannt gewordenen Punkte dem nicht schon Unterrichteten in Folge von Abweichungen oder überhaupt Unscheinbarkeit und Verdecktheit des Aufschlußpunktes noch jetzt völlig zu entziehen im Stande ist. In Folge dessen werden auch erst die Lokalaufsuchungen für die fortschreitende geologische Kartographie mit Bestimmtheit entscheiden, ob östlich des 39-Meridians Braunkohlengelager unter der Diluvialbede nicht mehr zu suchen sein wird.

Die beigelegte Karte, welche „die Verbreitung des Tertiärgelages im Bereiche der Provinz Preußen“ darstellt, gibt nun auch gleichzeitig einen Gesamtüberblick in Bezug auf die Sectionsvertheilung der geologischen Karte, von welcher im letzten Winter Section 3: Rostitten (kurisches Haff, südlicher Theil) und Section 6 Königsberg (West-samland) erschienen sind und durch jede Buchhandlung bezogen werden können. In kürzester Zeit erscheinen Section 2: Memel (kurisches Haff, nördlicher Theil), Section 4: Elst (Memel-Delta) und Section 7: Labiau (Ost-samland).

## Der Sand und dessen Herkunft.

Von Heinrich Girard.

Erster Artikel.

Wer es sich vorgenommen hat, vor einem größeren Publikum ein mineralogisches Thema zu behandeln, der darf sich die Schwierigkeiten nicht verhehlen, welche eine solche Aufgabe mit sich führt. Auf jedem andern Gebiete der Naturforschung darf vorausgesetzt werden, daß der Leser über Naturkörper und über deren Kräfte mehr oder weniger vorbereitend unterrichtet sei; bei einem mineralogischen Gegenstande muß dagegen angenommen werden, daß die Substanz, von der gehandelt werden soll, im günstigsten Falle den Lesern im Allgemeinen bekannt sei, daß aber doch nur wenige Personen mit den Eigenschaften und der Natur derselben näher vertraut sind. Das Steinreich wird ja von uns, wenn wir mit ihm im Großen in Berührung kommen, gewöhnlich nur mit Füßen getreten, und wenn es uns im Kleinen entgegentritt, da erscheint es zumeist in den kaum kenntlichen und widerwärtigen Gestalten, die wir als Staub und Schmutz bezeichnen, und denen eine nähere Aufmerksamkeit zu schenken, von vornherein wohl nicht verlangt werden kann. Wenn der vorstehende Lord Palmerston einmal im englischen Parlamente, als über die Reinigung des Themsewassers verhandelt wurde, einen Ausdruck gebraucht hat, der vielen Beifall erregte, indem er sagte: „Schmutz ist nur eine Sache am unrechten Orte“, so will ich hoffen, daß es auch mit gestattet sein werde, hier von demjenigen Naturkörper zu reden, welcher gewöhnlich das Hauptmaterial der Massen bildet, die wir als Schmutz und Staub zu bezeichnen pflegen: ich meine den Sand.

Sand ist ein allverbreitetes Ding in der Natur. Zwar gibt es Orte, wo man den Streusand von auswärts importirt; doch geschieht das niemals, weil ihnen der Sand ganz und gar fehlt, sondern nur darum, weil er nicht in jener schönen, reinen Gestalt vorhanden ist, welche ihn als Streusand brauchbar macht. Denn in allen Thälern und Ebenen, an allen Ufern der Continente rollt das Gewässer Sand herauf und herab, und wenige Stellen nur, wie z. B. die Korallen-Inseln der warmen Ozeane, die allein aus den kaltigen Grüssen jener kleinen Reichthiere aufgebaut und erst in der jüngsten Epoche der Erdentwicklung aus den Meeresfluthen emporgeriegen sind, entbehren gänzlich seiner fruchtbringenden Gegenwart. Man kann vielleicht lächeln, daß ich den Ausdruck fruchtbar für den Sand gebrauche; da aber die Substanz, aus der er besteht, gar vielen unserer Pflanzen und besonders den so wichtigen und verbreiteten graskartigen Gewächsen ein unentbehrlicher Bestandtheil ist, der von ihnen mitunter sogar frei wieder ausgeschieden wird, so zeigt sich, daß auch die belebte Welt des Sandes zu ihrer Entwicklung dringend bedarf.

Dieses nützliche Material finden wir nun unter den verschiedenartigsten Umständen überall verbreitet. Ursprüng-

lich stammt es aus den Gesteinen der allerältesten Gebirge. Aus diesen haben die Kräfte der atmosphärischen Welt, Wasser, Eis und Wind, es von seiner anfänglichen Lagerstätte losgerissen, haben es zertrümmert, zerkleinert, abgerieben und es zugleich durch Bäche und Ströme abwärts gespült bis in das flache Land und an die Ufer des Meeres. Mitunter ist es hier ein wenig zur Ruhe gekommen, im günstigen Falle sogar in's tiefere Wasser gelangt, wo es unter dem Druck und der lebendigen Thätigkeit des Meeres zu festen Massen zu Sandsteinen erhärtet konnte; aber an vielen Stellen ist es beweglich geblieben, auf unbestimmte Zeiten hinaus.

An solchen Stellen treibt der Wellenschlag den Sand vom Ufer hin und her, oder es kreiset ihn ein vorbestehender Seewind weithin über das Land. Es hatte bisher nichts Unwahrscheinliches, anzunehmen, daß der Sand, welcher heute die Pyramiden Egyptens umhüllt, einst aus den Fluthen des Atlantischen Oceans emporgeriegen sei und das ganze weite Afrika durchwandert habe; wir wissen aber jetzt, daß dies nicht der Fall ist, daß er von der Mitte der Sahara aus einerseits in die Libische Wüste, andererseits zu den Dünen vordringt, welche die selten besuchte Küste zwischen den Canarischen und Capverdischen Inseln bedecken und eine Höhe von 600 F. erreichen.

Dieser allverbreitete Sand besteht nun in allen Lokaltäten vorwiegend nur aus einer und derselben Substanz, aus einem Mineral, das man Quarz nennt. Dieser Quarz, dessen Name ein alter deutscher Bergmanns-Ausdruck ist, in Herkunft und Bedeutung unbekannt, verankert seine Verbreitung in der ganzen Welt vorzüglich einer seiner Eigenschaften, nämlich seiner Härte. Denn da er härter ist als alle andern mit ihm in Gesteinsarten verbreitet vorkommenden Mineralien, so finden wir ihn stets da erhalten, wo Zertrümmerung und Abreibung aus compacten Gesteinen kleine Körner, d. h. Sand, gebildet hat. Das härtere Mineral hat hierbei die neben ihm vorkommenden weicheren Mineralien, je länger, um so mehr zerrieben und vertheilt, während es selbst erhalten blieb. Doch nur selten ist die Vernichtung des weicheren Materials völlig gelungen. Meist finden sich auch in dem reinsten Quarzsande noch kleine Körner fremder Mineralien, die, in der Regel anders als der Quarz gefärbt, den einzelnen Sandarten zur bestimmten Unterscheidung dienen können. Wer z. B. die Sande in der Umgegend von Halle näher prüfen wollte, der würde in dem Sande, der an der Oberfläche des Terrains im Osten von der Stadt vorkommt, ganz andere Beimengungen entdecken als in dem Sande, welcher im Süden austritt, und von diesem werden sich wiederum die Sande des Flußbettes, so-

wie die der Braunkohlen, durch verschiedene Beimengungen leicht unterscheiden lassen.

Möge hier die Anführung eines Beispiels Platz finden, welches beweist, wie weitgehend die Bestimmtheit wirken kann, mit welcher man einzelne Sandarten zu unterscheiden vermag. Im Sommer des Jahres 1846 erzählte mir in Berlin ein befreundeter Kaufmann, daß man an der Börse viel von einem außerordentlichen Diebstahl gesprochen habe, der in den letzten Tagen ausgeführt worden sei. Die preussische Bank hatte eine Kiste mit 100,000 Thalern in Kassanweisungen nach Münster geschickt. Diese Kiste hatte in Berlin zwei Tage nach der Verpackung und in Münster zwei Tage vor der Öffnung wohl verschlossen im Bankgebäude gestanden. Nichtsdestoweniger sollte beim Öffnen die Summe von 1000 Thlern. in Scheinen, deren Gewicht aber durch eingeschüttelten Sand ausgeglichen war. Nun sei man in Zweifel, ob der Veracht des Raubes aus Berlin oder aus Münster zu lenken sei. Ich bemerkte, daß sei sehr leicht auszumachen, wenn man den eingeschütteten Sand und eine Probe des gewöhnlichen Münster'schen Sandes herbeischaffen könne. Mit Erlaunen fragte darauf am andern Tage einer der Bankdirektoren bei mir an, ob das wirklich meine erste Meinung sei, und auf meine dringende Antwort wurden mir die gewünschten Proben übermittelt. Ich konnte alsbald erklären, daß der Diebstahl zwischen Magdeburg und Bielefeld ausgeführt worden sei, und erbat mir nun Sandproben von den zwischen jenen Städten gelegenen Stationen, an denen die Kiste, die mehrmals Halt gemacht hatte und ausgeladen worden war, sich aufgehalten hatte. Nachdem dieselben eingesehen waren, erklärte ich unter Zustimmung von zwei sachverständigen Kollegen, daß der Sand von Herford in Westphalen eine so vollständige Uebereinstimmung mit dem in die Kiste eingeschütteten Sand zeige, daß man auf das Bestimmteste annehmen müsse, der Diebstahl sei an diesem Orte ausgeführt worden. Die weitere gerichtliche Untersuchung soll diese Annahme auch bestätigen haben.

Aber nicht bloß die fremden Beimengungen, unter denen besonders das Vorkommen oder Fehlen von Gipsstücken oder kleinen weißen, silberglänzenden Glimmerschüppchen auszeichnend ist, auch die Form und Beschaffenheit der Quarzkörner selbst unterscheidet die verschiedenen Sandarten. So besteht z. B. der Morfeland, wie man ihn am liebsten zu Bauten verwendet, aus groben, nicht ganz runden, aber doch rundern Körnern, während der seine Sand der Braunkohlen, den man vielfach als Streusand denkt, oft gar keine kugligen Körner hat, sondern vorwiegend aus unregelmäßig geformten Brocken besteht, mit so schwach abgerundeten Ecken und Kanten, daß sich stänliche und plattenförmige Stücken in ihm finden. Solche etwae Körner beweisen nun immer, daß der Sand, welchen sie zusammenfassen, noch jung ist, d. h. daß er nicht Jahrhunderte lang von süßen oder salzigen Gewässern umhergerollt oder abgerieben worden sein kann, sondern sich noch an seiner Ursprungsstelle befinden muß.

Außer solchen mannigfaltig verschiedenen Sande in unsern Tiefseebän bezeugen wir aber auch demselben Material in festerer Gestalt in den Gebirgen als Sandstein. Wer einmal das Elbthal zwischen Pirna und Teschen besahren hat, oder wer die Gelsen von Averbach in Schlesien,

die Teufelsmauern am Harz oder die Sandsteinplateaus von Thüringen, Hessen, Franken und Schwaben kennt, die Grauwacken der Schiefer- und Steinkonglomerate gesehen hat, der hat dazwischen können, daß die fest gemauerten Sandmassen an unser Erdoberfläche noch viel beträchtlicher sind, als die jetzt noch beweglichen. Und doch sind alle diese festen Gesteine gewiß während langer Zeiten auch ein loser Sand gewesen; denn ihre Körner sind meist völlig abgerundet. Wie sind sie nun zu festen Massen verbunden worden? Man hat geschwiegen, daß könne schon allein durch den Druck großer Wassermassen, welche über ihnen gestanden haben, durch die Abhössung, d. h. die Abreibung der Körner aneinander herabgerollt sein; insofern läßt sich gegen diese Annahme sehr Vieles einwenden. Dagegen sieht man in den meisten Fällen, daß die Sandkörner durch kleine Mengen ihrer eigenen Substanz oder durch den Niederschlag kalkiger Theile verklebt worden sind, und eine solche Verfestigung geht auch noch heute in vielen Meeren und an Küsten vor sich. Wahrscheinlich findet sie in solcher Weise auch in unserer Nordsee statt, in einem Meeresarm, der sich je länger um so mehr mit Sand und Schlamm erfüllt, indem Alles, was die nordfranzösischen, englischen und westpreussischen Flüsse an Sand und Schlamm in sein Bett führen, durch die von West und Nord eindringende Fluth darin festgehalten und angehäuft wird. Seine Tiefe beträgt schon jetzt nicht mehr als höchstens 350 F. Adernliche Verhältnisse haben in vergangenen Zeiten an manchen Stellen unser Erdoberfläche geändert. So war der Boden des jetzigen Deutschlands in der mittleren Zeit der Erdentwicklung ein Wechsel von Inseln und Meer, in dem die Böhmen und Sachsen, der Harz, der Thüringer Wald, das Niederreineische Gebirge, der Denwald, Schwarzwald und die Vogesen das Festland repräsentierten, während aller Inseln vom Meere bedeckt war.

Da bildete das jetzige mittlere Thüringen ein kleines Meeresbassin zwischen dem Thüringer Walde, dem Voigtlande, dem Harze und den niederfachsischen Vorhöfbergen.

In dieses flache Becken schwemmte sich eine große Menge von dem Sande zusammen, der von den umliegenden, wenig hohen Inseln herabkam, und wurde lagerweise in Bänken von ein Paar Zoll bis zu mehreren Fuß Dicke abgelagert. Zwischen den Bänken lagten sich kleine Tonlagen ein, weil das Meer sich in einem wechselnden Zustand von Bewegung und Ruhe befand. Stürmte es, so wurde an denselben Stellen Sand verbreitet, wo sich bei ruhigem Wetter seiner Thonschlamm abzusetzen vermochte, und umgekehrt.

So war in diesem Thüringer Becken das Wasser bald klar und rein, bald trübe, und da die Porphyrsteine der angrenzenden Gebirgsinseln viel rothen Sand verbreiteten, so mischte sich das schwere, fein vertheilte Eisengrund aus denselben an vielen Stellen dem Sande bei. Er war daher nicht selten roth gefärbt, manchmal jedoch auch weiß, oftmals gestreift oder gestreift, und deshalb hat man diese Sandsteinbildung den bunten Sandstein genannt. Er bedeckte nicht bloß die Küsten der alten Inseln, welche jenes Becken umschlossen, sondern er breitete sich auch über weite Flächen an seichten Stellen und Untiefen der damaligen Meeresarme in Hessen, Franken und Schwaben aus.



# Die Natur

Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 5.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwetschke'scher Verlag.

**3. Februar 1869.**

Inhalt: Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, von Karl Müller. Erster Artikel. — Was man von der Sonne weiß, von Hermann Klein. Erster Artikel. — Literarische Anzeigen.

## Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Von Karl Müller.

Erster Artikel.

Es ließ sich voraussagen, daß das reizende Dresden mit seinen Kunstschätzen, seinen wissenschaftlichen Museen und Anstalten, zugleich als Mittelpunkt zwischen Norddeutschland und Oesterreich, für die 42. Naturforscher-Versammlung im Jahre 1868 ein ganz besonders anziehender Punkt sein werde. Diese Voraussicht ist in glänzender Weise in Erfüllung gegangen. Gegen 1132 Mitglieder und Teilnehmer versammelten sich vom 18. bis zum 25. September nicht nur zu ihrem Vergnügen, an welchem auch gegen 400 Damen Theil genommen haben mögen, sondern theilweis auch zu sehr ernster Arbeit. Während dieser Zeit bildet die Versammlung eine Welt für sich, die durch eine Centralverwaltung und ihr Tageblatt zusammengehalten wird. Welche Erfolge dieses persönliche Zusammenleben in einem so freudenvollen Zeitraume für die Einzelnen wie für

die Wissenschaft nach sich ziehen mußte, kann nur der ermessen, der selbst mitten darin stand.

Es ist überhaupt ein völliges Verkennen dieser Versammlungen, wenn man von ihnen eine directe Bereicherung der Wissenschaft erwartet. Das war niemals der Zweck ihrer Stiftung, und er kann es nach der Natur der Sache auch nicht sein. Eine hundert- oder tausendköpfige Vereinigung von Menschen aller Berufsarten, aller Charaktere und vieler Nationalitäten trägt von Haus aus so viel Quacksilber in sich, daß sie unmöglich jene Stetigkeit und Ruhe erlangen kann, welche zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung durchaus erforderlich sind. Jes der lebt in diesem Zeitraume der Vereinigung, so zu sagen, auf der Straße, und diese kann nicht die Welt statt sein, in welcher der Geist zu einer Concentration



seiner Kraft gelangt. Es fühlt sich auch Niemand dazu aufgelezt; Niemand trägt das Verlangen darnach. Denn nicht nur der Dichter, der Componist, der Bildhauer, der Künstler überhaupt bedarf des „stillen Kämmerleins“, das ihm in der Weisheit der Ruhe und Behaglichkeit seine Inspirationen vermittelt, sondern auch der Forscher. Die Trunkenheit des Selbstvergessens läßt auch sein Auge in „holdem Wahnsinn“ glänzen, wie der große britische Dramatiker von dem Dichter sagt, und solche Figuren passen nicht auf die Straße, wo tausend Augen auf den Einzelnen gerichtet sein können. Zudem ist der Naturforscher nicht sentimental genug, um mit seinem Werketagsgeschick zu kokettieren. Das hat er zu Hause gelassen, als Mensch will er einmal verkehren mit Menschen, die alle nach demselben Ziele ringen.

Man hat wohl in vielen Kreisen noch zu wenig beachtet, welche Erhebung, ja, welche Erbauung in einem solchen stillen Bunde, in der Gemeinsamkeit gleichstrebender Geister liegt. Keiner ist gekommen, der nicht den Willen mitgebracht hätte, das Seine zur allgemeinen Feier beizutragen, und diese festliche Stimmung liegt sichtbar über Allen ausgebreitet. Kein Wunder, daß das Gemüth hervortritt, daß die allgemeine Stimmung auch den Einzelnen in ihren Strudel reißt, daß schließlich eine Weihe und Begeisterung in den Massen lebt, zu deren Entwicklung Tausende von schönen Einzelheiten beigetragen haben. Der Hauptzweck der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, betonen ihre Statuten, ist, sich persönlich kennen zu lernen; und wahrlich, niemals ist in wissenschaftlichen Kreisen ein humaneres Werk begonnen worden, als damals, wo, auf D'Len's Aufruf hin sich am 18. September 1822 einige wenige Männer zu diesem Behufe in Leipzig zusammenfanden. Acht Jahre vorher (1815 am 4. October) war das Beispiel dazu in Genf durch den Dr. Goffe, Arzt und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Paris, gegeben worden, und dieses Beispiel hatte den deutschgesinnten D'Len zu seinem Aufrufe angeregt. Gegen 35 Personen folgten der Einladung nach Genf; eine so kleine Zahl, daß der Berufende wohl darüber den Muth hätte sinken lassen können; und doch, wie hat sich gegenwärtig der Ruf am Beginn unseres Jahrhunderts während der Entwicklung desselben ausgebreitet! Auch in Leipzig trug sich Ähnliches zu. „Ein einziges kleines Zimmer der Leipziger Pleisenerburg (vielleicht der Lage nach ähnlich dem, in welchem Luther einst für seine freie Glaubensüberzeugung den Wortkampf mit Eck durchfocht) umfaßte damals bequem die einzelnen Leipziger und die wenigen von auswärts eingetroffenen Ärzte und Naturforscher; aber eben die durch diese Einfachheit wesentlich mit bedingte Lebendigkeit und Herzlichkeit des Ganzen hatte bei mir, und gewiß ebenso bei manchen Andern einen besonders lebendigen und unvergesslichen Eindruck zurückgelassen.“ Diese in seinen Festzug geflochtene Erinnerung des Präsidenten der 42. Versammlung der

Naturforscher und Ärzte, des Hofrath Carus, zugleich des Reflor's aller Forscher Deutschlands, erklärt in schlichten Worten, worin damals die Bedeutung der Versammlung lag. Auch diesmal lag sie hier, obgleich seit jener Zeit, nachdem durch Humboldt's Einfluß eine Scheidung in Sectionen längt und mit Recht eintreten war, die Dimensionen der Versammlung sich so viel großartiger gestaltet hatten. Welche Vorurtheile des Einzelnen gegen den Einzelnen durch persönliche Begegnung ausgeglichen, ja wie mit einem einzigen Pinselstrich hinweggeschwunden werden können, muß man, so selbstverständlich es sonst auch auf der Hand liegt, selbst erlebt haben, um die Wirkung in der Erleuchtung der Herzen zu begreifen. Bei solchen Erlebnissen, welche auf die Fortbildung der Wissenschaft von dem keimfassenden Erfolge sein müssen, noch zu fragen, was denn die einer solchen Versammlung herauskomme, besetzt sofort, daß der Fragende noch niemals mitten in einer solchen stand.

Welch ein Reiz schon in einer Vorversammlung zu gegenseitiger Begrüßung! Die Weissen sind eben erst angekommen, Andere werden noch erwartet. Von sieben Uhr Abends an stehen die erleuchteten Räume Jedem offen, und Jeder eilt mit Spannung zu einem Stehbildchen, das selbst ein Flor von Damen verschöndert wird. Es gibt in der That nichts Reizenderes, als die allmähliche Entwicklung dieses Kreises zu beobachten, wie er sich nach und nach aus den verschiedensten Persönlichkeiten zusammensetzt. Instinctiv prüft man jeden neu Eintretenden auf das etwaige „Handwerk“, und siehe da, Jeder erscheint anerk. Statt daß die Physiognomie der Versammlung immer homogener würde, je mehr sie sich erweitert, wird sie immer heterogener. Keinem Einzelnen ist sein Handwerk anzusehen; ein kosmopolitischer Geist scheint in dem Ganzen zu fließen. Wer je eine große Versammlung von Zoologen, Philosophen und ähnlichen Gleichgestellten sah, bemerkt vergleichtend mit Ueberraschung, wie viel helterer dieser Geist sich ausdrückt. Unendlich größer ist die Anzahl weitmännlicher Gestalten und Persönlichkeiten; ungleich mehr ist die Individualität entwickelt; freier, selbstbewußter sind die Bewegungen. Reflectives findet man nur wenig auf den Gesichtern, wohl aber ein Etwas, das man als das Unmittelbare bezeichnen könnte. Alles das wird erklärlich, wenn man erwägt, daß der große Verein der Naturforscher und Ärzte durch kein Dogma geffest, durch keinen Corpögeist niedergehalten, von Männern aller Berufsarten zusammengeführt wird. Diese gesunde und glückliche Mischung vermischt das düstere Lichtbild des Grübelns und der Forschung auf einzelnen Gesichtern und leuchtet der Versammlung einen Geist der Jovialität ein. Wie ganz anders würde diese Physiognomie ausfallen, wenn sämtliche Mitglieder etwa nur Professoren wären! Mit Genugthuung dachte ich in diesem Augenblicke, um mehr als 30 Jahre zurückblickend, an die Naturforscher-Versammlung zu Jena und Schloß

Belvedere bei Weimar, wo zahlreiche Väter ihre Knaben emporkoben, um ihnen in der Waffe der Uebrigen den Mann zu zeigen, der kein Professor und doch der größte Naturforscher seines Jahrhunderts, einer der erhabensten Lehrer seines Volkes war. Diese Mischung von Berufs- und Dilettanten ist nicht hoch genug zu veranschlagen. Für die allseitige, von allem Schulgeiste freie Ausbildung der Naturwissenschaften ist sie von unerschätzbaren Folgen gewesen und wird es immer mehr werden, je größer der Kreis dieser Dilettanten wird. Auf die Versammlung selbst wirkt sie wahrhaft befriedigend ein; der Boffigkeitsfameit steht ein höchst respectables Corps ungebundener Männer gegenüber, die instinctiv gegen jene zusammenhalten und diese schon durch ihre Masse, wo nicht zugleich durch ihre wissenschaftliche Bedeutung niederhalten.

Daher die Freiheit der Bewegung; denn Jeder findet Seinesgleichen, an den er sich halten kann. Daher auch die Jovialität, das Herzliche des Ganges; denn nichts beengt den Ausdruck des Gemüthes. Um sich wahrhaft zu erbauen, brauchte man nur in seinem Winkel sitzen zu bleiben, um als stiller Beobachter die Verschwiegenheit dieser Herzlichkeit zu prüfen. Alte Freunde finden sich; neue Freundschaften werden geschlossen. Männer, die oft Jahre lang mit einander correspondirten, lernen sich hier persönlich kennen und finden sich vielleicht so ganz anders, als sie sich dachten. Andere, die sich literarisch feindlich gegenüberstanden, können schon aus Höflichkeit, da sie sich in den Sectionen und anderwärts vielfach wiederfinden müssen, nicht umhin, sich zu nähern, und unvermuthet ist eine Kluft überbrückt, die beide von einem Alp befreit. Mit Spannung fragt man nach dieser und jener Celebrität bei den älteren Mitgliedern herum, und unversehs sind die weiten Räume zu einer Menschen-Masse geworden, in der man sich weit über das Getriebe des Alltagslebens emporgehoben fühlt. So kurz auch oft nur die Begegnungen sind, so bewegend sind sie für das Gemüth durch die Fülle der Eindrücke, und dieser Geist trägt sich schließlich auf die einzelnen Gruppen über, die sich naturgemäß aus den Besprechenden und Vermittelnden herausbilden. Selbst für den Egreiz ist gesorgt; denn die Damen sind aufmerksame Beobachterinnen der Persönlichkeit und Celebrität. Ihre Erscheinung wirkt belobend und fördert den Ausdruck der allgemein menschlichen Beziehungen. Sie, die Ketzte, die Apotheker und die Dilettanten hauchen dem Gange, so zu sagen, einen demokratischen Geist ein, aus welchem mehr oder minder die Republik der Geister hervorwuchert; um so mehr, als die Rechte und Pflichten Aller die gleichen sind.

Diese 42. Vorversammlung trug aber auch noch eine andere Bedeutung in ihrem Schooße. Der Lage und Bedeutung Dreßdens nach durfte man schon eine sehr große Zahl von Norddeutschen erwarten. Allein, die Republik der Geister bindet sich an keine Nationalität, oder wehe der Wissenschaft, wenn es so wäre! Und doch konnte es

so sein nach dem Sturmjahre 1866! Das Bangen war mithin gerechtfertigt, daß die Süddeutschen und die Oesterreicher diesmal nur in geringer Zahl oder gar nicht erscheinen könnten. Es war daher eine freudige Ueberraschung in den norddeutschen Kreisen, als die Vorläufer unserer Landesteute im Süden und Osten wirklich erschienen, als sie noch zahlreiche Nachfolger ankündigten und nun sich mit jenem Wesen unter die Gruppen mischten, welches der Vater Völk im Zollparlamente so richtig als das Schilder, was uns Norddeutsche so wesentlich ergänz. Mit Staunen fanden nun Süden und Norden und Osten, wie Jeder in seiner Art ganz prächtig sei, wie leicht es sich zusammen leben lasse. Es trug wesentlich dazu bei, daß der Norddeutsche in den nächsten Tagen unverdredet wie Ein Mann, zugleich wie ein taktvoller Gastgeber handelte und namentlich den Oesterreichern im Vorrath und Secretariat gern überall den Vorrath einräumte. Was in dieser Beziehung die Dreßdener Versammlung für eine politische Bedeutung für ganz Deutschland gehabt hat, darf nicht unterschätzt werden; aber ebenso wenig, daß es gerade Dreßden war, welches diese glänzende Versammlung in seinen Mauern aufnahm. Für das Vorangegangene konnte die Wahl kaum glücklicher gedacht werden. Die nach Süden und Osten inclimirnden Sympathien des sächsischen Volkes, seine Herzigkeit und Widertreue machten Dreßden so recht geeignet zu einem Akte zwischen den Getrennten, und ich habe nicht gehört, daß der hiedurch erzielte Seelenkontakt irgendwo gestört worden wäre. Die Aufnahme, welche Dreßden der Versammlung bereitet, war über alles Lob erhaben. Die alte deutsche Herzlichkeit hatte den Sieg davon getragen; und um dies zu verstehen, muß man ausdrücklich von einer Stimmung Kunde haben, die vor den Festtagen der Versammlung nichts weniger, als günstig gewesen sein soll. Aber davon war keine Spur mehr zu finden; mit der Einwanderung der Geladenen waren Volk und Regierung einig, der Versammlung einen Boden zu bereiten, ohne welchen ihre Aufgabe gar nicht gedacht werden kann. Es hatte darum eine besondere Bedeutung, daß am nächsten Morgen, in der ersten allgemeinen Versammlung, der Staatsminister v. Mostiz-Wallwitz zur Begrüßung der Versammlung durch die Regierung, mit Nachdruck sprach: „Wir setzen einen großen Egreiz daran, nicht zurückzubleiben in den Werken des Friedens und Nichts zu verachtm, was geeignet ist, diese zu fördern.“ Mit Rechte erinnerte er daran, daß nur durch ein einmüthiges Zusammengehen Aller die natürlichen Kräfte des Volkes entwickelt, die schweren Folgen gesteigerter Productionskraft, die zugleich eine Ueberschöpfung, besonders an den Stätten der Industrie, nach sich zieht, vermindert werden können. Mit Recht erkannte er die Ziele der Versammlung als solche Werke des Friedens an; und wenn er es auch nicht direct aussprach, so fühlte doch wohl mancher Brust hinter diesen Worten noch jene Bedeutung sich hervorbringen, von der ich oben sagte.

Selbst der erste Redner der Versammlung, Professor Bruhns aus Leipzig, schlug in seinem Vortrage über die neuesten Himmelserscheinungen eine Saite an, die es zeigte, wie selbst in der speziellen Wissenschaft große Resultate nur durch einmütiges Aufeinandergehen vieler gewonnen werden können. Die mitteleuropäische Gradmessung, die Fundamentalfestimmung der astronomischen Fixpunkte, die Positionsbeobachtungen von 100,000 Sternen und ähnliche Arbeiten zeigen sonnenklar, daß die Naturwissenschaften wenigstens es nicht sind, welche die Völker entzweien und trennen. Oder wer anders, als sie, verband die europäischen und asiatischen Regierungen im Sommer 1868 zur Ausbreitung der seltenen Sonnenfinsterniß, deren Beobachtung wieder zu einem so selbstverleugenden einmütigen Handeln der Forscher verschiedener Nationalität drängte! Es machte darum keinen geringen Eindruck, daß es selbst der greise Herrscher des Landes nicht unter seiner Würde gehalten hatte, einen Vortrag über den naturwissenschaftlichen Unterricht anzuhören, den ein Mann überkommen, welcher nur wenige Schritte von ihm entfernt, auf seiner Tribüne, so zu sagen, den ersten Gegenßatz vertretet und, bis an die Grenze des Erlaubten gehend, mythologische Worte über Kosmismus und Denkfreiheit ausspricht. Der Eindruck mußte um so tiefer werden, als jener Herrscher, trotz seiner Stellung zum Romanismus, so leutselig war, den Redner sich vorstellen zu lassen. Und doch hatte dieser Redner höchst legerische Ansichten zur Verteidigung der Naturwissenschaft ausgesprochen, hatte er mit einem gewissen Triumphe betont, daß im J. 1868 der Jesuitenpater Serchi zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsterniß mit nach dem

Oriente geschendet worden sei, und zwar von einer Seite, die vor Zeiten den Galilei zum Widerrufe zwang. Ein einfacher Journalist, der verlegerte Redacteur der Berliner Volkszeitung, so sagte er weiter, konnte im J. 1868 die preussische Regierung zu einer Expedition nach Indien zur Beobachtung derselben Sonnenfinsterniß bestimmen, der auch ein Jesuit beizuwohnte. Welche Macht der Verhältnisse! Welche Summe von Kräften! Welche Demokratie in Leben und Wissenschaft!

Fassen wir Alles mit Einem Male zusammen, so bot die Dresdener Versammlung, wie sie sich namentlich in ihrer allgemeinen Sitzung ausprägte, eines der glänzendsten Bilder des Zusammenwirkens Aller zu einem gemeinsamen Ziele der Menschheit, ein Bild der Einheit des Menschengeschlechts, trotz der größten Verschiedenheit der Einzelnen, ein Bild des Friedens. Wie um eine religiöse Idee scharten sich Männer aus allen Lebenskreisen zusammen, vom Herrscher und seinen Prinzen, seinen Ministern herab bis zum einfachsten Privatmanne. Ob diese Idee in ihnen Allen lebendig war, ist gleichgültig. Doch kann das letzte Ziel der Naturwissenschaft nur in der Ergreifung der Stellung des Menschen zur Welt und ihren ewigen Gesetzen bestehen; und wenn das Gefühl der Abhängigkeit, wie unsere Theologen sagen, Religion ist, so schwebte diese selbige religiöse Idee allerdings mitten in der Versammlung. Ich glaube nicht zu viel zu sagen, daß sie nur mit den Größten eines Kirchengängers die improvisirte großartige Aula verließ, um sich zur Bildung der Sectionen in ihre verschiedenen Lokale zu begeben.

### Was man von der Sonne weiß.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Beobachtungen während der totalen Sonnenfinsterniß am 18. Aug. 1899.

Von Hrn. J. Klein.

Erster Artikel.

Die Sonne bildet den Hauptkörper in dem Systeme von Himmelsorganismen, welches ihren Namen trägt. Jeder einzelne der sie umkreisenden Planeten könnte verschwinden, ohne daß dadurch die Existenz des Kosmosystems im Ganzen in Frage gestellt wäre. Verschwinde hingegen plötzlich die Sonne, so wäre eine sofortige Revolution unter den Planeten die erste Folge und der spätere Untergang der bestehenden Individualitäten die letzte. Die ungeheure Masse der Sonne hält gegenwärtig das ganze Planetensystem in festen Banden, sie herrscht gewissermaßen mit absoluter Gewalt. Aber wenn das plötzliche Verschwinden der Sonne die Existenz der Planetenwelt als Ganzes aufheben würde, so würde, wie die neuere Wissenschaft gezeigt hat, schon der Verlust des Sonnenlichtes und der Sonnenwärme hinreichen, um das vegetative Leben an der Erdober-


fläche zu vertilgen. Wenn wir auch den Ursprung der Lebenserscheinungen auf unsern Erdbörper wissenschaftlich nicht zu erklären vermögen, so können wir doch die Bedingungen nachweisen, welche erfüllt sein müssen, damit das Leben unmittelbar nach seinem Beginne nicht wieder erlosch. Zu diesen Bedingungen gehören auch das Sonnenlicht und die Sonnenwärme, beide sind zum Gedeihen des Lebens so nothwendig, als die Luft und das Wasser. Unter dem Einflusse des Sonnenlichtes bildet die Pflanze durch Zersetzung der Kohlen säure der Atmosphäre Kohlenstoff und nimmt dadurch an Gewicht zu. In der Dunkelheit verlieren die Blätter Kohlenstoff, wie dies auch mit dem Keime und den Wurzeln der Fall ist. Der Kohlenstoff wird durch den Sauerstoff der Luft verbrannt, und die Pflanze verliert an Gewicht. Eine Pflanze, der das lebende Licht der Sonne entzogen

ist, kann demnach nur so lange existiren, als das Samenkorn Kohlenstoff zu liefern im Stande ist; ihre Dauer ist


mentell nachgewiesen und gezeigt, daß unter dem Einflusse des Sonnenlichtes in einem der Düngung beraubten Boden



Sichtbarkeit des Venusdurchgangs im Jahre 1674.



Sichtbarkeit des Venusdurchgangs im Jahre 1689.



demnach durch das Gewicht bedingt. Ein eigentliches Wachsen und Zunehmen kann daher nicht stattfinden. Boussingault hat die Richtigkeit dieser Schlüsse auch experi-

während der Vegetation Aufnahme von Kohlenstoff und gleichzeitige Fixirung von Sauerstoff und Wasserstoff stattfand, während in der Dunkelheit unter wenig abweichen

den Temperaturverhältnissen Auscheidung von Kohlenstoff, von Wasserstoff und Sauerstoff eintrat.

Aber nicht minder, wie das Licht, ist die Sonnenwärme zum Weichen vegetativer Organismen an der Erdoberfläche nothwendig. Ich will nicht darauf eingehen, nachzuweisen, wie die höchste Entwicklung des thierischen und pflanzlichen Lebens mit denjenigen Regionen zusammenfällt, die vermöge ihrer planetarischen Lage den Vorzug genießen, von den wärmenden Strahlen einer fast immer im Zenith stehenden Sonne erreicht zu werden. Man könnte einwenden, daß die höchste Entwicklung der menschlichen Kultur und des menschlichen Geistes nicht in den Tropen zu suchen ist, daß die heisse Zone, wie Schläger bemerkt, noch keinen großen Mann hervorgebracht hat. Ich will vielmehr nur hier an die Ergebnisse der heutigen Wärmeliebe erinnern, welche zeigt, wie alle Kräfte, welche wir in Industrie und Technik benutzen, nur umgewandelte Sonnenwärme, Arbeit der Sonne sind, die im Schooße der Erde niedergelegt wurde, des Tages harrend, wo sie in anderer Gestalt wieder in den allgemeinen Kreislauf des Seins eintritt. Die Kraft, welche die Bewegung des größten Eisendahnzuges übernimmt, hat ebensowohl vor Jahrmehrladen in der Sonne geirrt, wie diejenige, die Krystall an Krystall bindet und die regelmässigen Figuren des zerbrochenen Schneeflockchens bildet. Und wunderbar! Die Kraft, welche nothwendig ist, um die feinen Strahlen der Schneeflocke aus Wasserdampf herauszustellen, würde hinreichen, die Eismassen der größten Steinlawinen bis zu dem Gipfel der höchsten Berge der Erde emporzuschleudern. Solche Kraftvorräthe, von der Sonne stammend, werden allein auf unserem Erdballe in jedem Augenblicke tausendfach verbraucht; sie müßten sich erschöpfen, wenn nicht die Sonnenwärme neue zuführte, sie werden sich erschöpfen, wenn die Sonnenglut erlosch. Kein Leben kann dann mehr bestehen, keine Schneeflocke wird mehr aus den Küsten fallen, keine Dampfwolke sich erheben, ja die atmosphärische Luft selbst würde beim gänzlichen Fehlen der Wärme ein compactes festes Ganzes bilden, ähnlich den festen Körpern, zu welchen Farabae's Genie eine Anzahl der früher sogenannten permanenten Gase durch Wärmeentziehung veredelt hat.

Haben wir in dieser Einleitung einen flüchtigen Blick auf die Wichtigkeit des Sonnenballs in seiner gegenwärtigen Daseinsform für die Existenz des Erdballs und der auf ihm vegetirenden Organismen geworfen, so sehen wir nunmehr zur astronomisch-physikalischen Betrachtung der Sonne und derjenigen Phänomene über, welche dieselbe bei gewissen Gelegenheiten für unsern Anblick darbietet. Es wird sich hierbei herausstellen, daß man fast bis zur neuesten Zeit herab von unserm Centralkörper weit weniger mit Bestimmtheit wußte, als dies der Fall zu sein schien. Wir werden erkennen, daß diejenigen Ansichten über die physische Constitution der Sonne, welche bis vor wenig Jahren die

unbedingt vorherrschenden waren, mit der Wirklichkeit keineswegs übereinstimmen.

Die annähernde Kenntniß des wahren Abstandes und der Größe der Sonne ist eine Errungenschaft der neueren Zeit. Das ganze klassische Alterthum hat sich in dieser Hinsicht nicht über einige vage und nichts weniger als philosophische Ansichten zu erheben vermocht. In der That hören wir von Aicomedes, daß die Epicuräer der Sonne einen wahren Durchmesser von 1 Fuß beileigten. Diese Leute verstanden sich freilich besser auf Gastronomie, als auf Astronomie. Aber auch Anaxagoras, jener in vieler Hinsicht seiner Zeit so weit vorausgeleitete Denker, hielt die Sonne schon für sehr groß, als er sie mit dem Flächenraume des Peloponnes verglich. Das erinnert an die früheren Versuche des Nacapsos und Petosiris, welche für den Abstand der Sonne von der Erde 74 Meilen herausrechneten. Aristarch fand dagegen, daß die Sonne wenigstens 19 Mal weiter als der Mond von uns entfernt sein müsse und einen Durchmesser besitze, der jedenfalls den Erddurchmesser um mehr als das Sechsfache an Größe übertriffe; indess diese Meinung erfuhr sich unter den Zeitgenossen keines Beifalls. Die Distanz von etwa 11,000,000 Meilen, welche Pösidonius als Sonnenentfernung angab, kommt zwar unter allen bisher genannten der wahren am nächsten; allein dieser Umstand ist weit mehr auf Rechnung eines zufälligen Errathens, als einer wirklichen Messung zu schreiben. Denn um eine solche Distanz durch astronomische Beobachtungen zu bestimmen, dazu fehlte es den alten Culturvölkern an nicht mehr als an Allem.

Hatten aber zuerst im J. 1691 einen verhältnismäßig bequemen und sehr sicheren Weg gezeigt, die Entfernung der Erde von der Sonne zu bestimmen, und zwar aus den Beobachtungen des Planeten Venus, wann dieser als kleine, schwarze, scharfbegrenzte Scheibe vor der Sonnenscheibe vorüberzieht. Diese „Durchgänge der Venus“ können auch gegenwärtig noch als das sicherste Mittel angesehen werden, die Sonnenentfernung zu bestimmen; indess treten sie so selten ein, als daß es nicht wünschenswerth erschiene, auch auf andern, häufiger sich darbietenden Wegen zu demselben Ziele zu gelangen. Wir werden diese andern Methoden der Reihe nach betrachten, vorher aber noch Einiges über die Venusdurchgänge bemerken.

Die regelmäßige Auseinanderfolge dieser Erscheinungen ist in eine große Periode von 423 Jahren eingeschlossen, und zwar tritt das Phänomen innerhalb dieses Zeitraumes ein nach je 105  $\frac{1}{2}$ , 8, 121  $\frac{1}{2}$  und abermals 8 Jahren. Der letzte Venusdurchgang fand am 3. Juni 1769 statt; in den nächsten 500 Jahren werden noch folgende Durchgänge eintreten:

1874 am 8. December

1882 „ 6. „

2004	:	7.	Juni
2012	:	5.	"
2117	:	10.	December
2125	:	8.	"
2247	:	11.	Juni
2255	:	8.	"
2260	:	12.	December
2368	:	10.	"

Die Beobachtung der Venusburchgänge von mehreren geeigneten Punkten der Erdoberfläche ergibt zunächst nur den Winkel, unter welchem der Erdbahnmesser vom Planeten Venus aus gesehen wird, oder die „Parallaxe“ der Venus<sup>1)</sup>. Da aber das Verhältniß der Entfernungen der Venus und der Erde vom Sonnenzentrum für jeden gegebenen Moment mit großer Schärfe bekannt ist, so läßt sich aus der Parallaxe der Venus leicht auch die Sonnenparallaxe finden, und diese gibt die Sonnenentfernung in jeder beliebigen Maßeinheit.

Die zahlreichen Beobachtungen, welche am 3. Juni 1769 in den entlegenen Erdgegenden angestellt wurden, ergaben im Mittel nach Ende's Untersuchung eine Sonnenparallaxe von 8,57116 Bogensecunden. Dieser Parallaxe entspricht eine wahre Entfernung des Erdmittelpunktes vom Centrum der Sonne, welche 20,652,329 geogr. Meilen beträgt. Babinet schätzte der Erste gewissermaßen, welcher die Sonnenparallaxe größer als den soeben mitgetheilten Werth annehmen zu müssen glaubte. Die spätere Untersuchung Leverrier's ergab als Resultat 8,95<sup>2)</sup> und Poncelet in Berlin erhielt bei einer erneuten Berechnung des letzten Venusburchganges, als er bei den Hülfsgrößen durchgängig die neuesten Werthe benutzte, eine Sonnenparallaxe von 8,86<sup>3)</sup>.

Inzwischen hat man im J. 1802 auf einem bereits von den älteren Astronomen nicht ohne Erfolg betretenen Wege versucht, einen genaueren Werth für die Sonnenparallaxe zu gewinnen, nämlich gelegentlich der Marsopposition in jenem Jahre. Man versuchte nämlich die Parallaxe des Mars, der damals der Erde sehr nahe kam, durch direct mikrometrische Messung zu bestimmen und hieraus die Sonnenparallaxe abzuleiten. Glückselige Beobachtungen zu Pulkowa und am Cap der guten Hoffnung ergaben 8,964<sup>4)</sup>, während aus den Beobachtungen in Greenwich und Australien ein Werth von 8,932<sup>5)</sup> folgte. Kann man auch gegenwärtig derartigen Bestimmungen noch nicht das volle Gewicht der aus den Venusburchgängen folgenden Werthe beilegen, so zeigen sie doch hinreichend, daß die bisher angenommene Parallaxe von 8,57<sup>6)</sup> auf jeden Fall um einige Zehntel-Seconden zu klein ist.

1) Streng genommen die Differenz der Venus- und Sonnenparallaxe.

2) Newcomb hat übrigens gezeigt, daß Leverrier einige Fehler bei der Berechnung begangen hat, und daß er ohne diese zu einer Parallaxe von 8,78<sup>6)</sup> hätte gelangen müssen.

Auf einem von den vorhergehenden gänzlich verschiedenen Wege hat Foucault die Sonnenparallaxe bestimmt. Aus den Beobachtungen der Aberration des Fixsternlichtes ergibt sich nämlich, daß die mittlere Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn  $\frac{1}{10000}$  von derjenigen des Lichtes ist. Sobald aber die mittlere Geschwindigkeit der Fortbewegung der Erde in jeder Secunde bekannt ist, läßt sich hieraus sehr leicht auch der ganze Umfang der Erdbahn berechnen. Man braucht zu diesem Ende nur damit die Anzahl der Secunden zu multipliciren, welche das fideleische Jahr enthält. Dividirt man hierauf das erhaltene Resultat durch die Zahl  $\pi$  oder durch das Verhältniß des Kreisumfangs zum Durchmesser, so erhält man den Durchmesser der Erdbahn, und die Hälfte hiervon gibt die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne. Sobald aber diese gefunden ist, so erhält man unter Zugiehung des bekannten Erdbahnmessers sehr leicht die Sonnenparallaxe. Diese Methode ist allgemein ein'ach, wenn die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes genau bekannt ist. Schon Galilei hatte fruchtlose Versuche gemacht, diese zu bestimmen; er fand die Zeit, welche das Licht gebraucht, um einen Weg von mehreren Meilen zu durchlaufen, unmerklich klein.

Im Jahre 1848 begann Arago sich aufs Neue mit der Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit durch Beobachtungen in kurzen Distanzen zu befassen; allein es sollte diesem berühmten Physiker nicht vergönnt sein, die projectirte Untersuchung auszuführen. Ein Augenleiden, die erste Mahnung an seinen 5 Jahre später erfolgten Tod, erlaubte ihm keine Beobachtungen dieser Art mehr. Von Arago dazu aufgefordert, trat Fizeau an seine Stelle. Dieser geschickte Physiker bestimmte die Schnelligkeit des Lichtstrahles, indem er dieses einen Raum von 17,266 Meter durchlaufen ließ. Das Resultat war eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 42,576 geogr. Meilen in jeder Secunde. Foucault besaß, dieses Resultat mit verbesserten Instrumenten und Beobachtungsmethoden zu verbessern. Fast 12 Jahre lang war dieser berühmte Experimentator damit beschäftigt, seine Versuche immer mehr zu vervollkommen, ehe er das entscheidende Wort sprach. Als definitives Resultat fand sich, daß der Lichtstrahl in jeder Secunde einen Raum von 308 Millionen Meter durchläuft; die Unsicherheit dieses Ergebnisses übersteigt schwerlich  $\frac{1}{4}$  Million Meter. Die mittlere Schnelligkeit der Erde in ihrer Bahn beträgt demnach 30,800 Meter in jeder Secunde. Führt man nun die oben angezeigte kleine Rechnung weiter durch, so ergibt sich schließlich eine Sonnenparallaxe von 8,86<sup>7)</sup>, was mit dem von Poncelet berechneten Werthe übereinstimmt. Das Verhältniß von  $\frac{1}{10000}$  der Erdgeschwindigkeit zur Schnelligkeit des Lichtstrahles folgt aus Struve's Bestimmung der Aberrationsconstante zu 20,4451<sup>8)</sup>. Dieser Werth scheint indeß nach neueren Untersuchungen weniger genau zu sein, als der von 20,25<sup>9)</sup>, welchen früher Delambre erhalten. Wendet man diesen an, so wird die Parallaxe

um ungefähr  $\frac{1}{4}$  Zehntel Secunde größer und kommt damit der Wirklichkeit, aller Voraussicht zufolge, am nächsten. Hofrath Hansen entlich hat auf einem von den vorhergehenden ganz verschiedenen Wege aus der Theorie des Mondes die Sonnenparallaxe zu 8,91" gefunden, und dieser Werth darf vorläufig als der genaueste angesehen werden. Zur definitiven Bestimmung erwartet man mit Spannung die nächsten Venusdurchgänge, besonders jenen vom 6. December 1882. Wenn nicht ungewöhnliche atmosphärische Umstände störend einwirken, so wird es hoffentlich gelingen, die Sonnenparallaxe bis auf das Hundertstel der Secunde verbürgen zu können.

Ich habe die allgemeinen Erscheinungen der beiden Venusdurchgänge bezüglich der Sichtbarkeit für die ganze Erde berechnet und hiernach die beiden umfließenden Karten entworfen, welche zeigen, welche Regionen unseres Planeten das Phänomen ganz, theilweise oder gar nicht sehen.

Der Parallaxe von 8,91" entspricht eine mittlere Entfernung von 19,890,000 geogr. Meilen. Die Masse der Sonne beträgt das 319,455fache der Erdmasse.

Der mittlere scheinbare Durchmesser der Sonnenscheibe ist 32'0,9". Da nun in derselben Entfernung der Erdsdurchmesser 17,82" groß erscheint, so ist demnach der Sonnendurchmesser größer und zwar 107,8 mal größer, als der Erddurchmesser. Der letztere beträgt 1718,9 geogr. Meilen; demnach hat der Sonnendurchmesser eine Größe von 185,000 geogr. Meilen. Das Volumen der Sonne über-

trifft jenes der Erde 1,253,000 mal und umfaßt also 3300 Billionen Kubikmeilen.

In Folge der Excentricität der Erdbahn ist der scheinbare Sonnendurchmesser veränderlich und schwankt zwischen 32'34" im Maximum und 31'29" im Minimum. Letzteres findet am 2. Juni, wenn die Erde am weitesten von der Sonne entfernt ist, erstes am 1. Januar im Perihelium der Erde statt.

Die Sonne ist eine vollkommene Kugel, ohne alle Spur von Abplattung; doch scheinen die neuesten Untersuchungen anzudeuten, daß bisweilen scheinbare oder wahre Schwankungen der äußeren Begrenzung der Sonnenscheibe stattfinden, entweder in Folge der Strahlenbrechung in der Sonnenatmosphäre, welche einzelne Theile der abgewandten Hemisphäre über den wahren Sonnenrand erhebt, oder auch in Folge wirklicher Hydrauerveränderungen. Wir werden in der Folge hierauf zurückkommen.

Da das Volumen der Sonne jenes der Erde 1,253,000-mal, ihre Masse die Erdmasse aber nur 319,455 mal übertrifft, so folgt hieraus eine durchschnittliche Dichte des Sonnenballes von  $\frac{1}{4}$  der Erddichte. Ferner berechnet sich aus diesen Angaben leicht, daß der Fallraum in der ersten Secunde, der an der Erdoberfläche 30,1 pariser Fuß ist, an der Sonnenerdoberfläche volle 405 f. beträgt. Die Geschwindigkeit eines freifallenden Steines ist also dort schon mehr mit derjenigen einer Flintenugel an der Erdoberfläche vergleichbar.

## Literarische Anzeigen.

Soeben erscheint in dem unterzeichneten Verlage:

### Die Gesundheitslehre

nach dem neuesten Standpunkte der Hygiene

populär dargestellt von

**Dr. Wilhelm Zikarek.**

21 Bogen. gr. 1 Zbr.

Dieses Werk, aus Vorträgen entstanden, welche der Verfasser im Berliner Sanitätsverein mit vielem Beifall gehalten, zeichnet sich durch klare Darstellung der wissenschaftlicher Genauigkeit vor allen ähnlichen Schriften vortrefflich aus. Gänzlich in seiner Art aber ist es wegen seiner Methode. Man macht in der That die Gesundheitslehre als eine Wissenschaft vollkommener durch eine populärwissenschaftliche Gesundheitslehre. In abgerundeten und doch zusammenhängenden Bildern lehrt daher der Verfasser die Neuerungen und geheimen Thätigkeiten des geistigen Lebens, die Kräfte, welche es erhalten, die Schwächen, die es bedrohen, die Verletzungen der Natur zu ihrer Abwehr und die Wege, auf welchen einseitige Störungen wieder ausgeglichen werden. Dabei lernt Jedermann am Besten, danach bildet er sich mit Beiläufigkeit selbst die Regeln zur Erhaltung und Förderung seiner Gesundheit, Regeln, die er gern befolgt, weil er ihre Zweckmäßigkeit begreift, und die er auch nicht leicht vergißt, weil er sie gewissermaßen jederzeit von Neuem findet.

Gouls Erschel Verlagshandlung in Berlin.

Verlag von **Friedrich Vieweg und Sohn**  
in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

### Das Buch der Natur,

die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie umfassend. Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymnasial-, Realschulen und höheren Bürgerschulen gewidmet

von

**Dr. Friedrich Schoeber,**

Director der Oberbergisch-technischen Real- und Lehrschule in Ratingen.

Siebenzehnte, durchgesehene Auflage. In zwei Theilen. gr. 8. Mit 120 Abbildungen.

Erster Theil: Physik, physikalische Geographie, Astronomie und Chemie. Mit 301 in den Text eingedruckten Holzschnitten, Sternkarten und einer Mondkarte. Preis 1 Zbr.

Zweiter Theil: Mineralogie, Geognosie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie. Mit 616 in den Text eingedruckten Holzschnitten und einer geognostischen Karte in Farbendruck. Preis 1 Zbr. 10 Sgr.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Sgr. (1 fl. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verleger: Schönbacher'sche Buchdruckerei in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Hee und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 6.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwetschke'scher Verlag.

**10. Februar 1869.**

**Inhalt:** Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, von Karl Müller. Zweiter Artikel. — Der Sand und dessen Herkunft, von Heinrich Wierd. Zweiter Artikel. — Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen, von G. Wagnig. 4. Die Baumstübenformation und die geologische Karte der Provinz Preußen. Zweiter Artikel. — Kleinere Mittheilungen.

## Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte.

Von Karl Müller.

Zweiter Artikel.

Von der früheren Versammlung waren der gegenwärtigen 18 verschiedene Sectionen vereint: 1. Mathematik und Astronomie, 2. Physik und Mechanik, 3. Chemie und Pharmazie, 4. Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 5. Botanik und Pflanzenphysiologie, 6. Zoologie, 7. vergleichende Anatomie und vergleichende Pathologie, 8. Anatomie und Physiologie, 9. innere Medizin, 10. Medicinalreform, 11. Chirurgie und Ophthalmologie, 12. Gynäkologie und Geburtshilfe, 13. Psychiatrie, 14. öffentliche Gesundheitspflege und gerichtliche Medizin, 15. naturwissenschaftliche Pädagogik, 16. Kinderheilkunde. Außerdem bildete sich aber noch eine Section für Anthropologie und Ethnologie, sowie eine für Kriegsheilkunde und Militärgesundheitspflege; die Geographie blieb, wie bisher noch immer,

auch diesmal unvertreten. Jede dieser Gruppen ist wieder eine Welt für sich, die sich durch einen wechselnden Vorsitzenden und einen Sekretär regiert; die Verhandlungen aller bilden den wesentlichen Inhalt des Lageblattes, so daß dieses als der officielle Ausdruck der Versammlung erscheint.

In diesen Sectionen pulst das specifische Leben des Ganzen. Während in den allgemeinen Versammlungen nur Wenige zum Worte gelangen und Debatten über die Vorträge nicht stattfinden können, weil dieselben, um Allen zugänglich zu sein, am besten nur Generelles enthalten, und eine Debatte darüber bei einer tausendköpfigen Versammlung kaum durchzuführen sein würde, gelangt in den Sectionen jeder Einzelne in parlamentarischer Form dazu,



wenn er es wünscht. Doch machen nur Wenige Gebrauch von diesem Rechte. Immer sind es nur Einzelne, die, noch lebhaft ergriffen von ihren Forschungen, sich des Wortes bemächtigen und damit auch einen wissenschaftlichen Inhalt in die Versammlung bringen. Es ist richtig, daß zur Bekanntmachung dieser Mittheilungen keine so große Versammlung berufen zu werden braucht, weil die Zahl der Zeitungen hinreichend groß ist, um sie auf dem kürzesten Wege in das Publikum zu bringen. Allein, ohne dieses Behelfe würde kein Zusammenhalt ermöglicht werden; und immerhin ist der Gewinn ein bedeutender. Denn was die Einzelnen bewegt, pflegt auch in der Regel das Bewegende in der Wissenschaft für jedes einzelne Jahr zu sein; gleich einer Ausstellung, repräsentirt mithin jede einzelne Versammlung den jedesmaligen wissenschaftlichen Zeitgeist. Da aber dieser Zeitgeist, nach des Dichters Worte, der Herren eigener Geist ist, so fühlt sich Jeder durch denselben annehmen in seinen eignen Kreis gebannt. Wie im Spiele lernen sich gerade hierbei die einzelnen Forscher in ihren Eigenthümlichkeiten kennen, wo die ideale Hülle abgestreift ist, die in der Ferne sie umgab. So tritt man sich menschlich näher und gewinnt die Ueberzeugung, daß die Forschungen auch eine psychologische Seite der Beurtheilung darbieten. Dieser Satz hat überhaupt bisher noch wenig oder gar keine Beachtung gefunden, und doch ist er so wichtig! Man spricht so leicht von objectiven Urtheilen, ohne zu bedenken, daß dieselben an eine Persönlichkeit gebunden sind, und selbst das scheinbar nüchternste Urtheil einer Individualität entflammt, auf welches die verschiedensten Eigenthümlichkeiten des Charakters und der physischen Organisation einwirken. Vieles erklärt sich mittelst eines solchen Charakters-Studiums, was sonst vielleicht ein Räthsel für den Einzelnen bliebe, weil eben in den geistigen Ausprägungen eines Individuums auch dessen Charakter sich ausdrücken muß, ohne daß sich der Betreffende dessen selbst bewußt ist. Der geniale Napoleon lernte darum so leicht über diejenigen seiner Gegner, deren Charaktereigenthümlichkeiten er vorher sorgfältig studierte, um sie bei seinen taktischen Entwürfen schon im Voraus in Anrechnung zu bringen. Wer in dieser Begleitung Studien zu machen geübt, findet auch in einer Naturforscherversammlung ein reiches Feld der Beobachtung, das einen unendlichen Reiz in sich trägt. Um bindende Beschlüsse zu fassen, sind eben die Forscher nicht zusammengekommen; das duldet weder der Geist der Wissenschaft noch deren Vertreter, und hierin unterscheidet sich eine solche wissenschaftliche Versammlung wesentlich von jeder andern. Keine Fraction hat die Macht, durch Fassung von Resolutionen über die andere zu siegen; und als der Versuch dazu in Dresden von einer Fraction der Section für öffentliche Gesundheitspflege dennoch gemacht wurde, fand sie einen so entschiedenen Widerstand, daß ihr Beginnen in Nichts zerbrach. In der That ist diese natürliche Spaltung der Geister mehr oder weniger in jeder einzelnen Section

vertreten, und das gibt den Sectionen ein völlig anderes Gepräge, wie den allgemeinen Versammlungen. Sie sind charakteristischer, individueller, ein Gemisch von aristokratischen und demokratischen Elementen, in welchem die ersten, besonders vertreten von den Professoren und Akademikern, immer die Neigung zur Herrschaft, manchmal in kleinlicher Weise verrathen. Trotzdem gebietet selbst in den Sectionen kein Corpsgeist; Teilnehmer und demokratischere Mitglieder halten in der Regel durch Zahl und Besinnung das Gleichgewicht. Das gilt besonders von solchen Sectionen, die eine practischere Tendenz in sich tragen, wie z. B. die Section für öffentliche Gesundheitspflege, die sich auf die verschiedensten Berufskreise stützen muß, die Section für Mineralogie, Geologie und Paläontologie oder die Section für Chemie und Pharmazie, deren Pfleger meist praktischen Kreisen angehören, u. s. w.

Das Bild dieser Sectionssitzungen ist trotzdem ein schwankendes. In der Regel schreibt man sich in die Liste derjenigen Section ein, der man nach Beruf und Neigung vorzugsweise angehört. Doch hat das keine bindende Kraft; Jedem bleibt es überlassen, einer beliebigen Sectionssitzung beizuwohnen, sobald ihn der Wunsch treibt, dort einen vermutlich interessanten, schon im Tageblatt angekündigten Vortrag anzuhören oder verschiedene Persönlichkeiten aufzusuchen, um sie näher kennen zu lernen. Oft wird dies schon dadurch nöthig, daß manche der hervorragenden Naturforscher mehr in fremden, als in ihren eigenen Sectionen aufzukommen sind. Niemand hindert diese freie Bewegung, die in den naturhistorischen Kreisen besonders stark ist, während die Forscher der exakten Naturwissenschaften viel einseitiger zu sein pflegen. Aus diesem Grunde hat der Gebrauch, die einzelnen Sectionssitzungen auf verschiedene Stunden zu verlegen, seine große Bedeutung für die Hospitanten; und zwar um so mehr, als sie in den meisten Dingen, wo die Sectionen in verschiedenen und entfernten Räumen untergebracht werden müssen, einen größeren oder kleineren Marsch dahin zu unternehmen haben. Aber trotz dieser Freiheit der Bewegung ist es nicht durchzuführen, sich von allen Sectionen ein Bild in der Wirklichkeit zu verschaffen; Zeit und Lust reichen dazu nicht aus, da, um das Zusammenleben in Freiglichkeit und Gemüthlichkeit zu fördern, meist nur die erste Hälfte des Tages zu diesen Sitzungen verwendet werden kann. Um jedoch trotzdem jedem Teilnehmer ein Bild der ganzen Versammlung zu überliefen, hat man die schöne Einrichtung getroffen, die Protokolle jeder Sitzung im Tageblatt abdruckend; eine Einrichtung, welche von Seiten der Ausführenden einen nicht unbedeutenden Zeitaufwand, von Seiten der Druckerei das Opfer von Nacharbeiten erfordert. Damit ist aber auch etwas Effectuelles, Lebendes geliefert, und Niemand wird diese flüchtig entstandenen Blätter anders, als mit Dank und schöner Rück Erinnerung in die Hand nehmen. Mit diesen Gefühlen ergreife auch ich sie jetzt, um an ihrer

Hand dem Leser ein Bild dieser Arbeiten zu entrollen, ein Bild, das, so flüchtig es auch immer ausfallen möchte, doch immer ein Blatt aus dem Leben des deutschen Volkes sein wird.

Nach den offiziellen Berichten hielt die Section für Mathematik und Astronomie vier Sitzungen. Was sie in denselben speciell verhandelte, entzieht sich naturgemäß dem Interesse eines größeren Publikums. Nichtsdestoweniger läßt sich aus dem Gange im Allgemeinen folgen, daß beide Wissenschaften fortwährend dessen eingebettet sind, was ihnen ihre großen Erfolge sicherte, nämlich der Verbesserung der Rechnung und der Instrumente. Immer wieder nachrechnen und immer wieder beobachten, was die vorübergehende Generation bereits als das non plus ultra des zu Ergänzenden annahm, ist ja keiner Wissenschaft so eigen, wie gerade der Astronomie und Mathematik. Die bornirten Lebensrichtungen könnten daran lernen, wie man Wahrheit findet. — Auch die geistverwandte Section für Physik und Mechanik pflegt nicht im Stande zu sein, ein großes Publikum zu sich heranzuziehen. Dennoch war die Fülle der Mittheilungen so groß, daß sie sich zu fünf Sitzungen genöthigt sah. Zu einem großen Theile bewegten sich diese Mittheilungen um Wärme, Electricität und Galvanismus; andere handelten über die Unzulänglichkeit des Wassers, über die Verdunstungskraft der Erdatmen, über die graphische Darstellung dioptrischer Aufgaben u. s. w. So anregend und spannend das Alles aber auch war, so trar es doch entschieden in den Hintergrund gegen die brillanten Experimente des Herrn Rudolf König aus Paris, eines einfachen Mechanikers und geborenen Königsbergers, mit seinen selbsterrunden akustischen Apparaten. Sie füllten eine ganze Sitzung aus mit jenem Reize, den man stets empfindet, wenn man den Helden einer Geschichte selbst vor sich sieht, seine Geschichte selbst von ihm erzählen hört. Schon aus der Pariser Weltausstellung hatten dieselben eine allgemeine Ueberschau hervorgerufen; daß sie aber auch in Dresden von ihrem Erfinder gezeigt und erläutert wurden, gehört zu dem Bemerkenswerthesten der ganzen Versammlung. Unsichtbare Schwingungen der Luft, die bei jedem Tone in Bewegung gesetzt wird, dem Auge sichtbar zu machen und sie in ihrer gesetzmäßigen Beständigkeit zu zeigen, das war die Aufgabe des Experimentators. Er löst sie ebenso einfach wie brillant dadurch, daß er durch feingestimmte Stimmgabeln und Orgelpfeifen einfache und combinirte Töne hervorbringt, daß die schwingende Luftsäule durch eine Gasflamme getrieben, durch dieselbe gleichsam sichtbar wird, indem sie ganz bestimmte Figuren (zusammengesetzt aus Berg und Thal) bildet, die sich in einem rotirenden Spiegel wie ein Lichtbild abbilden und so lange konstant sichtbar bleiben, als der gleiche Ton anhält. Wie da wozu die Lichtstrahlen stieße, so stieße nun König das, was man längst als Schallwelle der Theorie nach kannte, auf die einfachste Art in seinen Flammenbildern,

ja so einfach, daß man kaum begreift, wie man nicht schon längst auf dieselben verfiel. Es bleibt König's besonderes Verdienst, diese Schallwellen durch die ganze Tonleiter hindurch, bis zur Grenze des hörbaren Tones unterfacht und selbst biblisch fixirt und vervielfacht zu haben. Darum wirkte aber auch sein Vortrag wie eine Leisung aus Einem Gusse in den Wenigen, die das Glück hatten, ihm dabei zu wohnen. Was überhaupt die fragliche Section auszeichnete, war, daß sich in ihren Mittheilungen deutlich das Streben ausdrückte, zu allgemeinen Anschauungen zu gelangen, anders ausgedrückt, der Erscheinungen Fülle auf allgemeine einfache Gesetze zurückzuführen. Sie hat damit ganz den Charakter der heutigen physikalischen Wissenschaften vertreten, der sie geistig erfüllt hinsteht.

Bei weitem weniger ist das der Fall auf dem Gebiete der Chemie. Sie hat noch zu viel zu entwerfen, bevor es ihr gelingen kann, die Tausende von Einzelheiten, in welche sich schon die heutige Chemie auflöst, unter allgemeine Gesetze zu bringen. Dieser Charakter brüdete sich auch in den vielen einzelnen, zum Theil höchst interessanten Mittheilungen der Section für Chemie und Pharmacie, besonders aber auch darin aus, daß zur Entgegnahme aller angedeuteten Vorträge sechs Sitzungen nöthig wurden. Eine solche Uebersicht spricht wohl am besten von der großen Richtigkeit, die jetzt auf diesem Gebiete der Naturwissenschaft herrscht. Die Zerlegung bekannter Stoffe in ihre Elemente, die Darstellung neuer Körper zu industriellen oder wissenschaftlichen Zwecken, Verbesserung der Methoden dieser Darstellungen — diese Richtungen beiderseits, wie die heutige Chemie überhaupt, auch die für sie gebildete Section.

Die vierte Section für Mineralogie, Geologie und Paläontologie hielt zwar nur vier Sitzungen; aber sie ersetzte diese durch mannigfache Ausflüge in die nähere oder weitere Umgebung Dresdens, die bekanntlich des Eigenthümlichen genug bietet. Schon von Haus aus eine der lebendigsten Sectionen, indem sie drei sehr verschiedene, wenn auch verwandte Gebiete der Forschung in sich vereinigte, zeigte sie diesen kalaidäopsischen Charakter auch zu Dresden sowohl in den Mittheilungen, als auch in den Persönlichkeiten. Beide lieferten darum ein so buntes und heiteres Gemisch von Forschungen über einzelne Mineralien, Krystallisation, Gebirgsbau, Verfeinerungen und Erdbildung, daß man wohl von einer „angenehmen Temperatur“ dieser Sitzungen hätte sprechen können. Trotzdem erreichte sie zeitweise einen Höhepunkt, wie er wohl kaum in einer andern Section erreicht wurde, als es sich nämlich darum handelte, gewisse Forderungen zu bekämpfen, welche, aufgestellt und verteidigt von Mohr in Bonn, die Steinkohlen für Reste aus Seepflanzen und Tungen, den Kammereibühl zwischen Eger und Franzenbad in Böden für einen submarinen Krater erklärten. Die letzte Frage ist eine untergeordnete; die erste jedoch würde die bisherigen Ergeb-

nisse der paläontologischen Forschung gänzlich über den Haufen geworfen haben. Doch wurde sie noch von derselben Section, wie es ja für jeden Eingeweihten nicht anders zu erwarten stand, hoffentlich für immer, abgethan, indem Bergsbaudirector Kretschmer aus Zwickau eine Menge von Steinkohlenpräparaten unter dem Mikroskope vorzeigte, die einfach die bisherigen Beobachtungen bestätigten, daß nämlich das Material unserer Steinkohlen aus Nabelhölgern, Sigillarien, Calamiten u. s. w. zusammengesetzt sei. Da die Mohr'sche Ansicht auch vielfach in weiteren Kreisen in Cours gesetzt ist, so war es vielleicht nicht überflüssig, ihrer an diesem passenden Orte speceller zu erwähnen.

Die Section für Botanik und Pflanzenphysiologie spiegelte ihren heutigen Charakter nur zu getreu ab. Zeilen, Kryptogamen-Befruchtung, Pilze — alles Uebrige Tand. Und doch war es höchst bezeichnend, daß derselbe Mann, der diese einseitige Richtung durch seinen wissen-

schaftlichen Fanatismus wesentlich mit heraufbeschworen, das Schneiden dieser Section nie besuchte, sondern sich zu einer Section hielt, die, für Anthropologie und Ethnologie gegründet, ihrem Gegenstande gemäß nach großen Anschauungen, weiten Perspektiven, weltumfassenden Ideen ringt. Es war nicht allein mein Urtheil, daß von der scientia amabilis wenig zu sehen gewesen sei; aber es ist mein Urtheil, daß dieselbe sich nur um so schöner entfalten wird, wenn erst diese Kiste überbrückt und Alle auf ihren normalen Standpunkt beschränkt sein werden. Denn das große gemeinsame Ziel kann nur eine Physiologie der Form sein, die, nachdem sie den „schönen Wald“ gleichsam in Zellen aufgelöst hat, ihn dann nur um so schöner wieder aufbauen muß, damit das belebende Gewand unserer menschlichen Hermal auch als eine von Geist durchdrungene Hülle vor Aller Augen dasthe. Wir befinden uns eben noch in den ersten Anfängen dazu.

## Der Sand und dessen Herkunft.

Von Heinrich Cicard.

Zweiter Artikel.

Indessen können nicht überall die Sandsteine genau auf diese Art gebildet sein. Im J. 1834 entdeckte man in einem Sandstein-Bruch zu Heßberg bei Hildburghausen eigenthümliche Reife, welche große Ähnlichkeit mit den Fußstapfen gewisser Bräutelschnecken hatten. Man erkannte bald, daß sie die Ausfüllung von Einbrüchen waren, welche laufende Thiere in halb erhärtetem Thonschlamm hervorgebracht hatten. Nur war man dadurch über den Vorgang selbst, der sie gebildet, noch nicht im Klaren; denn da dieser Sandstein für eine Meeresbildung gehalten wurde, so konnte man doch nicht annehmen, daß diese Thiere ihre Fußspuren unter dem Wasser eingedrückt hatten. Außerdem war dieser Thon offenbar an der Luft ausgetrocknet; denn er ließ jene eigenthümliche Zerspaltung sehen, welche wir auf jedem ausgetrockneten Tümpel, der Thon zurückgelassen hat, wahrnehmen. Es wurde später erkannt, daß diese Fährten nicht Säugethieren, sondern großen Salamandern angehörten; Schildkrötenspuren fand man neben ihnen, ja endlich auch zahlreiche Einbrüche, welche nur von Vögeln herrühren konnten. Riesenvögel-Fußstapfen, deren Abdruck 15 Zoll Länge auf 9 Zoll Breite hatte, deren Schrittwette 18 Fuß betrug, wurden neben vielen andern kleineren Vogelspuren in Nordamerika entdeckt. Und das war kein Humbug. Sie waren in dünnen Thonlagen von 1 Zoll Dicke abgedruckt, die mit stärkeren Sandsteiniagen wechselten. Man mußte diese Sandsteine nach solchen Erfahrungen für eine Festlandbildung halten.

Genauere Studien über den großen Dünenzug, welcher an der Westküste von Schlemig und Jütland sich hinzieht,

haben uns des Näheren über die Vorgänge belehrt, die bei der Bildung solcher Festlandfeinsande thätig waren. Es ist ein sehr eigenthümliches Terrain — diese Dünenkette. Erdtiefte man sie von fern am Horizont, so glaubt man eine feste Gebirgskette vor sich zu sehen; denn die scharfen zackigen Formen erinnern viel eher an die Contouren von Porphyren und Gneisgebirgen, als an ein bewegliches Gebilde von Sand, vom Winde zusammengeweht. Gegen das Meer hin sind diese Höhenzüge theils ganz sanft abgeflacht, theils durch Meeresschwümmungen fast senkrecht abgeklüftet, gegen das Land aber fallen sie immer steil mit 30° Neigung ab. Wie bilden sie in gleicher Höhe fortlaufende Züge, sondern immer erheben sich wechselnde Höhen neben einander, die durch mehr oder weniger tiefe Thäler getrennt sind. Tritt man in's Innere eines solchen Dünensystems ein, so erkennt man daher eine doppelte Thalbildung: Längsthäler, die parallel mit der Küste laufen und die Dünenmasse in mehrere parallele Reihen trennen, und Quertäler, welche diese Dünenreihen in einzelne Hügelwände theilen. Unbeschreiblich schön ist der Anblick einer solchen Dünengegend. Überall ist man von Sand umgeben, den der geringste Wind in Bewegung setzt, und nur selten sieht man ein lebendiges Wesen in dieser Einöde. Auf der Höhe der Düne vergeht hin und wieder der Aukerfresser seine Brut; ein Hase und an einzelnen Orten ein Kaninchen sind die einzigen größeren Thiere, denen man hin und wieder begegnet, und der langsam, regelmäßige Schlag der Wellen an's Ufer ist der einzige Ton, der das Ohr erreicht. Meilenweit kann man zwischen den Dünen hingehen, ohne daß die Scene

sich im Geringsten veränderte, und ohne daß man auch nur eine andere Pflanze sähe, als den Strandhafer und einige starre Gräserarten in den wasserreicheren unter den Dünen thütern. Steigt man auf die äußere Düne hinaus, dann wechselt das Bild, und das Meer breitet sich mit seinen Wogenzügen, die gegen das Ufer als weiße Brandungen andringen, vor unserm Auge aus. Aber auch das Meer ist wenig belebt, und nur in weiter Ferne sieht man mitunter ein Schiff ziehen, denn auch die Schiffe fliehen die leichten Küsten, welche nur selten einen Hafen bieten, in denen sie bei den nicht seltenen Stürmen einen sicheren Schutz zu finden vermöchten.

Ganz anders dagegen zeigt sich die Scene, wenn das Meer vom Sturme bewegt wird. Kaum ist man im Stande sich auf der Düne stehend zu erhalten. Der Sturm setzt den Sand, selbst den größten, in Bewegung, und nur eine grünte Haut vermag längere Zeit den Schmerz auszuhalten, welchen dessen gegen Gesicht und Hände gepirschte Körner verursachen. Nach allen Seiten ist man von mächtigen Sandwolken umgeben, und das Meer bildet längs der ganzen Küste, so weit das Auge reicht, eine Reihe von Wasserfällen, wo die Wellen, indem sie sich an Uferlen bricht, in einer Höhe von 15—20 Fuß sich überstürzt und sich in Schaum auflöst, — ein Schauspiel, dem an Großartigkeit kaum irgend ein Wasserfall der Welt gleichgestellt werden kann. Schneeweisse Schaumbälle gleiten wie Mövenzüge über die Dünen hin bis weit in's Land hinein, und der Beobachter schüt bald Gesicht, Hände und Kleider mit Salz überzogen. Es wird schwierig, sich bei dem Lärmen des Wellenschlags verständlich zu machen. Immer mächtiger jagt der Sturm, immer weiter steigen die Wellen an den Dünen heraus, und ist eine Hochfluth mit dem Sturme verbunden, so dringen sie durch die zum Meere geöffneten Thäler weit in die Becken des inneren Dünen-Systems hinein.

Vom Sturm bewegtes Wasser der Küste ist niemals rein, Sand und Schlamm, Seerpflanzen und Thiere, lebend oder todt, erfüllen dasselbe. So tritt es zwischen den Dünen hinein. Hat der Sturm sich gelegt, so fließt es zum Theil durch die Dünenthäler wieder hinaus, bleibt aber immer noch in ansehnlicher Menge in einzelnen Vertiefungen zurück, da die Thaleschnitte zwischen den Dünenhügeln nie bis zur Fläche des Strandes hinabgehen. Das eingeschlossene Wasser kommt allmählig zur Ruhe; der Schlamm, den es enthält, setzt sich zu Boden, die Reste von Meeresspflanzen und Thieren legen sich allmählig darauf; denn auch die anfangs lebenden Thiere sterben in dem eingengten Gewässer bald ab, und das Wasser verlegt sich dabei nach und nach durch den Sand der lockeren Düne zum Meere hinab. Nun wird die Schlamm- und Thonschicht, welche es zurückließ, trocken gelegt, wird fester und geröthet, und jetzt kommen diejenigen Bewohner des Landes, welche Thiere und Pflanzenteile fressen, und tappten in dem noch nicht

ganz erhärteten Thonschlamm umher, nach Beute suchend. Setzt dann in der nächstfolgenden ruhigen Zeit der gewöhnliche Wind der Küste in regelmäßiger Weise wieder ein, der vorhergehende Windstrom, der ja der Vater der ganzen Dünenbildung ist, so bläst er nach wie vor den Sand an der Düne hinauf und über diese hinab in das dahinter liegende Thal. Der ausgetrocknete Thon wird mit einem Lager von Sand bedeckt, die Fußspuren füllen sich aus, und die Sandschicht verbleibt sich so lange, bis ein neuer Sturm eine neue Thonlage über sie ausbreitet. Wird endlich ein solcher Küstenstich in späterer Zeit wieder unter das Wasser des Meeres versenkt, oder bringt auf andere Art eine erhärtende Flüssigkeit in ihn hinein, so wird der erst lockere Sand zu einem festen Sandstein verbunden. Das ist der Vorgang, welcher uns die Fußspuren längst untergegangener Geschlechter überliefert hat.

Unwillkürlich drängt sich bei der Betrachtung der großen Massen von Sand und Sandstein die Bemerkung auf, daß die Substanz derselben doch eine der verbreitetsten in unserm festen Erdrinde sein müsse. Und allerdings ist das der Fall. Die Kieselerde oder Kieselsäure, aus welcher der Quarz, d. h. der Sand, besteht, ist das Produkt der Verbindung eines dunkelbraunen, kohlenähnlichen, halb metallischen Körpers mit jener Luftart, welche wir Lebensluft oder Sauerstoff zu nennen pflegen. Wissen wir uns den früheren Zustand unfreies Erdkörpers als einen feurigen denken, so hat es sicherlich eine Zeit gegeben, wo nur die schwer verfliegenden Metalle und ähnliche feuerbeständige Substanzen seine Kugel zusammensetzten, während alle flüchtigen Stoffe ihn als eine heiße, feine, weite Atmosphäre umgaben.

In dieser Zeit war an der Erdoberfläche sowohl jene braune, dichte, kohlenähnliche Substanz, das Silicium, so wie das neuerdings berühmt gewordene leichte Metall der Thonerde, das Aluminium, besonders häufig verbreitet, und während beide sich mit dem Sauerstoff der Atmosphäre verbanden, während andere bis dahin verflüchtigte Stoffe, die Aetzstoffe aus der Potasche, der Soda und dem Kalk, sich auf der Erdoberfläche niederschlugen, blühten sich auf diesem Gemenge und aus einer kleinen Vermischung jenes Hauptbestandtheils unseres Erdkörpers, des Eisens, das erste, daher älteste Gestein. Wir haben Ursache anzunehmen, daß dies erste Gestein eine Granitart gewesen sei. In den Graniten treten drei Mineralien nebeneinander auf: der Feldspath, der Quarz und der Glimmer. Feldspath und Glimmer enthalten fast zu zwei Dritttheilen Kieselsäure, Quarz besteht aus ihr allein. Wenn dieses älteste Gestein nun bei dem späteren Niederschlag von Wasser an der Erdoberfläche von diesem ihr bis dahin unbekannten Körper von neuem zerlegt, zertrümmert und verbreitet wurde, so hat der Quarz, als der härteste der drei Bestandtheile jener Gesteinsart, als Sand sich zumest erhalten, während der Feldspath in Thonschlamm, der Glimmer in seine Blättchen aufgelöst wurden.

Bei allen diesen Vorgängen spielt die Härte des Quarzes eine ganz besondere Rolle, und wir sind daher wohl aufzufordern, dieselbe etwas näher in Betrachtung zu ziehen. Nächstlich wird mancher Leser sich erinnern, daß es wohl kaum ein unangenehmeres Gefühl gibt, als die Empfindung an unsern Zähnen, wenn wir auf Sand im Brode beißen, der aus dem Mühlstein in dasselbe gelangt ist, und darum schreibt auch Wertheim an die Lesende: um Eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute sähete ich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knirschten mir.“ Hier haben wir einen Maßstab für die Härte des Quarzes. Das Härteste, was wir in der Tier- und Pflanzenwelt kennen, das ist der Schmelz unsern Zähne, und diese härteste Substanz der belebten Organismen wird von der Härte des Sandes doch noch um Vieles übertroffen. Stahl läßt sich zwar auch schon härter als der Zahnschmelz machen, aber doch nicht leicht um so viel als der Quarz. Ebenso ist er auch härter als alle harten Kunstprodukte, die wir darstellen können, als Glas und Porzellan, als Steingut und Metall von irgend einer Art — und darum ist er allem dem, was uns umgibt, auch so verderblich. Quarzstaub, d. h. sehr feiner

Sand, zerträgt uns alles, was wir haben; nur Edelsteine läßt er unverletzt, und da er außerdem durch seine Flüssigkeit, die auf der Erde vorhanden ist, sichtbarlich aufgelöst oder verändert wird, so hat er wirklich unter den verbreiteten Substanzen am meisten Recht, das Prädikat der Unvergänglichkeit sich anzueignen.

Indessen ist er doch sein eigener Feind. In Bächen und Flüssen, wie am Strande und auf Dünen, reibt sich beständig Korn an Korn, und die dabei entstehenden ganz kleinen, unsichtbaren Abfälle lösen sich doch, so schwer löslich der Quarz auch ist, im Wasser auf. Auch da, wo Pflanzen zwischen Quarz verwesen, scheinen ganz kleine Mengen von ihm aufgelöst zu werden, und da er sich auch aus den Rassen zerlegter Mineralsubstanz, die man gewöhnlich Thon nennt, ausscheiden kann, so circulirt auf diese Weise, wenn auch nur in ganz kleinen Mengen, dennoch seine scheinbar unmanöverbare Masse. Kommt er nun auf solchen Wegen an Stellen, wo durch Verdunstung seines Lösungsmittels oder durch die Gegenwart einer Substanz, die ihn verdrängt, seine Ausscheidung nöthig wird, so setzt er sich ab, doch nicht in jenen kleinen unregelmäßigen Stücken oder Körnern, wie wir ihn bisher gesehen, sondern in Krystallen.

## Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen.

Von C. F. v. S. v. S.

### I. Die Braunkohlenformation und die geologische Karte der Provinz Preußen.

Zweiter Theil.

Die Wissenschaft begrüßt hier ein großartiges und um so anerkennenswerthes Unternehmen, als solches, im Gegensatz zu ähnlichen geologischen Specialkartenwerken, wie sie in Rheinland und Westphalen bestehen und seit einer Reihe von Jahren auch in Schlesien und Sachsen auf Staatskosten auszuführen werden, ein acht provincielles zu nennen ist, da sowohl die Idee zu demselben von der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft entsprungen ist, als auch der Provinzial-Landtag auf Anregung derselben bisher die nicht unbedeutenden Kosten gewährt und auch neuerdings den Fortgang der Aufnahmen auf Jahre hinaus gesichert hat.

Das vorliegende Unternehmen ist aber auch in gewissem Grade ein völlig neues in seiner Art zu nennen. Denn wenn wir auch geologische Karten, ältere wie neuere, größere und kleinere, aus den gebirgigeren Gegenden Deutschlands in großer Zahl besitzen, so hatten doch die geologischen Provinzialkarten von Sachsen und Schlesien ein nicht zu unterschätzendes Material von Vorarbeiten zur Verfügung. Unser weites norddeutsches Tiefland ist jedoch, vom geologischen Standpunkte aus betrachtet, noch ein ziemlich unbekanntes Land. Man begnügte sich bisher mit der Kenntniss der in demselben spärlich auftauchenden Inseln älterer Formationen und der allerdings richtigen, aber doch sehr

allgemeinen Annahme, daß alles übrige liegende Terrain wenigstens an der Oberfläche aus Diluvial- und Alluvialgebilde bestehe. Eine cartographische Trennung oder gar Bildung beider Formationen wurde bisher noch so gut wie gar nicht unternommen. Einen der ersten Versuche zu einer solchen verdanken wir, wie bereits in der einleitenden Bemerkung erwähnt wurde, gerade dem jetzigen Bearbeiter der Karte von Preußen in seinem Erstlings-Werk: „Die Diluvial-Ablagerungen der Carl Brandenburg“, Berlin, 1863. In dem weiten Felde seiner jetzigen Thätigkeit fand derselbe also so gut wie gar keine Vorarbeiten oder Vorbilder, und die erscheinenden Kartenblätter sind hier im äußersten Osten des norddeutschen Tieflandes ebenso Epoche machend, wie die einzige bisher existierende ähnliche Karte der Niederlande für den äußersten Westen Norddeutschlands.

Wir sehen in den beiden vorliegenden Sectionen nicht nur Diluvium und Alluvium scharf getrennt hervortreten, sondern auch gleichfalls durch Farben ein unteres und oberes Diluvium, ein älteres und jüngeres Alluvium unterscheiden und erhalten auf diese Weise eigenthümliche und interessante Einblicke in die unterschiedliche Wasserbedeckung früherer Perioden.

Vom rein geognostischen Standpunkte aus ist also das

Kartenunternehmen vollständig neu. Aber es handelt sich hier in den jüngeren und jüngsten Bildungen unfer Erdruste ebenso um die Möglichkeit einer Ausbarmachung der Karte für den Landbau, wie in den älteren Formationen zu Zwecken des Bergbaues. Die geologische Karte der Provinz Preußen macht daher auch den Anfang von geognostisch-landwirtschaftlichen Bodenkarten und bildet die erste und notwendige Grundlage zu den seit langen Zeiten verschiedentlich, aber stets, weil der Untergrund fehlte, vergebens erstrebt und versucht speciell agronomischen Karten.

Die vorliegenden Blätter unterscheiden zu diesem Zwecke in den genannten Formationsabtheilungen, je nachdem die eine oder andere der Schichten den unmittelbaren Untergrund bildet, vorzüglich: thonig, thonig-saifig (mergig), thonig-sandig (lehmig), sandig und endlich humose Bildungen durch Aufstufung der für die Formationsabtheilung gewählten Farbe, so daß die Unterscheidung in jedem bestimmten Falle möglich und das geologische Gesamtbild doch nicht zerstückt wird.

Was nun speciell die Wahl der beiden zuerst publicirten Sectionen betrifft, so muß diese als eine besonders glückliche bezeichnet werden, da gerade in dem West-Saamlande die relativ ältesten der überhaupt nur an wenigen Punkten innerhalb Preußens unter dem Diluvium aufgeschlossenen Tertiärbildungen zur Darstellung kamen und somit gewissermaßen ein Anschluß der jüngeren an die älteren Formationen, eine Vereinigung der neuen, den Landbau, mit den älteren, den Bergbau in erster Reihe befördernden Karten bewirkt wird. Das genannte Blatt eröffnet nämlich gleichzeitig der Industrie und speciell dem Provinzliedner noch so gut wie fremden Bergbau ein neues und weites Feld durch Nachweis der nicht nur auf die Küstenberge beschränkten, sondern unter einem beträchtlichen Theile des Landes fortwirkenden, so erhabenen dreiseitigführenden Tertiärschicht. Unserer im Ganzen industriearmen Provinz wird also durch die Arbeiten für die geologische Karte ein ganz neuer Industriezweig eröffnet, der ihr einen bedeutenden Aufschwung verheißt.

Mit Zug und Recht können wir der Karte, die gleich jetzt als neueste und ausführlichste Spezialkarte an sich je dem Ein- und Anwohner der betreffenden Gegenden er-

wünscht sein wird, sich auch namentlich in der genannten Section 8 für Strand- und Seebaderkunde dadurch ganz vorzüglich eignet, daß sie sowohl Villen, Reuhäuser, Bäder, niken, Kaufhöfen, Reustufen und Gänge, als auch Königsbirg selbst auf einem Blatte enthält, das Prospektikon stellen, daß sie in Kurzem alle bisher existirenden Hand-, Reise-, Comptoir- und Bureau-Karten verdrängt haben wird, da sie durch die Uneigennützigkeit der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu dem verhältnismäßig niedrigen Preise von 1 Thlr. pro Section nicht nur von den Gesellschaftsmitgliedern, sondern von Jedermann durch den Buchhandel bezogen werden kann. Die genannte Gesellschaft hat hierbei in erster Reihe die Absicht, „die Kenntnisse des Bodens zu unseren Füßen“, welche leider unserm sonst so voranschreitenden Jahrhundert noch recht sehr fehlt, nach Kräften zu verbreiten. Daß ihr das in hohem Grade gelungen wird, hoffen wir um so mehr, als die Karten das so umfassende topographische Material der Generalstabskarten bei noch etwas niedrigerem Preise \*) und die genaue geologischen Details noch als Gratisgabe bieten.

Die verdiente Anerkennung ist auch dem Unternehmen bereits vielfach zu Theil geworden. Namentlich hat das Königl. Ober-Bergamt in Breslau nicht umhin gekonnt, von seinem Standpunkte aus „das große Verdienst der Theilhaber und namentlich auch die patriotische Opferwilligkeit der Provinzialstände, welche die Ausführung dieses schönen und so außerordentlich mühsamen Kartenwerks ermöglichten, im vollsten Maße anzuerkennen.“ „Es legt dieses Kartenwerk und dessen Herstellung aus Provinzialfonds“, heist es in seinem Schreiben vom 26. Nov. 1867, „ein rühmliches Zeugnis ab für die Provinz selbst und die geistige Entwicklung der Provinz. Dasselbe wird, davon sind wir überzeugt, für die Entwicklung der Mineralindustrie in der Provinz Preußen von den segensreichsten Folgen sein, und wir können daher nur dem aufrichtigen Wunsche Ausdruck geben, daß die mit so vieler Mühe und Sorgfalt begonnene Ausführung der Karte in ungehörter und erfolgreicher Weise fortgeschritten möge.“

\*) Jede dieser Karten umfaßt ein Areal von 36 □ Meilen, entspricht also dem Raume von 2 1/2 Generalstabkarten (16 Tgr.).

## Kleinere Mittheilungen.

### Das Erdbeben in Pommern am 13. Januar d. J.

In der Nacht vom 12. zum 13. Januar d. J. hatten wir hier ein ziemlich heftiges Erdbeben. Es war zwar unbedeutend im Vergleich mit den gewaltigen Erschütterungen in Südamerika und den Ausbrüchen des Vesuv, aber doch erschreckend für Viele, die es unversehrt überraschte, und besonders lebhaft für die Wissenschaft. Große Erdbenen werden selten genau beobachtet, weil der Schreck den Verstand übermüht; solche kleine Spielereien beobachtet der Einsichtige mit ruhigem Verstand. Es war gerade Mitternacht vorüber, eine Minute nach zwölf Uhr, als die Erschütterung begann.

Draußen war Alles still, kein Lärmen regte sich, die Menschen waren alle zur Ruhe gegangen, und selbst die letzten Gassenhändler waren abgegangen. Erst zwei Tagen hatten wir Binkhiller; nach dem Kampf der letzten Kustschmungen hatten sich die Wellen gelöst, und ein leichter Nebel bedeckte die Gegend. Bei leisem Hauch aus Osten hatten wir Frost (—1° R.), und das Barometer stand auf 29". Jedes Geräusch war leicht zu vernehmen und zu unterscheiden.

Ganz ohne Vorbereitung, ohne jedes weitere Gelöse begann die Erschütterung ungefähr in der Weise, wie wenn schwer beladene Wagen unvermuthet um die Ecke raffen und das Haus erschüttern.

Fenster stürzten, Thüren zitterten und das Haus erbebte. Der Stoß kam von Süden ober SBW. und ging nach Norden. Das Haus, in welchem ich wohne, liegt der Länge nach von SBW. nach RND. Der Stoß erschütterte zuerst die Fenster der Wohnkammer an der Südseite und zwar das westwärts gelegene stärker als das nach Osten befindliche, dann die nordwärts gelegene Thüre, darauf die Glas-Thüre der Vorhalle, dann verlor er sich nach der Treppe hin. Die Bewegung ging wogerecht, ich hörte wie die Gegenstände der Reihe nach erschüttert wurden, zuerst das Fenster, dann der Tisch, zuletzt die Thüre. Ich stand vor dem Tisch und spürte die Bewegung unter meinen Füßen. Ich stand mit dem Gesicht nach Westen und spürte wie die Schwingungen von Osten nach Westen ziehend, unter meinen Füßen von links nach rechts liefen.

Es waren im Ganzen 3 Stöße, die zusammen etwa 6 Sekunden währten, von denen der erste, welcher minder stark war, 2 Sec., der zweite stärkere 2 Sec. dauerte, und, nachdem eine Pause von 1 Secunde eingetreten war, der dritte, welcher wieder schwächer als der erste war, 1 Sec. anhielt. Ich kann es nicht genau Zeiter messen, aber ich will es versuchen, unter dem Bilde eines Baustenwürfels von der Erstschütterung eine Vorstellung zu schaffen.

Man denke sich einen Viertelviertel-Zahl;  $\frac{1}{16}$  und  $\frac{1}{16}$  Aufschlag, dann Accent (erster Stoß) und Nachklang (Nachschlag); wiederholt  $\frac{1}{16}$  und  $\frac{1}{16}$  Anlauf (zweiter Stoß), dann eine Viertel-Pause; eine weitere Viertel-Pause,  $\frac{1}{16}$  Anlauf und ein dritter Schlag. Nach dem ersten Schlag folgte ein Nachlauf, weil die Bewegung im Gange war, und nach dem zweiten ein Halt. Die Bewegung war gedehnt, wobei sowohl die Pausen als auch der schwächere Anlauf eintrat; der letzte Stoß war ein Rückfall.

In gleicher Weise wie ich, haben auch andere Leute, die in der Nähe des Meeres (nordwärts) wohnen, die Bewegung von Süden nach Norden erkannt. Auch die wogerechte Richtung scheint mir aus manchen Berichten zu folgen. Einige haben Töpfe auf dem Dien, Gläser, Teller u. s. w. raseln hören; Andere fanden die Bettstellen, die auf kleinen Stöckchen standen, verrückt. Die Schiltschiffe vor dem Zeughaus hörte ein Häufchen Kanonenkugeln aus einander reiten. Andere vernahmen, wie die Ludwigskule wankte. In Bezug auf die Stärke hat Niemand genauere Beobachtungen angestellt; jedoch erkenne ich so viel, daß man in der tiefer liegenden Kreuzstadt die Stöße minder stark spürte, wie auf den Höhen der Altstadt und dem südlichen Viertel. Der Grund dürfte vielleicht darin zu suchen sein, daß in der Kreuzstadt über dem Hüfen 80—100 Fuß hoher Sand, von dem alten Rhein-See her, liegt und in der Altstadt sowie am Südende die Häuser unmittelbar auf dem Granitfelsen stehen. Man kann den Unterschied spüren, wenn ein Eisenbahnwagen in vollen Lauf gebracht wird und auf den Schienen fortzieht. In den gepörrichten Etagen der ersten und zweiten Klasse wird man das Dröhnen viel weniger spüren, als auf den harten Bänken der dritten Klasse; das Postler Bildet hier also die Saubildung.

Wie weit die Erstschütterung ging, ist mir die jetzt noch nicht bekannt geworden. Vermuthlich nur weiß ich, daß sie nordwärts in Weizen, Ransen und Rianfrucht, westwärts in Rüchelsheim und Wein, durch das Feld bis Worms geführt wurde, südwärts in Rannstadt, Oberstadt und der Bergstraße entlang, ostwärts bis Reilschheim, Rüdelsstadt und Dieburg durch den ganzen vorderen Oberrhein, also im Umkreis von 6—8 Stunden wahrgenommen wurde. Ueber die Richtung hat Niemand etwas Bestimmtes beobachtet. Ein Mann im Oberrhein-Idal will zwar die Richtung von NW. nach SO. erkannt haben. Der Unterschied von NW. nach Norden ist nicht gering. Die Erschütterung liegt nur darin, daß er die Rückschläge für die eigentlichen Stöße annahm.

Einige wollen auch ein Geräusch dabei vernommen haben; Andere erkannten es als unterirdisches Rollen; ein Mann von Langen

will von Süden her einen Knall, wie von einer glatten (nicht gezogenen) Kanone gehört haben, worüber ich jedoch — da ich mich im Zimmer befand — nicht zu urtheilen vermag; was dagegen Andere als Geräusch im Hause wahrgenommen haben, glaube ich als Geräusch der dröhnenden, raselnden Gegenstände erklären zu können. Ich wenigstens habe ganz bestimmt kein anderes Geräusch gehört, als was durch die dröhnenden Fenster und Thüren entstand. Ich hoffe indes, daß weitere Berichte darüber ausfließen werden.

Darmstadt, den 14. Januar 1860.

Heinrich Becker.

#### Luther und Kopernikus.

Dr. Hipler, Subregens des Realcollegiums zu Braunsberg, hat vor Kurzem unter dem Titel „Nicolaus Kopernikus und Martin Luther“ eine kleine Schrift veröffentlicht, in welcher er manche interessante Einzelheiten aus dem Leben dieser beiden großen Zeitgenossen und Reformatoren des 16. Jahrhunderts mittheilt, die er theils aus den erbländischen Archiven, theils aus den in Upsala aufbewahrten Briefen des berühmten erbländischen Bischofs Johannes Dantkowsky geschöpft hat. Bemerkenswerth ist, daß der Bischof dieser Gelegenheit von der katholischen Kirche den Vorwurf abzuwenden sucht, als ob sie jemals der Kopernikanischen Lehre eine ernste Exposition gemacht habe. Er beruht sich darauf, daß die durch die Inkoncarnation im J. 1616 erzielte Censur des Kopernikanischen Hauptwerkes, auf Grund deren bekanntlich Galilei verurtheilt wurde, von seinem Papste bestätigt worden sei. Dagegen behauptet er, daß es die Schule von Wittenberg gewesen sei, von welcher von Anfang an die Exposition gegen das Kopernikanische System ausging und bis in die neueste Zeit verzweigt getragen wurde. In wie weit gewisse moderne protestantische Theologen (Rinal und Genossen) dieser Behauptung einen Anschein von Recht gewähren, wollen wir dahin gestellt sein lassen. In Betreff Luther's hat der Verfasser unbestreitbar Recht. In seinen Tischreden spricht sich der große Reformator (S. 2260) folgendermaßen aus: „Es ward gedacht eines neuen Astrologi, der wollte demellen, daß die Erde bewegt würde und umginge, nicht der Himmel oder das Firmament, Sonne und Mond, gleich als wenn einer auf einem Wagen oder in einem Schiffe sitzt und bewegt wird, meinte, er sitze still und ruhere, das Erdreich aber und die Bäume gingen und bewegten sich. Aber es gebet jetzt also: wer da will klug sein, der muß ihm etwas eigenes machen, das muß ihm das allerbeste sein, wie er's macht. Der Rarr will die ganze Kunst Astronomiä umkehren. Aber wie h. Schrift anzeigt, so hieß Josua die Sonne still stehen und nicht das Erdreich.“ Ähnlich dachte auch Melanchthon, und Georg Joachim Rheticus, der einzige Freund und Anhänger des Kopernikus unter den Wittenberger Gelehrten, sah sich nach seiner Rückkehr von Frauenburg, wo er sich 2 Jahre lang bei Copernikus aufgehalten hatte, veranlaßt, seine Professur zu Wittenberg uederzuliegen und nach Leipzig zu überziehen. Ob ist auffallend, daß sich unsere heutigen glaubenshaften Zeugniser der Kopernikanischen Lehre nicht mehr auf dies Zeugniß der Reformatoren beschränken, und vielmehr sich aus Unwissenheit zu erklären. Willen würde es ihnen freilich nicht viel. Denn wenn zu Luther's und Kopernikus' Zeiten jene Lehre von der Bewegung der Erde noch eine streng wissenschaftliche war, deren Gründe zu erfüllen der gesunde Menschenverstand nicht ausreichte, sondern ein nur Wenigen zugänglich, unfaßliches astronomisches Wissen erfordert wurde, so ist sie heute eine Kinderreife, die zu fassen wenig Verstand und gar kein Wissen erfordert, und die auf so klaren Thatsachen beruht, daß man nicht weiß, was größer ist, die Vernunft, welche die Thatsachen nicht kennt, oder die Unverschämtheit, welche sich darüber hinwegsetzt.

C. H.



## Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

N 7.

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

17. Februar 1869.

Inhalt: Gesunde Luft, von Otto Ale. Dritter Artikel. — Der Wassereindruck von Biellaga, von Franz Erdem von Bivenot. — Was man von der Sonne weiß, von Hermann Klein. Zweiter Artikel.

### Gesunde Luft.

Von Otto Ale.

Dritter Artikel.

Nachdem uns die bisherigen Betrachtungen zu der besklagenswerthen Thatsache geführt haben, daß die meisten geschlossenen Räume, die von Menschen bewohnt werden, oder in denen sie sich dauernd als Kranke oder als Gefangene aufhalten, oder die sie vorübergehend um künstlerischer oder wissenschaftlicher Genüsse willen oder zu dem Zwecke geistlicher Vergnügungen besuchen, einer reinen und gesunden Luft entbehren, müssen wir untersuchen, wie überhaupt die Luft beschaffen sein muß, die als gesunde gelten kann, und wie groß die Menge der reinen Luft ist, deren ein Mensch in einem geschlossenen Raume bedarf. Pettenkofer's Untersuchungen haben uns gezeigt, daß diejenige Luft, welche sich als ungesund schon durch üble Gerüche kund gab, und welche in dem Eintretenden zumal das Verlangen nach frischer

Luft erregte, stets über 20 Theile Kohlenäure in 10000 Theilen Luft enthielt. In seinem eignen kleinen Arbeitszimmer fand Pettenkofer, selbst wenn er sich mehrere Stunden lang darin mit seinem Assistenten aufgehalten hatte, nie mehr als  $5\frac{1}{2}$  bis etwa 9 Zehntausend Theile Kohlenäure, und in dieser Luft fand er sich stets behaglich und fühlte nie das Bedürfnis, die Fenster zu öffnen oder das Zimmer zu verlassen. Wir können also daraus schließen, daß eine Luft erst aufhört der Gesundheit zuträglich zu sein, wenn sie mehr als 10 Theile Kohlenäure auf 10,000 Theile Luft enthält, und in der That wird sich eine solche Luft auch stets durch schlechten Geruch kenntlich zu machen beginnen. Um also den Kohlenäuregehalt der eingeschlossenen Luft nicht zu solchem Grade anwachsen zu lassen, wird für



eine beständige Erneuerung der Luft gesorgt werden müssen, grade wie man einer Flamme frische Luft zuführen muß, wenn sie fortbrennen soll. Es fragt sich nur, wie viel frische Luft zugeführt werden muß, um der Verderbnis durch die Athmung entgegenzuwirken. Wichtig war der Meinung, daß für einen erwachsenen Menschen in einem Raume von 376 Kubf. Inhalt in jeder Stunde mindestens 194 Kubf. reiner Luft zugeführt werden müßten. Nach neuern Erfahrungen hat sich diese Menge weitaus als unzureichend herausgestellt. Pettenkofer stütze seine Berechnung auf die Thatfache, daß jeder Mensch in der Stunde mindestens 12 Kubf. Luft ausathmet, und daß darin mindestens  $\frac{1}{4}$  Kubf. Kohlenäure enthalten ist. Offenbar muß nun die Menge der zuzuführenden frischen Luft soviel mal die Menge der ausgeathmeten Luft übertreffen, als der Kohlenäuregehalt der letzteren den Unterschied zwischen dem Kohlenäuregehalt der frischen Luft und dem einer Luft, worin sich ein Mensch dauernd wohlfühlt, übertreffe. Die Rechnung ergibt, daß nicht weniger als das 200fache der ausgeathmeten Luft an frischer Luft zugeführt werden muß, wenn in einem geschlossenen Raume Menschen sich dauernd wohl befinden sollen. Für jeden Menschen würde also die erforderliche Zufuhr 2400 Kubfuß betragen. Dies Ergebnis der Rechnung ist in der That durch die Praxis bestätigt worden. Als man in Paris anfangs auf mechanischem Wege frische Luft von außen in die Krankensäle einzutreiben, hatte man noch keine Abnung von dem ungeheuren Bedarf. Aber Versuch auf Versuch lehrt, daß man nicht eher die Luft in den Krankensälen für genügend rein erklären konnte, daß auch nicht eher aller übel Geruch daraus verschwunden war, als bis man jene erwähnte Luftmenge für jede Stunde und für jeden Kranken eingetrieben hatte, und seitdem gilt in Frankreich jene Leistung als die geringste, welche von einem Ventilationsapparat gefordert werden muß.

Man wird freilich über diese ungeheure Größe der Zufuhr frischer Luft staunen, deren wir zu unserm Gesundheitsbedürfnis sollen, und es darnach kaum für denkbar halten, daß wir in unsern geschlossenen Räumen, die doch jeder künstlichen Ventilation zu ermanen pflegen, noch leben können. Aber zum Glück übernimmt die Natur in Verbindung mit der Beschaffenheit unserer häuslichen Räume einen großen Theil des Lufterneuerungsgeschäfts von selbst. Wider unsern Willen sorgt schon der unbedachte Verschluß unser Thüren und Fenster für die Erneuerung der Luft, und im Winter wird diese unsehrwillige Ventilation noch durch den von innen geheizten Ofen auf das Vierfache unterküpft. Aber die damit verbundenen Wärmeverluste haben in unser Zeit leider auf alle möglichen Vorkerkungen sinnen lassen, um diese abtheillose Ventilation zu beschränken oder ganz zu beseitigen. Die Wärme kostet Geld, denkt man, und muß zusammengehalten werden; die Luft achtet man ja für nichts werth. Man verstopft also die Fugen an den Fenstern sorgsam und verkleidet die Thüren mit

Luchtheisen, oder man sorgt durch Doppelthüren und Doppelfenster für einen möglichst dichten Verschluß. Man heizt die Ofen von außen und führt die zur Verbrennung nöthige Luft von außen ein. Dazu wird noch in ärmeren Familien wenigstens sehr häufig im Winter dasselbe Zimmer zum Wohnraum, Arbeits- und Schlafraum benutzt. An Verderbnis der Luft und Entwidlung unreiner und überflüssiger Dünste läßt man es also nicht fehlen, und doch ist man außer sich, wenn durch zu häufiges Oeffnen der Thüre dieser schrecklichen Luft Gelegenheit zum Entweichen gegeben wird, weil mit ihr zugleich die übermäßig geliebte Wärme verloren geht. Leider ist auch noch in den meisten Fällen die wenige Luft, die zum Ersatz für die verdorbene durch Thüre und Fenster einschlüpfen kann, selbst nicht viel werth, da sie aus engen Gassen oder noch engeren, schmutzigen Höfen herkommt und auf ihrem Wege durch das Haus selbst sich noch mit allen möglichen üblen Ausdünstungen sättigt.

Zum Glück aber sind alle unser künstlichen Vorkerkungen, der frischen Luft den Eintritt durch Thüren und Fenster in unsere Wohnräume zu verwehren, bei weitem nicht so erfolgreich, als wir beabsichtigen und glauben. Den größten Einfluß auf den Luftwechsel in unsern Zimmern hat die Temperaturdifferenz zwischen der äußeren und inneren Luft. Pettenkofer fand, daß in seinem 3000 Kubfuß fassenden Arbeitszimmer bei einer Temperaturdifferenz von 20–24° C. etwa 3800 Kubfuß, bei 19° Differenz nur 3000, bei 4° Differenz sogar nur 900 Kubfuß frischer Luft in der Stunde eintraten. Als er die Fugen der Thüren und Fenster sorgfältig verkleidet hatte, sank der Luftwechsel bei 19° C. Temperaturdifferenz zwischen außen und innen auf 2100 Kubfuß. Man sieht daraus, daß nichts nachtheiliger für die Gesundheit ist, als der Aufenthalt in kalten Zimmern und zwar nicht der Kälte wegen, die im Freien gar nichts schadet, sondern des mangelnden Luftersatzes willen. Selbst ein geöffnetes Fenster vermag diesen nicht hinreichend zu schaffen. Pettenkofer öffnete bei 4° Temperaturdifferenz einen Fenstersügel von 9½ □ Fuß Fläche, und doch erreichte der stündliche Luftwechsel noch nicht 2100 Kubfuß, also so viel als selbst bei verklebten Thüren und Fenstern bei 19° Temperaturdifferenz Rattastaus hatte. In ähnlicher Weise wech auch der Luftwechsel, welcher durch von innen geheizten Ofen bewirkt wird, wenig durch den mehr oder minder dichten Verschluß der Thüren verändert. Während unter gewöhnlichen Verhältnissen bei lebhaftem Feuer 2480 Kubfuß Luft in der Stunde durch den Ofen zogen, betrug bei verklebten Fenstern die durchlebende Luftmenge 2400, also nur 80 Kubfuß weniger.

Der Leser wird sich in einiger Verlegenheit befinden, wie er sich diese natürliche Ventilation erklären soll. Denn legendes müßten doch die 2400–3000 Kubfuß Luft, die

in jeder Stunde auch bei sorgfältigstem Verschluss von Thüren und Fenstern in ein solches Zimmer einströmen, einen Eingang finden. Wenn es aber die Thüren und Fenster nicht sind, die diesen Eintritt gewähren, dann müssen es am Ende — so undenkbar es im ersten Augenblicke scheint — die Wände selbst sein, welche die Luft durch sich hindurchlassen. In der That hat Pettenkofer schon im J. 1851 darauf aufmerksam gemacht, daß die Wände unserer Häuser keineswegs so dicht sind, als man allgemein glaubt, und daß die Porosität des gewöhnlichen Baumaterials wie der daraus aufgeführten Mauern eine sehr wichtige Rolle in unsern Gesundheitsverhältnissen spielt. Wie bedeutend aber diese Porosität ist, und in welchem Grade diese für einen so sicheren Schutz gegen die äußere Atmosphäre gehaltenen steinernen Mauern unserer Häuser der Luft den Durchzug gestatten, davon kann sich der Leser durch einen einfachen Versuch überzeugen.

Man nehme einen gewöhnlichen, guten und trocknen Ziegelstein und überziehe vier Flächen desselben mit einer für die Luft un durchdringlichen Masse aus gelbem Wachs, Öl und Harz, so daß nur zwei gegenüberliegende Flächen frei bleiben. Diese letzteren bedeckt man dann mit zwei der Größe der Flächen entsprechenden Blechen, die in der Mitte ein etwa  $\frac{1}{2}$  Z. großes Loch haben, in welches je eine Röhre von einigen Zoll Länge eingelötet wird. An ihren Rän-

dern müssen diese Bleche darauf ebenfalls mit der Wachsmasse überzogen werden, so daß sich nirgends die geringste Lücke darbietet. Die ganze Vorrichtung stellt nun gleichsam eine Röhre von  $\frac{1}{4}$  Zoll Durchmesser dar, in welche eine Ziegelmasse von einer gewissen Dicke und Oberfläche eingeschaltet ist. Wißt man dann in das eine Rohr hinein und hält man zugleich die Mündung des andern unter Wasser, so zeigen die aufsteigenden Luftblasen, daß die Luft durch den Ziegelstein hindurchgeblasen wurde und, da sie nirgends seitlich entweichen konnte, durch das zweite Rohr ihren Ausgang nimmt.

In ganz ähnlicher Weise verhält sich auch der Mörtel, der bekanntlich theils zur Verbindung der Bausteine, theils zur Bekleidung der Wände benutzt zu werden pflegt. Pettenkofer nahm Mörtel aus einem sehr alten Gebäude, der also außerordentlich hart geworden war, und schiedte ein möglichst cylindrisches Stück desselben ganz in der vorberausgegebenen Weise her. Er konnte dann mit Leichtigkeit auch durch dieses Mörtelstück Luft hindurchblasen.

Wir kennen also jetzt die Wege, auf denen die Natur ohne unser Zutun die frische Luft in unsere Wohnungen gelangen läßt, und es wird sich nur fragen, ob diese Zufuhr eine ausreichende und unter allen Umständen auch eine gleichbleibende ist.

## Der Wassereintrich von Wiclitzka.

Von Franz Eblem v. Wiesner.

Das große Ereigniß des Wassereintriches zu Wiclitzka, welches in der letzten Zeit nicht nur den Fachmännern reichlichen Stoff zu Erörterungen bot, sondern die Theilnahme der ganzen gebildeten Welt hervorrief, wurde leider in den meisten Fällen in so unrichtiger Weise geschildert, daß es nicht ohne Interesse sein dürfte, den wahren Sachverhalt seinem ganzen Umfange nach zu erfahren.


Ebe ich an die Schilderung des Ereignisses gehe, sei es mir gestattet, einige Bemerkungen vorauszusuchen, welche, obwohl rein geologischer Natur, sich zur Verständigung des Folgenden doch nicht als unnütz erweisen werden.

Betrachtet man eine geologische Karte des nördlichen Europa's, so fällt gewiß Jedem der langgestreckte Zug mittlerer Tertiärlagerungen auf, welcher, in der Schweiz zwischen dem Juraegebirge und dem Nordsaume der Alpen des ginnend, sich ununterbrochen weit nach Osten hin erstreckt. Nach einer starken Verengung bei St. Pölten in Niederösterreich, deren Ursache das Eingreifen des böhmischen Gebirgsmassives ist, nehmen diese Tertiärbildungen an Breite beträchtlich zu, erfüllen die Niederung von Wien und erleiden eine zweite sehr bedeutende Verengung bei Wiclitzka, wo sie im Norden älteres Gebirge, im Süden die Karpathen (Karpathen sandstein oder Gips) begrenzen. Diese

mittleren Tertiärlagerungen, in dem Gebiete zwischen dem Senfer- und Bodensee unter den Namen der Molasse des Kantons, bestehen daselbst aus mergeligen, in der Regel sandigen Schichten, zu denen noch häufig Geröll und Conglomerat hinzutritt, welches den Namen der Nagelfluhe führt. Schon früher datt man die Beobachtung gemacht, daß gegen den Jura hin, z. B. bei Deningen, die Schichten horizontal gelagert sind, im Verhältniß zur Nähe der Alpen jedoch immer mehr aufgerichtet und gebogen erscheinen und unter die älteren Ablagerungen, hier unter die Kreide, scheinbar einfallen. Die verschiedenen in der Schweiz gemachten geologischen Detailuntersuchungen lehrten uns, daß sich daselbst eine ununterbrochene Linie verfolgen läßt, längs welcher solche Faltungen zu beobachten sind, und welche man die Faltungslinie oder Antiklinal-Linie der Schweizer Molasse nannte, die jedoch nicht als fortlaufender Hügelzug, sondern bloß durch die Schichtenstellung ausgeprägt ist. Es geht somit daraus hervor, daß nach Ablagerung der Molasse noch eine durchgreifende Hebung der Alpen in ihrer ganzen Erstreckung stattfand, und daß diese Hebungen langsame, aber langandauernde Pressungen nach Außen verursachten.

Favre, der allbekannte schweizerische Geolog, machte

bei Genf die Beobachtung, daß die steile Kette des Mont Salève, aus Schichten der Juraformation bestehend, ganz isolirt aus dem flachen Molassefeld hervorrahe, und sich an dieselbe die Molassefandsteine in aufgerichteter, gefalteter Stellung anlegen. Es mag dies also ebenfalls als Beweis dienen, — daß nach Ablagerung der Molasse eine Erhebung des Alpensystemes stattfand, deren Pression nach Außen die Faltung der Molasse bedingte, die dort am stärksten ersichtlich sein muß, wo feste Massen — hier die des Mont Salève — einen Widerstand leisteten (Fig. 1). Die Masse des Mont Salève verhielt sich, wie aus dem Gesagten ohnehin einleuchten dürfte, bei dem Emporsteigen der Alpen in einem passiven Zustande.



Der Mont Salève.

Es würde zu weit führen und auch hier nicht am Plage sein, wenn man das bisher Besprochene in seiner ganzen Ausdehnung betrachten wollte, und es genügt, zu erwähnen, daß dieselben Verhältnisse sich in einer langen Reihe weiterhin verfolgen lassen, bis endlich die Karpathen es sind, welche durch ihr Emporsteigen die Aufklaffung und Spaltung des Tertiärgebirges zur Folge hatten.

In der nächsten Nähe Bistitz's befinden sich im Gebiete des Tertiärlandes mehrere isolirt stehende Theile älteren Gebirges, aus Jura und Kreide bestehend, welche man sehr passend mit dem Namen „Klippen“ belegte, und an welche sich in eben derselben Weise, wie wir es am Mont Salève sahen, die Tertiärschichten aufgerichtet und gefaltet anlegen.

Durch den Zug von Tertiärablagerungen, welcher bei Bistitz nicht mehr als 1000—1200 Klafter Breitenausdehnung besitzt und einerseits durch älteres Gebirge, andererseits durch den Nordsaum der Karpathen begrenzt ist, geht nun auch die von dem Molassefeld her sich fortsetzende Antiklinalinie durch, deren Vorhandensein das so sehr bedeutungsvolle Ereigniß zu Bistitz neuerdings bestätigt.

Die neuesten Beobachtungen zeigen uns, daß bei dem Abdampfen von Meerwasser in der Absehung der Salze eine gewisse Reihenfolge, Dissociation genannt, besteht. Es fällt zuerst und schon bei einem sehr geringen Concentrationszustand Eisenoxyd nebst anderen Eisenverbindungen zu

Boden. Mit den höheren Concentrationsgraden erfolgt das Abscheiden des kohlensauren Kalkes, des schwefelsauren Kalkes oder Gipses, des Chlornatriums oder Kochsalzes, des Chlormagnesiums, wie der Bromverbindungen, und endlich im höchsten Concentrationszustande das der Kalkverbindungen, der sogenannten Kalksalze.


Auf der großen Saline zu Staßfurt in der Provinz Sachsen fand man dieselbe Reihenfolge der Ablagerung und traf in den die Salzflöße begleitenden Thonen, Handthone genannt, die Kalksalze an, welche Anfangs unbenutzt blieben, durch ihre spätere Verwerthung aber als Düngemittel den so enormen Aufschwung von Staßfurt veranlaßten. Diese hohe industrielle Bedeutung ließ dem

Gedanken nicht allzuleben liegen, den österreichischen Salinen eine größere Aufmerksamkeit zu schenken, als dies bisher der Fall gewesen ist, um sich zu verewigern, ob auch in unseren Salzwerken neben dem Chlornatrium industriell-verwerthbare Nebensalze in entsprechender Menge angetroffen werden würden.

Im J. 1861 am 6. November berichtete H. R. Rose in der geologischen Gesellschaft zu Berlin über seine Untersuchungen eines blauen Steinsalzes von Staßfurt, welches mit farblosem Salze zusammen vorkommt und reich an Chlorkalium (Solvin) ist. Schon damals führte Rose etwas Ähnliches von Kalusz in Galizien an, und es datirt seit dieser Zeit die wiederholt gemachte Hindeutung auf die Möglichkeit, auch in den galizischen Salinenbezirken Chlorkalium zu gewinnen. Im December 1866 wurde in einem Berichte aus Bistitz die wenig Hoffnung gebende Mittheilung gemacht, daß in den bisher aufgeschlossenen Theilen dieses Salzwerkes kein Vorkommen bekannt geworden sei, welches das Vorhandensein von Kalksalzen des Natriums könnte. Im Februar 1867 traf von Kalusz ein Bericht ein, welcher über die Analysen einiger Salze vorkommende der Kaluzer-Saline Aufschluß gab und eine ansehnliche Menge von Chlorkalium in einigen der untersuchten Mineralien nachwies. Die große Wichtigkeit, welche, wie bereits erwähnt, das mächtige Auftreten der Kalksalze zu Staßfurt erlangt hat, ließ immer mehr und mehr

es wünschenswerth erscheinen, nochmalige Untersuchungen zu Wieliczka anzustellen, welche aber leider durch Mangel an genauer Kenntniß der geologischen Verhältnisse dafelbst von Seiten der die Ausführung leitenden Personen dem Wassereinbruch zur Folge hatten. Es wird hier zweckmäßig sein, in Kürze die Lagerungsverhältnisse von Wieliczka zu erläutern, theils um der leichteren Verständlichkeit willen, theils um zu zeigen, daß nach den bereits dafelbst gemachten Erfahrungen die weitere Auffassung der Kalisalze als eine vergebliche bezeichnet werden muß.

Wie aus der beifolgenden Skizze ersichtlich sein mag, beginnen die Tertiärschichten mit einer ungefähr 60 Klafter mächtigen Lage von marinem Sand (o), welcher durch



Profil der Salzablagerung bei Wieliczka.

A Branz-Jurischicht; B Nitz-Negis; C Oass Ockerreich; D Mittiger Horizont; 1 Hangend-Teig; 2 Salzhorn mit Schräg Salz (oft Hunderte von Kubikklaffen); 3 Epizal, 4—7 A. 4 Schichtsalz, 6—8 A.

seine Wasserführung ausgezeichnet ist. Unter diesem Sand folgt eine ebenso mächtige Lage von marinem salzlosem Thon (1), marine Fossilien führend, welcher mit dem Namen des Hangendteiges belegt ist. Darunter befindet sich eine bei 30 Klaftern mächtige Schicht von Salzthon (2) mit eingeschlossenen unregelmäßigen Salzkrüppeln, welche, oft viele Hunderte von Kubikklaffen stark, den Namen Grün-salzkrüppeln führen. Unter diesen liegt ein nahezu 6 Klaftern Mächtigkeit besitzendes Steinsalzflöz, welches vielfach durch Ton, Lignit u. s. w. untereignet ist und Epizal (3) heißt. Unter diesem Steinsalzflöz folgt endlich ein ebenso mächtiges Flöz (4) des gesüßtesten, ganz reinen, kleintörnigen Steinsalzes, des Schobiksalzes, das sich nach den bisher gemachten Beobachtungen in drei von West nach Ost ziehenden Gruppen wiederholt, deren jede dieselben Faltungen zeigt. Zur Auffindung der so hochwichtigen Kalisalze, wählte man in Wieliczka den auf dem Horizont des Hauses Ockerreich befindlichen Querschlag Klostl, der breites eine Strecke weit gegen die Hangendschichten des Salzthons getrieben war. Da man innerhalb der Salzthonschichten,

welche man in der Länge von 75 Klaftern durchfahren hatte, noch immer kein günstiges Resultat erzielte, — so doch nur ein solches zu erlangen möglich gewesen wäre, — so verlängerte man den genannten Querschlag bis auf 125 Klaftern, von seinem Anfangspunkte aus gerechnet.

Der eigentliche Sachverhalt des Wassereinbruches ist nun folgender: Am 19. Nov. des vorigen Jahres wurde man die ersten Spuren aufsteigenden Wassers gewahr, welcher Zufluß später in solcher Menge und mit solcher Heftigkeit geschah, daß man am 23. desselben Monats früh das Wasser nicht mehr zu bewältigen im Stande war, und am 24. Nov. über einen auf den tieferen Strecken des Salzbergbaues Wieliczka starker einbrechenden Wassereinbruch

von der Oberbehörde der Salzischen Salinen Anzeige erstattet wurde. Die große Menge fast reinen Quarzandes, frei von jeder thonigen Beimengung, welche das eingebrochene Wasser mit sich führte, schloß jeden Zweifel über dessen Herkunft aus, da es unter diesen Umständen nicht dem Hangendteig eingelagert sein konnte, sondern aus den diesen Teig überlagernden marinen Tertiärsanden herrühren mußte, was auch die mitgeführten fossilen Conchilien bekräftigten. Man war somit an der Grenze des Teiges gewesen den Tertiärsand angelangt (m).

Ein Telegramm vom 2. Nov. gab die Menge des Wasserzuflusses mit 50 Kubikfuß per Minute an und erwähnte zugleich eine merkbare Abnahme, was bis zum 30. desselben Monats so weit richtig war, als der Zufluß nur noch 30 Kubikfuß per Minute betrug. Erst am 1. December traf ein genauer Bericht ein, welcher bei der Dringlichkeit der ersten Arbeiten wohl nicht früher erwartet werden konnte und der Hauptsache nach folgenden Inhalts war:

„Am 22. Nov. erfolgte in dem 110 Klaftern unter

Lage liegenden, nördlich vom Franz Josephsschachte befindlichen Querschlag Klostl, etwa 825 Klaftern von dem Eingange desselben entfernt, ein Einbruch von trübem, mit Sand verunreinigtem Wasser statt, welches aus dem an der Grenze der Formation befindlichen salzlosen Ton hervorgekommen scheint. Die anfänglichen Nothdämme bielten den Wasserandrang nicht Stand, und die Zimmerung der Streden wurde beschädigt; man mußte daher mit der Herstellung aus drei in kurzen Zwischenräumen hintereinander aufzuführenden Mauerdämmen mehr an den Eingang der Streden vorrücken. Am 30. Nov. muß das Wasser in den tiefer liegenden Bauen 11 Klaftern Höhe, und es mußte somit alles aufgegeben werden, um die Dämme noch vor Anfüllung der tiefer liegenden Theile mit Wasser zur Vollendung zu bringen. Zur größeren Sicherheit wurde endlich noch ein vierter Damm aus Holz, ein Keildamm, eingeschlagen, und somit waren alle Kassegelein getroffen, um dem Wasser Einhalt zu thun. Das Halten der Dämme hängt davon ab, daß sie nicht von der laugenden Kraft des Wassers umgangen werden, was nicht so leicht zu befürchten ist, da die Auslaugung noch nirgends wahrgenommen werden konnte und dieselbe überhaupt im festen Steinsalz viel weniger wirksam zu sein pflegt."

Die Dämme, welche nur aus dem Nutzen sein konnten, wenn deren Anlage im Hangendregel zur Ausführung hätte gelangen können, erwiesen sich, wie vorher zu sehen war, als machtlos, da der erste derselben innerhalb 1½ Stunden, die andern jedoch innerhalb eines Tages von dem Wasser umlaugt wurden. Immerhin ist aber den Dämmen der Vortheil zuzuschreiben, daß sich der mitgeführte Sand hinter denselben ansammelte und so die Kraft des entgegenfließenden Wassers etwas gehemmt wurde, in Folge dessen der Zufluß auf 25 Kubikfuß per Minute sank. Zunächst blieb nun nichts anderes übrig, als das Wasser in die tieferen Horizonte zu leiten, wo dessen Ausbreitung, ohne nachtheiliger Folgen nach sich zu ziehen, geschehen kann, da sich die größeren Baue und Verbaue, welche sich auch unmittelbar unter der Stadt Wienitzla erstrecken, erst über dem Horizont Rittinger befinden. Die gemachten genaueren Untersuchungen ergaben, daß das Wasser, wenn es in eben demselben Maße, wie bis vor Kurzem, (25 Kubikfuß) fortfließen würde, nicht vor 3½ Monaten den Rittingerhorizont erreichen könnte, von wo an erst eine ernste Gefahr für den ganzen Bau sowohl, als auch für die Stadt zu befürchten wäre. Es besteht somit die wichtigste Aufgabe darin, das Wasser womöglich auf einem gleichen Niveau, nämlich unter dem Horizonte Rittinger zu halten, um es von da mit der Zeit gänzlich zu bewältigen. Augenblicklich arbeitet bereits eine Wasserhebmachine im Franz-Josephsschachte, welche 8 Kubikfuß Wasser per Minute hebt. Eine zweite Röhrensaug zur Verdrängung dieses Quantum's ist nahe der Vollendung. Auf einem andern Schachte (Elisabeth), steht ein 50 pferdekraftiger Dampfgepöpel, mit welchem in

Wasserläsen 16 Kubikfuß Wasser gehoben werden, so daß man mit diesen beiden Maschinen allein schon 30—32 Kubikfuß Wasser per Minute auspumpen im Stande ist. Diese Maschinen, in Verein mit einer von dem nabeliegenden Kohlenbergbau Janowitz herbeigeschafften, mit deren Aufstellung schon begonnen wurde, und die eine Leistungsfähigkeit von 8 Kubikfuß Wasser per Minute besitzt, sind vollständig genügen, um den Wasserstand mindestens auf gleichem Niveau unter dem Horizonte Rittinger zu erhalten.

Für unvorhergesehene Eventualitäten ist endlich eine Maschine von 50 Pferdekraft requirirt, welche 58 Kubikfuß Wasser per Minute heben wird, während inzwischen auch die Aufstellung einer 250 pferdekraftigen Maschine beginnt, deren Leistungsfähigkeit 90 Kubikfuß Wasser per Minute betragen muß.

Im Ganzen wird man also über 400 Pferdekraft zu verfügen haben, welche 145—150 Kubikfuß Wasser, somit die fünffache Menge des gegenwärtigen Wasserzuflusses entfernen werden. In 3—6 Monaten wird es also möglich sein, das ganze, bis dahin eingeflossene Wasser zu bewältigen und dann entweder den Wasserzufluß ganz zu hemmen oder so weit zu regeln, daß eine konstante Wasserhebmachine jede weitere Gefahr ausschließt.

Das schließliche Urtheil über den ganzen Fall kann einfach nur dahin lauten, daß hier eine vollständige Janowitzung der geologischen Verhältnisse vorliegt. Zu wissen war nöthig und auch möglich: 1. daß Kalisalze, wenn solche nicht im Salzbone vorkommen, im salzlosen Hangendregel niemals angetroffen werden können, und 2. daß, wenn einmal der Querschlag schon so weit getrieben wurde, man mit der nöthigen Vorsicht hätte zu Werke gehen sollen, dabei die Faltungen des Gebirges wohl im Auge behaltend, um nicht, wie dies hier der Fall gewesen, die Teufelsichten viel früher zu durchfahren.

Hoffentlich werden durch dieses nicht zu verkennende Unglück manche Mängel geheilt werden, und namentlich ist es zunächst die Salzgewinnung, welche einer bedeutenden Reform bedürfen wird. Oesterreich hat nämlich bekanntlich die Verpflichtung, ein beträchtliches Quantum Salz an Rußland abzuliefern. Das von den Salzwerken in großen Blöcken abgebaute Salz wird nun, wenn es für Rußland bestimmt ist, in kunstvoll gearbeitete Fässerform gebracht — Salabanen genannt — welche ein Gewicht von 280 Pfund aufweisen müssen. Die Fässerform wurde gewählt, um das Aufladen auf die Schiffe zum Vortheil der Weiserbeförderung zu erleichtern. Ist das Salz jedoch für das Inland bestimmt, so wird es in parallelepipedische Stücke gleichfalls von bestimmtem Gewicht und Größe zugebaut. Alles bei der Verarbeitung abfallende Salz, ungefähr 43 Procent der Gesamtmenge, wird als sogenanntes Wis-

nuttensalz in der Grube gelassen, wo es theils als Verfab, theils zur Anfertigung käuflicher Kunstgegenstände dient.

Der Schaden, welcher dem Areal durch die Nichtbenutzung des Minutenfalzes erwächst, erhält von selbst.

## Was man von der Sonne weiß.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Beobachtungen während der totalen Sonnenfinsternis am 18. Aug 1878.

Von Herm. J. Klein.

Zweiter Artikel.

Das Sonnenlicht galt den Alten als das reinste und vollkommenste aller bekannten Lichter, und dies ist auch unzweifelhaft richtig. Als man jedoch bald nach Erfindung des Fernrohrs schwarze Flecken auf der Sonnenscheibe entdeckte, behaupteten die Anhänger des Aristoteles, diese Wahrnehmungen seien falsch, indem die Sonne als das vollkommenste Licht keine Flecken zeigen könne. Indeß mußten diese Einwürfe verflummen, als mit der vervollkommenung der Ferngläser Jedem die Möglichkeit gegeben ward, sich von dem Vorhandensein der Sonnenflecken durch den eignen Augenschein zu überzeugen.

Die Ehre der Entdeckung der Sonnenflecken gebührt dem Astronomen J. Fabricius, dessen erste Beobachtungen bis zum Anfange des Jahres 1611 hinaufreichen. Die Prioritätsansprüche Galilei's könnten als definitiv beseitigt angesehen werden, wenn bewiesen wäre, daß nicht Herr Chasles in seiner meisterhaften Autographensammlung viele dieser bisher unbekannten Briefe von Galilei's Hand besitzte, aus denen hervorgeht, daß der italienische Professor die Flecken vielleicht noch vor dem J. 1610 gesehen hat. Wenn diese Voricht vielleicht nicht nothwendig zu sein scheint, den erinnere ich daran, daß der gelehrte französische Akademiker Chasles eines uns Tagelicht gezeig hat, aus denen folgt, daß Galilei und nicht Huggens den ersten Mond der Saturne entdeckt hat, daß aber Galilei öffentlich über seine Entdeckung tieffsten Schweigen beobachtete und sie nur brieflich an Pascal mittheilte, der sie weiter an den zwölfjährigen Newton beförderte! Wenn solche unerwartete Thatsachen an's Licht kommen, so darf man wohl da, wo die Geschichte der Wissenschaft berührt wird, einige Voricht anwenden.

Kehren wir wieder zur Sonne zurück.

Die ersten Beobachtungen der Sonnenflecken ergaben sehr bald, daß die Sonne einer Umwandlungsbewegung um ihre Axe von West nach Ost unterworfen ist. Allein die genaue Zeitdauer dieser Rotation ist schwierig zu bestimmen, indem die Flecken unaufhörlichen Neubildungen und Auflösungen unterworfen sein und, wie schon Scheriner vermutete, außer der allgemeinen Rotationsbewegung, noch eine sehr veränderliche eigene Bewegung besitzen, so daß ihre wahre Bewegung eine Art von Spirale darstellt. Die Rotation der Sonne beträgt annähernd 25 1/2 Tage.

Die Sonnenflecken erscheinen bei starker Vergrößerung ungemein gerissen und unregelmäßig. Weist werden sie von einer helleren Hülle, der Penumbra, dem Halbschatten oder dem Hofe, umgeben, deren Form in allgemeinen Zügen die vergrößerte des eigentlichen Fleckens ist. Diese Bemerkung gilt indeß nur für den flüchtigen Anblick in kleinen Ferngläsern. Verfolgt man die Entwicklung eines Sonnenfleckens flüchtig unter Anwendung großer Teleskope, so findet sich, daß die Gestalt des eigentlichen Fleckens unabhängig von derjenigen der Penumbra sich verändert, man erblickt diese letztere allmählig ihre Form verändernd,

und in günstigen Momenten kann man, wie ich mich überzeugt habe, wahrnehmen, daß die Penumbra aus einer Menge sehr kleiner Flecken besteht.

Die größten Sonnenflecken finden sich in zwei Zonen, zwischen dem 5. und 30. Grade nördl. Breite und zwischen denselben Paralleltreifen in der südlichen Hemisphäre der Sonne. Allein auch außerhalb dieser Zonen, derertheils die gegen die Pole hin, existiren eine Menge Flecken, die bloß zu klein sind, um in gewöhnlichen Fernrohren gesehen werden zu können. Diese kleinen Flecken sind durchgängig matter als die besten Höfe, sie vertheilen dem Sonnenrande ein gestüpftes, griechenbäugliches Aussehen. Nach dem ausgezeichneten Sonnenbeobachter, Prof. Spörer in Aanklam, ist die Sonne vielleicht nie ganz flächenförmig und von gleichmäßigem, ununterbrochenem Glanze. Diejenigen Beobachter, welche mit schwachen Ferngläsern die Sonnenoberfläche durchforschen, sehen allerdings bisweilen ein vollkommen gleichmäßig helles Bild der Sonne, allein dies ist bloß eine Folge der ungenügenden optischen Kraft des angewandten Instrumentes.

Die größten Sonnenflecken übertreffen an Areal nicht selten unsere ganze Erdoberfläche um ein Vielfaches. Diese großen Gebilde haben durchschnittlich auch die längste Dauer, doch übertreift diese, so viel mir bekannt, niemals 10 bis 12 Sonnenrotationen. Die Vermuthung Schwabe's, daß er auf der Sonnenoberfläche im J. 1864 eine Art konstanter Gebildes wahrgenommen habe, hat sich in den genaueren Untersuchungen Spörer's keineswegs bestätigt.

Die aufmerksamen, Jahre lang ohne bedeutende Unterbrechung fortgesetzten, Untersuchungen Schwabe's haben das merkwürdige Resultat ergeben, daß sich in der allgemeinen Häufigkeit der Sonnenflecken eine Periode von etwa 11 Jahren ausspricht. Indeß wurden die ersten hierbei gehörigen Eracebnisse des Dessauer Astronomen nicht genugsam beachtet und wären vielleicht spurlos vorübergegangen, wenn nicht R. Wolf, als er am 4. December 1847 ein Fernrohr nach der Sonne richtete und die eben sehr zahlreichen und schönen Flecken beobachtete, ten Entschluß gefaßt hätte, sich speciell mit der Periodicität der Sonnenflecken zu befassen und alle früheren Beobachtungen der Sonne zu sammeln. Dank der Ausdauer dieses Gelehrten, fand er sich bald in der Lage, nachweisen zu können, daß die mittlere Dauer der Sonnenfleckenperiode 11 1/2 Jahre beträgt, so daß ein Jahrhundert genau 9 Perioden umfaßt. Im Jahre 1860 fand Wolf ferner, daß diese Periode nur eine unregelmäßige ist, welche in einen größeren Cycles von 55 1/2 Jahren eingeschlossen ist und zwar in der Art, daß die Länge der secundären Perioden innerhalb dieser Generalperiode zwischen 9,87 und 12,44 Jahren schwankt. Aus einer eingehenden Untersuchung des gesammten vorliegenden Materials hat R. Wolf gefunden, daß seit Entdeckung der Sonnenflecken ihre größte Häufigkeit auf folgende Jahre fällt: 1615,5, 1626, 1639,5, 1649, 1660, 1675, 1685,

1692, 1705,5, 1717,5, 1727,5, 1738,5, 1750, 1761,6, 1770, 1779,5, 1788,5, 1804, 1816,8, 1829,5, 1837,2 1848,6, 1860,2.

Schon im J. 1852 hat Wolf gefunden, daß diejenigen Jahre, welche sich durch zahlreiche Sonnensflecken auszeichnen, auch eine größere Menge von Nordlichtern aufzuweisen haben. Dies veranlaßte den thätigen Director der Sternwarte in Zürich einen möglichst vollständigen Nordlichtercatalog zusammenzustellen, der in der That das erste Ergebnis befähigte. Eine weitere Untersuchung über diesen höchst interessanten Gegenstand stellte Wolf im Verein mit Frig. an, und es ergab sich mit Evidenz, daß die Häufigkeit der Sonnensflecken derjenigen der Nordlichter parallel laufe, und daß sich im Nordlicht nicht nur die Periode von 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahren, sondern ganz besonders noch die große Periode von 55<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahren auf das schönste abspiegle. Aber noch mehr. Im Frühling 1859 erkannte Wolf, daß die magnetischen Variationen, die in ihrem Gange ebenfalls einen gewissen Parallelismus mit der Häufigkeit der Sonnensflecken zeigen, wenn sie wirklich dem Sonnensfleckenstande proportional seien, sich gegenseitig zu einander verhalten müssen, wie etwa zwei Ablesungen der Lufttemperatur an zwei verschiedenen Stellen. In der That ergab sich, daß aus der Häufigkeit der Sonnensflecken die Größe der Deklinationsvariation für verschiedene Orte der Erdoberfläche mit großer Annäherung an die Wirklichkeit berechnet werden kann. Der ursächliche Zusammenhang der magnetischen Phänomene mit den Sonnensflecken ist allerdings augenblicklich noch vollkommen dunkel, aber der Nachweis der Existenz eines solchen Causalzusammenhangs bleibt darum nicht weniger eine der merkwürdigsten und interessantesten Entdeckungen, deren sich unser gegenwärtiges Jahrhundert rühmen darf.

Ungleich weniger sicher erscheint der Zusammenhang der Häufigkeit der Flecken mit gewissen Stellungen der Planeten Merkur, Venus, Erde und Jupiter, welchen Balfour Stewart und Laiz wahrgenommen haben wollen. Einer anziehenden Wirkung auf die als flüssig gedachte Sonnenoberfläche wäre diese angebliche Thatsache keineswegs zuzuschreiben, denn Jare hat berechnet, daß die Gesamtanziehung aller Planeten nicht hinreicht, einen Sonnensturm zu erzeugen, welche mit der Fluth der irdischen Ozeane, wie sie durch den Mond hervorgerufen wird, zu vergleichen ist. Uebri gens hält Wolf, der sich schon seit dem J. 1857 mit dem Einfluß der Planetenstellungen auf die Häufigkeit der Sonnensflecken beschäftigt, diesen Einfluß noch keineswegs für sicher bewiesen. Wir können daher davon absehen, näher auf die Theorien einzugehen, welche einige englische und französische Forscher aufgestellt haben, um die Art und Weise dieser Einwirkung klar zu machen, Theorien, die sich übrigens dadurch auszeichnen, daß sie keineswegs genügen, die angenommenen Thatsachen als notwendig daraus abzuleiten.

Neben den Sonnensflecken, deren scheinbar tiefe Schwärze nur durch den Contrast mit der hellen Oberfläche der leuchtenden Scheibe hervorgebracht wird, zeigt die Sonnenober-

fläche auch helle Stellen, die sogenannten Fackeln. Diese sind von viel mannigfaltigerer Gestalt als die Flecken. Bald zeigen sie sich als rundlich, zusammengeknüpfte, lichte Knoten, bald als helle, flussartige Ähren, bald auch mehr buschigartig mit unbestimmten Grenzen. Die Sonnenfackeln zeigen sich am häufigsten in denjenigen beiden Zonen, in welchen die bedeutendste Fackelbildung erfolgt; doch existieren sie im Allgemeinen auf der ganzen Sonnenoberfläche und treten selbst in der unmittelbaren Nähe der Pole auf. Ein sehr aufmerkamer Beobachter, H. Weber, hat gefunden, daß die Lichtentwickelungen oder Fackeln keineswegs, wie man bis vor Kurzem angenommen geneigt war, ordnungslos auf der Sonnenoberfläche entstehen und vergehen, sondern, daß in ihrem Auftreten im Großen und Ganzen eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit herrsche, der zu Folge die Fackeln von den Polen der beiderseits gegen den Sonnenäquator herabsteigen. Die Fackeln selbst bewegen sich freilich nicht in dieser Weise, sondern nur die sie erzeugenden Kräfte; es tritt daher das Maximum der Intensität und Häufigkeit jener Gebilde successiv in immer geringeren geographischen Breiten auf, bis schließlich, wenn etwa die Zone in der Nähe des Sonnenäquators erreicht ist, eine neue Fülle an den Polen ausbricht.

Aus den vorstehenden geschichtlichen Erörterungen über die Auseinanderfolge unserer Wahrnehmungen an der Sonnenoberfläche erhebt, daß die Kenntnisse der Ähren höchst unvollkommen in dieser Beziehung waren. Wir brauchen uns daher nicht zu wundern, wenn wir bei den alten Philosophen nur wilde Spekulationen über die Natur des leuchtenden Sonnenballes antreffen. Selbst moderne Philosophen sind in dieser Hinsicht keineswegs glücklicher gewesen, wie überhaupt das Phantasieren ohne Zuziehung der beobachteten Thatsachen weit mehr ein Philosophieren als wissenschaftliches Forschen genannt zu werden verdient. So sagt z. B. De n in seiner im J. 1831 in 2. Auflage erschienenen Naturphilosophie über die Sonne und das Sonnensystem: „Ein Ganzes von einem Centrialkörper und mehreren Peripheriekörpern heißt Sonnensystem. Das Chaos ist nicht denkbar, ohne zugleich Sonnensystem zu sein. Die Sonnensysteme sind nichts besonders Essentielles, sondern mit dem Chaos oder mit dem Lichte gegeben, ja nur der durch das Licht geschriebene Aether. Die Urmaterie, als Licht erscheinend, muß zugleich als Sonne und Planet erscheinen. Uraet, Sonne und Planet sind einerlei und unterscheiden sich nur dadurch, daß jener in diesen individuell ponirt ist, während er in sich nicht ponirt ist u. s. w.“ Was aus solchen apodiktischen Behauptungen ohne jeden Beweis für ein positives Wissen und Begreifen daraus kommen soll, ist nicht näher bekannt. Erklärungen und Theorien über die Natur der Sonne, wie über jede Naturerscheinung, können sich nur auf wirkliche Beobachtungen stützen; der Philosoph gelangt im besten Falle nur dazu, eine Möglichkeit zu ergründen, der mit gleicher Berechtigung eine unbekannte Zahl anderer Möglichkeiten an die Seite gesetzt werden kann. Wir haben daher Theorien über die physischen Zustände der Sonne nur da zu suchen, wo die Sonne mit Ausdauer und hinreichenden Hilfsmitteln untersucht worden ist.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Sgr. (1 R. 30 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verlag: Schöner'sche Buchhandlung in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ute und Dr. Karl Müller von Hatz.

**N 8.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, S. Schwesig'scher Verlag.

**21. Februar 1869.**

**Inhalt:** Gesunde Luft, von Otto Ute. Viertes Artikel. — Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, von Karl Müller. Dritter Artikel. — Der Sand und dessen Herkunft, von Heinrich Girard. Dritter Artikel. — Kleinere Mittheilungen. — Literarische Anzeigen.

## Gesunde Luft.

Von Otto Ute.

Viertes Artikel.

Wer hätte sich von vornherein denken können, daß die Mauern unser Häuser so wenig dicht seien, daß die Luft durch sie hindurchstreichen kann! Pectenlofer's Versuche haben uns gezeigt, daß die Materialien, aus denen sie aufgeführt werden, daß Steine und Mörtel ungewisselhaft der Luft den Durchgang gestatten. Aber der geistvolle Forscher hat sich damit nicht begnügt, er hat uns dieselbe Eigenschaft auch von jeder fertigen Wand nachgewiesen und zwar in einem Grade, der mit Recht in Erstaunen setzen muß. Er ließ sich zu diesem Zwecke auf einer luftdichten Unterlage von Gussfelsen ein Stück Wand von 2 Fuß Höhe, 2 1/2 Fuß Breite und 14 Zoll Stärke aus Ziegeln und Mörtel aufführen und blies an den schmalen Flächen mit Gepp, an den beiden gegenüberstehenden breiten Flächen mit dem gewöhnlichen Mörtelbrenn überziehen. Nach einer

vollständigen Austrocknung dieses Wandstücks wurden die mit Gepp beklebten Flächen mit der erwähnten Mischung von Wachs, Öl und Harz luftdicht überzogen, auf die gegenüberstehenden großen Flächen aber, die je 3 1/2 Fuß umfaßten, Metallplatten aufgekittet, die je mit einem Rohre von 1/2 Zoll Durchmesser versehen waren. Wurde nun mit dem Rohre der einen Seite ein Kautschukrohr verbunden, dessen Ende einige Linien tief in Wasser tauchte, und dann durch das andere Rohre mit einem Blasbalg oder mit dem bloßen Munde Luft eingeblasen, so durchdrang diese Luft das ganze Wandstück und erschien in dem gegenüberliegenden Rohre als heftiger Strom, der mit lebhaftem Geräusch durch das Wasser brausete. Pectenlofer gelang es sogar, durch eine solche mehr als einen Fuß dicke, sorgfältig gemauerte Wand hindurch ein brennendes Licht mit



dem Munde auszublasen. Dazu wurde nur ein langer Kautschuckschlauch am Rohre derjenigen Gläse, auf welche geblasen werden sollte, befestigt, mit welchem sich der Expectorator dann auf die andere Seite der Wand begab, so daß er hier bequem die brennende Kerze vor die Öffnung des andern Rohrs halten konnte. Es bedurfte nur einer geringen Anstrengung der Lungen, um das Licht durch den ganzen Mauerkörper hindurch auszublasen.

Alle diese Versuche sind so einfach, daß sie der Leser allenfalls selbst anstellen kann. Befremden wird das Ergebniß derselben insofern, als wir doch von dem beständigen Luftstrom, der durch die Wände in unser Zimmer eindringen soll, für gewöhnlich gar nichts merken. Wir müssen indeß bedenken, daß die Festigkeit jener Luftströmung nur durch die Enge der Röhre bedingt war, welche sie passieren mußte. Die Geschwindigkeit strömender Luft verhält sich nämlich bei gleichen Zeiten umgekehrt wie die Querschnitte der Röhren, durch welche sie strömt. Wenn also die Geschwindigkeit des Luftstroms, der die Kerzenflamme auszublasen vermochte, etwa 10 Fuß in der Secunde betrug, so konnte die Geschwindigkeit der Luft, auf die ganze Wandfläche vertheilt, deren Querschnitt den des Rohrs fast um das 3000fache übertraf, nur noch etwa  $\frac{1}{3}$  Linie in der Secunde betragen. Unser Gefühl aber, das überhaupt nicht sehr empfindlich für die Bewegung der Luft ist, nimmt eine solche in der Regel erst deutlich wahr, wenn sie eine Geschwindigkeit von etwa 4 Fuß in der Secunde besitzt. Daß wir von der durch die Wand fließenden Luft also nichts merken können, ist daraus klar. Nur die gesteigerte Reizbarkeit mancher nervenkranker Personen empfindet wohl einmal einen leisen Zug von der Wand her, besonders wenn die einklassende Luft eine von der Zimmerluft sehr verschiedene Temperatur besitzt.

Wie werden es schwerlich noch bezweifeln können, daß unsere Wohnräume von dem unaussprechlichen Strome atmosphärischer Luft nicht ganz unberührt bleiben. Allerdings wird die Strömung der Luft beim Durchgang durch die Mauern bedeutend verlangsamt. Bei einem Versuche, den Pettenkofer anstellte, betrug die Fläche der dem Freien zugekehrten Zimmerwand 225 Quadratfuß. Durch eine freie Öffnung von dieser Größe würden bei einer Geschwindigkeit der Luft von 10 Fuß in der Secunde nicht weniger als 8 Millionen Kubikfuß Luft im Laufe einer Stunde haben hindurchgehen müssen. Da in Wirklichkeit aber in das Zimmer etwa 2400 Kubikfuß Luft durch die Wand einge drungen waren, so war die Geschwindigkeit der Luft durch diese Wand um mehr als das 3000fache verringert worden. Trotz dieser außerordentlichen Verlangsamung ist aber die Menge der durch Wände und Mauern in unsere Wohnungen eindringenden Luft immer noch eine ungeheure. Wenn wir auch die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Luft durch die Mauern bewegt, nur zu  $\frac{1}{3}$  Linie in der Secunde annehmen — eine Bewegung, die kaum noch durch künst-

liche Instrumente nachweisbar sein dürfte — so treibt doch ein mäßiger Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 10 Fuß in der Secunde gegen die Wand bläst, durch diese bei 20 Fuß Länge und 12 Fuß Höhe in einer Stunde nicht weniger als 1500 Kubikfuß Luft von außen in das Zimmer. Daß bei stärkerem Winde dieser Luftvorrath durch die Wände hindurch ein noch lebhafter sein muß, ist selbst verständlich. Damit stimmt auch die gewöhnliche Erfahrung überein, daß wir bei windigem Wetter im Winter mehr heizen müssen, als bei ruhigem. Sehr wesentlich hängt ferner die Lebhaftigkeit des Luftwechsels von dem Unterschiede zwischen der draußen und der im Zimmer herrschenden Temperatur ab. Im Winter, wo dieser Unterschied ein sehr bedeutender ist, läßt sich darum eine hinreichende Ventilation der Zimmer leicht bewirken. Ein geöffnetes Fenster leistet ja im Winter binnen einer halben Stunde oft so viel, als im Sommer während eines halben Tages. Um so schlimmer steht es freilich im Winter oft um die Wohnungen der Armen. Der Arme, der leider zunächst an die Befriedigung des stürmisch mahnenden Mangels denken muß und es deshalb unterläßt, sein Zimmer zu heizen, versetzt sich untermuth eines der unentbehrlichsten Nahrungsmittel, die gesunde Luft. Der Mangel eines Temperaturunterschiedes verringert die natürliche Ventilation, die gerade für diese überfüllten Wohnungen besonders nöthig ist, und die Luftverderbnis wird größer als sie im Sommer jemals sein kann. Die Versorgung der Armen mit Holz ist darum eine der größten Wohlthaten; sie schafft den Armen nicht bloß behagliche Wärme, sondern auch gesunde Luft und ist darum für die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse oft wichtiger, als Suppenanstalten.

Wenn wir die Mauern und Wände unserer Häuser als die kräftigsten Vermittler einer natürlichen Ventilation kennen gelernt haben, so werden in dieser Beziehung doch noch einige Einschränkungen zu machen sein. Zunächst müssen wir alles Holzwerk von dieser wohlthätigen Wirksamkeit ausschließen. Daß es wenigstens in sehr geringem Grade für die Luft durchgängig ist, können wir schon an den Wänden, namentlich an den Decken älterer Häuser mit unsern Augen sehen. In den gemauerten Decken von Zimmern, in denen viel geraucht oder durch Lampen und schlechte Feuer Kuf erzeugt oder selbst nur viel Staub aufgewirbelt wird, können wir in der Regel sehr deutlich die Stellen erkennen, wo Balken unter dem Lohm liegen. Diese Stellen erscheinen weißer als die übrige Decke, weil hier das Holz den Luftwechsel verhindert, während durch den Lohm die Luft sehr lebhaft hindurchdrang und dabei wie in den Maschen eines Siebes die feinen Kuf- und Staubtheilchen zurückließ. Holzhäuser, namentlich Blockhäuser, sind darum keineswegs die gesündesten Wohnungen. Aber auch die Mauern selbst können unter Umständen unfähig werden, den Luftwechsel zu vermitteln, nämlich wenn sie von Feuchtigkeith durchzogen sind. Mörtel, wie Ziegelsteine verlieren

ihre Durchgängigkeit für die Luft vollständig, sobald sie hinlänglich mit Wasser benetzt sind. Ihre Poren, durch welche sonst die Luft mit Leichtigkeit hindurchstrich, sind vom Wasser erfüllt, und dieses haftet in seiner feinen Vertheilung so fest, daß es durch die Luft selbst beim heftigsten Anbrange nicht verdrängt werden kann. Versuche, die Pettenkofer mit solchen feuchten Mauerstücken in der bereits erwähnten Weise anstellte, lehrten, daß es mit der größten Anstrengung nicht möglich war, auch nur ein Luftbläschen durch sie hindurchzuleiten. Diese Thatsache ist von der größten Wichtigkeit, da sie uns über die gesundheitsgefährlichen Wirkungen feuchter Wohnungen, besonders der Kellerwohnungen aufklärt. Nicht die Feuchtigkeit an sich ist es, welche das Wohnen in solchen Räumen so ungesund macht, obgleich die mancherlei Fäulnisproceß, welche durch die Feuchtigkeit eingeleitet werden, durch die sich dabei entwickelnden schädlichen Dünste viel dazu beitragen, die Luft zu verpesten. Das Schlimmste bleibt immer der Mangel jeder natürlichen Ventilation. Dieser ist es, der in Verbindung mit der schlechten Nahrung vorzugsweise

diese dumpfen Wohnungen zu Brutstätten des „scrophulösen Gefindels“ macht. Man möchte sich fast wundern, daß die Todtenregister nicht noch furchtbarere Dinge von solchen Städten berichten, in denen Tausende von Menschen in Kellern wohnen. Haarsträubend genug ist es, wenn, wie aus amtlichen Berichten feststeht, in Pils vor dem J. 1852 von 21,000 Kindern, die in Kellerwohnungen geboren wurden, 20,700 vor dem fünften Lebensjahre hinstarben, also von 100 nicht einmal zwei das Alter von fünf Jahren erreichten. Es ist eine ernste Mahnung für unsere Gegenwart, dafür zu sorgen, daß dieser Herde physischer und moralischer Verderbniß weniger werden, daß man in den großen Städten nicht gar zu ängstlich bei der Benutzung jedes Raumes sei, daß man für freie Plätze und geräumige Höfe Sorge, die für die Städte so nöthig, wie die Lungen für das Thier sind, daß man jenen entsehligen Familienhäusern ein Ende mache, in denen jedes Loth ein Zimmer benannt und mit Menschen vollgepfropft wie, deren Athem die jedes Weibchens nach außen entweichende Luft mit unerträglichen Pesthauchen erfüllt.

## Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Von Karl Müller.

Dritter Artikel.

Die Section für Zoologie hat schon von Haus aus den Vortheil für sich, daß Anatomie und Physiologie von ihr längst getrennt sind. Hierdurch tritt das zoologische Element mehr in den Vordergrund und gibt den Verhandlungen eine wohlthuende Frische. Damit gewinnt sie aber auch mehr Zeit, und dieser Gewinn ist bei der Größe des zoologischen Gebietes ein bedeutender. Denn so kam es auch in Dresden, daß in den fünf notwendig gewordenen Sitzungen Mittheilungen über die verschiedensten Thierklassen, die biologischen und kosmischen Wesen gemacht werden konnten, von den Infusorien herauf bis zu den Säugethiern. Selbst nachdem sich die Section für vergleichende Anatomie genöthigt gesehen hatte, sich dem ursprünglichen Plane nach, wieder mit der Zoologie zu vereinen, verwandelte sich dieser Charakter nicht. Manche Mittheilung kam so zur Geltung, die ein allgemeines Interesse in sich trug.

So sprach z. B. Reg.-R. von Kiesenwetter aus Bauen über die Insekten-Faunen der Hochgebirge und zeigte, daß sie sich ganz wie Insektfaunen, d. h. isolirt zwischen den übrigen verhalten; um so mehr, als die meisten dieser Insekten ungeflügelte sind. Im karpathischen Tatraagebirge, welches mit den nächsten höheren Gebirgen nur durch niedrige, noch nicht die subalpine Region erreichende Hügel zusammenhängt, hat jedes seiner zahlreichen Quertäler, welche in Felsensteinen enden, eine Fauna für sich, die aus diesen Steinen nicht heraus kann. Trotzdem bemerkt man in ihr keine Rassenbildung; man hat sie folglich als

selbständige, uralte Schöpfungen zu betrachten. Ist das aber wahr, so ist damit auch ein schöner Gegenbeweis gegen die Darwin'sche Schöpfungstheorie und zugleich gegen das sogenannte Migrationsgesetz Moritz Wagner's, von dem ich in Nr. 1 dieses Jahrganges der „Natur“ berichtete, gegeben.

Ein ähnliches Thema behandelte Hauptmann v. Hoerner, nämlich die Wanderung der Vögel. Er theilte sie in eine dreifache ein. Entweder dehnen die Vögel ihren Verbreitungsbezirk alljährlich weiter aus und acclimatiren sich in fremden Gegenden; oder sie erscheinen plötzlich in großen Massen, nachdem sie einige Zeit vorher kleinere Flüge vorausschickten, um dann im Verlauf von Monaten oder Jahren sich ebenso wieder zurückzuziehen; oder sie werden schließlich ohne jeden Zusammenhang mit ihrer Art einzeln verschlagen. Die erste Weise der Wanderung findet ihre natürliche Erklärung in den Wandlungen der Bodencultur. Sowie diese sich und das Klima bessert, verlegen die Vögel aus den Grenzgebieten ihre Wohnungen gern dahin und accomodiren sich den neuen Verhältnissen vollständig. So lag sich z. B. ein Rohrfänger (*Calamohorpe arundinacea*) bei Frankfurt a. M. nach Vertilgung seiner Schlupfwohnungen bei das trodene Laubgehäcke der Promenaden zurück und hing später sein Nest in dem Dickicht gerade aufsteigender junger Schößlinge einer verschmittenen Erbe ebenso auf, wie er es vor ihm im Schilfdickicht gewohnt gewesen war. Der Kammerdovogel (*Turdus pilaris*) galt noch im Anfange die-

frs Jahrhunderts als hochnordischer Vogel, während er jetzt in Schlessen, in der Lausitz und bei Leipzig Brutvogel ist und sich gegen Norden hin nur noch bis Pommern findet. Die Haubenlerche (*Alauda cristata*), vom älteren Nrehm noch als sibirischer Vogel betrachtet, ist schon bis an den Rhein vorgebrungen, wo er noch im Anfange der 50er Jahre selten war. Dagegen dringt der Sittich (*Pyrrhula serinus*) auf zwei verschiedenen Wegen aus dem Süden nach Norden vor: den Rhein abwärts bis Frankfurt und von Ungarn bis nach Schlessen. Die Geler, zur Zeit des deutschen Reisenden Pallas in Südrussland noch unbekannt, haben sich dort niedergelassen, seitdem daselbst große Viehheerden gehalten werden. Der Kormoran (*Haliastur carbo*), früher durchaus Seevogel, sucht jetzt, zum Schrecken der Besizer, unsere Süßwasser-See'n heim. Als Beispiel für die zweite Art der Einwanderung in Massen dient das Steppenhubn (*Syrhaptes*); es erschien im Jahre 1863, wahrscheinlich von der Hipe in Centralasien vertrieben, in Schlessen, verschwand aber 1864 wieder. Es ist bekannt, daß dieses interessante Gelbhuhn sich selbst bis über Thüringen hinaus, ja, bis England verbreitete, aber dort ebenfalls wieder verschunden ist. Die dritte Art der Einwanderung hat weniger Interesse; man kann in der Regel weder die Gründe noch die Gegend bezeichnen, woher die Vögel kommen und wohin sie wieder gehen. — Auch bei den Insekten sind ähnliche Wanderungen bekannt. Unter andern Beispielen überschreitet der Dleanderwurm (Sphinx Nerii) fast alljährlich das Mittelmeer, um sich an der südfrenzösischen Küste niederzulassen oder, der Verbreitung seiner Futterpflanze folgend, selbst nach Norden zu gehen, wo er sogar schon in Kurland angetroffen worden ist. — Bei dieser Gelegenheit dürfte auch die anderweitige, für die Seidenindustrie höchst wichtige Mittheilung des Prof. Nach in Prag interessieren, daß der japanesische Eichenspinner (*Yama mai*) seit zwei Jahren in Krain zur Seidenzucht gezogen und vollständig acclimatist ist. Im Winter 1867 bis 1868 überwinterete er im freien Eichenwalde so, daß aus den ausgelegten Eiern viel kräftigerer Käupchen austreten, als aus den im Zimmer gezogenen. Ebenso dürfte hier eine andere Beobachtung von Interesse sein, die eigentlich in der botanischen Section von Dr. Bail mitgetheilt wurde. Sie betrifft eine ähnliche Thatfache wie jene, die neulich von Paul Kummer in diesen Blättern (Nr. 3) über die Vernichtung eines Waldverwüsters durch Pilze auf Kügen veröffentlicht wurde. Nach Bail vermüßte die Eulenraupe (*Noctua piniperda*) in der Tschuder Halbe bei Danzig ein Areal von 22,000 Morgen. Trotz dieser Wafsenhaftigkeit gelangten aber doch nur wenige Exemplare der Raupe zur Verpuppung; die meisten wurden durch die Entwickelung eines Pilzes (*Empusa*) vernichtet.

Die Section für vergleichende Anatomie und vergleichende Pathologie war nicht so glücklich, sich zu constituiren. Sie beschloß daher, die erstere wieder nach alter Sitte mit

der Zoologie zu vereinen, und letztere, welche überdies zu wenig Berührungspunkte mit jener hat, den betreffenden medicinischen Sectionen zu überwelsen; um so mehr, als zu wenig Veterinärärzte erschienen waren.

Dafür war die Section für Anatomie und Physiologie um so rühtiger. Denn ihre Mittheilungen häuften sich derart, daß sie kaum in fünf Sitzungen bewältigt werden konnten. Von Anatomie kam dabei am wenigsten zum Vorschein; wohl aber herrschte die Physiologie durchaus. Für ihren heutigen Stand ist es sehr bezeichnend, daß sich die meisten Vorträge um den Frosth drehten; er ist gleichsam das A und O Aller geworden, die sich mit Nervensphysiologie beschäftigen, und die Welt der Frösche hätte, da sie um dieser Zwecke willen zu Tausenden hingelichtet wird, allen Grund, sich bei Galvani zu beklagen, durch ihm als ein so nervöses Geschöpf berühmt geworden zu sein. Doch Scherz bei Seite, so haben wir alle Ursache, uns dieser wichtigen Entdeckung immer mehr zu freuen. Das zeigte unter Anderem sehr deutlich, was Prof. Solz aus Königsberg von Fröschen mittheilte, denen er schon vor Monaten das Großhirn aus dem Kopfe genommen hatte. Ungeteigt, bleiben sie völlig ruhig an demselben Orte sitzen, sehen aber und vermeiden, bei künstlich hervorgerufenen Sprungbewegungen, die ihnen in den Weg gelegten Hindernisse; auch deßhalb sie noch eine vollkommene Beherrschung ihres Gleichgewichts, sie sind also trotz der Wegnahme ihres großen Gehirns nicht aller Intelligenz beraubt. Zerstückt man hingegen auch noch die lobi optici, so verliert das Thier die Beherrschung seines Gleichgewichts, dreht sich aber dennoch mit der Geschwindigkeit eines unverwundeten Frosches auf den Bauch jurst, sobald es auf den Rücken gelegt wird. Das Vermögen der Intelligenz ist folglich nicht auf einen bestimmten Gehirnthheil beschränkt; im Gegentheil muß jeder der einzelnen Theile sein bestimmtes Maß von Intelligenz in sich tragen, durch welche eine bestimmte Bewegung bederrscht wird. Das Rückenmark allein scheint ohne jede Anlage von Intelligenzvermögen zu sein.

Auch die Section für innere Medicin durfte sich rühmen, in ihren vier Sitzungen höchst allseitig und frisch Gegenstände der mannichfaltigsten Art behandelt zu haben. Manches davon reicht in seinem Interesse weit über die Grenzen der Section hinaus, und sie verdankt das den Fortschritten der Neuzeit, welche die ärztliche Kunst nicht allein auf Medicamente, sondern auch auf eine richtige Ernährung zu bauen sich bestrebt. In dieser Beziehung stand ein Vortrag des Dr. Isidor Stück aus Liverpool über das frische rothe Blut als Arznei und Nahrungsmittel obenan. Der Redner sah sich bei manchen Krankheiten seiner Patienten genöthigt, vorzugsweise durch kräftige Nahrung zu wirken, und er erreichte das durch Verabreichung frischen Blutes in so bedeutendem Maße, besonders bei Schwindfüchtigen und Bleichfüchtigen, daß er nach langen und mühsamen, höchst kostspieligen Versuchen eine solche

Nahrung auch für Suppenanstalten auffand, welche die vegetabilischen und darum wenig ernährungsfähigen Suppen in animalische und damit höchst nahrhafte verwandelt. Es gehört zu dieser Mischung, daß man das Blut in breiten Gefäßen auffängt und öfters umgießt, damit es möglichst viel Sauerstoff aus der Luft aufnehme. Das so gebildete Serum wird nun theilweis ausgepreßt und zu sehr feinen Stüchchen (Hachée) gerhackt, worauf es den fertigen, dreitägigen Speisen nebst einer Quantität des flüssigen Blutes zugesetzt wird. Für Kranke bereitet er eine Suppe durch Auskochen von Kaibschäfen, welcher er die gleichen Substanzen hinzusetzt. Trotz des herrschenden Vorurtheils der Engländer gegen Blutgenuss fand das Verfahren in Liverpool Eingang und bewährte, wie es ja auch ganz natürlich ist, eine große Ernährungsfähigkeit. Im Grunde ist es nichts anderes, als was Liebig mit Fleischextract erreicht; nur daß es Jedermann in seiner eigenen Hand hat, sich, wenn er keinen Fleischextract besitzt, die Nahrung jederzeit selbst verschaffen zu können. In der That kann der Genuss dieser Substanzen nicht genug empfohlen werden, wo es entweder der Organismus nicht vermag, etwas Anderes, als flüssige, leichte Nahrung zu verdauen, oder wo, wie in Armenhäusern und Suppenanstalten, die arme Bevölkerung meist auf wenig kräftige Suppen angewiesen ist. Wie vermögen eben nicht ein ganzes Leben hindurch von Vegetabilien zu existiren, wie die Vegetarier behaupten. Genügende Kraft- und Stoffentwidelung kann, — sehr richtig! — nur aus einem Gemisch vegetabilischer und animalischer Nahrung zugleich hervorgehen. Darum werden weiße Bohnen, obgleich sie an der Spitze aller vegetabilischen Nahrung stehen, doch erst durch einen Zusatz von Fleischextract in animalische verwandelt. Einen abgemagerten, blutleeren und schwachen Mann von 61 Jahren entließ Dr. Glück geheilt und gekräftigt schon nach 8 Tagen, indem er denselben Hachée mit flüssigem Blut und gleichzeitig dreimal täglich ein Eisenpräparat gab. Weber Eisen- noch Milchgenuss hatten früher bei diesem Manne gebohen.

Auch die künstliche Fabrication von Mineralwässern kam durch Dr. Ewich aus Eöln zur Sprache. Derselbe hat diesen Zweig medicinisch weiter entwickelt, indem er gegen Unterbestörungen aus den Hauptbestandtheilen der Natronquellen ein Hämorrhoidalwasser fabricirte, das, wie er sich ausdrückt, an Wohlgeschmack seines Glases sucht. Ebenso ist von ihm ein Gleichwasser componirt worden, das ausserdem noch Lithion und Kali im Ueberschuss enthält. Auch hat er von den Bestandtheilen des Hämorrhoidal- und Gleichwassers Pastillen gefertigt, damit der an die Wässer Gewöhnte auf Reisen das Mittel bei sich führen könne, und auch solche Patienten davon Gebrauch machen können, die überhaupt kein Mineralwasser vertragen. Selbst für Gleichsüchtige hat er ein Gleichschwasser componirt, und zwar ein kalk- und kochsalzhaltiges, das den Eisengehalt stets aufgelöst enthält. In Dresden machte er auf ein neues

Wasser dieser Art, auf ein Sod- und Kochsalzwasser aufmerksam. In allen diesen Compositionen seien die wirksamen Bestandtheile in größerer Menge, als in den natürlichen Quellen vertreten, doch nur bis zu der Grenze der Verdauungsfähigkeit. Der Fortschritt hierin ist unverkennbar. Einmal sind diese Wasser eine Wohlthat für alle diejenigen, welche nicht leicht Gelegenheit nehmen können, an die betreffenden Curoorte zu gehen. Dann entwickelt sie den zuerst von Struve eingeschlagenen Weg darauf, daß die Mineralwasserfabrication unschädlich dadurch einen neuen Aufschwung erfahren muß. Aerzte, welche von dem Dasein dieser Wasser noch keine Kenntniss haben sollten, machen wir darauf aufmerksam, daß Dr. Ewich eigene Versuche über seine Fabricate ausstellt.

Ein höchst interessanter Schritt zur Ermittelung der Wirkungsweise der Arzneimittel wurde von Professor Bing in Bonn durch die Untersuchung über die Wirkung des Chinins gethan. Es zeigte sich, daß dasselbe in seiner Verbindung mit Säuren das beste antiseptische Mittel gegen Fäulnis der Proteinstoffe ist. Ganz nach dieser Wirkung richtet sich auch sein heilender Einfluss bei Thieren, welche direct von der Vene aus mit sauligen Flüssigkeiten vergiftet wurden. Es liegt folglich die Annahme sehr nahe, daß es in ähnlicher Weise auch in jenen Fällen wirken werde, wo Stoffe der sauligen Gährung eingeathmet oder gemessen wurden, wie das ja in den Fieberzuständen erkennbartermassen der Fall ist. Seine Fieber heilende Kraft scheint also darin zu bestehen, daß es das Protoplasma der Körperhaltung gegen Fäulnis schützt. Das hat so viel für sich, daß wir mit Spannung den weiteren Versuchen entgegen sehen.

Eine Section für Kinderheilkunde, die sich ebenfalls nachträglich erst in Dresden constituirte, hielt vier sehr lebendige Sitzungen und zeigte damit nur zu sehr die Nothwendigkeit einer solchen Section, deren Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. Die Anwesenden fühlten das auch selbst am Schlusse ihrer Verhandlungen, weshalb es sehr zu wünschen ist, daß eine solche Section auch bei den folgenden Versammlungen nicht fehlen möge. Die Verhandlungen selbst entziehen sich jedoch wegen ihres specifisch-medicinischen Charakters einer weiteren Mittheilung. Sehr interessant aber war die Mittheilung des Dr. Förster in Dresden, daß nach den Beobachtungen eines 33jährigen Zeitraumes in der Dresdner Kinderheilklinik eine gewisse Periodicität der Kinderkrankheiten in epidemischer Form unverkennbar ist. In Dresden selbst hebt das Scharlach alle 5 bis 6 Jahre wieder; die Wärrern halten einen Zeitraum von 7 bis 8 Jahren für ihre Wiederkehr fest. Masern erscheinen, wie in München, alle 2 bis 3 Jahre; der Keuchhusten hält einen Cklus ein. Die Masern nehmen in Dresden häufiger ihre Entwicklung im Sommer, als im Winter, und Förster leitet dies davon her, daß dort der

Schuleintritt zu Othen und nicht zu Michaeli erfolgt. Das ist eine Beobachtung, die wieder einmal recht schlagend zeigt, was die Ueberfüllung unserer Schulschulen zu sagen hat. Professor Ranke in München, welcher dieses Thema durch

einen größeren Vortrag über Kinderkrankheiten in München angeregt hatte, fand ebenfalls die Mägen an den Schuleintritt gebunden, dort aber in den Herbst und Winter fallend, weil hier der Eintritt im Herbst stattfindet.

## Der Sand und dessen Herkunft.

Von Heinrich Girard.

Dritter Artikel.

Es ist das Recht der festen Körper, feste Formen zu bilden. Wo sie auch Ruhe finden und Krystallfassen, nirgends bedingt die äußere Umgebung ihre Gestalt, immer nur das innere Gesetz. So sehen wir den Quarz allüberall in regelmäßigen sechsseitigen Pyramiden oder in sechsseitigen Säulen, welche am Ende eine Pyramide tragen, sich absetzen. Dabei ist nicht allein der ungefähre Umriß gleich, sondern die Winkel dieser Formen gleichen einander bis in alle Einzelheiten. Zwar ist der äußere Ansehen oft verschieden: die einen Säulen sehen schlanker, die andern mehr gedrungen aus; die Pyramiden scheinen mitunter unregelmäßig zu sein, sind es aber nur in ihrer äußeren Ausdehnung, nie in der Stellung ihrer Flächen zu einander. Je weniger rein dabei die Masse ist, je einfacher erscheint die Form, je reiner, klarer, glänzender dieselbe, um so mannigfaltiger, verwickelter zeigen sich die Gestalten. Stets ist jedoch der leicht verständliche Grundtypus, die regelmäßige Sechseckigkeit, streng festgehalten, und nie fehlt jene Spitze an dem Ende des Krystalles, die für den Quarz bestimmt auszeichnend ist. Es scheint dabei, daß reinere und langsamer abgekühlte Masse mehr Neigung hatte, Säulen zu entwickeln, als unreinere, schneller ausgeschiedene, und in der Sprache hat sich daher der Gebrauch gebildet, die klaren, säulenförmigen Krystalle „Bergkrystall“ zu nennen, während man die trübeeren Massen und die kurzen Pyramiden als gemeinen Quarz bezeichnet.

Der Bergkrystall war schon den Alten wohl bekannt. Sie nannten ihn Krystallos und blickten ihn für festgewordenes Wasser. Sie glaubten daher auch, daß man ihn keiner geringen Hitze aussetzen dürfe, weil er sich darin zerstöre. Die Römer kannten seinen Fundort in den Alpen, bezogen ihn von dort und trieben großen Luxus mit Gefäßen aus demselben. Nero besaß eine Schößstelle und zwei schöne, reich geschnittene Becher aus Bergkrystall, von denen einer, aus welchem Szenen aus der Hiobe eingeschnitten waren, 4000 Thaler nach unserm Gelde gestoft haben soll. Im Jörn zerbrach er einst die beiden Gefäße, um, wie er sagte, „sein Jahrhundert dadurch auch zu strecken, daß nie ein Anderer aus solchem Becher trinken könne.“ Bei uns wird jetzt der Bergkrystall nicht gerade hochgeschätzt. Schöne, größere Krystalle verarbeitet man zu Kunstgeschäften, besonders zu Schalen oder Vasen, kleinere zu Vetschaften u. dgl. m., rechte klare in neuester Zeit vielfach zu Damenschmuck. Neuerdings haben sich hierbei die Schlei-

feselen von Katharinenburg im Ural ganz besonders ausgezeichnet, da sie allein es verstehen, den Bergkrystall nicht bloß mit glatter, sondern auch mit matter Oberfläche zu verschleifen. Doch ist die Liebe für dergleichen Arbeiten jetzt nicht mehr so lebhaft, als in jüngst vergangenen Zeiten. Im 17. und 18. Jahrhundert, wo man das äußerst klare, stark glänzende und farbenbrechende Krystallglas noch nicht herzustellen wußte, erschien der Bergkrystall von höherem Werth als jetzt.

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts enthielt der französische Kronschatz nicht weniger als 216 große Stücke und Gefäße von Bergkrystall, die man zusammen auf 997,000 Livres schätzte. Darunter waren 60 Basen, 46 Becher, 20 Gefäße von verschiedener Form (allein auf 250,000 Livres abgeschätzt) Urnen, Leuchter, Weibstessel, Krugstiele, Kaffeeteller, Totenköpfe u. s. w., auch eine völlig klare, tadellose Kugel von 1 Fuß im Durchmesser. Eine der schönsten Arbeiten war eine Urne von 9 Zoll Weite und 10 Zoll Höhe, deren oberer, fein ausgearbeiteter Rand mit 2 Masken verziert war, während die Wölbung Szenen aus der biblischen Geschichte in erhabenen Figuren von feinsten Arbeit trug. Man hatte dieses einzelne Gefäß für 100,000 Livres angekauft.

Mitunter ist der Bergkrystall nicht farblos wie gewöhnlich, sondern öfters graubräunlich, wo er Rauchtopas, schwarz, wo er Merion, hellgelb, wo er Citrin, violett, wo er Amethyst genannt wird. Auch der Amethyst war schon im hohen Alterthum wohl bekannt. Die Griechen gaben ihm den Namen Amethystos, weil sie glaubten, er schütze seinen Träger gegen Trunkenheit. Dieser anmutbige Schmuckstein, der eine Zeit lang aus der Mode war, erfreut sich jetzt der Gunst der Damen wieder, und wie selten seine milde, tiefe Farbe öfters wieder aus dunkelgelbem Golde angenehm hervorleuchtet. Woher die schöne Farbe rührt, ist nicht genau bekannt; wahrscheinlich ist sie von einer kleinen Menge einer kohligen Verbindung abzuweisen, denn sie verachet in großer Hitze. Vorsichtig erhitzt, bei Abschluß aller Luft, verändert sie sich nur zu einer bräunlich-gelben Färbung, und was die Juweliere Goldtopas nennen, ist nur gegläuter Amethyst. Indessen hat bei ihm, wie bei so vielen andern Dingen, die Kunst versucht die Natur nachzuahmen, und wenn man heut zu Tage an neuem Schmuck schön violette Frauenaugen sieht, die wie aus blassem Amethyst gearbeitet erscheinen, so mag man

nur dreist annehmen, daß es Glas sei. Eine kleine Prüfung mit einem Stückchen Kiesel oder Feuerstein wird einen festesten Beweis bald liefern. Auch könnte man an Glanz und Klarheit den wahren Stein vom Glas wohl unterscheiden; um diesen Unterschied indeß zu vermeiden, hat man die Kuppe in der Regel matt gelassen.

Die Amethyste kommen jetzt besonders häufig in Brasilien vor; früher bezog man sie ausschließlich aus dem Orient. Die orientalischen, die zumeist von Ceylon kommen, sind auch heute noch die schönsten, und geschmuckte Damen wissen beide Arten sehr wohl von einander zu unterscheiden. Sie behaupten, daß der orientalische Amethyst, wenn man ihn in Wasser werfe, seine Farbe auf einzelne Stellen zusammenziehe, während der brasilianische das niemals thue. So wenig das von vorn herein glaublich erscheint, so kann man sich doch durch den Augenschein bald davon überzeugen. Indeß hängt die Sache einfach so zusammen, daß die orientalischen Amethyste ursprünglich stielig in der Farbe sind, daß diese Flecke durch den Schliß fast ganz unmerklich werden, dagegen deutlich wiederum hervortreten, sobald man einen solchen Stein auf eine helle Unterlage aus Glas oder Porzellan in Wasser legt. Da die brasilianischen Steine stets gleichmäßiger gefärbt sind, so können sie einen solchen Wechsel von hellen oder dunkleren Stellen niemals zeigen.

Nach dem bisher Gesagten möchte es wohl auch am Orte sein, noch ein Paar Worte über das Vorkommen der Bergkristalle hier zu sagen. In neuester Zeit hat man die größten klaren Blöcke und Kristalle in dem Besouze-Gebirge der Insel Madagaskar aufgefunden. Dort sollen Massen von 5 und 6 Fuß Durchmesser vorgekommen sein, und aller Sand der Gegend soll aus Bergkristall bestehen. Die näheren Verhältnisse des Fundortes sind jedoch noch nicht bekannt und werden es wohl auch sobald nicht werden, da der Wechsel englischer und französischer Intriguen das große und wichtige Inselfand wohl lange noch in unruhiger Bewegung erhalten wird. Besser unterrichtet sind wir über eine Reihe von Fundorten in den Alpen. Dort treten die Bergkristalle ganz besonders schön im Dauphiné und in den Schweizer Alpen auf, und in den letzteren sind die allerreichsten Fundstätten auf dem verhältnismäßig kurzen Raume von ungefähr 15 Meilen westlicher Erstreckung aufgefunden worden. Sie liegen von dem Riesfthorn in dem Ober-Wallis bis zu dem Tödi in dem westlichen Graubünden, in Bergen, deren Mittelpunkt die Gotthardstraße durchschneidet. So entdeckte man z. B. im J. 1720 im Zinkenstod, unweit des Passes, der die Grimsel heißt, in einem Quarzgang, der von Außen nur in 3 F. Breite sichtbar war, eine Kristallhöhle oder einen Kristallkeller, wie die Schweizer sagen, der 120 Fuß Tiefe und an seiner breitesten Stelle 18 Fuß Weite hatte. Er enthielt einzelne Kristalle von 8 Etr. und deren viele von einem Centner Schwere, zu-

sammen gegen tausend Centner, für die man den Betrag von 25,000 Thalern löste. In einem Felsen des nicht weit entfernten Thales wurde im J. 1787 eine Kristallhöhle aufgeschlagen, in der sogar Kristalle bis zu 14 Centnern aufgefunden wurden. Von diesen schafften die Franzosen, als sie im J. 1799 das aufgestandene Walliser Land nach langem Widerstand bezwungen und verebert hatten, zwei größere Kristalle nach Paris, deren einer, 800 Pfund schwer, noch heute im Jardin des Plantes zu sehen ist.

Bei der Kostbarkeit, welche doch große klare Bergkristalle stets behalten werden, ist die Entdeckung eines solchen Kristallkellers immer ein großer Glücksfall für den Finder, und unter den Bewohnern jener Gegend haben sich daher stets einige gefunden, welche dergleichen Keller aufzusuchen gehen. Doch ist das jedes Mal ein wagnissvolles Unternehmen; denn nur die äußersten Spitzen des Gebirges pflegen dergleichen Schätze zu beherbergen. Hoch oben zwischen Eis und Schnee muß jede Felswand, jeder freie Vorsprung mit dem Eisernten sorgfältig abgesehen werden, ob nicht der weiße Streifen eines Quarzanges an ihr zu entdecken sei, und ist er aufgefunden, dann muß um jeden Preis die Stelle selbst erreicht werden. Oft bleibt nichts übrig, als an einem Seil sich von der Höhe einer Klippe selbst herabzulassen, und glücklich, wenn das gleiche Ehr dann unter dem Schlag des schweren Hammers den hohlen Klang vernimmt, der eine innen offene Spalte anzeigt.

Wie die meist weniger gefährliche Gensensjagd, so wird auch dieses Suchen der Kristalle zur Leidenschaft, und wenige Kristalljäger sind bisher in ihrem Bette daheim gestorben. Darum bleibt aber dies Geschlecht nicht aus; so lange die Kristalle noch einen ansehnlichen Werth behalten, und das wird wohl für lange hin der Fall sein, werden sich immer neue und waghalsigere Nachsucher finden. Wenn wir auch jetzt nicht mehr den hohen Werth wie ehemals auf Kronen, Kandelaber und Gefäße von Berg-Kristall zu legen pflegen, so hat die Technik und die Wissenschaft doch andere Verwendungen für dies Material gefunden, die es in hohem Werth erhält. Optische Instrumente und besonders Brillengläser werden daraus in großer Zahl geschliffen, weil diese sogenannten Gläser vom Staub nicht angegriffen und daher im Laufe der Zeit nicht matt und trübe werden. So sehen wir denn auch hier, daß, wenn uns die Natur ein in seiner Art vollkommenes Gebilde liefert, wir auch, je länger um so mehr, es nützlich anzuwenden lernen.

Werfen wir nun schließlich unsern Blick auf das zuletzt Betrachtete zurück, so scheint sich uns daraus die wohl erquickliche Betrachtung zu ergeben, daß auch die scheinbar rohe, unorganische Substanz aus ihrer trüben, wenig schönen Urgefaß in der vieltausendjährigen Entwicklung des Erdkörpers einer Verschönerung und Verklärung still entgegengeht.

## Kleinere Mittheilungen.

### Stichtigkeit des Feuer Salamanders.

Brehm beschreibt im 5. Bande des „Illustrirten Thier-Lebens“ S. 413 den Feuer Salamander und erwähnt dabei die ausführlichen Untersuchungen von Abini über die Stichtigkeit desselben. Ich füge den dort mitgetheilten Thatfachen folgende Beobachtung hinzu. Ich hatte vor einer Reihe von Jahren in einem Wäse einen Salamander, der sich in demselben eingerichtet hatte und sich im besten Wohlbefinden zu befinden schien. Um dasselbe nach meiner damaligen Ansicht zu erheben, brachte ich ihm noch einen Gefäßhälter, hatte aber durch Antagischalter abgesehen nicht die Zeit, die ersten Begrüßungen der beiden Thiere zu beobachten. Nach einigen Stunden fand ich meinen alten Salamander allein. Er hatte seinen Gefäßhälter fruchtlos vergeblich. Ich ließ ihn nun einige Wochen binnern und führte ihm dann wieder einen recht starken Gefäßhälter vor, um ihn zu prüfen, ob er sich nun die Zeit, den Bewegungen der beiden Thiere zuzusehen. Interessant war der Kampf. Jeder suchte den Gegner

zu beissen, sich selbst aber vor dessen Biß zu schützen, und so war es ein kühnes Angreifen und vorrückiges Zurückweichen. Endlich lagte der alte Salamander den neuen beim Hinterfüße und biß ihn fest. Der Gefäßhälter blühte sich rückwärts und streckte die Vorderbeine in die Höhe, als ob er die ganze Welt um Hülfe anrufen wollte. Ich habe selten bei einem Thiere einen ausgeprägteren Ausdruck des Schmerzes gesehen. Ich befreite den Gefäßhälter und setzte ihn in ein anderes Glas, auf dessen Boden sich Wasser befand. Als ich einige Stunden später nach ihm sah, lag er todt im Wasser, welches eine milchweiße Färbung angenommen hatte. Hier war eine Vergiftung durch den Eiweiß ausser Zweifel gestellt, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Salamander im Freien auf diese Weise manchen Stüd seiner Beute gewinnt. Daß er dies durch den ausgeforschten Saft bemerksamen sollte, bleibt jedenfalls zweifelhaft. Vielleicht scheucht er durch denselben nur größere Thiere, die ihm verderblich werden könnten, von sich weg, indem er ihnen Uel erregt, wie dies ja das Stinkthier in seiner Weise auch thut. S. Volze.

## Literarische Anzeigen.

**Lüdingen.** Im Verlage der **H. Laupp'schen** Buchhandlung ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Schwabens Medusenhaupt.

Monographie der subangularen Pentacrinen

von

Prof. Dr. **Grunstedt.**

4 1/2 Bogen Text gr. 8° und 4 lithogr. Blätter, die zusammengeheftet, ein Tableau von 5 1/2 Fuß Höhe und 4 1/2 Breite bilden, den Fund in einem Fünftel der natürlichen Größe treu darstellen; nebst Erklärung der auf dem Tableau befindlichen 16 größeren und kleineren Nebentafeln.

4 1/2 Thlr. = 8 fl.

Des Herrn Verfassers schon oft so glückliche Hand war es vorbehalten, mit dem Fund einer 24 par. Fuß langen und 16 1/2 breiten Schieferplatte eine Frage der Lösung aufzuwerfen zu können, die seit mehr als 300 Jahren die Naturforscher nahezu resultatlos beschäftigt und oft zu den felsamsten, widersprechendsten Meinungen geführt hat. Durch die gelungenen bildliche Darstellung und den eingängigen, erklärenden Text bringt der berühmte Geognost ein nie geahntes Licht auf die Lebensweise jener merkwürdigen Geschöpfe.

(Die zum Tableau gehörigen 4 großen Blätter werden jedem Käufer unverweilt von der Verlagsbuchhandlung gratis nachgeschickt.)

Kuicher Verlag von Carl Hoffmann in Stuttgart.

## Calwer, Käferbuch.

Naturgeschichte der Käfer Europa's, neue Auflage, herausgegeben von Dr. G. G. Calwer und Dr. med. G. Jäger. 40 Bogen gr. 8° mit 48 fein colorirten Tafeln. Geh. 4 1/2 Thlr. = 7 fl. 30 kr.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

### Dr. Otto Ull's ausgewählte kleine naturwissenschaftliche Schriften.

1. **Bändchen:** Die Chemie der Küche. geb. 18 Sgr.
  2. **Bändchen:** Silber aus den Alpen und aus der mitteldeutschen Gegend. geb. 18 Sgr.
  3. **Bändchen:** Chemische Skizzen für Haus und Gewerbe. geb. 24 Sgr.
  4. **Bändchen:** Skizzen aus dem Gebiete der organischen Chemie und ihrer Anwendung auf tägliches Leben und gewerbliche Kunst. geb. 24 Sgr.
  5. **Bändchen:** Jahr und Tag in der Natur. geb. 24 Sgr.
- Die Käufer sind immer nur zur Abnahme eines vollständigen Bändchens verpflichtet.

Halle, im Januar 1869.

G. Schwetschke'scher Verlag.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Sgr. (1 R. 30 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Buchhändler nehmen Bestellungen an.



**Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.**

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Hall.

**N 9.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Hall, C. Schwetschke'scher Verlag.

**3. März 1869.**

**Inhalt:** Was man von der Sonne weiß, von Hermann Klein. Dritter Artikel. — Vergleichung des Sommers von 1808 mit den Sommern von 1842, 1846, 1857, 1859, 1863 in Berlin, von Ph. Wolfers. — Kleinere Mittheilungen.

**Was man von der Sonne weiß.**

Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Beobachtungen während der totalen Sonnenfinsterniß am 18. Aug. 1868.

Von Hermann J. Klein.

Dritter Artikel.

Galilei erklärte die Sonne für ein Lichtmeer, in welchem die Sonnenflecken als Wolken umherschweben. Diese Ansicht fand in der ersten Zeit viel Beifall, wurde aber später von einer andern Hypothese verdrängt, nach welcher die Sonne ein gebogener, mit einer Lichthülle umgebener Körper und die Sonnenflecken die Gipfel von Bergen seien, welche durch locale Erniedrigungen (Ebben) des Lichtmeeres über dessen Niveau emporragten und uns sichtbar würden. Dieser Hypothese hingen besonders D. Cassini, Lahire und Lalande an. Indess widerlegte sie sich durch die bloße Bemerkung, daß die Sonnenflecken neben der allgemeinen Rotationsbewegung noch eine eigene Fortbewegung besitzen. Hätten Cassini und Lahire fleißigere Messungen und Ortsbestimmungen der Sonnenflecken ausgeführt,

so würden sie auf diese wunderliche Hypothese nicht gekommen sein. Indess ist diese Theorie noch immer zulässiger, wie die Meinung des Malapertus, nach welcher die Sonnenflecken kleine, nahe der Sonnenoberfläche kreisende Weltkörper, Minima von Planeten sein sollten. Ganz abgesehen davon, daß die Sonnenflecken eine sehr unregelmäßige und wandelbare Gestalt besitzen, beweist schon allein ihre Größe und Zahl, daß es sich hier nicht um selbständige Planeten handeln kann.

Der Erste, der sich eingehend mit der Theorie der Sonnenflecken beschäftigte und eine auf wissenschaftliche Principien gegründete Erklärung zu geben unternahm, war Alexander Wilson, Astronom in Glasgow. Die erste Grundlage zu seiner später so berühmten gewordenen Theorie



lieferte ihm die Beobachtung eines großen Sonnenfleckens am 22. November 1769. Wilson bemerkte nämlich, daß die Penumbra des Fleckens in der Nähe des Sonnenrandes an der innern, gegen den Sonnenmittelpunkt gerichteten Seite schmaler als an der entgegengesetzten erschien. Er schloß hieraus, daß der eigentliche Kernfleck tiefer liege als die Penumbra, und daß jene eccentriche Lage eine Folge der Projection beim Anblick von der Seite sei. Ein halbes Jahrgeht nach Wilson begann sich William Herschel mit der Sonne zu beschäftigen. Von den Vorstellungen Wilson's ausgehend, glaubte er annehmen zu dürfen, daß die Sonne an und für sich dunkel sei, daß sie aber zwei Umhüllungen besäße, eine äußere, selbstleuchtende, glänzende, die Photosphäre, und eine innere, erleuchtete Wellenschicht zwischen jener und der Sonnenoberfläche. Von der Sonnenoberfläche aber sollen, nach Herschel's Meinung, gasartige Ströme aufsteigen, welche, die Photosphäre durchbrechend, die Erscheinung der Sonnenflecken darbieten.

Herschel's Erklärung fand allenthalben Beifall, als sein es ergab sich bald, daß sie keineswegs ausreichte, alle beobachteten Thatfachen zu erklären. Daher unternahm es Arago, sie zu vervollständigen. Nach diesem berühmten Physiker sind vielmehr drei Umhüllungen der Sonne anzunehmen, eine innere, schwach leuchtende, vielleicht nur erleuchtete, eine äußere, die hellstrahlende Photosphäre, und über dieser endlich eine Region schwach leuchtender Wolken, die sich nur bei besonderen Gelegenheiten zeigen, auf welche wir später zurückkommen werden.

Die neuesten Beobachtungen haben nun ergeben, daß auch selbst die Arago'schen Sonnenumhüllungen nicht ausreichen. Secchi und Chacornac schließen vielmehr aus ihren Beobachtungen, daß noch mehrere Schichten rings um den dunklen Sonnenball anzunehmen seien, so daß dieser letztere also eigentlich zwiebelartig von einer Anzahl concentrischer Schalen wolkiger oder gasartiger Natur umgeben sein würde.

Die Wilson-Herschel-Arago'sche Theorie der Sonne ist bis vor Kurzem die allein herrschende gewesen. Niemand wagte daran zu rütteln. Aber es ist merkwürdig, daß die Basis der ganzen Hypothese, nämlich die optische Verzerrung der Höfe der Flecken an der einen Seite beim Nähertritten gegen den Sonnenrand, von Niemandem mit derjenigen Consequenz und unter Anwendung der geeigneten Instrumente verfolgt wurde, welche sie doch jedenfalls verdiente. Man hielt die alten Wahrnehmungen von Wilson und einige gelegentliche der späteren Zeit für vollkommen sicher und vergaß ganz, daß bereits Lalande, der sich mindestens ebenso eifrig und um dieselbe Zeit wie Wilson mit der Sonne beschäftigt hatte, vollkommen die Zuverlässigkeit der vom letzteren Beobachter gezogenen Schlüsse bestritt. Die eccentriche Stellung der Kernflecke gegen den umgebenden Hof, sagt Lalande, kommt keineswegs immer beim Nähertritten an den Sonnenrand vor, ja häufig

findet sogar das Gegentheil statt, und die dem Sonnenmittelpunkte zugewandte Hälfte der Penumbra ist breiter als die entgegengesetzte. Hätte aber Wilson mit seiner Theorie Recht, so könnte letzteres in keinem einzigen Falle stattfinden, vielmehr müßte immer das Umgekehrte eintreten. In diesen Bemerkungen hat sich Lalande als einen sehr feinen und aufmerksamen Beobachter gezeigt, wie erst die neueste Zeit vollständig erkannt hat.

Berzelius hatte sich eine eigene Ansicht über die Sonnenconstitution gebildet. Nach ihm kommt das Sonnenlicht allerdings von der Photosphäre, die Wärme aber geht vom Kerne aus. Diese Ansicht ist gegenwärtig nicht mehr haltbar; aber der schottische Gelehrte hat sehr Recht, wenn er behauptet, die schwache Wellenschicht, welche Herschel und Arago zwischen die Photosphäre und den dunklen Sonnenkern placiren, könne diesen unmöglich vor der Gluth der obern Hülle schützen. Demselben Einwurf scheint man sich auch von anderer Seite bemerkt zu haben; denn um die Vermischung noch größer zu machen, und um nur noch unsinniger gegen alle bekannten physikalischen Gesetze anzugehen, nahmen Einige sogar an, die Sonne sei an und für sich gar nicht heiß, sondern die Hitze entstehe nur da, wo die Sonnenstrahlen von einem festen Körper abprallen!

Der letzte und hauptsächlichste Angriff gegen die so eben entwickelte Sonnentheorie ging vor wenigen Jahren von Heidelberg aus. Dort hatten Kirchhoff und Bunsen in der von ihnen geschaffenen Spectralanalyse ein Mittel entdeckt, direkt den physikalischen Zustand der Sonne aus dem Wege des Experiments zu untersuchen. An Stelle subjectiver Anschauungen trat jetzt die strengere physikalische Untersuchung. Das Ergebnis war der Wilson'schen Theorie diametral entgegen. Die Sonne besteht nicht aus einem dunkeln, relativ kalten Centralkerne mit einer Umgebung von concentrischen Hüllen in noch unbekannter Zahl. Die Sonne brennt, die Sonne ist ein im Zustande der höchsten Weißgluth befindlicher Körper, der von einer Atmosphäre umgeben ist, welche eine etwas niedrigere Temperatur besitzt. Die Sonnenflecken sind Analoga unserer Wolken. So lautete der Ausspruch Kirchhoff's.

Es kann nicht Wunder nehmen, daß eine derartige, alle bisherigen Theorien über den Haufen werfende Anschauung, besonders da sie keineswegs von einem professionellen Astronomen ausging, und da sie sich keineswegs auf astronomische Beobachtungen stützte, sondern diese vielmehr dementirte, bei den Astronomen keinen Anklang finden wollte. Die Kirchhoff'sche Theorie ließ sich nicht leicht widerlegen; allein mußte man ihr deshalb beistimmen?

Spörer in Anklam gebürtig das Verdienst, durch unermüdete Beobachtungen, verbunden mit genauen Ortsbestimmungen der Flecken, Material zu einer streng wissenschaftlichen Prüfung der Wilson'schen Theorie gesammelt zu haben. Das Ergebnis der Untersuchungen war, daß die Beobachtungen nicht beweisen, die Flecke seien Vertiefungen,

und daß die excentrischen Hockstellungen, welche allerdings bei einigen Flecken vorkommen, überwiegend eigenthümlichen Vorgängen an der Sonnenoberfläche zugefchrieben werden müssen, keineswegs aber als Erscheinungen optischer Verfälschung aufzufassen sind. In vielen Fällen zeigt sich eine ungleiche Breite der Penumbra zu beiden Seiten des Fleckens nur in schwächeren Ferngläsern; in Spörer's Telescop zeigte sich dann die Penumbra allseitig fast gleich breit verlaufend und mit solchen Ausbuegungen und feinen Einschnitten versehen, daß an eine trichterförmige Einkerbung in dem Sinne, wie Wilson meinte, nicht im Entferntesten zu denken ist. Spörer hält die Sonnenflecken für Analoga unsrer Wolken und stimmt im Ganzen der Theorie Kirchhoff's bezüglich der Flecke und Höfe bei.

Nach Kirchhoff ist der Vorgang bei Bildung eines Fleckens folgender.

Durch lokale Abkühlung in der Sonnenatmosphäre (nicht in der Photosphäre) entsteht zuerst eine Wolke. Diese wirkt durch ihre Existenz gegen die höheren Theile der Sonnenatmosphäre gewissermaßen wie ein Schirm, indem sie die Wärmestrahlung der glühenden Photosphäre abhält und dadurch in den oberen Schichten der Atmosphäre eine Abkühlung und Condensation hervorruft. Dies gibt Veranlassung zur Bildung einer zweiten Wolke, die von und als Penumbra gesehen wird. Ist die erste Wolke, also der Kernfleck, klein, so wird auch die Abkühlung in den oberen Schichten der Atmosphäre nur unbedeutend, und die Penumbra fehlt dann für unsern Anblick ganz. Die kleinsten Flecken zeigen in der That keine Penumbra.

Faye zu Paris hat sich, gestützt auf die langjährigen Beobachtungen Carrington's, bemüht, die Resultate Kirchhoff's und Spörer's über die Natur der Sonnenflecken zu widerlegen. Leider hat indeß der französische Gelehrte sich selbst nur wenig mit Sonnenbeobachtungen befaßt und, was noch weit schlimmer ist, die Kirchhoff'sche Theorie der Fleckenbildung gänzlich mißverstanden. Er kämpft demnach in seiner Entgegnung gegen ein Phantom, das er selbst geschaffen. Kirchhoff sieht, wie bereits bemerkt, die primitiven Ursache der Fleckenbildung in einer lokalen Abkühlung der Sonnenatmosphäre, Faye versteht indeß hierunter die Photosphäre der Sonne, und aus dieser Verwechslung entstand jene lange Aufzählung von Unmöglichkeiten, die er in den Comptes rendus dem deutschen Physiker vorhielt.

„Man kann sich“, sagt Faye, „ohne Zweifel vorstellen, daß eine irdische Wolke nach und nach, ohne sich aufzulösen, vom Pole zum Äquator gelangt, vorausgesetzt, daß die Winde, welche sie treiben, dieselbe auch in einer gewissen Höhe erhalten, weil die äußere Kälte ihr überall folgt. Können wir aber zulassen, daß beim Fortweichen einer Sonnenwolke die erkaltete, begrenzte Stelle der festen oder flüssigen Oberfläche der Photosphäre fest mit forttrückt und jene Wolke durch zwei, drei und selbst sechs Monate be-

gleitet?“ Man sieht, Faye zeigt überzeugend, daß die Sonnenfleckentheorie mittelst Erkaltung eines begrenzten Theiles der Photosphäre sofort zu Absurditäten führt. Allein wer hat denn eine derartige Theorie überhaupt aufgestellt? Faye glaubt naiver Weise, es sei die Kirchhoff'sche Annahme. Allein der Heidelberger Forscher erklärt mit gerechter Verwunderung, daß es nicht seine Hypothese sei, welche zu den von Faye gezogenen Folgerungen führe.

Faye nimmt auch an der Kirchhoff'schen Theorie von horizontalen Strömungen in der Sonnenatmosphäre, analog denjenigen, welche im Luftmeere unsrer Erde als Passate circuliren, Anstoß. Allein die wahrscheinliche Existenz solcher Strömungen ist durch die Beobachtungen Sechi's, nach welchen die Polarregionen der Sonne kälter, als die äquatorialen Gegenden sind, verbürgt. Ist dies nämlich in der That der Fall, so muß an der Oberfläche des Sonnenkörpers die Atmosphäre von den Polen nach dem Äquator strömen, hier emporsteigen und, oben überfließend, gegen die Pole zurückkehren. Die Circulation in der Sonnenatmosphäre wird weit regelmäßiger vor sich gehen, als ihr Analogon auf unserm Planeten, weil dort die störenden Einwirkungen fortfallen, welche aus der Abwechselung der Tages- und Jahreszeiten entspringen. Kirchhoff glaubt, daß sich die hauptsächlichsten Wolken in der Sonnenatmosphäre nur da bilden, die größten Sonnenflecken also da entstehen, wo Äquatorial- und Polarstrom an einander grenzen. Unter dieser Voraussetzung ist vollkommen verständlich, daß die Wolken weder nach den Polen, noch nach dem Äquator fortgetrieben werden.

Aus den Beobachtungen Carrington's hat Faye das Resultat abgeleitet, daß die Center der Sonnenflecken gegen die Sonnenränder hin gewisse Verschiebungen zeigen, welche darauf hindeuten, daß die Kerne tiefer liegen als die helle Umgebung, daß also, der Wilson'schen Hypothese gemäß, die Sonnenflecke Vertiefungen sein. Allein Spörer hat mit Evidenz nachgewiesen, daß die Schlüsse, welche Faye aus den Beobachtungen Carrington's gezogen, aus diesen keineswegs mit Nothwendigkeit folgen. In den genauen Beobachtungen des Anklamer Astronomen hat sich Nichts gezeigt, was auf eine tiefere Lage der Kerne als die Sonnenoberfläche hindeutet; im Gegentheil beharrt Spörer bei seiner Ansicht, daß sich die Flecken entfernt oberhalb der hellen Stellen und oberhalb der Sonnenfäden befinden.

Zöllner hat die Ansicht aufgestellt, die Sonnenflecken seien Schlackenmassen, welche lokal entstehen und an heißeren Stellen des feurig-flüssigen Sonnenballs weiter schmelzen oder vergehen. „Ich kann“, sagt der genannte Physiker, „die Ansicht Kirchhoff's nicht theilen, welcher den dunklen Kern der Flecken als eine Wolke aus condensirten Metalldämpfen ansieht, über welcher sich in Folge der hierdurch nach oben verminderten Wärmestrahlung in gewissem Abstände eine zweite, weniger dichte Wolke bildet,

die alsdann zur Erklärung der Penumbra und ihrer gesetzmäßigen Veränderung am Sonnenrande dienen soll. Mir scheint die Annahme jener zweiten Wolke etwas erkünstelt, um so mehr, da man bei Voraussagung der schladenartigen Beschaffenheit des dunklen Kerns schon mit einer Wolke über denselben ausreicht, um alle Erscheinungen der Penumbren ganz in der von Kirchhoff angegebenen Weise begrifflich zu machen. Uebrigens glaube ich hierbei bemerken zu müssen, daß man bei allen bisher aufgestellten Theorien der Sonnenflecken den Einfluß der Refraction der Sonnenatmosphäre auf die Gestalt der an ihrer Oberfläche wahrgenommenen Objecte mit Unrecht gänzlich vernachlässigt hat. Selbst wenn die Penumbra in gleichem Niveau mit dem dunklen Kern auf der Sonnenoberfläche sich befände, so würde man im Stande sein, lediglich durch Annahme einer hinreichend starken Refraction, sowohl die Vergrößerung des dem Sonnenrande zugekehrten Theils der Penumbra, als auch jene scheinbaren Vertiefungen zu erklären, welche sich am Sonnenrande oft an der Stelle zeigen, wo in Folge der Rotation ein Flecken verschwindet. Die interessanten Resultate, zu denen Kummer in seiner Abhandlung „über atmosphärische Strahlenbrechung“ gelangt ist, scheinen mir die Berücksichtigung der Refraction des Lichtes in der Sonnenatmosphäre für jede Hypothese über die Sonnenflecken durchaus nothwendig zu machen. Es sind zwei Umstände, welche die Dichtigkeit der Sonnenatmosphäre als Function ihrer Höhe modificiren, die Schwerkraft und die hohe Temperatur an der Oberfläche der Sonne. Da beide Ursachen im entgegengesetzten Sinne wirken, so wird das Maximum der Dichtigkeit und folglich auch des Brechungsvermögens nicht an der Oberfläche, sondern in einem gewissen Abstande über derselben sich befinden. Durch diese Eigenthümlichkeit müssen die von Objecten an der Sonnenoberfläche ausgesandten Strahlen jedenfalls Ablenkungen in ihrer Richtung erleiden, welche unter Umständen die Veranlassung zu mancherlei optischen Täuschungen werden können.“ —

„So lange die Schladen noch nicht durch größere Ausdehnung und Consistenz in ihrer Beweglichkeit auf der feuerzerglühenden Sonnenoberfläche gehemmt sind, werden sie, analog den ertastischen Felsblöcken in schwimmenden Eisschollen, vermöge der Centrifugalkraft des rotirenden Sonnenkörpers nach den Aequatorialgegenden getrieben werden, wie denn in der That die überwiegende Mehrzahl der Sonnenflecken nur in einer bestimmten Aequatorialzone beobachtet wird.“


Die Ansicht, daß die Sonnenflecken gewaltige Schladenmassen seien, findet in den directen Beobachtungen, gegenüber der Hypothese von Wolkenmassen, keine sonderliche Stütze. In der That zeigen die Sonnenflecken unter Anwendung von starken Vergrößerungen ununterbrochene Wandlungen, Auflösungen und Neubildungen, die sie weniger

mit festen Körpern, als mit wolkenartigen Gebilden vergleichen lassen. Auch die Fortbewegung großer Flecken und die cotatorischen Bewegungen einzelner Gebilde dieser Art deuten ungleich mehr auf einen Zusammenhang wolziger Gebilde, als auf ein Aggregat schladenartiger Massen. „Ich habe“, sagt Spörer, „hinreichend erkannt, daß von einer einfachen Verschlebung der Massen mehr oder weniger fester Gebilde gar keine Rede sein kann, vielmehr nur von einem Fortwachen wolkenartiger Massen, wobei Auflösungen und Neubildungen unaufhörlich vorkommen.“ Was den Einfluß der Strahlenbrechung auf die Objecte an der Sonnenoberfläche anbelangt, so hat Zeilner sehr Recht, wenn er behauptet, daß man denselben mit Unrecht so lange vernachlässigt habe. Erst die genauen Messungen von Spörer und Sechi haben auf diesen Einfluß zurückverwiesen; aber der erwähnte Astronom hat auch erkannt, daß in den meisten Fällen der Einfluß einer Strahlenbrechung durch die Vorgänge auf der Sonne weit übertroffen wird. Die directe Beobachtung spricht also hier gegen die Vermuthungen Zeilner's.

Die wissenschaftliche Deutung der Sonnenfackeln bietet gegenwärtig noch ungemeine Schwierigkeiten. Die alte Ansicht, die in ihnen Berge von wahrhaft ungeheuren Dimensionen sah, hat nicht einmal die subjective Anschauung für sich. Denn die Gestaltungen der Sonnenfackeln, die Verzweigungen der Lichtadern und die Ausdehnungen dieser Gebilde sind der Art, daß die ungemein seltene Beobachtung von kleinen, bergartigen Erhöhungen (denen aber doch wahre Dimensionen von Hunderten von Meilen zukämen) am Sonnenrande, sehr wohl auf andere Weise erklärt werden kann, wie dies Spörer gezeigt hat. Dieser gelehrte Beobachter erinnert nämlich daran, daß, da die Sonne zweifellos eine Atmosphäre besitzt, in dieser auch die Erscheinung der Strahlenbrechung stattfinden muß. In Folge dessen wird rings am Sonnenrande ein schmaler Saum erscheinen, der eigentlich schon der abgerandeten Hälfte angehört, aber eben durch die Strahlenbrechung scheinbar über den geometrischen Sonnenrand gehoben wird. Ob dieser feine Saum unter gewöhnlichen Verhältnissen sichtbar ist, muß dahin gestellt bleiben; einige Beobachtungen bei totalen Sonnenfinsternissen, und besonders der Umstand, daß der Sonnendurchmesser, wie er aus den Beobachtungen bei dieser Gelegenheit geschlossen werden kann, gemeinlich den direct gemessenen um einen sehr kleinen Betrag übertrefft, deuten allerdings auf eine solche gelegentliche Sichtbarkeit hin. Wenn dieser feine Saum aber auch für gewöhnlich unsichtbar ist, so können doch einzelne Stellen desselben dadurch sichtbar werden, daß sich intensive Fackeln darauf befinden. Diese letzteren erscheinen dann am Sonnenrande in Gestalt von hervorragenden Punkten und bieten den Anblick von bergartigen Erhöhungen, während das Ganze bloß eine optische Täuschung ist.

# Vergleich des Sommers von 1842 mit den Sommern von 1842, 1846, 1857, 1859, 1865 in Berlin.

Von Ph. Wolfers.



Darstellung des Verlaufes der Temperatur während des Sommers von 1842, 1846, 1857, 1859, 1865 und 1868.

Die punktierten Linien bezeichnen die höchsten Temperaturen, die ausgezogenen die mittleren Temperaturen der Tage. Die häufigere horizontale Linie bezeichnet die Grenze der Temperatur von 15°. R = Regen; H = einzelne Tropfen; G = Gewitter.

Man hat häufig Gelegenheit, zu erfahren, wie schwach das Gedächtniß der Menschen für außerordentliche Witterungserscheinungen ist. Man darf sich daher nicht darüber wundern, daß man bei solchen Gelegenheiten die Bemerkung hört und liest: „Die ältesten Leute erinnern sich keiner ähnlichen Erscheinung.“

Wir haben auch in diesem Jahre einen eigenthümlichen Sommer erlebt, und wenn jetzt bereits die Fischweiden der Hipe, welche wir zu erelden hatten, der Vergessenheit anheimzufallen beginnen, so mag es wohl gerathen sein, dieselben noch einmal in Betracht zu ziehen, und zwar indem wir den Verlauf des letzten Sommers mit dem der oben angeführten fünf früheren Sommer vergleichen. Nur auf diese Weise werden wir ermitteln können, ob und welche außerordentliche Erscheinungen sich gezeigt haben. Die meteorologischen Beobachtungen, welche zu Grunde liegen, sind auf der hiesigen Königl. Sternwarte angestellt worden.

Wir schicken die Erklärung voraus, daß wir unter einem Sommertage einen solchen verstehen wollen, dessen mittlere Temperatur (Mittel aus der höchsten und niedrigsten Temperatur)  $15^{\circ}$  R. oder mehr beträgt. Unter der Dauer des Sommers werden wir den Zeitraum vom ersten bis zum letzten Sommertage verstehen. Vergleichen wir unter dieser Voraussetzung die Sommer in der allermeisten Weise mit einander, so haben wir folgende Darstellung:

	Anfang	Ende	Dauer	Sommertage
1842	Mai 29	Sept. 9	104 Tage	53
1846	„ 22	„ 12	114 „	67
1857	„ 21	„ 18	121 „	74
1859	„ 26	„ 27	125 „	73
1865	„ 5	„ 11	130 „	56
1868	„ 10	„ 23	137 „	84

Man ersieht hieraus, daß der letzte Sommer nicht nur von allen sechs hier betrachteten die größte Dauer gehabt, sondern daß auch während desselben die größte Anzahl von Sommertagen stattgefunden hat.

In Rücksicht auf die Wirkung, welche die Wärme auf den lebendigen Körper ausübt, ist aber nicht allein die Anzahl der Sommertage im Allgemeinen maßgebend, sondern vorzugsweise die größere oder kleinere Anzahl der Sommertage, welche ohne Unterbrechung stattgefunden haben. In der folgenden Zusammenstellung sehen wir für jeden einzelnen Sommer je zwei dieser größten Perioden:

	Größte Periode	Tage	Größte Periode	Tage
1842	Aug. 14—Sept. 1	19	Aug. 5—Aug. 12	8
1846	Juli 29—Aug. 20	23	Juni 14—Juni 22	9
1857	Aug. 1—Aug. 23	23	Juni 25—Juli 7	13
1859	Juni 28—Juli 15	18	Aug. 1—Aug. 9	9
1865	Juli 15—Aug. 1	18	Mai 21—Mai 31	11
1868	Aug. 3—Aug. 22	20	Juli 8—Juli 23	16

Hieraus ersieht man, daß der letzte Sommer dem vom J. 1857 am nächsten kommt, und zwar nicht allein nach der Anzahl der ununterbrochenen Sommertage, sondern auch nach den Epochen, auf welche diese Perioden fallen. Diese sind aber nicht ohne Interesse, weil ja offenbar die hohe Temperatur auf verschiedene Weise wirken muß, je nachdem sie mit langen Tagen und kurzen Nächten, oder umgekehrt mit schon kürzeren Tagen und längeren Nächten zusammenfällt.

Die letztere Zusammenstellung haben wir der umstehenden graphischen Darstellung entnommen, welche für alle sechs Sommer den schon beschränkten Zeitraum vom 21. Mai bis 12. Sept. umfaßt. Wie am Fuße derselben bemerkt ist, sind durch R und G die Tage bezeichnet, an denen häufig Regen und Gewitter stattgefunden hat. Da wir letztern auch Regen verbunden ist, so können wir hieraus entnehmen, wie groß in den einzelnen Sommern die Zeiträume waren, innerhalb deren kein Niederschlag erfolgt ist. Betrachten wir hierbei nur den größten Zeitraum jedes Sommers, so haben wir folgende Zusammenstellung:

	Größter Zeitraum	Zahl der Regentage
1842	30 Tage	18
1846	22 „	19
1857	14 „	22
1859	11 „	44
1865	11 „	42
1868	19 „	27

Hienach zeigt der letzte Sommer keine hervorstechende Dürre, und ein ähnliches Resultat zeigt die danebenstehende Anzahl der während desselben Zeitraumes vom 21. Mai bis 12. September vorgekommenen Regentage. Dagegen war der letzte Sommer während desselben Zeitraumes ziemlich reich an Gewittern; es war nämlich:

	Zahl der Gewitter
1842	2
1846	7
1857	3
1859	12
1865	5
1868	9

In den Lehrbüchern der Meteorologie versteht man unter der Dauer des Sommers die drei Monate Juni, Juli und August. Für diesen engsten Zeitraum von 92 Tagen haben wir nun noch Tabellen entworfen, welche zuerst für Intervalle von 10 bezüglich 11 Tagen, dann für die einzelnen Monate und zuletzt für den ganzen Sommer folgende Angaben enthalten:

1. die mittlere tägliche Temperatur,
2. die höchste Temperatur,
3. die Zahl der Sommertage,
4. die Zahl der Regen- und Gewittertage.

	Mittlere tägliche Temperatur						Höchste Temperatur					
	1842	1846	1857	1859	1865	1868	1842	1846	1857	1859	1865	1868
	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad
Juni 1.—10.	13,2	13,3	14,1	15,9	12,3	14,6	20,8	20,0	23,9	23,3	16,9	20,8
„ 11.—20.	12,8	15,4	11,8	13,5	10,9	15,5	22,1	24,2	21,4	22,2	17,1	22,3
„ 21.—30.	14,1	15,2	16,6	14,9	12,5	15,9	20,6	22,0	24,9	22,0	21,3	25,1
Juli 1.—10.	15,1	16,0	15,9	16,2	15,7	13,9	25,6	22,8	24,3	25,3	25,1	22,8
„ 11.—20.	14,4	16,5	15,5	17,6	17,5	17,8	22,0	23,9	23,6	26,4	27,1	24,4
„ 21.—31.	13,2	16,0	15,5	16,8	19,2	17,7	19,0	24,6	22,7	24,7	28,0	27,3
Aug. 1.—10.	16,5	19,7	18,7	17,6	13,7	17,4	24,9	24,9	27,2	26,3	20,8	24,3
„ 11.—20.	18,4	16,7	17,3	15,8	16,1	20,7	25,8	22,0	22,9	21,5	25,0	26,9
„ 21.—31.	17,8	14,0	15,3	16,5	13,8	13,7	23,7	29,0	22,2	25,2	21,5	21,3
						1834						
	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad
Juni . . .	13,4	14,6	14,2	14,8	11,9	15,3	22,1	24,2	24,9	23,3	21,3	25,1
Juli . . .	14,2	16,2	15,6	16,9	17,5	16,5	25,6	24,6	24,3	26,4	28,0	27,3
August . . .	17,6	16,8	17,1	16,6	14,5	17,3	25,8	24,9	27,2	26,3	25,0	26,9
Sommer . .	15,1	15,9	15,6	16,1	14,6	16,6	25,8	24,9	27,2	26,4	28,0	27,3

	Sommerlage						Regen- und Gewittertage					
	1842	1846	1857	1859	1865	1868	1842	1846	1857	1859	1865	1868
Juni 1.—10.	2	3	4	7	0	4	4	0	2	1	4	3
„ 11.—20.	3	4	2	4	0	7	1	2	3	9	3	2
„ 21.—30.	4	6	8	5	1	5	5	1	2	3	5	2
Juli 1.—10.	4	6	6	10	6	3	0	1	2	2	5	3
„ 11.—20.	4	8	5	9	6	10	0	3	0	3	2	2
„ 21.—31.	1	7	6	7	11	10	2	2	3	7	2	2
Aug. 1.—10.	8	10	10	9	2	8	2	1	3	1	6	2
„ 11.—20.	9	10	10	7	7	10	1	2	3	4	5	3
„ 21.—31.	11	5	6	8	2	2	1	3	1	2	5	2
Juni . . .	9	13	14	16	1	16	10	3	7	13	12	7
Juli . . .	9	21	17	26	23	23	2	6	5	12	9	7
August . . .	28	25	26	24	11	20	4	6	7	7	16	7
Sommer . .	46	59	57	66	35	59	16	15	19	32	37	21

Stellen wir zwischen diesen einzelnen Angaben einige Vergleichen an, so ergeben sich folgende Resultate:  
 Im ersten Drittel des Juni kommt nur in einem Jahre, 1859, eine mittlere Sommertemperatur vor;  
 im zweiten Drittel des Juni in zwei Jahren, 1866 und 1868;  
 im dritten Drittel des Juni in drei Jahren, 1866, 1857 und 1868;  
 im ersten Drittel des Juli in allen Jahren, mit Ausnahme von 1868;  
 im zweiten Drittel des Juli in allen Jahren, mit Ausnahme von 1842;  
 im dritten Drittel des Juli ebenfalls in allen Jahren, mit Ausnahme von 1842;  
 im ersten Drittel des August in allen Jahren, mit Ausnahme von 1865;  
 im zweiten Drittel des August in allen 6 Jahren;  
 im dritten Drittel des August in den 3 Jahren 1842, 1857 und 1859.

Hieraus kann man schon mit Wahrscheinlichkeit abnehmen, daß in heißen Sommern — und von diesen ist hier allein die Rede — das zweite Drittel des August die höchste mittlere tägliche Temperatur haben werde. Dies wird in der That durch die vorliegenden Zahlenangaben bestätigt; denn nehmen wir aus allen 6 Angaben das Mittel, so erhalten wir die mittlere tägliche Temperatur  
 für das zweite Drittel des Juli . . . = 16°,8  
 für das dritte Drittel . . . = 16°,4  
 für das erste Drittel des August . . . = 17°,3  
 für das zweite Drittel des August . . . = 17°,5  
 für das dritte Drittel des August . . . = 15°,2

Betrachten wir nun die einzelnen ganzen Monate, so hat

der Juni allein im J. 1868 eine mittlere Sommertemperatur;  
 „ Juli in allen Jahren, mit Ausnahme von 1842;  
 „ August „ „ „ „ 1865.

Von den sechs hier im Allgemeinen betrachteten Sommern hat der letzte von 1868 die höchste Sommertempera-

tur. Da wir aber vor Kurzem in Johann Müller's Lehrbuch der kosmischen Physik, S. 284 die mittlere Temperatur der einzelnen Monate Juni, Juli und August für die J. 1829—1834 gefunden haben, so sind hier die dem letzten Jahre entsprechenden Werthe hinzugefügt worden. Hiernach sind 1834 der Juni und August wenig kälter, der Juli bedeutend wärmer als 1868, und in Folge des letzten Umstandes ist der ganze Sommer von 1834 ein wenig wärmer, als der von 1868 gewesen.

Die in der zweiten Tabelle aufgeführten Extrem der hohen Temperatur sind weniger maßgebend, als die bisher besprochenen mittleren Werthe, denen sie nicht entsprechen. Die Epoche, auf welche das Extrem in den einzelnen Sommern trifft, schwankt zwischen der Mitte des Juli und der des August. In einzelnen Sommern treten zwei derartige getrennte Extrem ein. Das Extrem von 1868 ist um 0°,7 geringer, als das von 1865, beide liegen aber im letzten Drittel des Juli.

In Betreff der Anzahl der Sommertage steht nach der dritten Tafel für den hier vorliegenden engeren Zeitraum die 1868 entsprechende nicht mehr, wie in den obigen Betrachtungen, obenan. Ihre Anzahl 59 ist um 7 geringer, als die 1859 entsprechende. Der Mai 1868 enthielt aber allein 17, der September 8 Sommertage, und addirt man diese 25 zu den in der Tabelle aufgeführten 59, so ergeben

sich die in ersterer Darstellung aufgeführten 84 Sommertage für 1868 wieder.

Durch die Vereinigung der Regen- und Gewittertage in der vierten Tabelle sind einige Abweichungen von den obigen Angaben, wo beide gesondert waren, entstanden; in den letzteren waren manche Tage doppelt gezählt, weil an einzelnen Tagen Regen und Gewitter stattgefunden hatten.

Das Ergebniss unserer Vergleichung können wir schließlich dahin zusammenfassen:

Der letzte Sommer war von allen sechs hier betrachteten der wärmste, in Rücksicht auf die ganze Dauer und die Zahl der stattgefundenen Sommertage.

Er steht ferner obenan, wenn man die engere, aber gleiche Dauer von 92 Tagen betrachtet und nach der diesem Zeitraum entsprechenden, mittleren täglichen Temperatur urtheilt. Dagegen steht er in dieser Beziehung hinter dem früheren Sommer von 1834 zurück.

Was die Dauer der größten trocknen Periode betrifft, so steht der Sommer von 1868 hinter denen von 1842 und 1846 zurück.

In Rücksicht auf die Anzahl der Regentage, und zwar für den weitem wie den engeren Zeitraum, findet er seine Stelle zwischen den Sommern von 1842, 1846, 1857 einer-, sowie 1859 und 1865 andererseits.

## Kleinere Mittheilungen.

### Können Neger weiß werden?

Diese Frage beantwortete kürzlich le Quatre Jages in der Revue des cours scientifiques bejahend. Nachdem er bemerkt hat, daß unter den Negern auch Albino's vorkommen, die weiße Haare und rothe Augen haben, erwähnt er folgender Thatfachen, um zu beweisen, daß wahrer Neger, die von Negern abstammen, wirklich ganz oder theilweise eine weiße Haut bekommen können, ohne Albino's zu werden.

Die erste Thatfache entlehnt er Buffon. Eine Frau, Grangelle genannt, Küchenmägde des Orléans Varnet, war die Tochter eines schwarzen Vaters und einer schwarzen Mutter und hat unter ihren Vorfahren keinen einzigen Weißen. Als zu ihrem 15. Jahre gab sie aus wie eine wahre Negerin. Damals aber begann ihre Haut mit Röthel und Mund weiß zu werden. In ihrem 30. Lebensjahre war der ganze Körper mit Ausnahme des Halses, des Rückgrats in seiner ganzen Länge und der Achseln rosenfarbig. Dort war die Haut braun mit schwarzen Flecken. Auf den schwarzen Stellen blieben die Haare schwarz, sonst wurden sie überall weiß. Die Frau war nicht krank, und ihre Haut veränderte ihre gewöhnlichen Functionen.

Die zweite, nicht weniger glaubwürdige Thatfache bezeugt Dr. Hammer. Ein junger Neger, Sohn eines Negers und einer Negerin, der auch unter seinen Vorfahren keinen Weißen hatte, wurde in seinem 16. Lebensjahre von einem Hunde gebissen. Der dadurch erzeugte Schrecken erzeugte folgende Erscheinungen. Während einer Zeit von 25 Tagen erlebte seine bisher schwarze Haut in augenscheinlicher Weise; sohan bedeckte sich sein Körper mit weißen Flecken, die endlich in einander flossen. Als er 25 Jahre alt war, hatte sein ganzer Körper eine weiße Haut, die nur einzelne braune Flecken zeigte. Der Untertheil des Gesichts war weiß, der Obertheil dagegen schwarz; der Scheitel war weiß, das Kopfhaar blieb aber unverändert, während das Haar an andern Stellen des Körpers nicht weiß, sondern blond geworden war.

Als dritte Thatfache führt de Quatre Jages an, daß der Admiral Fleuriot de Launay ihm kürzlich erzählt habe, daß sich am Gabun ein Dorf befinde, welches nur von weißen Negern bewohnt werde; sie hätten eine rosenfarbige Haut, blaue Augen, die das Licht sehr gut erträgen, und selbst, krauses Haar.

G. M.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Gr. (1 fl. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Verkäufer nehmen Bestellungen an.

Verleger: Schönböck'sche Buchdruckerei in Wien.



**Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.**

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 10.**

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, C. Schwesfke'scher Verlag.

**10. März 1869.**

**Inhalt:** Gesunde Luft, von Otto Me. Fünfter Artikel. — Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, von Karl Müller. Sechster Artikel. — Was man von der Sonne weiß, von Hermann Klein. Siebter Artikel.

**Gesunde Luft.**

Von Otto Me.

Fünfter Artikel.

Wo die Wohnräume nicht geradezu mit Menschen überfüllt sind, dürfte in den meisten Fällen die natürliche Ventilation, welche durch die Mauern hindurch und durch die Fugen der Thüren und Fenster stattfindet, ausreichen. Ueberdies werden ja auch in den meisten Häusern wenigstens zeitweise während der Reinigung der Zimmer die Fenster gelüftet, wenn man dabei auch weniger Gesundheitsrückfichten als die Befestigung des aufgewirbelten lästigen Staubes im Auge hat. Bei schönem Wetter läßt man wohl geradezu die Fenster offen, um der frischen Luft Eintritt zu gewähren, wobei es freilich zur Vermeidung des Zuges besser wäre, die oberen statt der unteren Flügel zu öffnen, wie es ganz allgemein in England Sitte ist, wo die Fenster nicht wie bei uns geöffnet, sondern auf- und niedergeschoben werden. Im Winter ist das Öffnen der

Fenster nicht so durchaus nöthig, da die natürliche Ventilation dann überhaupt viel lebhafter von Statten geht. Immer ist es aber wichtig, für Reinlichkeit in der Umgebung des Hauses zu sorgen, damit die in die Wohnungen eindringende Luft nicht bereits draußen durch wildereiche Ausdünstungen verpestet wird. Daß die Reinlichkeit im Hause für die gesunde Beschaffenheit der Luft eine ebenso wesentliche Bedingung ist, versteht sich von selbst. Nur kann diese Reinlichkeit bisweilen in sehr ungeeigneter und nachtheiliger Weise erzielt werden. Ganz besonders kann das Scheuern der Stuben, für das manche Frauen eine wahre Leidenschaft besitzen, sehr zur Verderbnis der Zimmerluft beitragen. Ganz gewöhnlich sind zu unsern Fußböden Bretter verwendet, die noch nicht vollkommen ausgetrocknet sind. Es bilden sich dabei zwischen den Dielen



mit der Zeit Zugen, in welche das Wasser beim Scheuern einbringt, und es entwickeln sich bei der Verdunstung desselben allerlei üble Ausdünstungen. Für Zimmer, die viel gebraucht werden, ist daher nichts empfehlenswerther, als die Dielen mit einem Anstrich von heißem Leinölstrich zu versehen, da ihre Reinigung dann der Anwendung sehr geringer Wassermengen bedarf und auch ein Einbringen des Wassers kaum stattfindet. Am wenigsten dürfte die natürliche Ventilation für Schlafzimmer ausreichen, für die man lieber noch so häufig die schlechtesten Zimmer des Hauses auswählt, die nach engen, dummigen Höfen hinaus gelegen sind, oder wohl gar sogenannte Alkoven, in die kein Fenster Luft und Licht von außen einläßt. Die vermehrte Hautthätigkeit während des Schlafes, namentlich in geheizten Räumen, erzeugt Dünste, die durch den widerlichen Geruch, durch den sie sich am Morgen bemerkbar machen, schon hinreichend anzeigen, daß der Aufenthalt in dieser Luft kein gesunder sein kann. Der erzeugte Wasserdunst verdrängt sich an den Wänden und hindert durch deren Feuchtigkeit vollends die natürliche Ventilation. Ein Lüften der Fenster ist darum hier besonders gerathen; unter allen Umständen aber muß jede Ueberfüllung vermieden werden. Im Allgemeinen kann man annehmen, daß für jeden Schlafenden mindestens ein doppelt so großer Raum erforderlich ist, als sein Bett einnimmt, für jeden Erwachsenen also etwa ein Raum von 24, für jedes Kind ein Raum von 16 Quadratfuß.

Einen so vortrefflichen Schutz und auch die natürliche Ventilation gegen die Luftverderbnis unserer Wohnräume gewährt, und obgleich wir fast 73 Procent dieser Ventilation der Porosität unserer Mauern und nur etwa 27 Procent der Undichtigkeit unserer Fenster und Thüren zu danken haben, so bleiben doch noch immer Räume genug übrig, die einer künstlichen Ventilation bedürfen. Allerdings mag ein Kohlenäuregehalt von 1 pro mille in Räumen, in denen sich Menschen nur vorübergehend einige Stunden des Lazes aufhalten, nicht gerade der Gesundheit nachtheilig sein; ja, man kann nicht einmal sagen, daß eine noch viel schlechtere Luft geradezu ein Gift sei und den Tod herbeiführen müsse. Aber es ist eine Thatfache, daß ein längerer Aufenthalt in überfüllten, schlechtgelüfteten Räumen ein Herd von Krankheiten zu erzeugen im Stande ist. Eine Wohnung, in welcher 10 Menschen gesund leben, kann für 20 oder 30 zum Krankheitsheerd werden. Scharpfe, Tuberkeln und andere chronische Leiden haben fast immer ihre letzte Quelle in der schlechten Luft der Wohnräume. Die Sterblichkeit in Krankenhäusern, Gefängnissen, Kasernen steigt fast immer in Beziehung zu der darin herrschenden Luft. Daß Schulen die Brutstätte vieler Krankheiten sind, ist längst nachgewiesen, und noch neuerdings hat man wieder darauf aufmerksam gemacht, daß der Ausbruch gewisser Hautkrankheiten der Kinder, namentlich Nansen und Scharlachfieber, in einem unverkennbaren Zusammenhange

mit dem Eintritt in die Schule stehen. Gerade die Schulen bedürfen ganz besonderer Sorge, da die in der lebhaftesten Entwicklung begriffene, raschlebende Jugend vorzugsweise einer reinen Luft bedarf. In vielen öffentlichen Localen, Theatern, Concerts und Ballsälen, kommt übri gens heut zu Tage noch eine besondere Quelle der Luftverschlechterung, die Gasbeleuchtung, hinzu. Man muß bedenken, daß schon jedes Pfund Del beim Verbrennen etwa 45—50 Kubikfuß Kohlenäure erzeugt, daß aber jede Gaslampe nicht weniger als 4 Kubikfuß Kohlenäure in der Stunde, also ziemlich so viel als acht athmende Menschen liefert. Wenn also 800 oder 1000 Menschen in einem Saale beisammen sind und 100 glänzende Gasflammen diesen Saal erleuchten, so tragen Menschen und Gasflammen zu gleichen Theilen zur Verderbnis der Luft bei. Daran denkt in der Regel Niemand. Wie oft sieht man in engen Comtoiren, deren Raum kaum für 4 bis 6 Menschen Luft genug bietet, noch an dem Pulte jedes arbeitenden Comtoiristen eine Gaslampe brennen! Man wundert sich dann, wenn die jungen Leute krank, wenn sie schwindelhaftig werden, und schiebt die Schuld auf allerlei giftige Eigenschaften des Gases. Und doch hat die Gaslampe nichts gethan, was man nicht von vornherein hätte wissen können; sie hat sich den zu ihrer Existenz notwendigen Sauerstoff vorweg genommen, und die Lungen der Menschen sind darüber zu kurz gekommen und haben statt der Lebensluft nur die durch die Gaslampe erzeugte Kohlenäure vorgefunden. Man hätte also, wenn Menschen und Gasflammen in solchem Raume friedlich nebeneinander existiren sollten, auch dafür sorgen sollen, daß die nötige frische Luft diesem Raume beständig zugeführt wurde.

Es gibt also Räume genug, die mit gesunder Luft nur durch eine künstliche Ventilation versorgt werden können. Es fragt sich nur, wie eine solche am einfachsten herzustellen ist. Früher dachte man sich die Sache so, daß eine besondere Oeffnung da sein müsse, durch welche die frische Luft eintreten könne, und eine andere besondere Oeffnung, durch welche die schlechte, verbrauchte Luft entweiche. Da die eintretende Luft gewöhnlich kälter und darum auch schwerer ist, meinte man die Oeffnung für diese möglichst tief in der Nähe des Fußbodens anbringen zu müssen, die Oeffnung für die austretende erwärmte und darum leichtere Luft dagegen möglichst hoch, in der Nähe der Zimmerdecke. Daß diese Ansicht eine irrthümliche ist, wird dem Leser schon aus dem Vorhergehenden einleuchten. An Wegen, auf welchen die Luft in unsere Zimmer eindringt, fehlt es in der Regel nicht. Es fehlt nur an der Bewegung selbst oder vielmehr an einer Kraft, welche die Luft in Bewegung setzt, sie ein- oder ausreibt. Hat man diese Kraft künstlich geschaffen, hat man die erforderliche Menge frischer Luft in ein Zimmer getrieben, so darf man gar nicht sorgen, daß die Luft im Zimmer, welche verdrängt werden soll, nicht etwa Ausgänge fände. Aber hat man durch

eine andere Vorrichtung die Luft des Zimmers vermocht, durch irgend eine Oeffnung zu entweichen, so bedarf es gar keiner besonderen Oeffnung, um für die zum Erlass einströmende Luft Wege zu schaffen. Daß man vollends nur schlechte, verbrauchte Luft durch eine Oeffnung aus einem Zimmer austreiben könne, ist ganz unsinnig. Man dachte sich wohl, die ausgeatmete Luft sei wärmer, also leichter als die uns umgebende Luft, und die verbrauchte Luft müsse sich daher vorzugsweise an der Decke des Zimmers aufhalten. Man vergaß, daß alle Gase ein außerordentliches Streben besitzen, sich gegenseitig zu durchdringen, und daß dieses Streben noch mehr durch die Wirkung der Denswärme und der natürlichen Körperwärme der Menschen gefördert werden muß. Vom Ofen wie von jedem menschlichen Körper gehen beständig aufsteigende Luftströme aus, während sich an den kühleren Wänden absteigende Luftströme

bilden. In Folge dieser beständigen, ziemlich rasch und allseitig vor sich gehenden Wanderung der Luft findet eine vollkommene Ausgleichung statt, so daß die Luft in der Nähe der Decke kaum erheblich von der am Fußboden verschleden ist. Pettenkofer fand in einem Saale des Münchener Gebärhauses den Kohlenäuregehalt der Luft am Boden zu 2,20 bis 2,27 pro mille und unmittelbar an der Decke zu 2,08 bis 2,09. Es ist also unmöglich, nur verbrauchte Luft aus einem Zimmer zu entfernen, und vielmehr die Aufgabe jeder guten Ventilation, daß die entweichende Luft nicht schlechter sei, als die im Zimmer zurückbleibende, daß vielmehr niemals und in keinem Theile des Zimmers die Luft wirklich schlecht werde.

Wir werden nach diesen Erläuterungen die verschiedenen gebräuchlichen Methoden einer künstlichen Ventilation näher zu prüfen haben.

## Ein Blick auf die 12. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte.

Von Carl Müller.

Dieter Meisel.

Außerordentlich besucht und sehr bewegt, hielt die Section für Medicinalerform drei Sitzungen. Wenn man ihre Protokolle aufmerksam liest, empfängt man ganz das Gefühl, als ob Künstler oder Schutzzöllner und Freihändler mit einander kämpften. Jene tragen ein Selbstbewußtsein in sich, wie man es kaum noch in unseren Tagen im ärztlichen Stande vermuthen sollte; denn es wird geradezu ausgesprochen, daß sich an Vielsitigkeit und Gründlichkeit der Bildung gar kein anderer Beruf mit dem ärztlichen vergleichen lasse, weshalb er auch Anspruch auf eine ganz vorzügliche Stellung im Staate, ein Recht auf einen Körpergehalt habe, der leider nicht unter den Ärzten gefunden werde. Dieser Satz scheint geradezu der Schöpfer der betreffenden Section gewesen zu sein und hätte folgerichtig dazu führen sollen, die Ärzte für Staatsbeamte und nicht für freie Gewerbetreibende zu erklären. Das Unangemessene und Veraltete einer solchen Anschauung sprach sich aus sofort in der Versammlung selbst aus. „Jeder Versuch, staatlich organisierte Corporationen der Ärzte herbeizuführen, ist dem allgemeinen Interesse sowohl, als auch dem speciellen des ärztlichen Standes nachtheilig. Das ärztliche Standesinteresse, wie die öffentliche Gesundheitspflege kann von den Ärzten auf dem Wege freier, mit dem Staate in keinem Zusammenhange stehender Associationen vollkommen genügend gefördert werden. Zur Ausübung des hygienischen Dienstes schaffe der Staat sich von jedem Privatinteresse unabhängige Organe.“ Dieser von Dr. Sachs in Halberstadt aufgestellte Satz, der einzig richtige für die moderne Zeitrichtung, der es geradezu offen ausspricht, daß Jeder in der Welt genau so viel gelte, als er verdiene, gab auch sofort die Richtung an, in welcher die ganze Debatte ver-

laufen mußte. Das Resultat ist darum auch ein höchst gelungenes, da die gewünschten Zustände entweder schon thatsächlich existiren oder sehr wahrscheinlich, manche aber sogar ungewiss sind, wie sich sogleich ergeben wird. Folgende Sätze sind das Resultat der an und für sich trotzdem wichtigen Verhandlungen.

1. Der ärztliche Beruf ist ein freier, keine Staats-einrichtung. a) Dem Staate seinerseits liegt nur die Sorge ob, daß allgemein wissenschaftliche und zur praktischen Ausübung der Heilkunde in allen Gebieten befähigte Ärzte auf Universitäten gebildet und geprüft werden können. b) Der Staat erkennt nur diese eine Art von Ärzten als solche an und statuirt unter denselben keinen Unterschied. c) Nachdem der Arzt in vorstehender Weise seine ausreichende Befähigung nachgewiesen hat, legt ihm der Staat weder in der Begründung seiner socialen Stellung, noch in der weiteren Entwicklung seiner wissenschaftlichen Richtung oder praktischen Thätigkeit, noch sonst irgendwelche Beschränkungen auf. d) Der Arzt hat also in seinem Berufe die volle Freiheit des Urtheilens und Handelns; jedoch werden ver-schuldet Gesundheits-schädigungen gerichtlich geahndet. II. Demgemäß sind alle den Privatärzten bisher noch in einzelnen Staaten auferlegten exceptionellen, d. h. anderen Ständen nicht auferlegten Verpflichtungen, Oblasten, Dienstbarkeiten, Bevormundungen und disciplinarische Maßregeln zu verwerfen. III. Man spricht den Wunsch aus, daß sich die Ärzte in allen Gegenden Deutschlands in Form freier Vereine associiren mögen.

Bei der Wichtigkeit der Sache in Betreff einer freiwirtschaftlichen Entwicklung unseres ganzen Staatslebens mögen folgende Bemerkungen zu vorstehenden Sätzen erlaubt sein.

Der Satz la widerspricht dem Hauptgrundsatz 1. Denn wenn der ärztliche Beruf ein freier, keine Staatseinrichtung sein soll, so muß es jedem Einzelnen überlassen bleiben, wie und wo er sich seine ärztliche Bildung verschaffen will, verschaffen kann. Aber es käme darauf hinaus, daß, wie ein hochberühmter Universitätsarzt zu sagen pflegte, wenn er um Ererbung oder Schenkung des Honorars angegangen wurde, nur Solche Ärzte werden müßten, welche Geld genug in der Tasche hätten. Darum wurde auch das Wort Universität mit Recht, wenn auch ohne Erfolg demaskiert. Selbst die Prüfung gibt keinen Maßstab für den Werth eines Arztes. Ich habe noch kürzlich von einem solchen Examinator gehört, was ich übrigens auch schon ausdramen mußte, daß die Weissen so viel auswendig lernen, als sie zum Examen zu gebrauchen denken. Weder Universität noch Prüfung garantiren folglich den guten Arzt. Satz 1b will ihn offenbar schützen und schließt damit Wundärzte erster und zweiter Klasse aus. Erstere aber hat das preussische Ministerium geschaffen, weil es der ländlichen Bevölkerung den großen Mangel an Ärzten weniger fühlbar machen wollte, indem es annahm, daß diese Ärzte das Land vorziehen würden. Im Allgemeinen freilich hat sich diese Annahme nicht bewährt, wie die Regierung selbst einmal im Abgeordnetenhaus gestand; wenn indeß die Bestimmung verworfen sollte, so würde die Zahl der Ärzte sich nur auf Gynasial-Primaner beschränken, ein großer Theil talentvoller Menschen von der ärztlichen Praxis ausgeschlossen werden. Bei der Leichtigkeit unserer Zeit, sich eine Bildung auf eigene Hand zu schaffen, und bei der massenhaften Popularisirung der Naturwissenschaften auf allen Gebieten müssen deshalb künftighin nur die allerfreiesten Bestimmungen gegeben werden, über welche aber die Gegenwart noch nicht spruchreif ist.

Höchst interessant müssen die Sitzungen für Chirurgie und Ophthalmologie genannt werden. Denn obgleich sich das meiste Material der fünf Sitzungen dem Interesse des Laien entzieht, so kamen doch zwei Gegenstände zur Verhandlung, welche ein allgemeineres Interesse beanspruchen können. Der eine wurde von Dr. Wilhelm Sueren sen. aus Berlin anregt und betraf ein neues System künstlicher Gummien zur Herstellung einer deutlichen Aussprache, sowohl bei angeborenem als erworbenem Gummien-Mangel. Diese künstlichen Gummien bestehen aus einer Gießplatte, die mittelst Klammern an den Zähnen befestigt wird und den Mangel im harten Gummien bedeckt. Das Material ist Guttapercha und vulkanisirter Kautschuk, und der Apparat wirkt durch die Thätigkeit des Muskelsystems in der Rachenhöhle. Jedensfalls ist das ein großer Fortschritt auf dem Gebiete der Chirurgie, die so leicht geneigt ist, Alles durch Operation zu heilen, wie sie es auch hier seit Langen bed so vielfach gethan hat. — Der zweite Gegenstand betraf die Stellung nervöser Ohrenkrankheiten, besonders des flörenden Ohrensaufens durch Einwirkung elektrischer Ströme, von

Dr. Brenner in Petersburg. Das Fortschrittliche darin ist, daß Brenner gezeigt hat, wie man im Stande ist, mittelst dieser Ströme zu entscheiden, ob das Ohrenleiden seinen Sitz im Nerven oder in andern Theilen habe. Durch die Einwirkung derselben werden besondere Reactionen hervorgerufen, die dem Untersuchenden sofort die Natur des Leidens enthüllen; z. B. entsprechen die wachsenden Strömen den geringeren Graden derselben besondere Geräusche, den höheren Graden besondere Töne von bestimmbarer Höhe und Klangfarbe.

Auch die Verhandlungen der Section für Gynäkologie und Geburtshilfe zeigen denselben erfreulichen Charakter, durch geeignete Mittel und Wege schloß sich über alle Hindernisse des menschlichen Organismus zu triumphiren. Ich hebe aus der Masse die in vier Sitzungen Mitgetheilten nur die Aussicht hervor, daß es den betreffenden Ärzten endlich gelingen werde, die das Leben so sehr erschwerende Menstrual-Kolik und die Unfruchtbarkeit der Frauen zu beseitigen. Man erblickt aus allen diesen einzelnen Sectionen deutlich den außerordentlichen Fortschritt unserer Zeit durch Theilung der Arbeit; jeder einzelne Zweig ist bereits zu einer eignen Wissenschaft herangewachsen, wodurch zwar die ganze ärztliche Praxis allmählig in einen Specialismus aufgelöst, aber auch um so Größeres gelieft wird.

Wahrhaft wohlthuend wirkte deshalb auf den stillen Beobachter die Section für Psychiatrie. Das vortreffliche collegialische Zusammenhalten ihrer Vertreter erschlief mir wenigstens als der Ausdruck eines ebenso treuen Zusammenwirkens zu Einem Ziele, als der Ausfluß einer Humanität, die so recht die eigentliche Grundlage einer bedeutungsvollen Section der medicinischen Wissenschaften ist. Die Verhandlungen der sechs Sitzungen bewegten sich auch meist auf diesem Boden. Leider sind sie in den Protokollen so kurz behandelt, daß man kein deutliches Bild von ihnen gewinnt, weshalb ich auf ein näheres Eingehen verzichten muß.

Um so auffälliger sind die Protokolle der Section für öffentliche Gesundheitspflege und gerichtliche Medicin gegeben; und mit Recht. Denn man kann wohl von dieser Section sagen, daß es in ihr am lebhaftesten, wenn nicht am besten berging. Die dort gepflogenen Verhandlungen wirken noch jetzt in gewissen Kreisen fort und haben theilweis sehr bestige Streitschriften hervorgerufen. Auf alle Fälle gehören sie zu den bedeutungsvollsten der letzten Naturforscherversammlung und rechtfertigen die große Theilnahme, welche den fünf Sitzungen von den verschiedensten Seiten der, von Ärzten und Laien entgegengebracht wurde. Der eigentliche „Pech im Karpentische“ war Dr. Barrentrapp aus Frankfurt a. M. Denn er war es, der durch seine mit großer Spannung erwartete Darstellung der Frankfurter Canalisation den Anstoß zur allseitigen Behandlung einer Frage gab, die nachher sehr viele größere Städte eine trennende geworden ist; um so mehr, als jene

Canalisation in der That eine Menge schwacher Seiten hat, welche auch von den Gegnern gründlich dargelegt wurden. Man bestreitet geradezu die Berechtigung eines Schwemmsystems, das zur Aufnahme und Fortschaffung des Latrinen-Koths in die Flüsse dienen soll. Denn es geht dabei ein Düngematerial zu Grunde, welches in landwirthschaftlicher Beziehung enorme Summen repräsentirt. Ebenso werde der Erment der Kanäle durch Bildung von Salpetersäure aus dem Ammoniak in auflöslichen salpetersauren Kalk verwandelt und dadurch zerstört, und die sauren Stoffe erhalten nun Gelegenheit, den Boden der Städte durch alle Winkel hin zu inficiren, schließlich die ganze Luft zu verpesten. Das Gleiche stelle sich auch an den Mündungen der Kanäle ein, wie London beweist. Dagegen suchen Andere zu beweisen, daß die Erfahrungen von 24 englischen Städten den günstigen Einfluß des Schwemmsystems auf die Sterblichkeit und die Verminderung von Pothus, Cholera u. s. w. darzuthun hätten. Somit kamen schließlich die Methoden der Desinfection der Städte zur Sprache: das Schwemmsystem, das Tonnensystem, das Lieraur'sche Verfahren (durch pneumatische Enttlerung der Kloaken den Dünger der Landwirtschaft zu erhalten und den Boden durch gründliche Entziehung seiner Gärstoffe gegen Infection zu schützen), das Desinfectionsverfahren von Süvern u. s. w. Alles zeigte seine Licht- und seine Schattenseite, so daß die Partien geradezu wie der ausinander gingen, wie sie zusammengekommen waren, unbekümmert und ohne zu einem festen, für alle Orte tauglichen Principe gekommen zu sein. Freilich wurden, um genau zu sein, einige Sätze als Resolutionen durch Majorität angenommen; allein es erhob sich eine Minorität da gegen, welche diese Art der Beschlussfassung durch Abstimmungen als unwissenschaftlich erklärte und gegen dieselbe einen besonderen Antrag an die allgemeine Versammlung stellte, über den man dort seinerseits zur Tagesordnung überging. Die durch ihre Form anstößigen Resolutionen waren einfach folgende.

„1. Die Gesundheit der Städtebewohner verlangt, als eines der dringlichsten Bedürfnisse, daß der Boden, worauf die Städte erbaut sind, rein und trocken erhalten werde; rein, indem aller flüssige Unrath (Küchen-, Hausreinsigungs-, Fabrik-Wasser u. s. w.) weder direkt dem Boden überfließt, noch in Gruben oder sonst wie in der Nähe der Wohnungen aufgespeichert, vielmehr vollständig und schnellst möglich aus den Städten hinweggeführt werde; trocken, indem das Grundwasser, wo dasselbe regelmäßig oder zeitweise höher als der Kellerboden der Häuser steht, niedriger als derselbe liegt und auf diesem Standpunkte dauernd erhalten werde. Zur Erreichung dieses Doppelm Zweckes sind folgende Forderungen zu stellen: 1. reichliche Versorgung der Wohnhäuser mit frischem reinem Wasser, und zwar am besten durch alle Stodwerke; 2. jeder Aufspeicherungsort, jede Art von Gruben (Verfälscherungs-, Sent-,

cementierte Gruben u. s. w.) sind unbedingt zu verbieten; 3. leichte und schnelle Abführung des durch den Gebrauch verunreinigten Wassers durch gut eingerichtete, gehörig gespülte und ventilirte unterirdische Abzüge, dergestalt, daß jeder Abfluß der flüssigen organischen Abgänge nicht nur im Bereiche der Häuser, sondern auch im Bereiche der ganzen Stadt unbedingt vorgebeugt wird; 4. diese Abzüge sind so einzurichten, daß jedes Ausströmen von Luft aus denselben in die Häuser und die Verunreinigung des Untergrundes wirksam verhindert wird; 5. die Abzüge müssen tiefer als die Kellersohlen liegen und sind so anzulegen, daß sie die Keller von etwaigem Grundwasser befreien, überhaupt die Keller vor dem Eintreten von Wasser in dieselben völlig schützen. 11. Eine besondere Beachtung verdient die Entfernung der menschlichen Excremente, des ekelhaftesten Verunreinigungs- des abflussfähigen Unrathes. Er geräth am schnellsten in Fäulung, entwickelt die miderlichsten und schädlichsten Gase und dient zugleich als Entwicklungshäute gewisser Krankheiten (Cholera, Pothus u. s. w.). In der Nähe unserer Wohnungen aufgespeichert, veranlaßt er Nachtheile und Gefahren, sowohl durch das Eindringen der Gase (und mit ihnen gewisser Staubformia aufsteigender Pilze und Sporen) in die Häuser, als auch durch die Verfälscherung der flüssigen Theile in das umgebende Erdreich, durch die hiervon abhängige Verderbniß der Brunnen und durch die Austüftungen solchen inficirten Erdreichs. Bei diesen Stoffen vor Allem ist jede Aufspeicherung verboten, schleunigste Entfernung geboten; und zwar sollen diese Stoffe noch frisch abgeführt werden, d. h. ohne jeden Aufenthalt gleich nach ihrem Entstehen. Nach dem Gesagten ist das Tonnensystem immerhin jeder Art von Gruben, selbst wenn diese durch die besten hydro-pneumatischen Apparate entleert werden, vorzuziehen und ebenso das Schwemmsystem dem Tonnensystem. Bei kleineren und mittleren, an großen Flüssen gelegenen Städten ist vom gesundheitlichen Standpunkte aus gegen die Ausgießung der frischen flüssigen Inhalte der Schwemmkanaäle in jene Flüsse nichts zu erinnern. Großen Städten kann diese Ausgießung, insbesondere in kleinere Flüsse, nicht gestattet werden. Hier empfiehlt sich, zumal da die Frage der Desinfection, d. h. gegenüber der bloßen Geruchslosmachung, die wirkliche Niederschlagung, Fäulung und Zerstörung der schädlichen Bestandtheile bis jetzt noch ganz problematisch ist, nach den bisherigen Erfahrungen vor Allem die Verfälschung der Felder. Die Verfälschung allein gewährt das Mittel, die Flüsse vollkommen rein zu erhalten und allen düngenden flüssigen Unrath dem Ackerbau zuzuführen, indem andererseits bei jeder Art von Abfuhr das Küchen-, Wasch-, Fabrik-Wasser, Straßenbünner u. s. w. der Landwirtschaft entsagen bleiben.“

Diese Sätze waren es, über die man sich durch Majorität, beschlüsse einigte. Doch sollen dieselben hiermit noch leis

wegs als definitive, sondern nur als Grundlage der Berathung einer Commission dienen, welche hieüber in der Naturforscherversammlung zu Innsbruck Bericht zu erstatten haben soll. Die Gewählten waren: Dr. Barrentrapp aus Frankfurt a. M., Baurath Hohrecht aus Stettin, Prof. Reclam aus Leipzig, Dr. Wasserfuhre aus Stettin, Dr. Götttschheim aus Basel, eventuell Oberbaurath Wiebe aus Berlin. Jedenfalls ist eine Grundlage gewonnen, von der aus ein Fortschreiten möglich ist, obgleich, wie man fast voraussagen kann, auch im nächsten Jahre neue Gegner und Freunde erstehen werden. Denn leider

scheinen sich bereits persönliche Leidenschaften der hochwichtigen Sache zu bemächtigen, wie aus einem „offenen Briefe an die Teilnehmer der 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte als Antwort auf die Aeußerungen des Dr. Georg Barrentrapp“ von Capitain Charles L. Piermurt und aus einer Broschüre des Ingenieur Pieper zu Dresden über „Schwemmanöale oder Abfuhr?“ hervorgeht. Das Publikum wird hierauf sorgfältig zu achten haben, wenn sich in der nächsten Zeit neue Kämpfe auf diesem Gebiete wiederholen sollten. Die Zeit allein wird lehren, wer Recht, wer Unrecht hat.

## Was man von der Sonne weiß.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Beobachtungen während der totalen Sonnenfinsterniß am 19. Aug. 1868.

Von Herm. J. Klein.

Vierter Artikel.

Wir kommen jetzt zu denjenigen Erscheinungen, welche von jeher die allgemeinste und schreckenste Aufmerksamkeit der Menschen erregt haben, zu den Sonnenfinsternissen, unter denen besonders die totalen, wo die ganze Sonnenscheibe durch den Mond verdeckt wird, für die Wissenschaft das höchste Interesse besitzen.

Sonnenfinsternisse werden schon im höchsten Alterthume erwähnt. Die Babylonier hatten in ihren Annalen 373 Sonnen- und 832 Mondfinsternisse aufgezeichnet, allerdings mit dem lächerlichen Zusage, daß diese Erscheinungen innerhalb eines Zeitraumes von 48,853 Jahren beobachtet worden seien. Im Alterthume berühmt ist die Finsterniß, welche angeblich Thales vorhergesagt, und die eintrat, als Kraxtes, der Vater des Krösus, mit dem Meder Kaxares Krieg führte. Nach den Untersuchungen von Hind, Airy und Zech ist das genaue Datum dieser Finsterniß in Uebereinstimmung mit den Angaben des Plinius der 28. Mai 584 v. Chr. Man hat lange und mit Unrecht daran gezweifelt, daß diese Finsterniß von Einfluß auf die kämpfenden Parteien in Kleinasien gewesen sei. Neuerdings haben indeß Barth's Untersuchungen der von Leprieu zuerst aufgefundenen alten Felskulpturen von Boghas-Köi („dem Dorfe des Engpasses“) in Kappadocien außer Zweifel gestellt, daß die genannte Finsterniß als ein Ereigniß von großer Wichtigkeit betrachtet worden ist.

Die Hauptgruppe der Figuren schmückt die rauhen Wände einer Felseninbiegung. Man erblickt von beiden Seiten nach dem Mittelpunkt zurückende Gestalten, deren Charakter und Tracht beiderseits ganz verschieden ist. Zwei Figuren von dämonischem Aussehen unterbreiten den Zug. Sie tragen in ihren Händen eine Art von Booten, und Leprieu, der sie zuerst zeichnete, glaubte, sie möchten die Marine vorstellen. Barth erklärt mit mehr Recht diese Art von Booten für zwei mondbiartelartige Scheiben und

ist überzeugt, daß hier die Sonnenfinsterniß vorgestellt werden sollte. „Gleich beim ersten Anblick dieser Gruppe“, sagt der berühmte Reisende, „drängte sich mir unwillkürlich der Eindruck auf, daß hier eine dämonische Naturgewalt, oder ein Naturphänomen dargestellt sei, aber den Augenblick waren mir die Verhältnisse der Aionatsgeschichte und der Sonnenfinsterniß nicht gegenwärtig; sowie ich indeß die Stelle des Herodot aufmerksam wieder durchlas, blieb mir nicht der geringste Zweifel, und ich hoffe, daß meine Erklärung auch andern aufmerkamen Beobachtern sich bewähren wird.“

Die älteste Sonnenfinsterniß, von der wir wissen, wird im Schilling der Chinesen erwähnt. Das Kapitel Insching gibt die näheren Umstände derselben an. Hiernach trat die Finsterniß ein am 3. Tage des Herbstmonats nach dem chinesischen Kalender des Hia, als sich Sonne und Mond im Sternbilde Fang befanden, das zwischen  $\omega$  und  $\epsilon$  des Skorpion liegt. Die gemeine Jahreszahl ist nicht angegeben, man weiß nur, daß die Finsterniß um die Mitte des 22. Jahrh. v. Chr. fiel. Man hat früher vergebliche Versuche gemacht, diese Finsterniß durch Rückwärtsrechnung zu verificiren, so daß man sehr gemeint war, den ganzen Bericht für eine Erfindung zu halten. Die neuesten Untersuchungen haben die Realität indeß vollkommen außer Zweifel gestellt, und das genaue Jahresdatum des merkwürdigen Phänomens ist 2158 v. Chr.

Obgleich die Sonnenfinsternisse bezüglich ihres Eintreffens keinen regelmäßigen Cyklus derselben, so kehren sie doch im Allgemeinen nach Ablauf von ungefähr 18 Jahren zurück, und es finden in dieser Zeit 41 Sonnen- und außerdem 29 Mondfinsternisse statt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Berechnungsmethoden der Alten sich auf diese näherungsweise Wiederkehr stützten, wobei dann natürlich das Nichteintreffen einer Finsterniß zu der vorherbestimmten Zeit nicht gerade sehr selten stattfinden konnte.

Die Berechnungsmethoden der Neuern datiren seit Kepler und Tobias Mayer. Die Entwicklung dieser Vorschriften gehet nicht hierbei, doch sind dieselben in der letzten Zeit auf so einfache Ausdrücke zurückgeführt worden, daß eine Schwierigkeit für den der elementaren Mathematik Kundigen kaum mehr vorliegt.

Wie bereits oben hervorgehoben wurde, haben für den Fortschritt der Wissenschaft die totalen Sonnenfinsternisse, d. h. diejenigen, bei welchen die ganze Sonnenscheibe eine gewisse Zeit hindurch durch den Mond verdeckt wird, die höchste Bedeutung. Weit weniger ist dies der Fall mit den sogenannten ringförmigen, wo um die Zeit der Mitte des Phänomens noch ein leuchtender Ring der Sonnenscheibe sichtbar bleibt, und am wenigsten mit den sogenannten partialen, bei denen nur ein mehr oder minder großer Theil der Sonne für unsern Anblick verdeckt wird.

Die Zeitdauer der vollständigen Verdeckung der Sonne durch den Mond kann nach Séjour's früheren Rechnungen in den allergrünlichsten Fällen für einen Ort unter dem Äquator auf höchstens 7 Minuten 58 Sekunden steigen; in den meisten Fällen bleibt sie aber bedeutend unter diesem Werthe. Die totale Sonnenfinsternis vom 18. August 1868, auf die wir weiter unten noch einzeln zurückkommen müssen, zeichnete sich unter allen bekannten der Neuzeit durch die verhältnißmäßig lange Dauer der Totalität aus, die für gewisse Orte der Erdoberfläche bis auf 6 Minuten 46 Sekunden liess.

Sobald der dunkle Mondrand bei seinem Fortschreiten über die Sonnenscheibe diese letztere etwa zur Hälfte bedeckt hat, macht sich im Allgemeinen erst eine auffallende Abnahme des Tageslichts bemerlich. Sie nimmt natürlich in dem Maße zu, als ein immer größerer Theil der Sonne verfinstert wird, und erreicht ihr Maximum zur Zeit der Totalität. In diesen Momenten ist die ganze Sonnenscheibe vom Monde wie von einem unbedinglichen Schirme verdeckt; allein nichtsdestoweniger tritt doch keine vollkommen nächtliche Dunkelheit ein, sondern vielmehr ein Zustand von Dämmerung, in welchem entfernte Gegenstände mehr oder weniger deutlich erkannt werden. Einzelne Berichte erzählen allerdings, vielleicht etwas übertrieben, von nächtlicher Dunkelheit; so sagt z. B. Clavius, daß die Dunkelheit bei der totalen Finsternis am 21. August 1560 so groß war, daß die Vögel aus der Luft herabsanken. Meist lagert sich indes ein grünlich-violetter Schein über die ganze Gegend, in welchem die einzelnen Gegenstände noch ziemlich gut zu erkennen sind. Man findet den Grund dieser eigenthümlichen Thatsache in dem hellen Lichtkranz, der sogenannten Korona, welcher die Sonne zu jener Zeit umgibt. Diese Korona ist bisher noch bei allen totalen Sonnenfinsternissen wahrgenommen worden, und schon Kepler erklärte sie für die Sonnenatmosphäre, während Andere hingegen eher darin eine gasförmige Umhüllung des Mondes zu sehen geneigt waren. Dieses letztere kann aber schon aus dem Grunde nicht richtig sein, weil eine derartige Mondatmosphäre sich in sehr vielen anderen Erscheinungen verrathen müßte, was entschieden nicht der Fall ist. Wenn nun auch die allgemeine Erscheinung der Korona sich durch eine angenommene Sonnenatmosphäre recht gut erklären läßt, und wenn auch die verschiedene Breite dieses lichten Kranzes bei verschiedenen totalen Finsternissen nicht hiergegen spricht, sondern aus dem verschiedenen Zustande der Luftdurchsichtigkeit ohne Schwierigkeit gedeutet werden kann; so zeigt die Korona doch auch noch eine Reihe

von Erscheinungen, deren genetische Erklärung nur unter gewissen Bedingungen und mit Schwierigkeit gegeben werden kann. Es sind dies die hellen, bisweilen sehr scharf begrenzten Strahlen in der Lichtkrona, die keineswegs von dem Sonnenmittelpunkte nach allen Seiten hin strahlenförmig auslaufen und demnach auf dem dunkeln Mondrande senkrecht zu stehen scheinen. Sie zeigen sich vielmehr schiefstehend, krumm gebogen und unter den verschiedensten Winkeln einander schneidend. Bei der Sonnenfinsternis vom 3. 1842 sah man in Perpignan einige, die verlängert, den Mondrand sogar tangirt haben würden. Während der totalen Sonnenfinsternis am 12. Juli 1860 haben die Beobachter in Spanien eine Menge von scharfbegrenzten Strahlen und Strahlenbüscheln, die nur theilweise radial verliefen, meist hingegen in ganz abweichenden und sogar einander durchkreuzenden Richtungen. Südwärts erblidete man deutlich gekrümmte Strahlen; zwei von ihnen flanden sich sommertisch wie eine Parentese gegenüber, während ein dritter über die Grenze des Ganzen hinausging und dann plötzlich abbrach. Wie sind diese eigenthümlichen Strahlen zu erklären? Gewöhnlich wissen wir nur, daß es nicht wohl optische Täuschungen sein können; allein über die wahre, physische Natur derselben haben wir noch keine der Einwürfe gesicherte Vorstellung. Man hat wohl an analoge Strahlen gedacht, wie sie auf unserer Erde das Noctilicht zeigt; allein bei einem scheinbaren Winkeldurchmesser von 1 Grad, wie ihn jene Strahlen häufig zeigen, würde man auf eine wahre Länge von 350,000 geogr. Meilen geführt, und diese ist doch zu bedeutend, um ohne Weiteres zuzugeben werden zu können.

Beim Auf- oder Untergange der Sonne bemerkt man, selbst unter den günstigsten Umständen, keinerlei Spur der Korona; nichtsdestoweniger hat man sie bei totalen Sonnenfinsternissen dennoch eine gewisse Anzahl von Sekunden vor und nach der vollständigen Bedeckung zu sehen vermocht. Am 15. April 1865 war die Korona zu Concepcion noch volle 36 Sekunden nach dem Aufhören des ersten Sonnenstrahles sichtbar.

Ist die Korona selbstleuchtend oder glänzt sie nur in dem reflectirten Lichte des eigentlichen Sonnenballes? Diese Frage blieb bis auf die jüngste Zeit herab eine ungelöste. Inzwischen haben jedoch die Untersuchungen der wissenschaftlichen Expeditionen zur Beobachtung der totalen Finsternis vom 18. August 1868 ungewissheit gemacht, daß ein großer Theil, wenn nicht das ganze Licht der Korona bloß reflectirt ist, wie weiter unten speciell gezeigt werden wird.

Eine andere merkwürdige Erscheinung, welche sich bei totalen Sonnenfinsternissen dem beobachtenden und bewaffneten Auge darbietet, sind die sogenannten Protuberanzen, feurigrothe, dergleichen flammenartige Zaden am Sonnenrande, welche eine sehr mannigfache Gestalt und verschiedene Größe besitzen.

Der Erste, welcher die Protuberanzen der Sonne wahrgenommen, scheint Stannan aus Bern zu sein, der bei der totalen Finsternis am 12. Mai 1706 kurze Zeit vor dem Wiedereintritten der Sonne am linken Rande der schwarzen Mondscheibe einen blutrothen Saum sah. Hieraus Bassinus beobachtete bei Gelegenheit der Finsternis am 2. Mai 1733 zu Gothenburg mehrere rothe Flecke von ihm Theil volliger Gestalt, die über dem dunkeln Mondrande schwebten. Seit man auf diese Erscheinung aufmerksam wurde, hat man sie noch jedes Mal bei

totalen Sonnenfinsternissen beobachtet; ja, Mitglieder der österreichischen Expedition nach Dalmatien zur Beobachtung der ringförmigen Finsterniß vom 6. März 1867 sahen eine Protuberanz, als die Bedeckung der Sonne erst bis zu 10,1 Zoll vorgeschritten war. Diese Protuberanz blieb volle 20 Minuten hindurch sichtbar und entwichend selbst dann, als die Finsterniß bereits wieder auf 10 Zoll abgenommen hatte, dem Auge nicht wegen Lichtschwäche, sondern bloß wegen eintretender Bewölkung. Auf die Möglichkeit einer derartigen Wahrnehmung hatte ich bereits vorher (S. 119) mit den Worten aufmerksam gemacht: „Nach den bisherigen Erfahrungen scheint es nicht unmöglich, auch bei bloß partialen Verfinsternissen die rothen Protuberanzen der Sonne theilweise wahrzunehmen, wenn man ein kleines Fernrohr benutz und beim Ausritte des Mondes diejenigen Theile des Sonnenrandes scharf in's Auge faßt, die durch den dunkeln Mondrand im nämlichen Ausenbleibe verdeckt werden. Bei diesen Beobachtungen muß natürlich die helle Sonnenscheibe möglichst aus dem Gesichtsfelde des Fernrohrs bleiben und darf man sich kein's dunklen Blendglases bedienen. Vielleicht veranlassen diese Bemerkungen den einen oder andern Leser in Buda-Pesth oder vorzugsweise in Hermannstadt (Siebenbürgen), welcher Ort in der Zone der ringförmigen Verfinsternung liegt, seine Aufmerksamkeit dem genannten Punkte zuzuwenden, wozu ich möglichst günstige Witterung wünsche.“ Schon vor Jahren hat Littrow darauf aufmerksam gemacht, daß die Sonnen-Auf- und Untergänge im Meere eine gute Gelegenheit darbieten dürften, Protuberanzen wahrzunehmen. Dieser Vorschlag scheint indeß bis jetzt nicht genügend gewürdigt worden zu sein, weil man wahrscheinlich das Suchen nach Protuberanzen bei solchen Gelegenheiten für vergeblich hielt. Die Wahrnehmung der österreichischen Beobachter läßt jedoch gar nicht daran zweifeln, daß dabei größere Protuberanzen sichtbar werden können. Es wäre daher allerdings sehr zu wünschen, daß diese Beobachtung die Küstenbewohner veranlassen möchte, den Vorschlag Littrow's zu beherzigen und bei klaren Auf- und Untergängen der Sonne eifrig nach Protuberanzen zu suchen. Ihre darauf verwandte Mühe würde höchst wahrscheinlich keine vergebliche sein, sondern vom besten Erfolge begleitet werden, wie eine Beobachtung von Tschini am 8. August 1865 beweist.

Auf Veranlassung Arago's haben die Beobachter der totalen Sonnenfinsterniß im J. 1842 in Hauptzugemerk auf die Protuberanzen gerichtet. Diese Gebilde wurden an allen Beobachtungsstationen wahrgenommen. Manche das von lassen sich allerdings nicht mit voller Sicherheit identificiren, was aber gewiß zum größten Theile von der Schwierigkeit einer scharfen Positionsbestimmung derselben in der verhältnißmäßig so überaus kurzen Zeit ihrer Sichtbarkeit herrühren mag. Die Höhe dieser Gebilde war sehr beträchtlich. Petitt maß dieselben und fand ihre Winkelausdehnung  $1' 45''$ . Da in derselben Entfernung der Erddurchmesser  $17,8''$  groß erscheint, so betrug demnach die wahre Höhe jener Protuberanz fast 6 Erddurchmesser, oder mehr als 10,000 geogr. Meilen.

Nach allen diesen merkwürdigen Beobachtungen erwartete man mit Spannung die große Sonnenfinsterniß vom 8. Juli 1851. Auch diesmal zeigten sich die Protuberanzen. Eine derselben, auf der westlichen Seite, erschien

hakenförmig gekrümmt, und in der Verlängerung der Krümmung schwebte eine Art von rother Wolke, die nach den Beobachtungen von Galle durch seine Fasern mit der Protuberanz zusammenzuhängen schien.

Die Lichtintensität dieser Gebilde war eine so bedeutende, daß man sie durch dünne Wolken im Fernrohr, ja mit bloßem Auge sogar wahrzunehmen vermochte. Die Gestalt der meist rubin- oder pfirsichrothen Erhebungen hat sich bei einigen während der Momente der Sichtbarkeit schnell verändert. Ihre Höhe überstieg zum Theil selbst 2 Bogeminuten, d. h. 12,000 geogr. Meilen. Außer diesen sogenannten Erhebungen wurden auch carminrothe, langgestreckte, bandartige, wie auf dem Mondrande anliegende, oft gezähnte, niedrige Streifen gesehen.

Die Finsterniß vom J. 1860 hat unsern Kenntniß der Protuberanzen nicht eben Wesentliches hinzugefügt; man fand sie bis zu  $2\frac{1}{2}$  Bogeminuten groß, sehr undständig und zahlreich. Bei der Finsterniß am 15. April 1865 gab Capellotti in Concepcion adersals eine gekrümmte Protuberanz mit einer frei schwebenden Wolke. Der vierte Theil des Sonnens (scheinbar des Mond-) Randes erschien von einem rothen, gezähnten Saume umhüllt.

Arago hat sich in seinen letzten Lebensjahren sehr viel mit Sammlung der Beobachtungen und Erklärung der Protuberanzen befaßt. Nachdem er alle zu seiner Zeit vorgebrachten Theorien durchgegangen, bleibt er zum Schluß bei der Annahme stehen, daß die Protuberanzen ungeheure Wolkenmassen seien, die in der Sonnenatmosphäre schwimmen. Mit Recht steht er in der ungetrübten Größe dieser Wolkenmassen seinen bedeutungsvollen Einwurf gegen seine Hypothese. In der That, weshalb sollten aus dem ungeheuren Sonnenhaute unter Verhältnissen, die ganz abweichend von denjenigen unserer Erde sind, keine Wolkenmassen von gleichfalls bedeutender Größe annehmbar sein? Wäre dies der einzige Einwurf, so würde allerdings die Arago'sche Hypothese, die natürlich Humboldt im Kosmos ebenfalls adoptierte, ziemlich wahrscheinlich sein. Indessen liegt die Sache wesentlich anders. Erstlich läßt sich nicht recht eins sehen, weshalb jene Wolken eigentlich eine rothe und nur höchst selten eine weiße Farbe zeigen sollten. Die Analogie mit unserm Morgen- und Abendroth ist offenbar hier nicht angebracht; denn die fraglichen Wolken (nämlich die Protuberanzen) befinden sich senkrecht über der weissen Scheibe ausstrahlenden Sonnenscheibe und senden uns in einer mehr senkrecht hierzu stehenden Richtung ihr Licht zu. Allerdings hat der Lichtstrahl vom Rande der Sonnenscheibe aus einen größeren Weg durch die Sonnenatmosphäre zu durchlaufen, als von der Mitte der Scheibe aus; allein, das hindert nicht vorzugsweise die rothe Farbe der Protuberanzen bedingt wird, ergibt sich aus dem Umstande, daß man auch schon weitgestreckte Gebilde dieser Art gesehen hat. Man ist vielmehr geneigt, die rothe Farbe als treu anzusehen, hervorgerufen durch Verbrennungserscheinungen, die in ihrer höchsten Intensität Weißgluth zeigen. Am wahrscheinlichsten hat man in den Protuberanzen Analoga ungeheurer Feuerfäulen zu erblicken; eine Annahme, die noch durch die Wahrnehmung Casari's (bei der totalen Finsterniß von 1842) unterstützt wird, daß die größeren Protuberanzen von rothen Rauchfäulen begleitet waren, die sich in ihrer aufsteigenden Bewegung kreuzten und einer heftigen Agitation zu unterliegen schienen.



# Die Natur

Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 11.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

**17. März 1869.**

**Inhalt:** Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, von Karl Müller. Fünfter Artikel. — Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen, von G. Schnip. 5. Die marine Diluvialfauna in Westpreußen. — Kleinere Mittheilungen.

## Ein Blick auf die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Von Karl Müller.

Fünfter Artikel.

Eine wahrhaft segensreiche Section kann die für Militär-Gesundheitspflege zuerst in Dresden gegründete werden. Das folgt schon aus den von Dr. Koch gegebenen Mittheilungen. Nach ihm haben die russischen Militärärzte einen hohen Rang, sind jedoch Militär-Beamte in des Wortes vorwiegendster Bedeutung, ohne legend welchen Einfluß auf Gesundheits-Verhältnisse. Die französischen Militärärzte sind Offiziere; die Armee hat 374 Stellen über dem Hauptmannrang; die Verhältnisse der Aerzte sind persönlich vortrefflich, doch sachlich unter aller Kritik, da sie in jeder Beziehung unter der Intendanz stehen. Italien hat absolut, Spanien fast vollständig die französischen Verhältnisse nachgeahmt. Daß bei uns in Deutschland erst neuerdings eine einigermaßen erträgliche Stellung der Militärärzte in Preußen geschaffen worden ist, ist bekannt.

Darum wird dieser Stand mit Spannung auf die nächste Naturforscherversammlung blicken dürfen. In Dresden konnte zunächst weiter nichts geschehen, als die Section zu begründen und eine Commission zu erwählen, die erst für jene Versammlung eigene Vorlagen vorbereiten soll.

Nicht minder freudig darf man die Gründung einer eigenen Section für Anthropologie und Ethnologie begrüßen. Seitdem namentlich die Urgeschichte des Menschen durch geologische und archäologische Studien vollständig Naturgeschichte geworden ist, seitdem auf dieser Grundlage die Kenntniß des Menschengeschlechtes so außerordentlich erweitert wurde, seit dieser Zeit machte sich eine solche Section mit unbedingter Nothwendigkeit geltend. Ihre Leitgedanken drückte Prof. Victor Carus aus Leipzig ganz vortrefflich in Folgendem aus. Ihre erste Aufgabe ist eine Naturdes



Schreibung des Menschen; zur Lösung dieser Aufgabe bedarf sie der Archäologie und Geologie. Bei der Frage nach den verschiedenen Menschenarten sind zu beachten: der Körperbau, die biologischen Merkmale und die ethnologisch-socialen Verhältnisse. Unser Kenntniss des Körperbaus der verschiedenen Menschenrassen ist aber noch sehr gering; nur das Skelet kennt man zum Theil; die Schädelmessungs-Methoden erscheinen noch immer unzureichend, weil man dabei nicht genethisch zu Werke geht. Zu den biologischen Merkmalen gehört auch die Sprache; doch hat man sich wohl zu hüten, sie allein als Merkmal eines Volkes zu betrachten, weil vielfache Verschiebungen von Völkern und ihren Sprachen vorgekommen. Wenn es ferner zum Charakter der Arten gehört, daß fruchtbare Begattungen zwischen ihnen nicht möglich sind, so findet allerdings eine Art Verschiedenheit unter den Menschen nicht statt, sobald allseitige Vermischungen für möglich gelten. Doch steht diese Annahme, daß alle Rassen fruchtbare Bastarde liefern, noch nicht einmal erfahrungsmäßig fest. In Bezug schließlich auf das Alter der Menschheit sind nicht nur geologische Thatsachen, sondern auch die Völkersagen, z. B. vom Drachen, zu beachten, sofern sie für die Geßirgen alter Völker mit gewissen Thieren, z. B. der Riesenschildkröte, sprechen. Schon aus diesen kurzen Bemerkungen leuchtet das große Feld der Thätigkeit der heutigen Anthropologie hervor, und die lebendige Theilnahme an den Sitzungen war nur ein Ausdruck für das lebendige Interesse, das den vortheilhaftesten Berufskreisen für diese Wissenschaft innewohnt. Wir dürfen es wohl ohne Uebertreibung aussprechen, daß die Anthropologie dereinst als eine Generalwissenschaft unserer gesammelten Naturwissenschaften dastehen wird, weil eben die ganze Schöpfung im Menschen gipfelt. Noch ist Vieles darin schwankend, und mit Recht machte Dr. M. Weinhold, der eigentliche Begründer der Section, auf die schwankenden Begriffe zwischen Ethnologie und Ethnographie aufmerksam. Beide seien oft für ein und dasselbe, oft für das Umgekehrte genommen worden, da man Sammlungen von Waffen, Kleidern u. s. w. ethnologische, statt ethnographische genannt und bei der Ethnographie verlangt habe, sie solle die innern Verbandschaftsverhältnisse der Völker ergründen. Auch die physischen Ausprägungen seien mehr zu beachten, um sie bei Beurtheilung der Menschwürdigkeit und Culturfähigkeit der angeblich niederen Rassen in der eigentlichen Anthropologie einen wichtigen Zweig ihres Studiums bilden zu lassen.

Schon bei den einzelnen Vorträgen zeigten sich die ange deuteten Schwierigkeiten in vollem Maße. So bei einem Vortrage des Dr. Schertellic aus Hongkong über Rassenverschiedenheiten in China. Dasselbst sind die malaisischen und polynesischen Elemente zu unterscheiden. Der malaisische Archipel im engeren Sinne sind die Sundainseln, deren Bewohner eine angenehme äußere Erscheinung bilden. Mit mehr breitem als ovalem Gesichte ohne hervorstechende Joch-

beine, verbinden sie mit einer kindlichen Natur mehr Neigung zur Erefahrt, als zum Ackerbau, weshalb auch die Chinesen als Arbeiter leichtes Spiel bei der Einwanderung haben. Eben mit Europäern scheinen fruchtbar zu sein und die Rasse zu verbessern. Weit schwieriger ist die Abgrenzung des polynesischen Archipels, und ebenso die allgemeine Beschreibung der polynesischen Rasse nach den äußern Merkmalen. Noch viel kindlicher und indolenter als die vorige, begt sie für die Europäer eine besondere Vorliebe, obgleich sie in Berührung mit derselben auffallend abnimmt. Trotz aller Unterschiede findet sich doch zwischen beiden Rassen ein inniger Zusammenhang. Die malaisischen Schädel zeichnen sich aus: durch kleine Jochbögen, sehr constante Basallänge (96—98 Millimeter), constant gleiche Höhe, sogenannter falsche Prognathie, meist flaches Dach und zwei ziemlich senkrechte Ebenen zwischen Hinterbauptschuppe und Seitenbein; die polynesischen (die sich übrigens nicht blos auf die Carotinen beschränken): durch übermäßige Länge (bis 200 Millim.), constant sehr lange Basis, constant große Schmalheit, mäßige Höhe, große Breite der Jochbögen, sowie durch Mäßigkeit und Schwere im Gegenfaze zu dem dünnen malaisischen, durch Bogenform, wenn sie von der Seite, durch Dachform, wenn sie von vorn gesehen werden, schließlich durch bogenförmige Verdickungen an den Seiten. Abweichungen auf den Nasobären und auf Mahagastar sind durch fremde Einflüsse erklärbar. So werden beide Stämme durch ihre Schädelbildung getrennt, durch ihre Sprache mit einander verknüpft; die rundliche Schädelform des Malaien ist mehr der eines Culturvolkes, während der polnensisches Schädel einem muskelstarken Volke angehört; Erscheinungen, die über den verschiedenen Ursprung beider Völker noch immer keinen sichern Anhalt geben.

Als ob die Section die von Carus gegebenen Leitgedanken sofort zur weiteren Entwicklung habe bringen wollen, zeigte Staatsrath v. Brandt, der auch unserm Leserkreise durch seine zoogeographischen Arbeiten räumlichst bekannt ist, daß nach alten Schriftstellern noch zu Cäsar's Zeiten das Renithier in Deutschland lebte. Diese Nachweise regten wieder zu andern interessanten Mittheilungen an. Ich hebe aus denselben als die wichtigste die des Dr. Weinhold hervor, daß in Westdeutschland früher Rundköpfe, später Langköpfe gewohnt hätten. Damit stimme auch die Ansicht fast aller französischen Forscher überein, daß eine brachycephalische (rundköpfige) Bevölkerung von Ibero-Baiernern einer dolichocephalischen (langköpfigen) von Celto-Belgen vorausgegangen sei. Welche Bedeutung dergleichen Forschungen haben, zeigte Dr. Schertellic auch an Schädeln des Hordern, besonders Jütlands und Mäns aus der Steinzeit. Denn für die Culturstufe eines Volkes ist das Verhältniß der Basis zu der Summe des Umfangs und der Höhe des Schädels wichtig. Die tiefstehenden Naturvölker steht die Schädelskapsel zurück hinter der verhältnismäßigen Länge der Basis, und hiernach stehen die Bewohner der

nordischen Steinzeit weit über den Polynesien. Auch ihre Steinwerkzeuge sind belehrend. In den Höhlenmahlhöhlen (Küchenabfällen) finden sich unvollkommenere, als in den Gräbern. Trotzdem scheint man nicht berechtigt, zwei verschiedene Zeitperioden anzunehmen, berechtigt aber zu dem Schlusse, daß auch in Dänemark die Völker der Steinperiode mit denen der britischen Inseln, die man gewöhnlich Celten nennt, dieselben gewesen seien. — Die andern, nicht weniger interessanten, aber doch zu speziellen Mittheilungen der sechs Sitzungen muß ich übergehen.

Die Section für naturwissenschaftliche Pädagogik reichte sich hier wie von selbst an, und man muß der allgemeinen deutschen Lehrerversammlung in Cassel dankbar sein, daß sie eine solche für die Naturforscherversammlung vorschlug, wodurch der letzteren eine Menge von Elementen überliefert werden, die sie eigentlich erst zum Abschluß bringen. Die Section ist gleichsam die Missionsanstalt der Naturforscherversammlung, und es kann nicht fehlen, daß dieses Apostelamt eifrig in die Entwicklung der Naturwissenschaften eingreifen wird; vorausgesetzt, daß die Section sich nicht einseitig aus Schulmännern, sondern auch aus Schriftstellern zusammensetzt. Vorläufig traten fast nur die ersten zusammen; aber mit einem Eifer, der Gutes verheißt. Schon die erste Sitzung legte den eigentlichen Grund für alles Spätere. Sie erklärte, „daß die gegenwärtige Organisation des naturwissenschaftlichen Unterrichts an niederen, wie höheren Lehranstalten, insbesondere an Gymnasien, weder für die Entwicklung der Wissenschaft selbst, noch für diejenige Berufswege, welche der Naturwissenschaften ganz besonders bedürfen (Medicin, Forst-, Land- und Volkswirtschaft), noch auch für allgemeine menschliche Bildung genügt.“ Deshalb erkennt die Section als ihre Hauptaufgabe an, „eine Organisation des naturwissenschaftlichen Unterrichts mit begründen zu helfen, welche den Anforderungen ebenso der Naturwissenschaften, wie der Pädagogik entspricht.“ Insbesondere stellt die Section die Forderung auf: „daß mit Rücksicht auf die obengenannten Berufsfächer zur Erzielung einer naturwissenschaftlichen Cultur an den Gymnasien in den unteren Klassen ein naturwissenschaftlicher Anschauungsunterricht und in den oberen Klassen ein nach richtigen pädagogischen Principien geordneter theoretischer Unterricht eingeführt werde.“ Dieser von Dr. Spier aus Wolfenbüttel und Dr. Arendt aus Leipzig eingebrachte Antrag darf als das bewegende Princip aller Verhandlungen betrachtet werden. Dem Einen erscheint es zu früh, dem Andern zu allgemein. Die Versammlung entschied sich in Folge dessen in ihrer vierten Sitzung für einen Antrag von Dörfling aus Dresden, welcher specieller auf den Gegenstand einging. Auch er erklärt den naturwissenschaftlichen Unterricht an den meisten Schulen für unzureichend, und zwar wegen unzulänglicher Bestimmungen in den Regulativen, wegen ungenügender Lehrkräfte und wegen Mangels an Anschauungsmitteln. In

seinem zweiten Theile erklärt er selbst die Methode des naturwissenschaftlichen Unterrichts auf den Realschulen, Gymnasien, Seminarien u. s. w. dringend einer Reform bedürftig; der naturwissenschaftliche Elementarunterricht sei einzig auf Anschauung zu gründen, und erst diesem Anschauungsunterrichte dürfe der theoretische folgen, durch welchen der Schüler der Reife für humanistische und technische Hochschulen zugeführt werde. Aus diesem Grunde seien die Grenzen der classischen Studien so weit abzurufen, daß die Erlangung der vorgeschriebenen Reife ohne Ueberlastung des Schülers ermöglicht werden könne. — Wir sehen folglich hiermit den alten Streik, der seit einigen Jahren zum Vortriebe der Philologen und zum größten Nachtheile der Naturwissenschaften ruhte, aufs Neue erwachen und wünschen nur, daß er recht bald ein besseres Resultat herbeiführe, wie bisher. Es gibt factisch nur Einen Staat in Deutschland, welcher darin allen andern vorausging, und dieser ist Württemberg; er hatte, wie zur Lehrerversammlung in Cassel, auch zur Naturforscherversammlung in Dresden einen Abgeordneten in der Person des Prof. Bopp aus Stuttgart gesendet. Daran könnten die übrigen, besonders Herr von Mähler in Berlin, lernen. Jener Abgeordnete war es auch, der den in Dresden gesponnenen Faden mit der nächsten Naturforscherversammlung verknüpfte, indem er 8 Theesen aufstellte, welche von einer eigenen Commission berathen und von ihr der nächsten Versammlung vorgelegt werden sollten. Mit Recht erkannte die Section die Sendung des Prof. Bopp als einen besonderen Akt des Fortschritts dankend an. — Unter den übrigen Verhandlungen ist übrigens noch ganz besonders hervorzuheben, daß die Section nicht bloß theoretisirte, sondern auch zur Erfüllung ihrer eigenen Forderungen beizug. In dieser Beziehung scheinen uns die von Prof. Mach in Prag konstruirten Stereoskopbilder für den Unterricht geradezu Epochenmachend zu sein. Mit Hilfe derselben ist er auf dem Wege, die ganze theoretische Physik anschaulich zu machen, wie er durch eine Reihe photographisch ausgenommener Darstellungen von Interferenzen bewies. Er hofft das durch eine neue, vom Kupferdrucker Tomassich in Wien erfundene Methode, Photographien durch den Druck zu vervielfältigen, zu erreichen. Sie beruht darauf, daß das Bild auf eine Zinkplatte photographirt und durch Säuren, welche die lichten Stellen wegessen, erhaben gemacht wird. Methode und Apparate sind stets die Sinneswerkzeuge der Wissenschaft gewesen, und sie werden es auch für den Unterricht sein.

Ueberhaupt kann es als ein wesentlicher Charakter der Dresdener Versammlung aufgefacht werden, daß sie einen völlig modernen Geist in sich trug, der aus dem Theoretischen heraus trat und nach einer Verbindung mit dem Leben strebte. So begann sie mit Virchow's Vorträge, welcher sich zum Organe ihrer machte, die schon seit Jahren die außerordentliche Bedeutung der Naturwissenschaften

für den Unterricht predigen; so endete sie mit Keclam's Vorträge über die Sterblichkeit der Kinder in großen Städten und mit einem Vortrage von Dr. Wittstiedt aus Gelle über die Gesundheitspflege des Arbeiterlandes. Mit Recht verlangt er von der deutschen Naturforscherversammlung, daß sie ein Hort dieser Bestrebungen sein möge, welche in dem Arbeiterlande einen höchst wichtigen Theil von uns selbst finden. Wir setzen hinzu, daß sie bald ihrer Auflösung entgegengehen würde, wenn sie sich nicht mit dem Geiste der neuen Zeit, entfernt von Professoren- und Gelehrtenbündel, erfüllte. Daß derselbe in speziellen Sectionen noch immer existierte, wer könnte das leugnen? Der Durchschnittegeist indes war sicher ein höherer, ein solcher, der unsere deutsche Naturforscherversammlung als eine wirklich nationale immer mehr erscheinen läßt. Damit wird und muß sie auch eine nationale Macht, gleichsam ein naturwissenschaftliches Reichsparlament werden, dessen Aussprüche, weil sie von den Tüchtigsten geprüft wurden, mit außerordentlicher Wucht

in's Gewicht fallen müssen. Sie wird zerstörend, aber im Zerstören auch aufbauend wirken. Diesem Gefühle gab der zweite Geschäftsführer, Hofrath Schläglichs aus Dresden, in seinem Abschiedsworte gegenüber der letzten allgemeinen Versammlung einen wahrhaft schönen Ausdruck: „Die Naturwissenschaft“ — so sprach er — „gestört nur das, was der Zerstörung werth war; mit sanfter Hand zieht sie die Binde des Aberglaubens hinweg, welche das Auge des Menschen beschattete; sie macht den Blick frei, und gerade dadurch, daß sie die Gebiete des mathematisch Erkennbaren und Nichterkennbaren sondert, befähigt sie die Ueberzeugung von einer höheren Weltordnung, die wir aber im Gefühle des Schönen und Erhabenen ahnen können. Und wenn wir mit solchen Anschauungen den Boden des glaubensstarken Volkes betreten, so haben wir eine Basis, auf welcher sich, wenn auch nicht die extremsten Parteien, wohl aber die große Uebersahl der gemäßigt Denkenden vereinigen läßt.“ Darum auf frohes Wiedersehen in Innsbruck!

## Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen.

Von C. P ä n i z.

### 5. Die marine Diluvialfauna in Westpreußen.

Unserm leider für die Wissenschaft zu früh verstorbenen Freunde Lehmann, Oberlehrer an der Realschule in Bromberg, kommt das Verdienst zu, im Diluvium bei Bromberg zuerst fossile Mollusken<sup>1)</sup> aufgefunden zu haben. Ferdinand Römer begrüßte diese Entdeckung<sup>2)</sup> mit den Worten: „In jedem Falle ist die Auffindung von Meeresconchylien in dem Diluvium bei Bromberg eine bemerkenswerthe Thatsache, weil sie den Anfang zu der Auffindung der bisher ganz unbekannten marinen Fauna des norddeutschen Diluviums bildet, deren vollständige Kenntniß allein uns eine genauere Einsicht in die Bedingungen, unter welchen der Absatz jener ausgedehnten und mächtigen Ablagerungen erfolgte, gewähren wird.“

So war im „alten Weichselbette“ bei Bromberg der Anfang gemacht. Dr. G. Berendt fand bald darauf im neuen Weichselbette zwischen Thorn und Rerne eine noch zahlreichere marine Diluvialfauna, die heute im Ganzen 10 Species umfaßt:

- 1) *Ostrea edulis* L., gemeine Auster, befindet sich in allen europäischen Meeren. (Fig. I.)
- 2) *Cardium edule* L., edibare Herzmuschel, ist in allen europäischen Meeren angetroffen; sie wird in Island und Italien gegessen, während die Schalen zu Kalk gebrannt werden; fossil ist sie bisher nur in Italien gefunden worden (Fig. II).

1) *Cardium* und *Buccinum* in Grabgruben auf der Pringenshöhe bei Bromberg.

2) Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XVI. 1864.

3) *Tellina solidula* Pult., feste Platt-, Zeller- oder Sonnenmuschel, ist in der Nord- und Ostsee, sowie an Englands und Frankreichs Küsten gemein. (Fig. III.)

4) *Corbula gibba* Oliv., düstige Korbmuschel, in der Nordsee und dem Mittelmeere gemein, wird häufig fossil in den Tertiärlagerungen bei Kassel, Diebolzen u. s. w. gefunden (Fig. IV.)

5) *Macla subtruncata* Dac., Trogmuschel, ist in der Nordsee heimisch. (Fig. V.)

6) *Scrobicularia piperata* Gmel., gemeine Pfeffermuschel, im westlichen Theile der Ostsee bei Warnemünde und in dem Mittelmeere zu finden, wird des pfefferartigen Geschmacks wegen gern gegessen. (Fig. VI.)

7) *Venus virginea* L., virginische Venusmuschel, ist in der Nordsee einheimisch. (Fig. VII.)

8) *Cyprina islandica* L., isländische Cyprina, wird in der Nordsee und in dem westlichen Theile der Ostsee bei Ederföde gefunden und ist in der Schweiz, Schweden, Norwegen und Deutschland, z. B. bei Bünde, Kassel, Diebolzen u. s. w., fossil sehr verbreitet. (Fig. VIII.)

9) *Buccinum (Nassa) reticulatum* L., Netz-Fischschale, ist in der Nordsee und in dem westlichen Theile der Ostsee bei Kiel und in den übrigen europäischen Meeren einheimisch; fossil trifft man sie in Oberitalien und Süd-Frankreich. (Fig. IX.)


10) *Cerithium lima* Brag., Hoens- oder Nabelschnecke, wird in der Nordsee und im Mittelmeere angetroffen und bei Kassel fossil gefunden. (Fig. X.)

Was die Verbreitung dieser Fauna betrifft, so fand Dr. G. Berendt die ersten Spuren eine Meile unterhalb Marienwerder, wo an dem Abhange des Plateau's zu dem

hier c. 1 1/4 Meile breiten Weichselthale — gegenüber dem Dorfe Rothhof — eine Sandmergelschicht in 40—50 F. Höhe über dem Weichselthale zu Tage tritt. Hier finden sich zahlreiche, äußerst gebrechliche Schalen von Mollusken, so wie einzelne kleine Hohlräume, welche durch Eisenoxydhydrat rothbraun gefärbte Pflanzenstengel ohne bestimmte Form zeigen. Noch zahlreicher treten die Schalen an den sandigen Gehängen des Festschales bei Rewe, namentlich bei Jakobsmühle auf, wo die eben genannten Species, völlig getrocknet und erhärtet, lose im Sande liegen. Die Menge derselben ist hier so groß, daß die Kinder des Dorfes Jakobsmühle gerade wie die Bewohner des Dörsesrandes gewohnt sind, mit diesen Diluvialmuscheln zu spielen. Die Erhaltung dieser Schalenreste, an denen fast durchweg noch keine Theilchen von Sandmergel haften, weist mit Entschiedenheit auf völlig gleiche Lagerung wie bei Rothhof hin. Die Muschelbank findet sich auch wirklich — außerhalb des Festschales, nicht weit von der nach Danzig führenden Chaußee, in einer Sandgrube, — in genau derselben Lagerung.

Offenbar hat dieser Reichtum an See-Mollusken in der Gegend von Rewe, die gewiß von vielen Bewohnern der Gegend als solche erkannt wurden, zumal Cardium edule und Tellina solidula — die gemeinsten Dörsesformen — hier am zahlreichsten vorkommen, den Grund zu

der dort viel verbreiteten Sage gegeben, daß ein Bufen der Dörses einst bis oberhalb Rewe oder bis oberhalb Marienwerder und Graudenz hinauf gegangen sei.



I *Cardium edule* L.; II *Corbula gibba* Oliv., a-f beide Klappen in natürl. Größe, g u. h Schale vergrößert; V *Nacra subovata* Dac., a-c in natürl. Größe, d Schloßrand vergrößert; VI *Cyprina islandica* L.

An den steilen Abhängen des linken Weichselufers von Münsterwalde über Föhlitz, Besseln, Koscielitz bis Neuenburg finden sich die Schalen im blauen Sandmergel. Bei der an einzelnen Stellen oft starken Wellenlagerung der Sandmergel und Thonschichten liegt das Muschellager bald

nicht über dem Weichseispiegel, bald in halber Höhe des Stellen 80—150 Fuß hohen linken Weichseisufer.

Alle diese Muschelreste liegen südlich des preussischen Höhenzuges innerhalb einer Sandschicht des Diluviums, welche entweder der unteren Abtheilung desselben, dem Diluviallande, angehört oder doch durch Umlagerung, resp. als Rückstand aus einer dieser Schichten entstanden ist.

Auf Letzteres deutet die stets bemerkte Oberflächelage der Sandschicht innerhalb des 3 Meilen breiten, zwischen Thörn und Bromberg zu beobachtenden diluvialen Strombettes, dessen Sohle im Minimum 50 F. über dem heutigen Weichseispiegel zu suchen ist. Diese Sandschicht ist nördlich und südlich von Bromberg in verschiedenen Graden aufgedeckt; die zahlreichen Muschelreste finden sich namentlich auf der Pringenhöhe an Südwest-Ausgange der Stadt, 130 Fuß über dem Weichseispiegel.

Dieselben kleinen Schalen der Muschel fauna finden sich auch im Grand auf den Höhen bei Thörn am Jakobskopf (80 Fuß über der Weichsel) und nahe der russisch-polnischen Grenze bei dem Dorfe Gerniewitz. Alle diese Verbreitungspunkte sind auf der nehmehenden Karte verzeichnet.

Sämmtliche Arten der vorhin aufgeführten Marine-Diluvialfauna leben noch heutigen Tages in der Nordsee, nur zwei Arten (Nr. 2 u. 3) zugleich auch in der Ostsee und einige der andern (Nr. 5, 8 u. 9) als Seltenheiten in dem westlichen Theile derselben; von der letztgenannten Art unterscheiden sich die fossilen, wie die heutigen Nordsee-Exemplare durch auffällende Dickchaligkeit, so daß unsere westpreussische Diluvialfauna eine ganz entschiedene Nordseefauna ist. Prof. Lovén, der sich mit der Geschichte der Molluskenfauna des Nordens seit langer Zeit mit besonderer Vorliebe und Ausdauer beschäftigt hat, unterscheidet unter den fossilen Molluskenresten des skandinavischen Nordens drei Zonen:

1. Eismeer: baltische Formen,
2. Eismeer: Nordseerformen,
3. Nordsee: celtische Formen.

Lovén betrachtet die innere Ostsee, nördlich und östlich einer Linie, die von Schonen nach Rügen gezogen wird, als ein östliches Eismeer, das mit dem weissen Meere in direkter Verbindung stand und die Thierformen desselben in sich aufnahm. Die Fundstellen fossiler Schalenreste bei Stockholm und Upsala geben davon Zeugniß. Dann wurde die Ostsee im Osten, resp. Nordosten abgesperrt, das Süßwasser nahm überhand, die meisten ihrer arktischen Thiere gingen zu Grunde, Süßwasserthiere wanderten aus

den Flüssen in sie hinein, und zugleich, vielleicht langsamer, zogen, einige Thiere aus der Nordsee in die Ostsee.


Gleichzeitig mit dem genannten östlichen Eismeer war die Nordsee ein jedoch entschieden artenreicheres westliches Eismeer, dessen Fauna uns in den Muschelbänken von Udenwada an der schwedischen Westküste noch heute aufbewahrt ist.

Nach der Bildung des englischen Kanals wanderten neue Arten von Westen herein, wie sie in der Nordsee und bis in's Kattegat hinein noch leben und in den artenreicheren Lagern fossiler Muschelreste (Nordsee: celtische Formen) auf der Insel Ljörn (Lschörn) an der Westküste Stans dinavens aus jener Zeit enthalten sind.

Eine Vergleichung unserer westpreussischen fossilen Fauna mit diesen drei Zonen ergibt eine entschiedene Uebereinstimmung mit der zuletzt genannten, die auch der Zeit nach die letzte ist und bis in die Jetztzeit fortbauert. Somit könnte man sich leicht versucht fühlen, beide Faunen zu identifizieren und für gleichartig zu halten. Dem entgegen steht jedoch die Thatfache, daß die bei Thörn, Bromberg, Thörn u. s. w. gefundenen Schalenreste nur dem Diluvium, den eigentlichen Glacialbildungen angehören, während die skandinavischen Fundpunkte genannter Schalthiere sämmtlich der postdiluvialen oder postglacialen Periode zugewiesen werden müssen.

Zieht man aus den bisherigen Funden weitere Schlüsse, so gelangt man zu dem Resultat, daß die nordsee: celtische Fauna nur eine Wiederherstellung der Molluskenformen ist, welche am Anfange der Diluvialzeit das große, Norddeutschland, einen Theil von Rußland, das südliche Schweden, Fütland und die britischen Inseln bedeckende Meer bevölkerten, daß also gleichfalls schon mit dem atlantischen Ocean in Verbindung stand. Die Ausbildung eines westlichen und östlichen Eismeres mit seinen vorherrschenden arktischen Formen wäre somit nur eine der Eizzeit folgende Zwischenperiode, in der durch die abermalige Hebung des mit Nordfrankreich noch in festem Zusammenhange stehenden Englands und der ebenso mit Norddeutschland und verbundenen skandinavischen Halbinsel sich zwei nur mit dem nördlichen Eismere in Verbindung stehende abgeschlossene Meeresbecken bildeten, deren Molluskenformen dann wieder der heutigen Bevölkerung Platz machten.

Schließlich noch die Bemerkung, daß Dr. G. Berendts vor Kurzem ungefähr 1/4 Meile oberhalb Königsberg am Abhange zum Pregeltale in der Mitte des Dorfes Arnau marine Mollusken aufgefunden hat; sie gehören den Gattungen Pecten, Nucula, Venus u. s. w. an.



*Fundpunkte  
für die  
Diluvialfauna.*

I *Cardium edule* L., i ein *Strophodon* derselben. III *Tellina solidula* Pall.; VII *Venus virginea* L.; IX *Buccinum reticulatum* L.; X *Cerithium lima* Brug., a-c vergrößert, d natürl. Größe.

## Kleinere Mittheilungen.

### Aufnahmen über die Entstehung der Ringwälle an Basaltbergen.

Wenn ich die Steinwälle betrachte, welche so häufig die Basaltkegel verschiedener Gegenden ringförmig umgeben, so kommt mir immer wieder der Gedanke, dieselben könnten zum Theil durch Menschenhand entstanden sein. Nimmt man an, daß diese mauertartig aufgestellten Steinwälle, welche viele Basaltberge von kegelförmiger Gestalt ringförmig fast umgeben, durch Ansammlung der vom Gipsel herabgerollten und noch rollenden Steinblöcke entstanden seien, so müßte die Vorgegestaltung eine solche Anhäufung begründen, indem die steilen Wände in sanftere Abhänge übergeben, und es müßten sich solche Ringwälle an allen kegelförmigen Basaltbergen finden. Welches ist aber nicht der Fall. Wir begegnen solchen Steinwällen an so steilen Abhängen, daß man nicht begreift, wie die rollenden Felsentrümmer in ihrem mächtigen Haß an solchen Stellen liegen bleiben konnten. Aelter ist es Thatfache, daß viele Basaltkegel keimringförmigen Anhäufungen, sondern nur einseitig mächtige Trümmerfelder haben.

Man könnte allenfalls annehmen, daß die Basaltblöcke, welche den Ringwall bilden, nicht herabgerollt und an den betreffenden Stellen liegen geblieben seien, sondern daß sie noch ihren ursprünglichen Lagerplatz um den vielleicht dichteren Kern des Berges einnehmen, welcher natürlich an Regelbergen stets eine ringförmige Form annehmen muß. In diesem Falle wäre die Bedeutung von *Rantfängen* oder Schlammhöfen (hier letzter Name) durch amorphisches Wasser abgesehwennt und ausgewaschen worden. Allein, wenn man diese hebel übereinander liegenden Steinmassen ansieht, so kann man sich nicht denken, daß sie einst mit einem Vindemittel ausgefüllt gewesen sein sollten; denn die in Steinbrüchen aufgedeckten Lager zeigen nie so große Massen abgesehwennten Bodens in ihrer Verbindung. Dann möchte man auch fragen, warum so viele denselben Einschlüssen ausgefüllte Basaltberge in ihrer größten Ausdehnung mit einer Decke abgesehwennten Bodens bedeckt sind, während die fast nie fehlenden schwarzen Trümmerfelder an denselben Bergen ausbleiben, als wäre nie ein Staubboden darauf gekommen, was sogar durchaus möglich sein muß, denn sonst würden sie mit Moos und höheren Pflanzen bedeckt sein.

Alles Dieses erweckt, komme ich zu der Annahme, daß viele dieser Steinwälle wenigstens theilweise von Menschenhänden aufgeführt worden sein können, und zwar zum Schutze, um eine gegen Feinde und wilde Thiere gesicherte Wohnung für kleinere Völkergestaltungen zu schaffen. Dasselbe Schutzbedürfnis, welches die Pfahlbauten schuf, konnte auch die älteren Bewohner der Basaltberge zur Anlage solcher Befestigungen bringen. Man fand den ganzen Berg mit guten Basaltsteinen bedeckt (wie noch heute in allen Basaltgegenden) und baute an den Seiten der natürlichen größten mauerförmigen Anhäufungen weiter, bis die Ringmauer fertig war. Die mehrmals übereinander verkommenen Ringmauern konnten entweder Familiengruppen begrenzt oder auch als Außenwerke der Befestigung gedient haben. Zur Gewissheit würde diese Vermuthung allerdings

erst dann werden, wenn man beim Abräumen solcher Steinwälle Spuren menschlicher Thätigkeit auffände. H. Jäger.

### Ein zweites Erdbeben in Darmstadt.

Am 20. Januar, also acht Tage nach dem ersten (in Nr. 6 berichteten) fand in Darmstadt ein zweites Erdbeben statt. Aus glaubwürdigen Berichten geht hervor, daß mindestens eine bedeutende Erschütterung stattfand; Einige wußten sogar zu verschiedenen Tageszeiten mehrere wahrgenommen haben. Die eine bedeutende Erschütterung war um 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Nachmittags, eine zweite, von mehreren Zeuten beobachtete, um 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Abends; eine dritte will ein Beobachter um 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Abends, eine vierte ein anderer um 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Abends wahrgenommen haben. Wie viel an den drei letzten Abends ist, läßt sich nicht entscheiden; denn die Zinnettschöpfung hat bei der aufgeregten Bevölkerung offenbar eine wichtige Rolle gespielt, da die eine Haupterschütterung um 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr viele Leute so erschreckt hatte, daß sie in ihrem Jittern des Hauses ein Erbeben wähnten. Der Berichtsteller, Herr Heinrich Becker, war selbst nicht am Orte; er befand sich in dieser Zeit in Frankfurt und hat dort keine Spur von der Erschütterung wahrgenommen, obgleich er sich in einem sehr ruhigen Stadtviertel befand und wiederholt nach dem Wetter umfas, alle auf Erschütterungen der Art Acht hatte.

Die Haupterschütterung am 20. soll höchst gemein sein, als die am 13. Januar. Leute sind von Stühlen emporgeschleudert, Kinder von Stühlen herabgeworfen worden. Die Bewegung ging von Süd oder Südwest nach Nord oder Nordost, also ziemlich übereinstimmend mit dem Zuge des granitischen Kernes des Denwaldes. Ein Mann im Gefängnis will sie als senkrecht emporsteigend und dann wagsrecht verlaufend empfunden haben. Einige wollen ein unterirdisches Rollen, Andere ein überirdisches Säulen und Weisen bemerkt haben. Sie währte 4 bis 5 Sekunden; Einige wollen sie 8 bis 10 Sekunden lang gefunden haben. Rückengewicht rasselte, Stühlen erklangen, Möbel fiel von den Wänden; an den Eisenbahnbauten bei Traßlar rutschten sogar die Wägen herab. In Griesheim, 3 Stunden nördlich von Darmstadt, hat man die Erschütterung gleichfalls wahrgenommen; doch soll sie hier nach mehreren Beobachtungen nur 2 Sekunden gedauert haben. Ebenso wurde sie an mehreren Orten des Odenwaldes und in Haffenshausen bemerkt.

Auch aus andern Gegenden wird von Erbeben berichtet, die im Laufe des Januar stattfanden. So wurde in der Nacht vom 12. zum 13. Januar einige Minuten nach 1 Uhr in Köln ein Erbeben beobachtet, der gleichfalls von Süd nach Nord ging, wie in Darmstadt, aber schwächer war als dort. Ferner wurde am 1. Januar Mittags 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr am Malarsen an Schwaben, bei Stoeckheim und Upsala ein heftiges Erbeben beobachtet. Ähnlich fand in Calcutta am 13. Januar ein bedeutendes Erbeben statt, das seine stärksten Wirkungen bis an den oberen Bramaputra und durch das ganze Gebiet von Assam bis nach Tilißpur erstreckte. Doch trug der Gleichzeitigkeit ein Zusammenhang mit den in Darmstadt verspürten Erbeben nicht annehmen an, verstreut sich von selbst. C. H.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 35 Ggr. (s. 30 Kr.)

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verlag: Scherff'sche Buchdruckerei in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 12.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

**24. März 1869.**

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt **durch die Post** beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das **Abonnement für das nächste Vierteljahr** (April bis Juni 1869) **ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß**, da sonst die Zufendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unsrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1868, in gefälligen Umschlag gebestet, noch zu haben sind.

Halle, den 24. März 1869.

**Inhalt:** Baker's Reiseverk., von Karl Müller. Größer Artikel. — Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen, von G. Bährig. — Die Sammlungen der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft. — Gesunde Luft, von Otto Me. Größer Artikel. — Literaturbericht. — Literarische Anzeige.

## **Baker's Reiseverk.**

Von Karl Müller.

Größer Artikel.

Ich habe in der letzten Zeit nichts so spannend-Interessantes gelesen, als den Bericht von Samuel White Baker über seine Entdeckung der westlichen Nilquelle. Er betitelt sich: „Der Albert-N'ganga, das große Becken des Nil und die Erforschung der Nilquellen“, und ist soeben in zweiter, wohlfeiler Volksausgabe, ein Band von fast 500 Seiten Umfang, für den beispiellos billigen Preis von 1 Thlr. 20 Sgr. bei Her-

mann Costenoble in Jena erschienen, von 33 prächtigen Illustrationen in Holzschnitt von Baker's eigener Hand, und einer Situationskarte begleitet. Ueber der ganzen Darstellung liegt ein solcher Reiz ausgebreitet, daß ich den dicken Band nicht eher wieder aus der Hand legen konnte, als bis ich mich an der Hand von Baker und seiner staunenswerth mutigen Gattin durch die furchtbaren Wildnisse Centralafrika's bis zum Albert-N'ganga



und wieder zurück bis nach Aegypten, hindurchgemunden hatte. Von Anfang bis zu Ende hält dieses Interesse an, und es ist darum geradezu ein Verdienst Costenoble's um die deutsche Literatur, daß er diesen Reisebericht in einer autorisirten Ausgabe dem deutschen Volke gab. Die große Entdeckung, um die es sich hier handelte, das Ziel von Jahrhunderten, ist aber so bedeutungslos, daß Jeder dieses Buch einmal gelesen haben sollte. Ich sehe darum nicht an, es unserm Leserkreis als das Eindringlichste zu empfehlen, weil ich überzeugt bin, daß das Buch die Kenntnisse des Lesers außerordentlich vermehren, seinen Gesichtskreis in ethnologischer Beziehung höchst bedeutend erweitern, sein Gemüth durch das Dramatische der Erlebnisse und der Darstellung ebenso erschüttern wie befehligen wird.

Ich habe das Buch auf meine Weise gelesen; und da diese Weise vielleicht dazu beitragen kann, den eigentlichen Kern des Inhaltes klarer hervortreten zu lassen, als das bei der Uebersetzung des Stoffes und bei der Erzählung von, tausend traurigen oder freudigen, das Interesse des Lesers an sich schon so sehr beanspruchenden Begebenheiten der Fall sein kann: so wird es unser Leserkreis sicher nicht unfreudig aufnehmen, wenn ich ihm dieser eine kleine Blumenlese aus dem Buche gebe, die, auf höchst geritzte Netzen gegründet, planmäßig einen einzigen Gesichtspunkt festhält. Dieser Gesichtspunkt ist darauf berechnet, eine Vorstellung von Land und Leuten in so kurzen Zügen zu geben, daß der hauptsächlichste Charakter der von Baker durchreisten Länder des Weissen Nil zur Erscheinung gelangt. Ich fühle mich hierzu um so mehr angetrieben, als Baker, wie er selbst gesteht, leider kein Botaniker war, der mit der Beobachtung des Charakteristischen auch den Einblick in das Specifische verbunden hätte. Diesen Mangel durch anderweitige Studien, soweit es die Sache zuließ, zu beseitigen, war eine hauptsächlichste Nebenaufgabe meiner Blumenlese. Möge sie daher wie eine kritische Einleitung zu der Lectüre des Reiseberichtes betrachtet werden!

Es war am 18. December 1862, als Baker seine Reise von Chartum aus auf dem Weissen Nil antrat. Doch gedenkt er erst 8 Tage später der Ufervegetation, welche aus Mimosenwäldern besteht. Nach ihm sind es die „Euntbäume“ oder *Acacia arabica*; nach Schweinfurth heißen dieselben aber „Ssant“ und stammen von der *Acacia nilotica*, deren Frucht man Ssarat (nicht Garra) nennt und ebenso vorzüglich zum Gerben wie zum Braunsärfen benutzt. Der Baum, bis nach Unterägypten verbreitet, wo er überall an Wegen und Dörfern angepflanzt ist und zu einem sehr stattlichen Baume mit schwerem, ebenholzartigem Holze empor wächst, erreicht hier nur eine Höhe von 35 F. und 18 p. im Durchmesser. Wie mir durch Barth erfahren, kommt diese Acacie unter dem Namen Gherred auch im südlichen Sudan, in Adamaua, häufig vor und rettete diesen berühmten Reisenden durch seine Tanninreiche Frucht vor der gefährlichen afrikanischen Ruhr. „Wenn sie in

vollem Laube stehen, gewähren sie aus der Ferne einen guten Anblick; kommt man aber näher heran, so sieht man, daß der Wald ein trostloser, vollständig überschwemmter Sumpf ist. Aus dem flagnenden Wasser ragen eine Menge umgefallener, abgestorbener Bäume hervor; hier und da sitzt ein einsamer Kranich auf den verfaulten Zweigen; zwischen den versunkenen Stämmen und Ästen hängen in der Regel treibende Wasserpflanzen, massenweise aufeinander gebauft und grüne schwimmende Inseln bildend. Dann und wann kommen dieselben mit dem trägen Strome langsam herabgetrieben, gespenstähnlich Störche tragend, die so auf Naturflüssen aus unbekannten Ländern eine Reise machen. Es ist eine vom Fieber heimgesuchte Wildniß — die Strömung beträgt nicht über eine Viertelmeile in der Stunde; — das Wasser hat eine Farbe wie eine Pferde-schwemme: ein Himmel für Mosquito's, für den Menschen aber eine dämpfige Hölle.“

Jenseits dieser überschwemmten Mimosenwälder nimmt das Land den sandigen Charakter des Sudans an und bedeckt sich mit bornigem Akitur-Gebüsch. Arabisch heißt es nach Schweinfurth eigentlich Kitter oder Lekter und gehört der *Acacia mellifera* an. Mit Ausnahme Aegyptens und des nördlichen Nubiens, erscheint sie, eine der verbreitetsten Arten, im ganzen Nilgebiete und bildet dicke Bosquets, welche einer halbgrasigen Form zuströmen. Sie auch ist es, die durch ihre spigen und harten, in Form eines Halbkreises getürmten Doppelschalen eines der undurchdringlichsten Gebüsche für den Reisenden erzeugt; um so mehr, als die Dornen fest an ihren Zweigen haften.

In dem Flusse selbst werden jene schwimmenden Inseln, von denen vorhin gesprochen wurde, immer zahlreicher, je weiter man den Weissen Nil aufwärts zieht. „Es gibt hier eine Pflanze (*Pistia stratiotes*), die einem kleinen Kohlkopf einigermaßen ähnlich ist und allein auf dem Wasser treibt, bis sie einen Kameraden trifft. Diese vereinigen sich alsdann, werden, je weiter sie schwimmen, immer mehr an und bilden unter Umständen Massen von vielen Tausenden, die sich mit andern Arten von Wasserpflanzen und Treibholz vermischt, bis sie endlich schwimmende Inseln bilden.“ Diese Thatfache war schon den älteren Botanikern bekannt; denn sie wußten, daß die Pistie bis nach Pelusium in Aegypten getrieben werde, aber dort nicht mehr blühe. Nur ist es nicht die *Pistia stratiotes* L., sondern es sind im oberen Nilgebiete zwei verschiedene Arten, die jene salatartigen schwimmenden Kisten bilden (*P. aethiopica* und *africana*). An und für sich sind sie der Supercativ der Meerlinsen, zu deren Verwandtschaft sie gehören, riesige Formen der Lemnaceen, welche auf allen tropischen Gewässern als wahrhafte Charakterpflanzen wiederkehren. Im Sudan ist die Pistie unter dem poetischen Namen „die helmatlose Fanna“ — gleichsam das Wasser-mädchen — bekannt, weil sie, von jedem Windhauche von Ort zu Ort getrieben, ohne festen Wohnsitz ist. Da sich aber durch

lange Ausläufer mehrere solcher Rassen an einander heften, so treiben immer ganze Colonien über die Fluthen dahin. In dieser Art ist sie auf dem Irtasir eine wohlbekannte Pflanzenform. Livingstone erwähnt sie auch am Zambezi im tropischen Südafrika, wo sie von den Portugiesen die *Asiacina* genannt wird; mit Wasserlinsen (*Trapa*) und Lotus zugleich verbindet, ist sie dort ebenfalls eine Charaktereigenthümlichkeit. Auf dem Weißen Nil wird sie aber mehr. Denn da sie wie ein Pflanzenfloß, dessen Segel die großen Blattoeffnungen sind, dem Winde keinerlei Widerstand entgegensetzt, so vereinigt sie sich leicht zu schwimmenden Inseln, die auf ihrer Flucht alle übrigen Wasserpflanzen, besonders die schwimmenden, mit sich fortreißen, bis endlich der Fluß in seinem trägen Laufe über und über zu einer Pflanzeninsel geworden ist. Diese Hilse besteht die Pflanze aus Pflanzen mit Schwimmbläschen (*Utricularia stellaris* und *inflexa*), aus leicht schwimmenden Kryptogamen (*Azolla nilotica*, *Massilea nubica* und *rotundata*), aus Wasserpflanzen mit stehenden Stängeln (*Ceratophyllum demersum*, *Najas graminea*) oder aus Pflanzen mit stehenden Blättern (*Nymphaea coerulea*, *stellata*, *Lotus* und *capensis*, *Limnanthemum niloticum*) u. A. Das sind vorzüglich die interessanten Wasserpflanzen, von denen Baker (S. 34) spricht, ohne sie benennen zu können.

Doch wäre mit dieser Inselformation des Stromes nur eine schöne Abwechslung gegeben, wenn es bei dieser treibenden Pflanzendecke bliebe. Allein sie bildet, wie sich bald zeigt, nur den Aufzug eines schon in Entwicklung begriffenen Teppichs, dessen Einschlag ganz andere Pflanzenformen sind. Es liegt nämlich auf der Hand, daß, wenn jener Aufzug ein dichter geworden ist, er wie ein Filter wirken und folglich so viel Schlammtheile in sich niederschlagen wird, als er bei der Ruhe des Stromes und seiner eigenen Dichtigkeit aufnehmen kann. Augenblicklich bringen vom Ufer her mannigfache Sumpfpflanzen vor und zwar um so leichter, als sie durch wandernde Sumpfvögel und Treibholz in großer Zahl herbeigeführt werden. Obenan stehen die Gräser: Rohr (*Arundo inisula*), Reis (*Oryza punctata*) und Zuckerrohr (*Saccharum negypticum*). Letzteres ist ohne Zweifel dasfele Gras, welches aus Baker als Zuckerrohr so vielfach bezeichnet. Ebenso drängen sich hohe Stoppelgräser vor: vor allen der Papyrus und eine verwandte Art (*Cyperus radiatus*). Selbst Rohrkolben (*Typha angustifolia*) treten hinzu und bilden nun mit den vorigen eine Hochvegetation, in die sich wiederum andere Pflanzenformen vergierend weben: Farnkräuter (*Ceratopteris thalictroides*), welche an den Sumpf gebunden sind und kaum an die Farnwelt erinnern, Nachtkergenanartige (*Jussieu repens*), welche unsere kriechenden Kosiachien oder unsere Gnarbiden vertreten, selbst schwimmende Kräuter aus der selben Familie der Nymphen (*Neptunia oleracea*), Pfeilkrauter (*Sagittaria cordifolia*) u. A. Sogar Kletterkräuter erscheinen,

binden, aber aus der Gattung der Ipomaea (*I. reptans* und *asarifolia*), welche Baker als *Convolvulus* bezeichnet.

Unter ihnen allen hat jedoch der Ambatsch die größte Berühmtheit erlangt. Durch einen häßlichen Fehler in Baker's Reiseverke ist diese merkwürdige Pflanze *Anemone mirabilis* genannt worden. Es soll *Aedemone* heißen, wie Kotschy sie nannte; in Wahrheit ist sie aber eine schon länger bekannte senegambische Pflanze, die *Hemimera Elaphroxylon*. Der letzte Name (Reichholz) gibt auch ihre Eigenthümlichkeit an; denn sie ist es, welche in der Pflanze jenes merkwürdige Schwimmholz liefert, das man geradezu einen geborenen Rachen oder besser ein geborenes Floß nennen kann. Das specifische Gewicht ihres Holzes liegt noch über dem des Korkes und macht es somit zu einer Art vegetabilischer Schwimmblase, von welcher man einen ganzen Stamm bequem unter den Arm nehmen, und leicht überallhin transportieren kann. Der Baum treibe gegen 20 f. hohe Stämme von der Dicke eines Menschenleibes und bedeckt sich, da er zu den Euphorbiaceen (*Ebofaren*) gehört, über und über mit heßigen Schmetterlingsblüthen, die das Melancholische der einseitigen Schwünge wesentlich mildern. Auch er geht bis zum Albert-N'panga, auf welchem ihn die Eingeborenen zu Flößen benutzen, auf denen sie ihre Anker für die großen Fische und für die Nilperde besessigen. Nur in der verwandten Schamblume Indlens (*Aeschynomene aspera*) hat der Baum einen Concurrenten, der mit ihm an Leichtigkeit des Holzes alle übrigen Hüter des Gewächereichs übertrifft; eine Eigenschaft, welche die Chinesen zur Bereitung ihres Reis- oder Blumenpapiers sinnig benutzen. Die mit dem Ambatsch manchmal verbundenen, von Baker (S. 43) erwähnten goldregemartigen Sträucher scheinen der *Cassia absus*, die Kürbisse, deren Samen in einem Faserne liegen, zu der Koloquinte zu gehören.

Krokodil und Nilpferd begleiten diese Vegetation bis zum Albert-N'panga, d. h. von Chartum gerechnet über 15 Breitgrade bis zum Äquator. Selbstverständlich tritt sie nur auf tragem Wasser auf, und dieses findet sich überall, wo der Weiße Nil schiffbar ist: von Chartum bis Gondokoro unter 4° 55' n. Br., dann sieben Tagesreise südlich von dieser Section der Schifffahrt, von wo aus Fahrzeuge direkt bis zum Albertsee hinauffahren können. Selbst in den Buchten dieses colossalen Nildeltas ist sie vorhanden, ebenso auf den Sümpfen längs des Weißen Nil, am bedeutsamsten aber in dessen unteren Theilen. Ueberall kann sie so dicht werden, daß man, ohne tiefer wie bis zum Knöchel zu versinken, über sie zu waten vermag. Was sie unter diesen Umständen für den Fluß werden kann, ist klar. Als Baker von seiner Reise zurückkehrte, hatte sich eine solche Pflanzenbarriere dieses der Ränderung des Bahr el Sagal auf dem Weißen Nil gebildet, die, 3 Stunden breit, den Fluß buchstäblich in zwei Theile geschnitten und

dieser vor ihr plötzlich aufhörte. Sie war bereits in eine solche Landbildung übergegangen, daß Schiffe, welche hier eine Menge Leute an der Pest verloren, ihre Toten in dem furchtbaren Dämme begraben hatten, während der Fluß jenseits der Barre filtrirt und geklärt weiter strömte.

Schon diese Massenvegetation wirft ein helles Licht auf die eigenthümliche Natur des oberen Nillandes. Wenn man jedoch weiß, daß der Strom auf weite Strecken zwischen flachen Ufern liegt, so hat man auch sofort eine Vorstellung von den Folgen. In der That, selbst an der Mündung des Bahr el Gajal (Gafal) ist der Fluß nur ein Fesseln von Marschen, von flugntendem Wasser, das von Binsen und Ambatschgebüß so bewachsen ist, daß man erst einen Kanal für die Durchfahrt der Boote lichten muß. Und hoch hat diese Mündung eine Ausdehnung von etwa 3 Meilen Länge und einer Meile Breite, so daß sie eher das Aussehen eines See's, als eines einstömenden Flusses hat. Dazu kommt noch, daß das Land an vielen Stellen nichts als eine ungeheure Ebene mit unbedeutenden Einsenkungen ist, die während der nassen Jahreszeit ausge dehnte Ger'n, während der trocknen halb ausgetrocknete Marschen bildet. Hier kann nur ein ununterbrochenes Wachstum stattfinden. Seine Folge ist eine Graswüsth, ein Dschungelland der großartigsten Ausdehnung, aber auch eine Fieberzone von derselben Intensität. Kein Wunder, sagt Baker, daß die Alten die Erforschung des Nil aufgaben, als sie an die zahllosen Windungen und Schwierig-

keiten dieser Marschen kamen; der Fluß gleicht einem verwirrten Gebind Arnen. Das hierdurch erzeugte Gefühl ist eine unbeschreibliche Schmerztheit; „der Weiße Nil ist ein wahrer Stör.“ Im Ganzen betrachtet, würde das Land mit dem Begriffe unserer norddeutschen Luch's und des Spreewaldes zugleich zusammenfallen. Der ewige Refrain Baker's lautet: Marschen, Sumpflust, Mosquito's, Elend, wo daumlose Rumpfe auf ungeheure Strecken hin die Herrschaft führen. Nur Krokodile und Nilpferde leben hier in Herrlichkeit, auf trocknere Stellen Elephanten und Kaffer-ochsen, selten anderes Wild, auf welches die Jagd ungemein schwierig ist. In dieser feuchten Atmosphäre gedeihen weder Weintrauben noch Granatapfel; selbst die Datteln blühen nur, ohne Früchte zu tragen, wo sie, wie in den Gärten der Missionarstationen, angepflanzt sind. Die einzigen trocknen Stellen sind in der Regel die Termitenhügel, welche von ihren Bewohnern so hoch aufgeführt sind, daß sie zur Zeit des Hochwassers in den oberen Stodwerken leben können. Auf Düngerhügeln aufgezogenes Rohr liefert den Eingeborenen den einzigen Schatten in der furchtbaren Sonnengluth.

Erst vor Gondokoro (4° 55' n. Br.) ändert sich diese Physiognomie des Landes; die Marschen haben trockenem Boden Platz gemacht, die Ufer liegen etwa 4 F. über dem Wasserspiegel und bekleiden sich augenblicklich mit Wald, während die Umgegend das Ansehen eines Obstgartens hat und dicht bevölkert ist.

## Die geognostischen Untersuchungen in der Provinz Preußen.

Von C. Bänig.

### 6. Die Sammlungen der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft<sup>1)</sup>.

Die Gesellschaftsammlungen sollen „ein Gesamtbild von der geologischen Beschaffenheit der ganzen Provinz geben“ und zerfallen nach der Gestalt des Bodens und seinem Inhalte in vier Abtheilungen.

Die erste Abtheilung, ein recht nationales Werk, bildet die Bernsteinammlung; die zweite umfaßt die Schichtungen der Bernstein- und Braunkohlenlager; die dritte verfolgt den Zweck, durch eine umfassende Reihe von Erdsproben aus den Zerküschichten und dem Diluvium als Leitfaden für die geologischen Untersuchungen zu dienen; und die vierte hat es sich als Aufgabe gestellt, die Geschiebe der Provinz mit ihren zählreichen sie begleitenden Bernsteinungen in einer übersichtlichen Zusammenstellung zu vereinigen.

1. Die Bernsteinammlung bestand bis zum J. 1864 aus 1179 Nummern, wurde bis Ende 1865 durch reiche Geschenke und werthvolle Ankäufe bis auf 9517 Nummern vermehrt und umfaßt heute außer 275 noch nicht ausran-

girten Stücken 10,228 Nummern. Durch Umfang und Inhalt steht diese Sammlung jetzt schon den wenigen andern größeren Sammlungen<sup>2)</sup> der Art ebenbürtig zur Seite und enthält ein reiches Material für die wissenschaftliche Forschung. Neben dem Sammeln der Bernsteinobecte lag es der Gesellschaft ebenso sehr am Herzen, auch für die wissenschaftliche Untersuchung des aufgespeicherten Materials Sorge zu tragen. Die vielen Hindernisse, welche diesem Streben bisher wegen der Schwierigkeit der Objekte, die nur von den vorzüglichsten Zoologen und Botanikern beherrscht werden, im Wege standen, sind zum Theil überwunden; Prof. Gustav Mayr in Wien wird in den nächsten Monaten eine größere Arbeit über die Bernstein-Ameisen dem Drucke übergeben. Außerdem hat Director Loez die Bernstein-Dipteren (über 6000 Nummern) nach Familien und Gattungen bestimmt und der ganzen Sammlung dadurch einen erhöhten Werth verliehen.

<sup>2)</sup> In Danzig von Berendt und Menge, im geologischen Cabinet zu Berlin von Lohm.

<sup>1)</sup> Gustos der Sammlungen ist Dr. H. Denicke.

Erwähnenswerth bleiben noch 1) eine Sammlung altpreussischer Bernstein-Corallen aus dem Boden Samlands (über 500 Stück) und 2) eine Sammlung bearbeiteter Bernsteinstücke (110 Nummern) von sehr altem Datum, die durch die Bagatungen der Herren Stantien und Becker bei Schwarjort im kurischen Haff zu Tage gefördert wurden.

2. Die Erbschichten der Bernstein- und Braunkohlenslager sind mit ihrem reichhaltigen Gefolge an fossilen Resten geordnet und illustriert die Arbeiten des Prof. Zaddach über das samländische Tertiärgebirge. Das vorige Jahr brachte allein 600 Erprobren (öfter ganze Profile), die in einem besonderen Schranke aufgestellt, von den Zaddach'schen Profilarten begleitet, Gelegenheits geben, mit dem Buche in der Hand die ganze Formation der samländischen Küste zu studiren. Diese Erprobren werden auch dann noch Zeugniß ablegen, wenn die dem raschen Wechsel jener Küste die lokal sichtbaren Verhältnisse sich geändert oder der Beobachtung ganz entzogen haben werden. Auch wurden die fossilen Blätter und Früchte aus den Braunkohlensletten bei Rauschen und Krastepeln gesammelt. Professor D. Heer in Zürich hat die Bestimmung und Beschreibung der Pflanzen der Tertiärformation übernommen. Seine Arbeit wird in kürzester Zeit von der Gesellschaft publicirt werden und verspricht ein um so bedeutenderes Resultat zu geben, als er inzwischen eine große Arbeit über die Tertiärfloora der hochnobrischen Länder demnächst hat und dadurch in den Stand gesetzt ist, manche Eigentümlichkeit der preussischen Braunkohlensflora zu erklären.

3. Die Erprobren, 300 Nummern aus der Tertiärformation, dem Diluvium und Alluvium, geben die Grundlage zu der Karte des Dr. S. Berendt; sie gewähren eine vergleichende Uebersicht vom obersten Humus bis zur Braunkohlen- und Bernsteinformation.

4. Die Sammlung der Gesteine unserer Provinz befindet sich noch in den Anfängen; sie war bisher nur auf die Beiträge und Theilnahme der Gönner der Wissenschaft angewiesen.

Auch hat das Kgl. Oberbergamt in Breslau die Sammlungen durch Zufendung eines höchst werthvollen Vergleichungsmaterials aus Schiefen bereichert, namentlich 1) durch eine Partie Blattabdrücke aus den die Braunkohle überlagernden Thon-schichten von Grünberg; 2) durch Gesteins- und Kohlenproben aus Laudan, Löwenberg u. s. w.; 3) durch eine Sammlung von Blattabdrücken aus den Thonlagern von Schöpsin und 4) durch verschiedene Braunkohlenproben und fossile Hölzer aus den schiefschen Gruben.

Schließlich haben wir noch der Gesellschaftsbibliothek zu gedenken, welche im J. 1859 etwa 1300 Bände zählte, unter denen aber die naturwissenschaftlichen Gesellschaftsschriften fast gänzlich fehlten. Um diesem Mangel abzuheben, wurde die Herausgabe der Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft begonnen, welche die naturwissenschaft-

lichen Beziehungen der Provinz vertreten und gleichzeitig als Lauschojekt mit andern naturwissenschaftlichen Gesellschaften dienen. Unsere Gesellschaft steht jetzt mit 202 naturwissenschaftlichen Gesellschaften und Herausgebern von naturwissenschaftlichen Zeitschriften über den ganzen Erdkreis im Lauschoverker. Es bringt dieser literarische Verkehr der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft jährlich über 200 Bände naturwissenschaftlicher Zeitschriften, von denen sehr viele gar nicht im Buchhandel zu haben sind, von gegen 1000 Jhr. Werth ein. Anfang 1868 zählte die Bibliothek 3946 Bände, von welchen 2021 den periodischen Zeitschriften angehören. Diesen großartigen Aufschwung verdankt die Gesellschaft ihrem Schriftführer für das Ausland und Bibliothekar Prof. Dr. K. Caspar, welcher mit dem hingebendsten Interesse für die Sache in seltenem Grade die Energie und Befähigung verbindet, die Akademien und gelehrten Gesellschaften aller Erdtheile mit ihr in Verbindung zu bringen.

Wir sind am Ende unser Mittheilungen. Die Resultate 3 1/2 jähriger Arbeiten — dies müssen wir mit Zug und Recht anerkennen — stehen, vom industriellen und landwirthschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, in dem richtigen Verhältnisse zu den aufgewendeten Mitteln und werden der Provinz Preußen in kürzester Zeit neue und lohnende Erwerbsquellen eröffnen. Der Wissenschaft haben die Arbeiten reichen Gewinn gebracht und die besten Früchte getragen. Wir erinnern hier nur an die Lösung der Frage nach dem Vaterlande des Bernsteins, die seit Jahrhunderten von vielen Gelehrten angesetzt und besprochen wurde, ohne endgültige Entscheidung gefunden zu haben. Wichtige und interessante Arbeiten über die von dem Bernstein eingeschlossene Fauna (von G. Mayr in Wien) und die Tertiärfloora (von E. Heer in Zürich) stehen in Aussicht.

Mögen der überaus rührigen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft, die mit richtigem Takte sich eine nach beiden Seiten — der Industrie und Landwirtschaft auf der einen, der Wissenschaft auf der andern Seite — hin lohnende Thätigkeit erwählte, lange noch, wie bisher, die reichen Mittel, die zur Fortsetzung der Arbeiten nothwendig sind, zufliessen, damit ein Werk zur Vollendung gelange, auf das sie mit Recht stolz sein darf! — Möge aber auch das gebildete Publikum unserer Provinz, wie ganz Deutschlands den erscheinenden und noch erscheinenden Werken die rechte Theilnahme zeigen, wie sie dieselben in hohem Grade verdienen. So fördern wir Alle dann ein zwar in seinen Grenzen provincielles, aber der Art und Weise seiner Ausführung nach echt nationales Werk, das auf's Neue der deutschen Thatkraft und Ausdauer, der deutschen Gründlichkeit, dem deutschen Forschergeiste, den deutschen Männern der Wissenschaft auf der Schwarte deutscher Cultur ein rühmliches Denkmal für alle Zeiten setzt.

## Gesunde Luft.

Von Otto Ull.

Schärer Artikel.

Obwohl man die Nothwendigkeit frischer Luft für unsere Gesundheit kennt, wird doch noch im Allgemeinen beim Bau unserer Wohnhäuser, wie öffentlichen Gebäude wenig Rücksicht darauf verwendet, und wo man es thut und durch künstliche Ventilations-einrichtungen zu Hilfe zu kommen sucht, sind irrige Anschauungen nur zu oft schuld, daß nichts oder selbst das Gegentheil dadurch erreicht wird. Man kann sich noch nicht von der Vorstellung lösen, daß unsere Wohnräume wirklich geschlossene Räume seien, deren Luft bei geschlossenen Thüren und Fenstern außer Verbindung mit der äußeren Atmosphäre sei, wenn man nicht besondere Wege dafür herstellt. Man glaubt dann das Aeußerste gethan zu haben, wenn man ein verdichtetes System von Kanälen für die ein- und abgehende Luft einrichtet. Die Erfahrung hat längst gezeigt, daß solche Einrichtungen völlig nutzlos sind. Selbst wo man die verdorbene Luft durch gedielte Essen auffangen ließ oder durch mechanische Kraft Luft in das Innere eines Gebäudes eintrieb, zeigte sich, daß durch die künstlichen Zuführungskanäle die inneren Gebäuderäume nur den kleinsten Theil der frischen Luft erhielten, daß in vielen Fällen sogar 14 Mal so viel Luft auf andern Wegen, durch Thüren und Fenster und Mauern Zutritt fand. Ja, es zeigte sich sogar, daß sich die Luft in den Abzugskanälen gar nicht einmal immer in der bradichtigten Richtung in's Freie, sondern gerade umgekehrt gegen das Innere der Gebäude bewegte. In dem Münchener Gebirgshaus, wo man Abzugskanäle vom Fußboden aus nach dem jeden Saal heizenden Ofen angelegt hatte, zeigte sich, daß unter 100 Fällen der Beobachtung 24mal der Apparat wirkungslos war, 17mal sogar ein entgegengesetzter Zug stattfand, statt der frischen Luft also die verdorbene Luft eines Krankenzimmers in das andere geführt wurde. Die Porosität der Wände übertrug und umbeugte in den meisten Fällen der Nothwendigkeit, besondere Oeffnungen für die Zustromung frischer Luft und die Abführung der gebrauchten herzustellen. Sorgen wir nur dafür, daß die erforderliche Menge frischer Luft in die Gebäuderäume eingetrieben wird, so können wir uns die kostspieligen Entlüftungskanäle ersparen, und selbst wo eine zu große Dichtigkeit des Baues die natürliche Ventilation erschweren sollte, würde die einfachste, in's Freie mündende Oeffnung besser sein, als daß man die verbrauchte Luft auf verwickelten Wegen im Hause spazieren führt und sich dadurch der Gefahr aussetzt, daß es ihr auch einmal einfallt, unterwegs umzukehren und sich in unsere Zimmer, statt zum Dache hinaus zu begeben.

Wir können von vornherein die Behauptung aufstellen, daß überall, wo es einer befähigten und reichen Zufuhr

frischer Luft bedarf, also in Krankenhäusern, Kasernen, überhaupt Räumen, in denen sich eine große Zahl von Menschen dauernd aufhält, es nicht genügen wird, diese Zufuhr durch die natürliche Bewegung der Atmosphäre in Folge der Temperaturdifferenz zwischen der äußeren Luft und der in den Gebäuderäumen eingeschlossenen bewirken zu lassen. Will man in Wohnräumen oder sonst die natürliche Ventilation unterstützen, so genügen die bekannten Windrädchen, und noch besser empfiehlt sich eine Einrichtung, bei welcher man statt einer Fensterreihe zwei Glasplatten von etwa 36 Quadratfuß Fläche anbringt, die oben und unten mit Belassung eines Zwischenraums von etwa  $\frac{1}{4}$  Zoll zwischen beiden Platten so übereinander gelitten sind, daß die Luft an beiden Seiten durch kleine, etwa 2 Linien breite Lücken an den Rahmen bequem einströmen kann, ohne einen irgend bemerkbaren Zug hervorzubringen. Daß die warme Luft des Zimmers dabei etwa mit entweichen möchte, hat man keineswegs zu befürchten, so lange Feuer im Ofen brennt, das ja beständig frischer Luft bedarf und diese nur dem Zimmer entnehmen kann, so daß wohl Luft von außen in das Zimmer eintreten, aber niemals nach außen entweichen kann. Wenn übrigen Windrädchen nicht immer ihre Pflicht zu thun scheinen, so liegt das in der Regel nur daran, daß sie zu klein sind. Man vergißt, daß jedem Menschen in einem Zimmer wenigstens 2500 Kubikfuß frischer Luft in der Stunde zugeführt werden müssen, und daß also etwa in einem Restaurationslocal, in welchem sich 20 Menschen beständig aufhalten, eine Oeffnung von zwei Fuß Länge und ein Fuß Breite erforderlich sein würde, um der nöthigen Luftmenge Eingang zu gewähren.

Sehr gemächlich hält man für die beste Ventilation diejenige, welche durch den Zug der Kamine vermittelt wird. Aber auch damit sieht es bei näherer Betrachtung übel genug aus. Die Trägheit des Kaminis ist offenbar von der innen und außen herrschenden Temperatur abhängig und ändert sich darum mit jeder Schwankung derselben. Man hat gewöhnlich eine ganz falsche Vorstellung von der Wirkung der Kamine. Man denkt dabei gar zu gern an ein förmliches Auffaugen, als ob etwa die wärmere Luft in ihrem Bestreben, aufwärts zu steigen, gewissermaßen einen leeren Raum erzeuge, in welchen nun die untere Luft wie durch einen Blasbalg eingesogen werde. Davon kann nach den bekannten Gesetzen der Physik keine Rede sein. Die wärmere und leichtere Luft folgt so gut dem Zug der Schwere, wie die kältere und schwerere. Ein Aufsteigen leichterer Luft in schwererer findet nicht in Folge eines besondern Bestrebens der ersteren statt, sondern einfach, weil eine Säule leichterer Luft einer gleichen Säule schwererer

nicht das Gleichgewicht zu halten vermag und daher von ersterer in die Höhe gedrückt wird, gerade wie Oel im Wasser aufsteigt. Die bewegende Kraft bei dem Zuge der Kamine rührt also lediglich von einem Uebergewicht der kälteren Luftsäule her oder ist die Folge des ungleichen Gewichtes zweier umgebend mit einander communicirender Luftsäulen. Je wärmer und leichter die Luft im Kamin, desto lebhafter wird die Bewegung. Freilich müssen wir bedenken, daß der Druck der Atmosphäre ein allseitiger ist, daß sich also, wenn einmal das Gleichgewicht der Luft durch die Gegenwart kalter und warmer Luftsäulen gestört wird, das Uebergewicht der kälteren und schwereren Luft überall geltend macht, wo sie mit der wärmeren und leichteren zusammentrifft. Deshalb wird auch hier wieder die Porosität unserer Baumaterialien von großer Bedeutung. Ist ein Kamin aus einem sehr porösen Material erbaut, so findet die Ausgleichung des gestörten Luftgleichgewichts auf der ganzen Länge desselben durch das Mauerwerk hindurch statt, und der von unten eintretende Luftstrom ist viel geringer, als bei einem Kamin aus weniger porösem Material, bei welchem die Ausgleichung ausschließlich durch den Koff und den Feuerraum vor sich geht. Daraus erklärt sich auch, warum fensterte Kamine, welche mit mehreren horizontalen oder geschweiften Kaminen in Verbindung gesetzt werden, häufig eine so ungenügende Zugkraft besitzen. Jedemfalls muß solchen Kaminen eine für ihre Leistung ganz unverbhältnismäßige Höhe gegeben werden, wenn man sie nicht aus ganz luftdichtem Material ausführen kann.)

Bei der Abhängigkeit, in welcher man sich bei einer solchen Ventilation durch Zugkamine den veränderlichen Zuständen der Atmosphäre gegenüber befindet, hat man es nicht bloß nicht in der Gewalt, zu allen Zeiten die erforderlichen Luftmengen in Gebäuderäume einzuführen, sondern vermag auch nicht einmal immer die Wege zu bestimmen, auf welchen die Luft zuströmen soll. Da die Luft durch alle Oeffnungen nach den mit dem Zugkamine zusammenhängenden Räumen drückt, so wird die Menge der auf zufälligen Wegen durch Thüren, Fenster, Wände ic. zuströmenden Luft in der Regel weit beträchtlicher sein, als die der auf den vorgeschriebenen Wegen einströmenden. Schöpfen diese zufälligen Wege aber aus schlechten Quellen, aus Kranzenimmern, dämpfigen Höfen oder Gassen, so führen sie schlechte statt reine Luft ein, und das ganze künstliche und kostspielige Ventilationsystem führt dann nur zu einer größeren Verderbnis der Luft. Ueberhaupt dürfte sich eine Ventilation durch Zugkamine nur für Räume empfehlen, in denen sich eine größere Zahl von Menschen für längere Zeit aufhält, in Theatern, Concertsälen ic., vorausgesetzt natürlich auch dann noch, daß der Kamin die gehörige Höhe und Weite besitzt, daß die Temperatur darin eine ausreichende ist, und daß er aus nicht zu porösem Material erbaut ist. Hohe Fabrikfornne eignen sich am besten dazu und können selbst auf ziemliche Entfernungen

hin benachbarte Gebäude ventiliren. Für gewöhnliche Wohnräume, die einer künstlichen Ventilation bedürfen, kann man ebenfalls den Zug der Kamine benutzen und zwar besonders, wenn man sich dabei der sogenannten Kenoischen Ventile bedient. Bei dieser in England sehr gebräuchlichen Einrichtung wird nahe unterhalb der Zimmerdecke ein Loch von etwa 6 Zoll Durchmesser in das Kaminrohr geschlagen und in diesem Loche eine Blechkappe an zwei horizontalen Zapfen so aufgehängt, daß sie im Zustande der Ruhe das Loch verschließt, bei dem leichten Druck der inneren Luft aber sich nach außen öffnet, während sie sich nach innen niemals öffnen, also auch niemals Rauch in das Zimmer einlassen kann. Im Winter, wo das Zimmer geheizt ist, ist auch in dem Kamin der nöthige Zug vorhanden; im Sommer kann man ihn durch eine kleine, in dem Kamin brennende Gasflamme herstellen. In Restaurationen, die einer reichlicheren Ventilation bedürfen, bringt man am besten eine Höbenleitung an, die in der Nähe der Decke nach außen führt und in dem Zimmer selbst in einem weiten Blechtrichter mündet, unterhalb dessen man eine kleine Gasflamme unterhält.

In den meisten Fällen genügt es die natürliche Ventilation dadurch zu unterstützen, daß man für Wege sorgt, durch welche die frische Luft eingehehen kann. Felder mit Gitterwerk oder durchbrochenen Eisenaufhängungen, die man in die Hausthür einsetzt, durchlöcherter Zinnschiben oder Drahtgesechte in einem Fenster des obersten Theils des Treppenhause bewirken dies vollkommen. Noch besser empfiehlt sich, freilich nur für Wohnabende, die in England vielfach übliche Einrichtung, die Treppentreppe zu heizen, wodurch ein bedeutender Luftwechsel im Innern des ganzen Hauses herbeigeführt wird, der sich nicht bloß auf die Corridore, sondern durch die Stubenthüren hindurch auch auf die Zimmer erstreckt.

Da, wo keine natürliche Ventilation, durch welche künstliche Mittel sie zu unterstützen sein mag, ausreicht, wo es insbesondere der Zufuhr großer und nach dem Bedürfnis wechselnder Mengen frischer Luft bedarf, also in Schulen, Krankenhäusern, Koffenen, Gefängnissen, bleibe das einzige zweckmäßige Ventilationsystem das unter dem Namen des Pulsionsystems bekannte, bei welchem die Luft auf mechanischem Wege durch die Kraft einer Maschine eingetrieben wird. Welcher Maschine man sich auch zu diesem Zwecke bedienen mag, der sogenannten Flügelventilatoren, bei denen nach Art der Windmühlenschüssel schräg auf einer sich schnellumdrehenden Achse gestellte Flügel oder Schaufeln die Luft einziehen, oder einer Art von Luftpumpen, wie sie Arnet zuerst vorgeschlagen hat, immer ist mit dieser Art der Ventilation der doppelte Vortheil verbunden, daß man der Luft vor ihrem Eintritt in den Gebäuderaum jede beliebige Temperatur mittheilen, und daß man sie zuvor desinficiren kann. Die nähere Beschreibung dieser Maschinen,

wie des Verfahrens der Abkühlung oder Erwärmung und der Desinfection der Luft gehört nicht mehr hierher.

Jedenfalls fehlt es uns unter allen Umständen niemals an Mitteln, uns in geschlossenen Räumen vor Luftverderbnis zu schützen und uns die für unsere Existenz und unser Wohlbefinden notwendige gesunde Luft zu verschaffen. Die Wissenschaft hat uns nicht allein auf die Gefahren dieser Luftverderbnis aufmerksam gemacht, sondern uns auch die Bedingungen kennen gelehrt, unter denen eine wirksame

Lufternewerung stattfindet, und endlich die Hilfsmittel an die Hand geben, sie herzustellen. Aber mit der Wissenschaft geht leider nicht immer die Einsicht im Volke gleichen Schritt, und trotz der besten Erkenntnis werden noch immer Tausende von Menschenleben geopfert und Stätten gesäubert und sogar neu geschaffen, die zu Herden physischer wie moralischer Vergiftung werden. Die Wissenschaft kann nur warnen und raten; der gesunde Menschenverstand und der gute Wille muß das Uebrige thun.

## Literaturbericht.

**Die Germania von Cornelius Tacitus. Uebersetzt von A. Berner. Stuttgart, bei Neff, 1868.**

Das in höchst geschmackvollem Äußeren vorliegende Buch gewährt als inneren Gehalt nicht nur die Uebersetzung der Germania des Tacitus, sondern auch das Original selbst. Am leisteren hat der, welcher der Sprache desselben mächtig ist, immer wieder von Neuem seinen Genuß und seine Freude; denn es stellt in der scharfen Fassung und in der durchdringenden Darstellung des alten Germaniens und seiner Bewohner ein Bild auf, an dem man die Züge noch auf unsere Gegenwart hinweisen und für den Charakter der heutigen Deutschen und für manche Eigentümlichkeiten, Sitten und Gebräuche des Volkes eine tiefer liegende geschichtliche Erklärung abgeben. Das heimliche Interesse, wie im Original, können Andere nun auch in der Uebersetzung finden. Die vorliegende Uebersetzung hat selbst etwas ungemein Leichtes und Gefälliges, so wie eine große Klarheit an sich und beist mancher Dunkelheit und Ungenauigkeit des Originals mit seinem Bild und Sinne. Allerdings ist sie ziemlich frei; sie macht mehr Worte, als selbst bei dem gegen die lateinische Ausdruckweise im Allgemeinen immerhin breiteren und wortreicher Charakter der deutschen Sprache nöthig gewesen, um das freilich noch besonders kurze und gekürzte Latein des Tacitus klar und verständlich wiedergeben. Sie ist aber auch in dem Sinne eine sehr freie, als dem Original nicht selten zugelegt wird, was nicht darin liegt, auch gar nicht darin liegt. Nur ein schlagendes Beispiel sei angeführt. Es handelt sich um die Stelle am Schluß von Cap. IV, wo Tacitus von den alten Germanen sagt, sie könnten weder Hitze und Dürst ertragen, noch sich im Boden und Klima gewöhnen. Hier trägt die Uebersetzung das, was Tacitus zunächst und wesentlich persönlich nimmt und als eine Schuld der Germanen darstellt, objectiv aus den Boden und das Klima des Landes, gleichsam als eine Schuld, über und kommt so auch mit dem in Widerspruch, was vorher (Cap. II) gesagt ist, daß das Land „aspera oculo“ sei, „unter raubem Himmel liege“. Die „Raubtheit des Himmels“ ist doch wohl eher ein Mittel gegen Hitze, als daß sie den Germanen dagegen nicht hätte „helfen“ sollen. Auch in Cap. XXII sagt Tacitus, daß bei den Germanen „plurimum hiema occupat“. In einem „winterrichen Klima“ sind auch die Einwohner an Kälte gewöhnt; dagegen kann es nicht die Schuld — wenigstens nicht die nächste und hauptsächlichste — des Bodens und Klima's sein, wenn sie in einem solchen Klima die Hitze nicht ertragen können. Es wird dies mehr Folge und Schuld der Ger-

manen selbst und gewisser Einrichtungen, nicht des Landes gewesen sein, welches Tacitus in Cap. V „silvis horrida“, reich an Wäldern nennt, in denen sie Schutz gegen die Hitze finden konnten. Heutzutage freilich befördert die meist unersättliche Entwaldung, die an manchen Orten zu einer wahren Wald-erwüstung zu werden droht, die Trockenheit und Dürre des Erbodens, das allmähliche Wegwälen der Mangenrde bei fortwährender Regenfluten und die Verschärfung der Luft.

## Literarische Anzeige.

Im Verlage von Josef Pock in Graz erscheint und ist durch alle Buchhandlungen und Postämter zu beziehen:

## „Sirius“.

Zeitschrift für populäre Astronomie.

Herausgegeben von Rudolf Falb.

In jeder klaren Sternennacht drängen sich seit Jahrtausenden der denkenden Menschheit Fragen auf, von denen viele schon beantwortet sind, eine daß diese Beantwortung zur Kenntniss derjenigen kommen könnte, die sich vorzugsweise für die Schönheit des Sternabdomens interessieren.

Für alle Jene, welche keine Mathematik studieren, wohl aber oft und gerne die Pracht des gekürzten Himmels bewundern, haben wir den „Sirius“ gegründet, der über alle Fragen möglichst genaue Aufschlüsse bringt und durch seine prachtvollen artistischen Beilagen, Sternkarten, Planetenbilder und Landschaften sich dem deutschen Volke als angenehmen und leicht verständlichen Führer durch die Herrlichkeiten der Nacht anbietet.

Wie sehr das Publikum einer solchen Zeitschrift bedurfte, beweisen am besten die rasche Ausbreitung unserer Blätter, welches sich in kurzer Zeit einen bedeutenden Leserkreis erlangt, und die vielen an die Redaction eingelaufenen Dank- und Empfehlungsbreiben, welche sich alle für das Unternehmen mit Begeisterung aussprechen.

Der „Sirius“ erscheint monatlich zweimal mit artistischen Beilagen und kostet vierteljährlich nur 20 Sgr. oder 1 fl. österr. W.

Probeummern des „Sirius“ liegen in allen Buchhandlungen zur Ansicht auf.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Sgr. (1 fl. 30 Kr.)

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Gedrukt: Schreyer'sche Buchdruckerei in Halle.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 13.**

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, G. Schwesigke'scher Verlag.

**31. März 1869.**

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt **durch die Post** beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das **Abonnement für das nächste Vierteljahr** (April bis Juni 1869) **ausdrücklich bei den Postanstalten** erneuert werden muß, da sonst die Zufendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unsrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1868, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben sind.

Halle, den 24. März 1869.

**Inhalt:** Baker's Reisezeit, von Karl Müller. Zweiter Artikel. — Die Entdeckung Grönlands, von Otto Me. Erster Artikel. — Was man von der Sonne weiß, von Hermann Klein. Fünftes Artikel. — Literaturbericht.

## Baker's Reisezeit.

Von Karl Müller.

Zweiter Artikel.

Gondokoro selbst, eine Station des Eisenbahnändlers mit einigen elenden Grasshütten, liegt bereits 20 F. über dem Niveau des Flusses. „Gerne Berge erfreuen das an die traurigen Flächen des Weißen Nil gewöhnte Auge; immergrüne Bäume, die, mit hübschen kleinen Dörfern der Eingeborenen unter ihrem Schatten über die Oberfläche der Landschaft hin zerstreut liegen, bilden nach einer langen und lästigen Reise (vom 18. December bis zum 2. Februar)

einen höchst einladenden Landungsplatz.“ Ich füge hinzu, daß hier offenbar auch eine Art Pflanzenscheide liegt, mit dem Verschwinden des Dschungellandes mehr oder weniger auch die Pflanzen des unteren Weißen Nil an dieser Grenze zu Ende gehen. Schon früher verlieren sich manche, die, in den unteren Theilen nicht selten, zugleich ein Bestandteil der umliegenden Steppenflora sind, z. B. die Säumer-Acacia (*A. spirocarpa*), der Lunbup oder die Sodaba



Kapper (Capparis Sodada) u. A. Bis nach Gondokoro oder darüber hinaus reichen: die Kitter- und die Land-Akacie (A. mellifera und nubica), die in den unteren Theilen oft ganze Quadratmeilen mit ihrem scrub-artigen Gebüsch überziehen; der Halefch oder Fegelig (Balanites aegyptiaca), aus dessen fettem Holze Lampenrösthre verfertigt werden; der Ufchar (Asclepias gigantea), dieses Unkraut des Sudans; der Senbaum oder Kal (Salvadora) u. A.

Augenblicklich geht mit dieser Veränderung der Natur auch eine große Veränderung mit dem Menschen vor sich. In den Niederungen lebe er ein Leben voll Elend. Umgeben von Heerden, leben doch manche Stämme, z. B. die Keffch-Neger, von Katten, Eidechsen, Schlangen und Fischen mehr als von dem Fleische ihrer Hausthiere, die sie nur aufressen, wenn sie an Krankheit gekorben sind. Die Abtheilungen, welche Baker von diesen Wilden gibt, erregen Mitleid und Ekel zugleich vor einer Menschengestalt, wie man sie sich nicht entsehliger an Eingekrumptheit vorstellen kann. Alles lebt mit dem Vieh in Schmutz und Sumpf. Hier aber, bei den Bari-Negern, zeigen die Wohnungen die vollendete Keinlichkeit. Jede ist mit einer undurchdringlichen Decke von dornigen Euphorbien (Candelaber-?) umgeben, mit hervorpringendem Dache zum Schattenwerfen versehen. In diesen Klimaten fürchtet man sich besonders vor dem Aufgang der Sonne; nur etwa eine Stunde vor demselben ist die Luft höchst angenehm kühl und säckernd. Sonst wird die Sonne als der allgemeine Feind betrachtet. Der ganze Mensch, wohlgeruchener wie er ist, steht im Einklange mit der Natur, die sich nun zu einem sauberen Berglande erhebt. Nicht mehr bodt er in Schmutz herum, mit den Thieren um die Wette, sondern er trägt seinen Schemel zum Niedersitzen überall bei sich. Freiheitsegefühl ist ihnen im hohen Grade eigen, weshalb sie auch als einer der feinstigsten Negervölker am Weißen Nil betrachtet werden. Gegen 1200 F. hoch erhebt sich der Bellaman, eine hübsche Masse von Gneis und Spenit, die in den Vertiefungen mit herrlichen Walden geschmückt ist. Das an seinem Fuße ausgebreitete Land nimmt den allgem. meinen Charakter des Sudans an und erscheint wie ein wohlbestandener, durch ferne Berge verschönerter Park. Doch wecheln auch hier dicke Dornbüschel von Mimosen mit den Wäldern ab, besonders die Schluchten erfüllend. Ihre Dornen sind wie Fischhaken gestaltet und legen einer Caravane die größten Hindernisse in den Weg, weil die Kammerle, zu hoch für diese Vegetation, mit ihrem Gepäc überall hängen bleiben. Diese Dschungel würden allein hinreichen, das Land unburchbarlich zu machen, wenn sie den Boden beherrschten. Meilenweit ist das auch der Fall; dann befindet sich der zur Verzeiwung getriebene Reisende plötzlich auf einer Anhöhe und schaut verwundert in ein höchst malerisches Thal hernieder, dessen Grund von reizenden Wiesen und marmelinen Wäldern, eingesäumt von colossalen Feigenbäumen, eingenommen wird. Das Thal von

Tollogo hat diesen Charakter. Es gleicht einer gewaltigen Straße zwischen schroffen Felsenmauern, die bis zu etwa 1000 F. aufsteigen, während an ihrem Fuße verworrene Massen herabgeschütteter Granitblöcke eine natürliche Festung für die zwischen ihnen angelegten Dörfer bilden. Westlich und östlich thürmen sich diese Berge auf und sind nur die Vorläufer noch höherer. Denn mit demselben wilden Charakter erheben sich die Granitmauern von Eueria gegen 2000 bis 3000 F., ein ähnliches Thal bildend, welches sie mit den tiefsten Schluchten, mit Felsblöcken, Gießbächen, Bäumen und Gebüsch auf das Gefährlichste verbarbariciren. Die Eingeborenen kennen auch diese strategische Eigenschaft ihres Landes sehr wohl und erheben sie noch dadurch, daß sie ihre Wohnungen mit dichten Bambus-Pallisaden umgeben. Weithin nach Süden zieht die Bergkette, bis sie in den blauen Bergen Kafaka's, in einer Entfernung von 50 bis 60 Meilen (engl.) nach Osten hin verschwindet.

Hat man das Thal von Eueria hinter sich, so betritt man ein vollkommenes Flachland, das mit einzelnen Bäumen geschmückt ist. Hier gibt es Obst in Fülle. Besonders wächst eine Art gelber Pflaumen von der Größe eines Eies in erstaunlicher Menge auf schönen Waldbäumen, die sie so zahlreich herabschütteln, daß der Boden unter ihnen ganz gelb ausseh. Sie sind auffallend süß und doch sauer, dabei sehr saftig und von ganz köstlichem Geschmack. Wahrscheinlich gehört dieser Baum zu dem Geschlechte der Datelpflaumen (Diospyros), welche im Sudan und anderwärts im tropischen Afrika oft wahre Riesensämme entwickeln. Troß dieser herrlichen Spenden der Natur wohnt doch kein Friede in dem Lande. Bei seinem offenen Charakter setzen sich deshalb die Bewohner genöthigt, ihre Dörfer mit einem weit haltbareren Stoffe, als der Bambus ist, zu umzingeln. Sie verfertigen ihre Pallisaden aus dem harten Eisensholze, welches ihnen die Natur hier in reichem Maße liefert. Sie nennen das Holz „Babanuse“, und dieses gesch. höchst sehr wahrscheinlich dem senegambischen Edenholze (Dalbergia melanoxylon) oder einer verwandten Art an; denn jene heißt auch im vorderen Nillande die Baba-Miss. Zu noch größerer Sicherheit ahmen die Bewohner ihre eigene Natur nach und pflanzen um die Pallisaden ein Dorngebüsch, das gegen 20 F. hoch aufsteigt und unburchbarliche Hecken bildet. Elephanten, Giraffen, Büffel, Zebras, Nashörner und große Antilopenarten durchstreifen das Land in zahlreichen Heerden; — ein Beweis zugleich, daß das Land reich an Gras ist und einen fetten Boden besitzt. Gegen die kühlen Abendstunden hin treten diese Heerden aus den dichten Wäldern und Dschungeln heraus und bleiben die Ebene in höchst lebendiger Art. Anderwärts, wo die Dschungeln zurücktreten, wo ein sanfter Boden beginnt, verwandelt sich die Ebene in eine Art von colossalem Desquarten. Fegulbäume, wie Baker schreibt, (s. oben), beinahe dieses Ansehen hervor; um so mehr, als sie großen Birnbäumen gleichen. Sie sind reich an Pottasche, welche man als Es-

sah für Stiefel benutzt, und diese kommt selbst in der Frucht vor, welche mit der Größe und Form einer Dattel einen sehr feinen, gewürzigen Geschmack verbindet.

Gegen den Lakt-Berg hin wird das Land immer reizender. Derselbe erhebt sich ebenfalls schroff bis zu einer Höhe von etwa 3000 F., die höchste Spitze einer östlichen Bergkette bildend, in welcher das breite Thal von Latuka ( $4^{\circ}35'$  n. Br.) liegt. Es ist gegen 40 M. lang und 18 M. breit, eine Fläche von Wäldern, dichten Dschungeln, freien Ebenen und den nie fehlenden Hygikbäumen, die an manchen Stellen das Ansehen eines Forstes darbieten, voll Abwechslung. Gegen Süden hin erhebt sich eine Bergkette bis zu 6000 oder 7000 F. über das Niveau von Latuka, während das äußerste Ende durch einen prächtigen isolirten Berg von etwa 5000 F. Höhe fast versperrt wird. Wie überall in Centralafrika, erhalten auch hier die Wohnungen eine Kreisform mit klobenförmigem Oberbau; und als ob sie nur ein Widerschein der reizenden Natur seien, gehören die Latuka's zu den schönsten Wäldern, die Baker je sah. Im Besitze zahlreicher Herden, die das Land freigebig ernährt, verbündet sich in ihrem Charakter mit dem Wohlstande sofort ein feindsüchtiges, heiteres Wesen; immer sind sie zum Lachen oder zum Kampfe bereit. In letzter Beziehung nehmen sie es mit jedem andern Stamme auf; um so mehr, als ihre Grobseimiede in der Verfertigung von eisernen Waffen sehr geschickt sind. Zu dem Allem gesellt sich noch ein Zug von Koketterie der Männer, der charakteristisch ist. Mit einer Ausdauer ohne Gleichen verwenden sie einen Zeitraum von 8 bis 10 Jahren dazu, ihr wolliges Kopfhaar zu einer Art von Helm zu verwandeln, in welchen ein reicher Schatz von Perlen und Muschelgehäusen gesammelt wird. Nur der Kavallerie vermögen sie nicht zu widerstehen; denn sie kennen nicht die Benutzung des Mantelbiers, deren sich die benachbarten Galas zu ihren Kriegszügen bedienen. Baker's Kamele waren ihnen ebenso ein Gegenstand von großem Interesse. Mit der Eitelkeit verbindet sich aber auch eine große Keiligkeit der Dörfer und Wohnungen, auf deren Herstellung sie viel Geschick, besonders bei dem Dache, verwenden. Trotzdem können die Frauen nicht den Anspruch auf ein schönes Geschlecht erheben; Schönheiten sind um so seltener, als auch hier das Weib das Lastthier des Mannes ist. Um so werthvoller sind die hiesigen Frauen als Gegenstand des Reichthums; jede Tochter ist zehn Kühe werth. Darum bringen die Töchter einer Familie deren Wohlstand, nämlich die Kühe ein, die Knaben mellen sie. Bei alledem oder gerade deshalb bleibt das Land unbebaut. Nur was zur anderweitigen Nahrung bringend notwendig, wird auf eine sehr primitive Weise kultivirt, indem man die Feldfrüchte nicht säet, sondern in Löcher steckt, welche mit einer eisernen Hacke in dem durch Regen erweichten Boden vorbereitet werden. — Auch im Herzen der Berge bewahrt das Land einen ähnlichen Charakter. Doch flüchten sich hier die Bewohner

mit ihren Dörfern auf Vorsprünge, die schroff und unzugänglich wohl gegen 1500 bis 2000 F. hoch die Thäler begrenzen. Schöne Blumen mit starken Gerüchen würzen die Luft der Bergeshöhen; in den Schluchten tritt der Pfirsichswildwachsend auf; unzählige wilde Weinreben, deren gewaltige schwarze Trauben höchst erquickend sind, ohne doch einen letterbaren Saft zu liefern, schlingen sich in Blumengewinden von Baum zu Baum. Zu den Blumen gesellen sich zahlreiche Früchte von Wohlgeschmack, besonders die gelbe Pflaume und der wilde Wein, dessen Trauben reichlich von dem Geschnitzten herabhängen.

Damit sind wir auf einer Hochebene angelangt, welche nicht nur die Wasserscheide zwischen Osten und Westen, sondern auch eine Pflanzenscheide bildet. Wir sind in Obbo,  $4^{\circ}2'$  n. Br., 2236' ü. M. Von Obbo aus nach Südosten ist Alles gebirgig; die höchsten Punkte der Kette steigen bis zu einer Höhe von 4000 bis 5000 F. über dem allgemeinen Niveau des Landes empor. Nach Süden hin erhebt sich das Land deutlich, obwohl es dort keine wirklichen Berge, sondern nur einige frei stehende Hügel gibt. Der Boden ist außerordentlich fett und bringt eine Menge von Riesen-Schwaben, das Guinea-Gras (*Panicum jubatum*), eine Hiesart hervor, mit welcher die Ebenen bedeckt sind. Es wiederholt sich also auch hier, was Schweinfurth in den Prairien des Sudans allgemein beobachtete, daß jede Grasart sich absondert und auf weite Strecken hin unermesslich herrscht. Derartige Streifen können nur mit sorgfältig gepflügten Kornfeldern verglichen werden, in denen Aehre neben Aehre, Halm neben Halm gedrängt einherwogen. Dadurch wachsen aber auch die gemessenen Streifen eigenthümlichen Abflüssen des Grün ins Nerthalb der Landschaft bedeutend und erhöhen ihre Reize zur Zeit der Fruchternte um so mehr, als dann die verschiedenen artigen Färbungen der bald rüthenden oder gelben, bald schwärzlichen Aehrenmassen sich geltend machen und schon von Weitem die vorherrschende Grasart erkennen lassen. Neue Spielarten von Yam (Dioscorea) gibt es hier, und viele von ihnen wachsen wild in den Wäldern. Die „Cololollo“ erzeugt mehrere Knollen an der Wurzel und auf dem Stengel und klettert, durch ihre Ranken unterstützt, an den Bäumen oder andern Gegenständen hinauf; aus jeder Stengelknospe entwickelt sich eine nierenförmige Knolle, die bis zur durchschnittlichen Größe einer Kartoffel heranreift. Ein einziger Stod erzeugt auf diese Weise gegen 150 Knollen, welche mit einer feinen Haut von grünlich-gelber Farbe bedeckt sind und, obgleich etwas wachsigartig, an den Geschmack der Kartoffel erinnern. Es gibt aber auch giftige Yam mit purgirendem und brechenregerender Kraft; und dennoch wird eine davon gemessen, nachdem sie viele Tage lang im Wasser digerirt, dann an der Sonne zu einer festen Substanz erhärtet war, die man zu Pulver zerstoßt und zu Suppen kocht. — Unter den vielen Wäldfrüchten der Wildnis befindet sich eine, welche einer Wale

muß in ihrer grünen Schale sehr ähnlich ist. Das Fleisch der letztern hat einen außerordentlich feinen Geschmack und die darin befindliche Nuß gleicht an Größe und schöner Mahagonifarbe genau einer Koffelkastanie. Diese Nuß wird geröstet, und wenn man sie zerrieben und gekocht hat, setzt sich an der Oberfläche des Wassers eine Art Fett oder Butter ab. Letztere wird von den Eingeborenen hoch geschätzt; denn manreibt sich mit ihr, wie es bei vielen nackten Wilden heißer Länder der Fall ist, die Haut ein, für die sie das beste Fett sein soll; schließlich wird sie gegessen. Unfehlbar meint Baker mit dieser Frucht eine Art des Schildbutterbaumes, der zuerst durch Mungo Park in Europa bekannt wurde. Wahrscheinlich ist es dieselbe Art, welche, zuerst von Heuclin am Weißen Nil erkannt, von Korsch *Butyrospermum niloticum* genannt wurde, während die Park'sche Art die *Bassia Parkii* ist. — Unter die ersten milchwachsenden Baumfrüchte gehört eine, die den Koffinen gleicht; sie wächst in Trauben aus einem großen Baume, und dieser ist wahrscheinlich wie in Afrika weit verbreitete *Cassia edulis* mit süßen, schwarzen kirschartigen Früchten aus der Familie der Leguminen. Auch Erdnüssen kommen in den Wäldern massenhaft vor; sie unterscheiden sich aber von der wohlbekannten afrikanischen Art der Westküste durch eine außerordentlich harte Schale. Jedenfalls meint Baker damit die Angola-Erdn. (*Voandzeia subterranea*). Eine milchwachsende Bohne erzeugt Blumen mit einem köstlichen Wohlgeruch. Vielleicht ist es eine *Dolichos*-Art. We. schmeckende Kürbisse mit wargiger Oberfläche, zweierlei *Cucurbit*-Arten, von denen eine durch ihre hellrothen Rippen außerordentlich schön wird, milder Pflanz, dessen Blattstiel bis zum Blatte karmoisinroth ist und nur einem Busch von Blättern ohne oberirdischen Stamm bildet, gefolien sich hinzu. Eine schöne Glacé-pflanze wächst ebenfalls wild; doch verwendet der Eingeborene in der Regel die Frucht einer *Mokart*. Letztere dürfte die den Molinen verwandte *Sausseuiera guineensis* der Westküste sein. Der Tabak erzieht eine außerordentlich große und wird wie in *Guinea* zubereitet, so nämlich, daß man die reifen Blätter zerstoßt, zu Brei anrührt, in juckendstachelnähnliche Formen preßt und trocknet, bis die Substanz vollkommen hart ist. In *Guinea* formet man käseartige Steine daraus, die oft mit Kuhlmiß verfälscht werden. Jeder Stamm hat auch sein besonderes Pfeifen-Modell: der Bari hat eine weite, trompetenartige Spiße,

der Latuka eine lange und enge, der Dibo besitzt die kleinsten und nettesten.

Bei der hohen Lage des Landes, welche Baker im Allgemeinen zu 3674 F. ü. M. bestimmte und für Dibo selbst auf 1438 Fuß über dem allgemeinen Niveau des Landes im Osten der Bergkette berechnete, kann es nicht des fremden, daß der Regenfall 10 volle Monate, vom Februar bis Ende November dauert. Die Folge ist eine so außerordentliche Fruchtbarkeit, daß die Vegetation die spärliche Bevölkerung gänzlich übermäßig und sie in eine Wildnis einhüllt. Ohne das Anzünden der Dschungeln würde das Land ein Morast der schauerlichsten Art werden, da selbst nach diesem Prozesse das Land noch nicht hinreichend gesäubert ist und fort und fort eine neue Vegetation treibt. Die durch *Livingstone* so verächtlich gemordene *Itese*-Hitzige scheint hier zuerst nach Süden hin aufzutreten und den Mangel von Mosquitos durch eine so viel fürchterlichere Plage zu ersetzen. Dagegen reduciren sich die dornigen Pflanzen und solche, welche Gummi liefern, auf wenige Arten oder auf nichts; ein charakteristischer Gegensatz zum Sudan, wo fast jeder Baum, jeder Strauch bewaffnet ist. Diese Masse von Laubwerk, von 10 Fuß hohen Gräsern, von Stacheln und weiden Weinreben ist wohl noch eine bequame Wohnstätte für die gewichtigen Körper der Elephanten, Nashörner und Büffel, aber nicht mehr für den Menschen. Im Ganzen, sagt Baker, ist es ein höchst uninteressantes Land, weil man nicht im Stande ist, dasselbe anders als auf schmalen Fußpfaden zu bereisen, die von den Eingeborenen gemacht worden sind. Und dennoch gibt es in diesem Regenzele noch Regenmacher für die regenfreie Zeit! Wäre die Lage des Landes nicht so hoch, so würde der Mensch den elenden Stämmen am unteren Weißen Nil gleichkommen müssen. Die hohe Lage aber gibt ein völlig umgekehrtes Resultat: einen schönen Menschenschlag, der sich besonders angenehm bei den Frauen ausdrückt, eine gewisse Nalvetät und Bescheidenheit des Charakters. Diese Bescheidenheit von den Nachbarn ist so groß, daß Baker daran dachte, die Dibo's von einer Einwanderung aus dem Somali-Lande abzuleiten. Der Stamm wird den Ethnographen auch dadurch merkwürdig, daß er der erste ist, welcher das Bedürfnis der Bekleidung empfindet. Von hier nach Zanzibar hin entwickelt sich das immer mehr, während der Mensch in den seuchten Niederungen naht bleibt.

## Die Entdeckung Grönlands.

Von Otto Ull.

Erster Theil.

Die erste deutsche Nordpolarexpedition ist zurückgekehrt, ohne das ihr gesteckte Ziel erreicht zu haben. Wenn sie auch bis zu der selten erreichten Breite von 81° 5' nach

Norden vordrang, wenn sie auch manche wichtige Küstenaufnahme im Nordosten Spitzbergens, namentlich in der Pinlopnstraße ausgeführt hat, wenn sie auch weiter als ein

Schiff zuvor über die Bäreninsel nach Osten hinaussegelte, wenn es ihr auch sogar gelang, den furchtbaren Treibeisgürtel, der das geheimnißvolle Polargebiet den Blicken der Forschung entzieht, zu durchbrechen und nur durch das an der grönländischen Ostküste festliegende Eis an weiterem Vordringen verhindert wurde, wenn sie endlich noch so reiche Schätze des Wissens, noch so alange B Beiträge für unsere Kenntniß der arktischen Natur heimbrächte; das Hauptziel, das offene Polargebiet, der Pol der Erde, zu welchem längs der Ostküste Grönlands der Weg gesucht werden sollte, ist nicht erreicht worden. Nichts wäre unvergesslicher, als wenn man sich durch einen solchen ersten verunglückten Versuch entmutigen lassen wollte, der zumal mit so unzulänglichen Mitteln, mit einem kleinen, wenigstens für jene Meere, in denen nur die Dampfkraft die Herrschaft gewährt, nicht ausreichenden Fahrzeuge, unter den ungünstigsten Umständen in einem ganz ungewöhnlichen Jahre, das von den Walfischfahrenden übereinstimmend als Eisjahr bezeichnet wird, unternommen wurde. Es war darum fast mit Gewißheit vorauszu sehen, daß der ersten Expedition eine zweite reicher ausgestattet, kräftiger zum ersten Kampfe gerüstete nachfolgen werde. Die deutsche Thatsache ist erwacht, der nationale Ehrgeiz ist rege geworden, und zu dem Drange wissenschaftlicher Forschung, der an sich schon so oft in Deutschland Großes geschaffen, hat sich in unsern großen Geschlechtern noch ein anderes Interesse gesellt, das in der Eröffnung neuer Walfischgründe und neuer Präyeheländer eine neue Quelle nationalen Reichthums erblickt. Die zweite deutsche Nordpolarexpedition kann insofern bereits für gesichert gelten, als die Ehre der deutschen Nation dafür bürgt, daß die Mittel zur Ausführung nicht fehlen werden. Schon werden im Hafen von Bremen die Schiffe gerüstet, welche unter dem Schutze des Dampfes den Kampf mit den Schrecken der Polarwelt auf's Neue aufnehmen sollen; schon sind die Männer der Wissenschaft gewonnen, welche an diesem ehrenvollen Feldzuge theilnehmen sollen. Ueber das Ziel kann Niemand mehr im Zweifel sein, und wenn man als dieses Ziel auch den Pol bezeichnet, so wird doch Niemand mehr daran Anstoß nehmen, weil es Keinem mehr einfallen kann, dabei an den mathematischen Punkt zu denken, sondern Jeder weiß, daß mit diesem Namen nur die Richtung bezeichnet werden soll, in welcher dem Unternehmen der Siegeskranz winkt. Seit Jahrhunderten schon ist nach diesem Ziele gestrebt worden, wenn auch noch nie so eifrig und so bewußt, als in unser Zeit, und mit uns werden auch jetzt wieder andere Nationen auf dem arktischen Kampfplatze erscheinen. Es ist interessant, zu sehen, wie die verschiedenen Völker die Angriffspunkte unter sich theilteit haben, wie jedes für seine Unternehmungen sich eine besondere Basis gewählt hat. Die Engländer und Amerikaner haben von jeher vorzugsweise den Parcy-Archipel und die nördliche Verlängerung der Baffinbai, den Emsithund und dessen Ausganga, den Lennepkanal, zum Ausgangspunkt ihrer Operationen gewählt.

Als vor 4 Jahren in England durch Osborn wieder eine neue Nordpolarexpedition angeregt wurde, war es dieser Weg, den man ins Auge faßte, und wenn der Amerikaner Hayes, wie verlautet, seinen Versuch, den Nordpol zu erreichen, erneuern sollte, würde er keinen andern Weg einschlagen. Frankreich hat sich die Behringstraße als Operationsbasis ausgesucht, eine freilich sehr spöttliche, wegen der weiten Fahrt um den langgestreckten amerikanischen Continent herum, die erfordert wird, ehe das Entdeckungsumternehmen selbst beginnen kann. Gustav Lambert, der Führer der beabsichtigten französischen Expedition, befindet sich darum noch gegenwärtig in Verlegenheit wegen Aufbringung der dazu erforderlichen, auf eine halbe Millen Franken veranschlagten Kosten. Rußland hat immer am liebsten seine sibirischen Küsten zur Basis arktischer Unternehmungen gewählt, und Schweden hat sich schon seit Jahren auf Spitzbergen und das spitzbergische Meer gefügt. Für Deutschlands Nordpolfahrten ist die grönländische Ostküste übrig geblieben, und wie der vorjähigen, ist sie auch der diesjährigen Expedition als Grundlage angewiesen. Warum übrigens Petermann, der deutsche Agitator auf dem geographischen Entdeckungsbiet, gerade diese grönländische Ostküste zugleich für die geeignetste und die besten Erfolgsge entsprechende Basis für Nordpolarexpeditionen halt, ist bereits im vorigen Jahre in diesen Blättern ausführlich erläutert worden. Jedenfalls hat Grönland für den deutschen Leser gegenwärtig ein besonderes Interesse gewonnen, und es wird ihm vielleicht angenehm sein, wenn ich ihn im Folgenden mit der Geschichte dieses Landes und seiner zweifachen Entdeckung näher bekannt mache.

Fast ein Jahrtausend ist es her, seit die erste Kunde von dem Dasein eines großen, im Westen Islands gelegenen Festlandes erlangt wurde. Es war um jene Zeit, als die große Normannen-Wanderung nach dem fernem Island stattfand, als Ummäzungen im Mutterlande zahlreiche Mißvergnügte aus den edelsten Geschlechtern und stütz von fürstlichem Blute mit ihrem Anhang über den Ocean trieben, die dann auf der nördlichen Eiseinsel einen merkwürdigen Freistaat bildeten, dessen Kultur bald die der mittel europäischen Staaten weit übertra, und der sich selbständig in Poesie und Wissenschaft, Handel und Literatur entwickelte. Meister der Schiffsahrt, schon um ihrer Selbsthaltung willen, wurden diese Isländer zu Entdeckern. Schon im J. 877 soll zwar der Isländer Gumbior die Küste von Grönland erblickt haben; aber die eigentliche Entdeckung dieses Landes beginnt erst hundert Jahre später.

Erik Raude (d. h. Rothhaar), ein ansehnlicher Grundbesitzer auf Island und aus fürstlichem Geschlechte stammend, war mit seinem Nachbar in Streit geraten und hatte diesen, einen der mächtigsten Herren, erschlagen. Zur Sühne des Todeschlages zu dreizehnem Erlö verurtheilt, ging er im J. 983 zu Schiffe, um nach damaliger Sitte Entdeckungen in unbekannten Meeren zu machen. Er folgte

der Richtung nach Westen, in welcher, der Sage nach, Guntlorn Land gesehen hatte, und es gelang ihm, an gewaltigen Eisbergen vorüber eine langgestreckte Küste zu erreichen, die er südwärts verfolgte. Nachdem er die in ein hohes Vorgebirge, das heutige Cap Farewell, auslaufende Spitze umschifft hatte, fand er eine Insel und eine Bucht, in welcher er überwintern konnte. Zwei Jahre verweilte Erik in dem neu entdeckten Lande, mit der Erforschung desselben beschäftigt; dann lehrte er nach Island zurück und erzählte dort von dem „Grünen Lande“, wie er es verlockend nannte, und von seinen schönen Wäldern und reichen Fischereien. Bald war eine Gesellschaft von Colonisten gewonnen, und 35 mit Menschen, Hausgeräth und Vieh beladene Schiffe segelten im J. 986 nach dem „Grünen Lande“ ab. Aber nur 14 von diesen Schiffen, darunter die Erik's und seiner Freunde Harjolf und Biarne, gelangten glücklich zur grönländischen Küste und gründeten die erste Colonie an ihrem Südbreite. Aber andere Colonisten folgten bald nach, und schon im J. 1124 war die Zahl der Ansiedlungen an der Ost- und Westküste so groß, daß damalige Schriftsteller ihre Bevölkerung auf ein Dritteltheil eines gewöhnlichen dänischen Bischofsprengels schätzten. Schon im J. 990 war ein Missionär aus Norwegen hinübergekommen, und es waren zahlreiche Kirchen, Schulen und Aeltern entstanden, die eine Zeitlang unter dem Erzbischof von Drontheim standen, bis im J. 1124 Grönland seinen eignen Bischof erhielt. Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts zahlte der Bischof von Grönland seinen Peterpfennig an den päpstlichen Stuhl in Rom und zwar in Balrosgähnen, die den Werth des Eisens hatten, und im J. 1327 brug diese Abgabe 130 Riepfund.

Nach einer kurzen Beschreibung Grönlands, die uns aus der Mitte des 13. Jahrh. aufbehalten ist, gab es damals dort zwei Städte, Gardar und Prætafid, und nicht weniger als 280 Höfe und Ansiedlungen. 15 Kirchen werden aufgeführt, von denen die Hauptkirche zu Gar-

dar, das zugleich der Sitz des Bischofs war, südlich von dem zuerst entdeckten Erikfjord lag. Nach einer andern Angabe zählte man an der Ostküste 19 bewohnte Buchten, 12 Kirchprengel mit 16 Kirchen und 2 Klöstern, an der Westküste 9 bewohnte Buchten mit 4 Kirchprengeln und 90 bis 100 Weilern. Zum Fischereibetrieb und um Treibholz zu sammeln, schiffte man weit über die Kolonien hinaus längs der Küsten hin, und selbst zwischen Europa und Grönland, namentlich aber mit Island und Drontheim wurde einiger Handelsverkehr unterhalten, der aber wegen der schwierigen Schifffahrt oft unterbrochen wurde.

Das war die Blüthezeit Grönlands, der aber ein jäher Sturz folgen sollte. Die dänischen Könige, welche in Folge der kalmarischen Union Norwegen beherrschten, hatten kein Herz für die normannischen Kolonien. Der Verkehr mit Grönland stockte, und mit dem Anfange des 15. Jahrhunderts verschwand das Land völlig aus den Augen der Welt. Im J. 1383 kam das letzte Schiff aus Grönland nach Norwegen mit der Nachricht vom Tode des dortigen Bischofs. Zwar wurde im J. 1406 noch einmal in Drontheim ein Bischof für Grönland ernannt — es war der siebzehnte seit der Gründung des Bisthums —; er schiffte sich auch im J. 1408 ein, gelangte aber nicht mehr in sein Sprengel, weil gewaltige Eismassen das Schiff zur Umkehr zwangen. Seitdem hörte jede Verbindung mit Grönland auf. Kalte Winter, wie der von 1423, Hungersnoth und Seuchen mögen die normannischen Kolonien schnell aufgerieben haben; vielleicht drangen auch die Eskimoes, die man früher nur im Norden Grönlands gefangen hatte, weiter südwärts vor und trugen durch Feindseligkeiten das Uebrige zur Vernichtung der Kolonien bei. Drei Jahrhunderte lang ist Grönland fast zur Sage geworden, und man spricht nur von furchtbaren Eismassen, welche die Ostküste Grönlands belagerten und jede Annäherung unmöglich machten.

### Was man von der Sonne weiß.

Mit besonderer Berücksichtigung der Beobachtungen während der totalen Sonnenfinsterniß am 18. Aug. 1868.

Von Herm. J. Klein.

Fünfter Artikel.

Wir wollen uns jetzt mit den Ergebnissen beschäftigen, zu welchen Kirchhoff bezüglich der Constitution der Sonne gelangt ist, um darauf zu den Resultaten überzugehen, welche die Sonnenfinsterniß am 18. August 1868 für oder gegen Kirchhoff geliefert hat.

Foucault scheint der Erste gewesen zu sein, der (1849) die Beobachtung machte, daß bei den Reflexen, die er über das Spectrum des electrischen Bogens zwischen Kohlenstücken anstellte, die hellen Natriumlinien, die in denselben vorhanden waren, in dunkle verwandelt wur-

den, wenn er das Licht, das von einer der Kohlenspitzen ausgegangen und durch den Bogen getreten war, zum Spectrum auseinander legte. Wenn er Sonnenlicht durch den Bogen leitete, so zeigten sich ihm die dunklen, von Fraunhofer mit D bezeichneten Linien (die, wie wir heute wissen, mit den hellen Natriumlinien zusammenfallen) in ungewöhnlicher Stärke. Diese Wahrnehmungen blieben indes unbeachtet und waren auch den Heidelberger Forschern Kirchhoff und Bunsen unbekannt, als diese im J. 1859 ihre Untersuchungen über die Spectra farbiger

Flammen begannen. Sie kamen im Verlaufe derselben zu dem wichtigen Resultate, daß das Spectrum eines jeden glühenden Gases umgekehrt (jede helle Linie in eine dunkle verandelt) wird, wenn durch dasselbe Strahlen einer Lichtquelle treten, die hinreichend hell ist und an und für sich ein ununterbrochenes Spectrum abt. Das Sonnenpectrum zeigt nun bekanntlich eine unzählbare Menge von dunklen Linien, und Kirchhoff und Bunsen haben u. a. gefunden, daß sämtliche Eisenlinien mit dunklen Linien des Sonnenpectrums zusammenfallen. Der erwähnte Physiker zeigte ferner, daß man mehr als eine Erklärung gegen Eins vortragen könne, daß jenes Zusammenfallen kein Werk des Zufalls ist. Die einzige Ursache, welche jene Erscheinung hervorgerufen kann, ist die, daß die Lichtstrahlen, welche das Sonnenpectrum geben, durch Eisendämpfe gegangen sind und hier die Absorption erlitten haben, die Eisendämpfe ausüben müssen. Nun enthält aber unsere Atmosphäre keine solchen Eisendämpfe; dahingegen steht der Annahme nichts entgegen, ja man ist gezwungen anzunehmen, daß die Sonnenatmosphäre eine hohe Temperatur besitzt, und in ihr sich Eisendämpfe befinden. Kirchhoff sagt ganz kurz: „Die wahrscheinlichste Annahme, die man machen kann, ist die, daß die Sonne aus einem festen oder tropfbar flüssigen, in der höchsten Glühhitze befindlichen Kerne besteht, der umgeben ist von einer Atmosphäre von etwas niedrigerer Temperatur.“ Auf diese Annahme gründete der Heidelberger Physiker seine Theorie der Sonnenflecken, die wir bereits eingehender besprochen haben. Man bezweifelt aber leicht, daß ein schlüssender Beweis der Richtigkeit der Kirchhoff'schen Theorie der Sonnenconstitution gegenwärtig hauptsächlich nur durch Beobachtungen bei totalen Sonnenfinsternissen gegeben werden kann. Wenn nämlich in der That das Sonnenlicht, wie wir es gewöhnlich wahrnehmen, und wie es in das Spectroscop eintritt, ein Gemisch von zwei Lichtern, dem Kerne und von der Hülle der Sonne ist, und in der That hierdurch die Umkehrung des Spectrums erfolgt, so muß im Augenblicke der totalen Verdeckung der Sonne durch den Mond, wo also das Licht des Kernes abgehalten wird, das Spectrum der äußersten Theile der Sonnenhülle, wozu die Protuberanzen gehören, helle Linien statt dunkler zeigen. Diese Thatfache zu constatiren, sind hauptsächlich die astronomischen Expeditionen gelegentlich der letzten Sonnenfinsternis ausgesandt worden, und — sie ist constatirt worden. Das geistige Auge hatte vorausgesehen, was dem körperlichen Blicke bis dahin noch nicht verliehen gewesen war zu schauen!

Ehe wir auf den Erfolg der einzelnen, zur Beobachtung der Sonnenfinsternis ausgesandten Expeditionen specieller eingehen, müssen wir vorher noch einige Worte über die Finsternis an und für sich vorausschicken.

Die Sonnenfinsternis am 18. August war, wie die Voraberechnung ergeben hatte, ausgezeichnet durch eine verhältnißmäßig sehr lange Dauer der Totalität. Der Mond

erreichte nämlich etwa 6 Stunden vor der Conjunction seinen Erdnähepunkt, so daß sein Durchmesser unter einem Winkel von 33° 28,8' erschien; gleichzeitig befand sich aber die Sonne noch fast in der Erdferne, die sie am 1. Juli erreichte, und in welcher ihr scheinbarer Winkeldurchmesser 31° 30,2' beträgt. Am 18. August war der Durchmesser der Sonne 31° 39,6'. Hierzu kommt noch, daß der scheinbare Durchmesser des Mondes für diejenigen Orte, in deren Scheitelpunkte die totale Verfinsternung stattfand, während des Verlaufs der Erscheinung zunahm. Alle diese Umstände machten die möglichst genaue Beobachtung der totalen Finsternis am 18. August zu einer Sache von größter Wichtigkeit. In Folge dessen haben denn auch die civilisirten Staaten Europa's nicht gezögert, Beobachter dorthin zu senden, wo das Phänomen in bester Entwicklung sich zeigen sollte, nämlich in die Küstengebiete des Indischen Oceans. Der Norddeutsche Bund sandte zwei Expeditionen aus, die eine nach Vorderindien befuhr eigentlich astronomischer Beobachtungen und die andere nach Aden befuhr photographischer Aufnahmen. Oesterreich sandte ein Expeditionscorps ebenfalls in die Nähe von Aden; außerdem beobachteten die Franzosen und Engländer an verschiedenen Punkten Hinterindien's.

Die erste Nachricht von dem Gelingen der Beobachtungen sandte der französische Physiker Janssen. Es war nur ein kurzes Telegramm; allein schon die wenigen Worte: „Das Spectrum sehr merkwürdig und überraschend“, waren genügend, um eine gewaltige Erregungsschaft als sicher zu dokumentiren.

Die norddeutsche astronomische Expedition hatte den Ort Moosir, etwa 20 englische Meilen südlich von der Ruinenstadt Bejapoor, in der Centrallinie der Finsternis als Beobachtungsstation ausersucht, eine Position, die, nach der übereinstimmenden Auflage der landesherrlichen Autoritäten, höchst günstig in der Nähe des Hochranges der West-Grafs gelegen ist. Die Astronomen hatten sich der ausgezeichneten und freundschaftlichen Unterstützung von Seiten sämtlicher englischen und einheimischen Beamten zu erfreuen, und wenn sich der Himmel ebenso günstig erwiesen hätte, so konnte es nicht fehlen, daß die Ergebnisse der Beobachtungen von ungemeiner Wichtigkeit werden mußten. Leider war dem aber nicht so. Das Wetter blieb ununterbrochen regnerisch. Am Morgen der Finsternis schien sich der Himmel anfangs aufzuklären zu wollen, aber bald mußten die deutschen Forscher sich sagen, daß ihre Bemühungen vergeblich gewesen seien: das Wetter war und blieb schlecht. Zur Zeit der Totalität war die Dunkelheit so groß, daß man selbst in der Nähe Druckdrift nicht lesen konnte. Die Wolken vergaßen sich stellenweise etwas, und man erblitzte Theile der Corona in weißem, glänzendem Lichte; auch Protuberanzen wurden gesehen und ihre Position am Sonnenrande bestimmt. Es war indeß total unmöglich, Spectralbeobachtungen anzustellen, denn die ganze

Zeit, welche in Folge der momentanen Zertheilung des Gewölks unseren Astronomen vergönnt war, belief sich auf höchstens etwa 5 Sekunden. Was unsere Beobachter in diesen kurzen Augenblicken geleistet, ist ein neuer Beweis für die hohe Ausbildung der beobachtenden Astronomie in Deutschland.

Eine zweite deutsche Expedition war nach Aden gegangen, um hauptsächlich photographische Aufnahmen während der Totalität anzustellen. Sie hat ihr Ziel, vom Wetter begünstigt, vollkommen erreichen können. Ein Mitglied derselben, Dr. H. Vogel, berichtet das Nachfolgende: „Am 18. August verließen wir früh um vier Uhr unser Lager. Etwa neun Zehntheile des Himmels waren bewölkt. Entschlossen machten wir uns an die Arbeit. Unsere Aufgabe war es, innerhalb der drei Minuten eine möglichst große Zahl von Bildern des Phänomens zu erhalten. Für diesen Zweck hatten wir uns förmlich an dem photographischen Fernrohr eingeübt, gerade wie Artisten vor ihren Kationen. — Wir hatten festgesetzt, daß es möglich sei, in 3 Minuten 6 Bilder zu machen. Der entscheidende Moment kam näher; der mit danger Serge von uns betrachtete Wolkenhimmel zeigte zu unserer Freude jetzt einige Lücken, durch welche die breite, theilweise vom Monde bedeckte, als Sichel erscheinende Sonnenscheibe sichtbar wurde. Die Landschaft erschien in dem feinsten Lichter, beinahe ein Mittelstadium zwischen Sonnen- und Mondlicht. Die chemische Lichtstärke erwies sich auffallend schwach. Immer kleiner wurde die Sonnenscheibe, und die Wolkenlücken schienen sich noch mehr zu öffnen — wir schöpften Hoffnung! — Die letzte Minute vor der Totalität verging im Fluge.

Dr. Fritzsche und ich trachten eiligst in unser Zeit und blieben daselbst; von der Totalität haben wir leider unter diesen Umständen Nichts gesehen. Unsere Arbeit begann. Die erste Platte wurde probeweise 5 und 10 Sekunden des Lichtes, um zu sehen, welche Zeit ungefähr die richtige sei. Ruhammed, unser schwarzer Diener, brachte mir die erste Kaffette in's Zeit. Ich goß dem Eisenentwicker klar über die Platte, gespannt der Dinge harrend, die da kommen sollten. — Da erlosch meine Lampe. — Licht! Licht! rief ich — Licht! Aber Niemand hörte; Alle hatten vollum zu thun. Da griff ich selbst zum Zeit mit der Hand hinaus, in der Linken die Platte haltend, fand glücklich eine kleine Deslampe, die ich mir für alle Fälle drennend bereit gesstellt hatte, und sah jetzt das Sonnenbildchen auf meiner Platte erscheinen: der dunkle Sonnenrand war umgeben mit einer Reihe eigenthümlicher Erhebungen auf der einen Seite, auf der andern zeigte sich ein seltsames Horn, beide Erscheinungen vollkommen analog in beiden Bildern. — Meine Freude war nicht gering. — Doch es war keine Zeit zum Freuen. Bald war die zweite und eine Minute später auch die dritte Platte in meinem Zeite. „Die Sonne kommt!“ rief Zerkler, die Totalität war vorüber. Alles erschien aber als das Werk eines Augenblicks, so rasch war uns die Zeit verfloßen. — Die zweite Platte zeigte bei der Entwicklung sonderbarer Weise nur ganz schwache Spuren eines Bildes. Vorübergehende Wolken schleier hatten im Augenblicke der Exposition die photographische Wirkung fast gänzlich verhindert. Die dritte Platte zeigte wieder zwei gelungene Bilder mit Protuberanzen am unteren Rande.“ —

## Literaturbericht.

Die **Notabilitäten der Tierwelt**, dargestellt in sechs Bildertafeln von W. Miller's. Berlin, Wigandt & Hempel. 1869. Gr. 8. 512 S. 2 Plt. 10 Sgr.

Ein gutgemeintes Buch, dem vierten internationalen Tierfachkongresse in Paris gewidmet, aber in vieler Beziehung veranlaßt, wie der Titel. Sowohl für die Tierwelt erweisen, um die ersten Erforschungen der Tierfachvereine zu fördern, ist hier ein eitel Zweck, allein er läßt sich nur dadurch erreichen, daß man die seitlichen Eigenschaften der Tierwelt dem Menschen näher bringt, daß man auf die unerschöpflichen Jüge von Intelligenz und Genuß einwirkt und es damit dem Leser überläßt, das Seelenverwandte der Tiere den selbst herauszuwinden. Das hat der Vf. zwar auch gethan, aber nur beiläufig, es war ihm nicht das Hauptmittel, seinen Zweck zu erreichen. In Weagenheil stellt er als solchen ein höchst ungeschicktes auf, und in der, wie sein Titel besagen soll, aber nicht kategorisch ausgedrückt, nur beiläufig gewordene Tiere in der Geschichte aufzucht; gleiches, ob sie durch seelische Eigenschaften oder durch Zufälligkeiten sich einen Namen erworben. Die Gänse des Kaplans, die Kraniche des Hofes, der Schwan des Kaiserhofes, die Beutier vor der Erhebung Jerusalem, die Laube Noah's, die Krokodile des Don Quixote, der Hase Sancho Panza's u. s. w. sind ihm ebenso brauchbare Figuren, wie Bary, der Hund des St. Bernhard, den

er auf dem Titelbilde darstellt. Und doch liegt keine innere Nothwendigkeit darin, daß das, was diese Tiere berühmt machte, auch mit zwingender Nothwendigkeit geschrieben mußte. Sie selbst konnten so wenig dazu, als das „Schat der Samier“, welches, weil es zu fällig ein dem Tempel der Sera entwendetes Goldstück beim Grafen aus der Erde stieg, dazu Veranlassung gab, daß Samos das Schatz von nun an verehrte. Durch die Aufnahme solcher fabelhaften Jüge schwächt der Vf. das naturhistorische Interesse an seinem Buche ebenso, wie durch die Darstellung, welche häufig in's Platte verläßt, wo der Vf. annimmt und gesteht sein will. Namentlich sind viele der Einführungen seiner sogenannten Bilder misslungen, indem sich der Vf. geradezu anstellt, als ob er ein Aufmerksammann mit dem brüthenden „Kerr! ein ander Bild!“ sei. Ein solches Chaos von Bohrem und Wüßhümern, Geringem und Richtigem, Naturhistorischem und Sagenhaftem, ohne Plan und System untereinander gemischt, wie in einem Kaleidostoffe, — brüht den Werth des Buches zu unserm Leidwesen beträchtlich herab und wird schmerslich die Wirkung ausüben, die sich der Vf. davon verspricht. Wie dies dauern es aufreicht, da, wie gesagt, der Zweck ein sehr edler ist und nicht genug gestiftet werden kann. Selbst der hohe Preis des Buches wird seiner Einföhrung beträchtlich schaden. Solche Bücher müssen so compendios und concis als möglich gehalten sein, damit sie in alle Kreise dringen können. R. R.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ue und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 14.**

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

**7. April 1869.**

**Inhalt:** Die Entdeckung Grönlands, von Otto Ue. Zweiter Artikel. — Auch ein Frühlingsbote, von B. Hausmann. — Vater's Reiser  
werk, von Karl Müller.

## Die Entdeckung Grönlands.

Von **Otto Ue.**

Zweiter Artikel.

Drei Jahrhunderte lang waren es nur vereinzelte kühne Seefahrer, die den Versuch machten, das in Vergessenheit gerathene Grönland wieder aufzufinden. Selbst der Erzbischof Wallendorf von Drontheim unternahm es im Jahre 1521, seinen verschollenen Bischofsprengel zu suchen; aber sein Schiff erreichte sein Ziel nicht. Ebenso vergeblich blieben die Bemühungen der Dänen unter Christian IV. und der Isländer; sie fanden nur Eisschollen und Eisberge aber keine Spur von menschlichen Wohnungen und ebensolchen Ansiedlern. Einer der kühnsten dänischen Seefahrer, Magnus Hentzen, soll die verlorne Küste sogar erblickt haben, ohne sich ihr jedoch nähern zu können. Auch Martin Frobisher, der berühmte englische Entdecker zur Zeit der Königin Elisabeth, mußte im Jahre 1576 dem Lande, das er entdeckte, und das kaum ein anderes

als Grönland gewesen sein kann, wieder den Rücken kehren, ohne es betreten zu haben. Einige Erzflusen, die er von den Ufern der von ihm entdeckten und nach ihm benannten Meeresenge zurückbrachte, und aus welchen die Goldschmiede in London vermeintliches Gold ausschmolzen, veranlaßte ihn zwar noch zu zwei weiteren Fahrten in diese Regionen, und auf der letzten führte er sogar eine hölzerne Festung an Bord, um festen Fuß auf dem neuen Lande zu fassen; aber zur Kenntniß des verschlossenen Grönlands haben auch diese Unternehmungen nichts beigetragen. Den bedeutendsten Erfolg in diesen Meeren erzielte noch der berühmte Henry Hudson im J. 1607. Vermochte er auch nicht seinen kühnen Plan, quer über den Pol hinweg den Weg nach Indien zu finden, zu verwirklichen, so gelang es ihm, doch längs der Ostküste Grönlands bis zu



einer hohen Breite, dem Berichte nach sogar bis gegen den 82. Breitengrad vorzudringen. Aber das Festland Grönlands hat auch er wohl nicht berührt.

Die eigentliche Wiederentdeckung Grönlands wurde erst im Jahre 1721 ausgeführt, also 338 Jahre nachdem das letzte Schiff aus den grönländischen Colonien nach Norwegen gekommen war. Hgns Egede, Prediger zu Vaagen im Stifte Drontheim, hatte, von einem heiligen Drange erfüllt, das verschollene Land und seine unglücklichen, von der Welt abgeschnittenen Landeute aufzusuchen, schon im Jahre 1717 sein Amt niedergelegt. Mit Aufopferung seines eigenen kleinen Vermögens und mit Hülfе des Ertrags mehrjähriger Sammlungen unter seinen Landsleuten gelang es ihm, zwei kleine Schiffe auszurücken, und zum Missionär für Grönland mit einem Gehalt von 300 Thlr. ernannt, verließ er, von seiner Frau, seinen zwei Söhnen und 46 andern Personen begleitet, am 12. Mai 1721 den Hafen von Bergen. Allerdings erreichte er nicht, wie er es erwartete und nach den Vorstellungen seiner Zeit erwarten mußte, die Eisküste an der Ostküste, sondern wurde von Stürmen und Strömungen nach der Westküste verschlagen, wo er an dem Süende an der Mündung des Baals-Flusses unter 84° n. Br. landete. Hier war es, wo unfeinseitig einst die alten Normannen ihre Ansiedlungen gegründet hatten. Aber von ihren Nachkommen fand sich nichts mehr vor; an ihrer Stelle war ein neues Volk, das der Eskimo's, getreten, unter welchen Egede sein Apostelamt antrat. Trümmer von älteren, zerstreut liegenden Häusern und Wohnstellen fanden sich hier an der Westküste in Menge vor; Hgns Egede allein zählte deren 90—110. Später fortgesetzte Forschungen haben diese Zahl noch vermehrt, Kirchenfundamente und Grabstätten mit Runenschriften sind gefunden worden, und es ist kein Zweifel mehr übrig geblieben, daß die größte normannische Colonie an der Südwestküste Grönlands gelegen haben muß. Aber durch alle diese Thatsachen wurde man noch nicht überzeugt; so sehr hatte sich seit Jahrhunderten der Glaube festgewurzelt, die normannischen Ansiedlungen müßten an der Ostküste Grönlands gestanden haben. Wie dieser Irrthum entstanden ist, darüber können wir jetzt kaum Vermuthungen haben. Es scheint, als ob eine im normannischen Finnland, östlich vom Miöa-See gelegene Landschaft, die im 9. Jahrhundert sowohl in einer päpstlichen Bulle Gregor's IV. als in einem Briefe Ludwig's des Frommen an den Apostel des Nordens, dem heiligen Ansgar, unter dem Namen „Grœn“ oder „Grœnland“ erwähnt wird, durch Verwechselung mit jenem westlichen Grönland in den späteren unwissenschaftlichen Zeiten zu jenem Irrthum Veranlassung gegeben habe. Jedenfalls hat man Jahrhunderte lang geglaubt, Erik's Entdeckung, seine Eisküste und sein Heringsfisch, wie seine ursprüngliche Colonisation habe auf der Ostküste Grönlands gelegen, und bis in unser Jahrhundert hinein hat man diese verschollenen Kulturstätten dort wieder suchen

zu suchen zu müssen gemeint. Wie deutlich man darum auch die Spuren der alten Normannenskolonien an der Südwestküste Grönlands gefunden hatte, man ließ sich doch nicht abhalten, im Osten danach zu suchen. Man glaubte sogar, die Bewohner der Westküste seien nur auf die Ostküste hinüber gedrängt worden und lebten dort noch in den alten Dörfern und Städten. Man scheute keine Gefahr, die wilden Schnee- und Eisberge zu übersteigen, welche beide Küsten dieses Landes von Norden nach Süden scheiden. Als aber an der Ostküste jede Spur einer früheren Bevölkerung verschwunden, mußte man doch widerwillig die Hoffnung aufgeben, hier die Ueberreste des alten Viðrums Garðar wiederzufinden.

Mit welcher Ausdauer und welchem Heldennuthe Hgns Egede seinen Beruf erfüllte, unter welchen Mühen und Leiden er die Befriedigung dieses Landes ausführte, das er selbst als ein „häßliches und recht fürchterliches Land“ bezeichnet, wie er selbst Hunger und Entbehrungen aller Art ertragen mußte, als nach zehnjährigen Bemühungen lange Zeit alle Unterstützung von der Heimat ausblieb, wie er für sich und seine Familie „die Größe zur Seebundessuppe auf einer Silberwage abwogen“ mußte, ist zur Genüge bekannt. Durch ihn ist Grönland ein Colonialstaat geworden und bis auf den heutigen Tag geblieben, ein normannischer bis zur Trennung Norwegens von Dänemark, seitdem, seit d. J. 1814 ein dänischer. Herrnhuter Colonien haben sich mit den dänischen gemischt, und Missions-, Fischerei- und Handelsstationen ziehen sich von der an der Südspitze unter dem 60. Breitengrad gelegenen Herrnhutercolonie Friederichsthal bis zur nördlichsten aller europäischen Niederlassungen, der unter 72°55' n. Br. gelegenen dänischen Colonie Uppernavik hinauf.

Alle Versuche, die Ostküste Grönlands zu erreichen und dort die so hartnäckig festgehaltenen alten Colonien aufzufinden, scheiterten lange Zeit an der Unmöglichkeit, die gewaltigen Eismassen zu durchbrechen, welche sich zwischen dieser Küste und Island zusammenbrängten. Noch in den Jahren 1786 bis 1789 hatte eine dänische Flotte unter einem Enkel Egede's vergeblich diesen Versuch gemacht. Erst der Dubliner Professor Giescke, welcher sich mehrere Jahre, naturwissenschaftlicher Zwecke willen, auf Grönland aufgehalten hatte, gab im J. 1818 einige Kunde von dieser unbekannten Ostküste, an welcher er bis zum 82. Breitengrad vordringen war. Diese Kunde klang wenig ermutigend; nach den Berichten der als überaus kläglich beschriebenen Eskimo's sollte die Küste nur noch bis zum 64° bewohnt und zur höchsten Noth überhaupt bewohnbar sein.

Ganz anders lautete die Schilderung, welche wenige Jahre darauf die berühmten Walfischfänger Scoresby, Vater und Sohn, von eben dieser Küste und zwar unter weit höherer Breite aus eigener Anschauung entwarfen.

Diese kühnen Walfischfänger unternahmen ihre Fahrt im Sommer 1822 in der ausdrücklichen Absicht, bei Gelegenheit des Walfischfangs die vermuteten alten Ansiedlungen auf Diskönland aufzusuchen. Sie durchbrachen zwischen 74° und 75° n. Br. ohne Schwierigkeit den gefürchteten Treibeisgürtel und erforschten südwärts die ganze Küste bis gegen den 70° hin. Ueberall fanden sie ein schiffbares Meer und waren überzeugt, daß, wenn es ihnen nicht an Zeit gefehlt hätte, sie ohne erhebliche Hindernisse bis zum 60° hätten gelangen können. Sie landeten viermal an der so lange unbetretenen Küste und fanden hier Naturverhältnisse, die im schroffen Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen standen und den alten Namen „Grönland“ vollkommen rechtfertigten. Großartig war der Anblick der fjordreichen, steilen, hohen Fjellküste; „nie habe ich et was gesehen“, sagt der jüngere Scoresb, „was ihr an kühner Größe und anjehendem Charakter gleichkäme. Landeinwärts gab es Strecken, die mit fußhohem Gras bewachsen, so schöne Wiesen bildeten, als man nur irgend in England sehen kann. Der Himmel war wolkenlos, und die Wirkung der Sonne, die ohne Unterbrechung Tag und Nacht ihre Strahlen niederfanke, übte einen zauberhaften Einfluß auf die Entwicklung der Pflanzenwelt. Alles keimte und wuchs mit wahrer Uppigkeit. Die Wärme stieg bisweilen auf + 17° R. und wurde zwischen den Bergen wahrhaft erdrückend. Zahllose Insekten und Schmetterlinge schwärmten umher; selbst ein Bienenstock mit Honig wurde von den Wafrosen aufgefunden. An jagdbaren Thieren des Landes wie des Meeres, an Renthiere, Hasen, Bären, Narmals, Strehkorn, Wafrosen, war nirgends Mangel, wie die Knochenhaufen bei den Ansiedlungen der Eskimo's bewiesen. Traß man auch diese Eskimo's nicht selbst, so waren ihre Wohnungen außerordentlich zahlreich und zwar noch mehr im Norden als weiter gegen Süden.

Diese Schilderungen erfuhren schon im folgenden Jahre eine Bestätigung durch die Expedition, welche von England zur Beobachtung von Penzelschneizungen unter dem Befehl Sabine's und Claverina's in diese Gegenden abgeschickt wurde. Diese Expedition erforschte die grönländische Ostküste vom 73 bis zum 76 Breitengrad, und auch sie fand überall Spuren von Eingeborenen und kam selbst mit diesen mehrfach in freundliche Berührung. Auch die Temperatur war ungewöhnlich hoch; sie stieg in der letzten Hälfte des August auf + 9° R. und sank nie unter — 4°, so daß die Reisenden in dieser hohen Breite die Nächte in Zelten, nur in Mantel und Decke gehüllt, zubringen konnten. Von Eis war selbst nach Norden hin nichts zu erblicken, so weit das Auge reichte.

Endlich unternahm Graah, von der dänischen Regierung ausgesandt, um der mangelhaften Kenntniß des Landes ein Ende zu machen, in den Jahren 1828 bis 1831 eine abenteuerliche Fahrt. Auf gebrechlichen Eskimobooten verließ er am 21. März 1829 die an der Südküste ge-

legene Colonie Nennortalik, um von Westen her um die Südspitze Grönlands herum die Ostküste zu erreichen. Es war eine gefahrvolle Fahrt. Links lag die bis zu 1000 F. hohe fjordreiche Küste, von welcher die gewaltigen Gletscher unaufhörlich unter Donnergebrüll ihre riesigen Bruchstücke in das Meer sandten, rechts der gefürchtete Treibeisgürtel des Meeres. Nichtsdestoweniger gelangte man bis über den 65° nach Norden hinauf und hätte auch nach der Ueberwinterung im folgenden Jahre die Fahrt fortgesetzt, wenn es die Frühjahrstürme bei der Verschaffenheit des einzigen übriggebliebenen gebrechlichen Bootes und seiner nur noch aus Eskimofrauen bestehenden Besatzung hätten rathsam erscheinen lassen. Auch die Ergebnisse dieser Fahrt bestätigten die früheren Erfahrungen. Ueberall war Fahrwasser genug und unter 63° 20' n. Br. selbst im Februar und März das Meer in einer Breite von 12 bis 15 Meilen eisfrei. Das Klima war mild, die Vegetation oft überraschend, und die Bevölkerung immer dichter, je weiter man nach Norden kam. Die Eskimo's wurden im Sommer im Freien nicht angetroffen.

Seitdem ist die Ostküste Grönlands, ausgenommen vielleicht von einigen Walfischfängern, nicht wieder besucht worden. Aber auch diese wenigen Erfahrungen genügen zum Beweise, daß die deutsche Nordpolerpedition Recht hat, wenn sie diese Küste zur Basis wählt, wenn sie hier ein schiffbares Meer und in der Annäherung einer zahlreichen Thier- und Menschenwelt eine Stütze für Ueberwinterungen zu finden hofft. Einer der erfahrensten jetzt lebenden arktischen Entdecker Englands, der schottische Walfischfahrer David Gray, hat sich noch im vorigen Jahre in einem Schreiben an den Präsidenten der Londoner geographischen Gesellschaft auf Grund seiner eigenen vieljährigen Erfahrungen für diesen Weg zum Pole ausgesprochen. „Nachdem ich viele Jahre hindurch“, schreibt er, „an der Ostküste Grönlands Walfischfang getrieben, die Gezeiten, die Meeresströmungen und die Eisverhältnisse zu verschiedenen Jahreszeiten beobachtet habe, bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß man hier wenig oder gar keine Schwierigkeit finden werde, ein Schiff bis zu einer sehr hohen Breite, wo nicht bis zum Pole selbst, hinaufzuführen, wenn man etwa unter 75° auf das Eis los steuert, wo gewöhnlich eine tiefe, bisweilen über 100 Fathellen tiefsehaft gegen die Shannon-Insel gerichtete Einbuchtung vorfindet, wenn man dort dem grönländischen Festland so lange folgt, als es die gewünschte Richtung beibehält, und dann nordwärts durch die Isen, dort mit Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Eiseiseln vorbringt.“ „Für den Fall, daß eine Expedition überwinteren müßte“, sagt er schließlich, „gibt es an der Ostküste Grönlands allem Anscheine nach Buchten und gute Häfen genug, die man dazu benutzen könnte, und nach meinen Beobachtungen scheint dort das Thierleben mindestens ebenso reich zu sein, als durchschnittenlich in anderen arktischen Gegenden.“

Das ist die Geschichte der Entdeckung Grönlands, die fortzuführen und zu vollenden aller Wahrscheinlichkeit nach

dem neuermachten Unternehmungsgelst der deutschen Nation vorbehalten ist.

## Auch ein Frühlingsbote.

Naturgeschichtliche Skizze.

Von W. Sausmann.

Allgemein bekannt und beliebt ist der Aukutz, welcher schon ziemlich früh im Jahre erscheint und seinen Ruf ertönen läßt. Mit ihm kommen zugleich eine Menge kleiner Singvögelarten, die sich mit munterem Zwitschern in den Feden und mit dem ersten Grün geschmückten Büschen umhertreiben. Wenn aber die ersten Maltage mit ihrem helleren Sonnenglanze und määmeren Luftbauche Alles mit feudiger Frühlingsluft beleben, dann eilt auch aus dem fernen, heißen Afrika der farbenprächtige, schlaue Driol seiner nördlichen Heimat zu, um die alten Lieblingspläze wieder aufzufuchen. Gar mancher der feundlichen Leser hörte dann wohl an schönem Frühlingsmorgen ein ledes, aber nicht unmelodisches Pfeifen aus dem grünen Wipfel eines Baumes ertönen, besonders wenn er



Der Driol oder die Goldhammel (*Oriolus galbula*).

an den bewaldeten Ufern eines Sees oder Flusses lustwandelte. Ist mochte er neugierig nach dem Vogel forschen, der da oben seine kräftige Stimme ertönen ließ, aber ohne Erfolg versuchte er es näher zu schleichen; der Driol ist so sehr und vorsichtig, daß es nur in seltenen Fällen gelingt, ihn zu Gesicht zu bekommen. Sobald sich ein Laufsther naht, beobachtet er ihn aus seinem duftigen Blätterversteck mit seinen kleinen, rothen Augen mit dem größten Mißtrauen. Als Warnungsruf läßt er dann ein heftiges kagendähnliches Geschrei hören und fliegt auf der entgegengesetzten Seite vom Störer weg, so daß dieser, völlig getäuscht, ihn noch immer auf demselben Baum wähnt, wo er ihn kurz vorher noch so lustig sitzen hörte. Kennt man aber das Lieblingsterrain der scheuen Vögel, so ist man schon eher im Stande, sie zu belauschen, namentlich

wenn man sich am frühen Morgen, durch einen Baumstamm oder Strauch gebückt, da aufstellt. Am liebsten halten sich die Driole in der Nähe größerer Flüsse und Gewässer auf. Verhält man sich ganz ruhig, so nähern sich die prächtigen Vögel oft ganz dreist. Schon Mancher sah sich angenehm überrascht, wenn er zum ersten Male diese schönen Thierchen sah. Das Männchen ist namentlich überaus schön. Der ganze Unterleib, Kopf, Hals, Brust und Unterflügel sind leuchtend hochgelb, der Schwanz zur Hälfte gelb und schwarz, die zwei mittleren Federn ganz schwarz. Die Oberflügel und Schwungfedern sind schwarz mit schmalen gelblichen Einsassungen. Die kurzen Füße sind blau-grün, der Augenstern, namentlich im Fröhlings, schön carminroth. Die Weibchen sind, wie

sagt bei allen Vogelarten, viel unscheinbarer gekleidet. Bei diesen ist das herrliche Gelb in ein schmutziges Graugelb verwandelt; am Bauche ist es weißlich. Die Federkanten sind mehr grau als gelb. Die Jungen ähneln sehr den Weibchen und bekommen erst in einigen Jahren das volle Prachtkleid.

Die Gattung *Oriolus* findet in Europa ihren einzigen Vertreter in unserm gewöhnlich unter dem Namen des Driol oder der Goldhammel oder auch des Pfingstvogels bekannten *Oriolus galbula*, während die andern Arten wäämeren Klimaten und andern Erdtheilen angehören.

Der Driol ist ein Zugvogel im eigentlichen Sinne des Wortes. Er kommt paarweise, in scharfem, nächstem Flüge aus dem Süden zurück und verläßt uns schon wieder, wenn kaum die Kirschzeit vorüber ist. Im Fröhlings

nähert er sich fast ausschließlich von Blattraupen und Käserchen. Vor seinem Abzuge besucht er fleißig die Kirchhöfen, weshalb er wohl in einigen Gärten auch Kirchvogel genannt wird. Die süßen Früchtlein pflückt er auch gern an. Doch thut er hier bei uns wegen seiner geringeren Anzahl selten so bedeutenden Schaden, als in den Heilgärten südllicher Länder, wo sich die Driole und auch ähnliche Liebhaber der süßen Früchte oft in solcher Menge einzellen, daß es den Eigenthümern gar nicht lieb sein kann.

Bei ihrem Nestbau entwickeln die Driole große Kunstfertigkeit und Klugheit und erinnern darin an die eigenthümliche Bauart der Webervögel und ähnlicher Südländer. Am liebsten hängen sie ihr Nest in der schlanken Gabel eines hohen Baumes auf, welcher womöglich über ein größeres Wasser hängt, wodurch der lecke Nestbauer die beste Aussicht hat, beim Abnaden des dünnen Astes hinunter in das tiefe Wasser zu fallen. Bekanntlich legen viele afrikanische Vogelarten aus Furcht vor Affen ihr Nest in so kluger Weise an. Vielleicht hat auch unser Driole von diesen die Art des Nestbaues angenommen. Die Alten besbrüten die 4 bis 5 glänzenden Eiern, am stumpfen Ende mit einzelnen schwarzbraunen Flecken gezeichneten Eier mit allem Eifer und bewachen sorgfältig ihr Nest. Rast sich eine tücklich umherschleichende Kage in der Nähe sehen, so ertönt sogleich der Warnungsruf, und weithin verfolgen die erzürnten Vögel oft den Eindringling, der sie und ihre Nachkommenschaft zu bedrohen wage. Auch Ibersgleichen dulden die Driole gar nicht gern in der Nähe, und nur auf dem besonders günstigem Terrain nisten mehrere Paare nicht allzuweit von einander entfernt.

Handelt es sich darum, einige dieser Prachtvögel für die Sammlung zu schiessen, so hat man oft seine liebe Noth. Sehr bald bemerken die schlauen Vögel die feindsliche Absicht des umherschleichenden Jägers und nicken ihn oft Runtenlang umher, bis es gelingt einen zum Schuß zu bekommen. Sind sie nur angeschossen, so verstecken und verkleiden sie sich auf's Beste und sind oft schwer aufzufinden; selbst im Wasser helfen sie sich noch fort und verkröchen sich unter Blättern und Wurzeln, sobald sie an's Ufer kommen. Erhascht man sie endlich, so deiffen sie wacker in die Fingern, und wenn ihr Schnabel stärker wäre, würden sie immerhin zu fürchten sein, was aber so nicht viel zu bedeuten hat.

Die Driole mit Dornen und Spreukeln, bei welchen Kirfchen vorgehängt sind, zu fangen, ist auch keine leichte Sache und gelingt nur, wenn man ihre Lieblingsbäume genau kennt, welche sie oft besuchen. Im Käfig sind sie wild und unbändig und gewöhnen sich nur schwer an's Futter. Die Weiffen sterben bald vor Sehnsucht nach der Freiheit, welche sie überaus lieben. Ihr Gesang — wenn man ihre störenden Pfeifen so nennen kann — ist jedenfalls zu unbedeutend, um sie mit vieler Mühe im Käfig zu erhal-

ten; obnehin geht bei den meisten Vögeln auch die Schönheit des Gefieders bald verloren, wenn sie längere Zeit im engen, schattigen Raume des Käfigs eingesperrt waren.

Wenn der Hochsommer vorüber ist, die milden Aukautage schon die Früchte zeltigen, und ein munterer Sönger nach dem andern verflummt, dann rükt sich auch unser Driole wieder in der Stille zum Aukgug. Familiensweise ziehen sie weiter und weiter den Flüsthären nach, die sich nach Süden geben. Redend und spielend sieht man sie an heiteren Morgen noch manchmal in den voll beschauften Baumkronen sich umher treiben. Jetzt halten sie sich viel weniger verborgen als im Frühling, und namentlich sind es die jüngeren, welche oft auf die niedrigsten Äste herunter kommen und so den Beobachter nahe an sich heranrönnen lassen. Nur die alten Männchen, denen auch jetzt noch prächtiges Gefieder allguleicht die Verfolgungslust erwecken dürfte, schlüpfen vorsichtiger durch die dichtesten Baumkronen. Nach einigen zur Eile mahnenden kühleren trüben Regentagen, ist auch der letzte der schönen Sommergäste verschwunden. Nur ausnahmsweise trafen wir einzelne noch am 2. September, ja einmal selbst am 16. September an. Diese Nachzügler hielt wohl nur ein vorzüglich erträgliches Nahrungsrevier zurück. Daher kam es denn auch, daß diese Spätlinge in der Regel so außerordentlich fett waren, daß sie sich niemals für die Sammlung präparieren ließen.

Manchmal geschieht es wohl, namentlich in unserm rauhen, hochgelegenen Gebirgslande mit seinen unermesslichen Waldungen, daß ein tüchtiger Spätschnäher die armen Driole überascht. Der drückende Mangel nöthigt sie dann, selbst von der Erde Insekten aufzuheben, welche der eifige Sturmwind von den Bäumen heruntergeschleuderte. In solcher Nothzeit vergessen sie dann die sonst eigene Schü und Vorsicht und nähern sich selbst den Häusern oder treiben sich in den breiten, mit Weidenbäumen bepflanzen Dorfgassen umher, wo in der Nähe der Stallungen u. s. w. sich noch am ehesten Insekten finden. Dann erlegen sie leider auch die Bauernkneben gar leicht, welchen die Schönheit der Fremdlinge natürlich gemalt in die Augen fällt.

Auffallend ist es, daß die Driole sich trotz ihrer Vorsicht und ihres späten Erscheinens, wo in der Regel stärkere Freiste nicht mehr eintreten, doch so wenig stark vermehren. Vor gefüllten Feinden nehmen sie sich doch auch wohl in Acht; auch bemerken wir nie, daß sie von Sperbern oder ähnlichen Räubern verfolgt worden wären. Auch die Menschen stellen ihnen wohl wenig nach, und da sie bei weitem mehr nützlich als schädlich sind, so verdienen sie von jedem fühlenden Naturfreund in Schutz genommen zu werden. — Allerdings ist das Fleisch der Driole vom besten Geschmack, aber bei ihrer Schütheit und ihrer verhältnismäßig geringen Anzahl bleibt es immer ein seltener Federbissen, der nur Wenigen zu Theil werden dürfte.

# Baker's Reisebericht.

Von Karl Müller.

Dritter Artikel.

Südlich von Dbbo beginnt ein höchst liebliches Land. Es läuft 5 Meilen vom Fuße des Gebirges parallel mit der Kette der Nubiberge. Äußerst parkähnlich und gut mit Wald bestanden, überwuchert aber auch hier das Gras. Schöne Blumen, besonders Erdbeeren, gibt es eine Menge. Die Nubiberge selbst haben an ihrem Fuße einen guten Waldbestand, während nach Süden hin ein schönes, freies Weideland mit süßem Kräuterschmuck von etwa 1 Fuß Höhe aufsteht. Es ist gewissermaßen eine Wellen-Prairie, deren wellenförmige Fläche auf den Erhöhungen von Dörfern gekrönt ist. Der District heißt Faradioko und liegt 3966 Fuß ü. M., also 292 F. höher als Dbbo. Durch seine wellenförmige Beschaffenheit entwirft er sich von selbst und erzeugt darum jenes schöne Weidestück im Ueberflusse. Ungeheuer große Viehherden sind der Erfolg dieser Natureigenen Fruchtbildkeit.

Nach dem Asua hin, der sein ganzes Wasser dem Weissen Nil zuwendet, steigt man wieder sanft abwärts, so daß man sich bei 3° 12' nördl. Br. gegen 2875' ü. M., 1091' tiefer als in Faradioko befindet. Auch hier behält das Land den lieblichen parkartigen Charakter bei, bleibt aber nichtblumiger dünn bevölkert. Die wenigen Dörfer, welche Baker sah, lagen auf niedrigen Hügeln von kahlen Granit, der sich in colossalen Massen isolirt aufhäuft. An dem felsigen Bette des zweitweit trockensten Flusses laden schöne Tamarindenbäume zum Ausruhen ein; das Gras ist nicht mehr eine selbst dem Feuer Schwierigkeiten bereitende Wildnis, sondern schrumpft zu bröckligem Stroh zusammen, welches augenblicklich in 30 F. hohen Flammen aufbrennt. Innerhalb einer Stunde war das ganze Land von seinem dünnen Grase befreit; es sah aus, als ob es mit einem Reichtum von schwarzem Sammet bedeckt wäre.

Auch nach Schoa zu, unter 3° 4' n. Br., bleibt sich der geschilderte parkartige Charakter der Landschaft getreu. Ein einziger Granitblock erhebt sich mit jähem Abfalle etwa 800 F. hoch über die wellenförmige Fläche und bedeckt sich an seinen Lehnen mit schönen Waldbäumen, während sich zahlreiche Dörfer malarisch hineinflechten. Durch jedes Thälchen rinnt ein Bächlein, wodurch das entwässerte höhere Land auffallend trocken und gesund wird. Gewaltige Feigenbäume spenden köstlichen Schatten, ohne den Fernblick zu hemmen. Dieser schneit etwa 25 Meilen gegen West zu Nord am Fuße der Faloro-Hügel hin; um so mehr, als die Lage von Schoa auf 3877 F., d. h. 1002 F. über dem Asua und 89 F. tiefer als Faradioko abzusinken ist. Sofort tritt der Feidbau entwicklung auf, als bisher. Große Massen Sesam, diese im tropischen Afrika so beliebte Frucht,

werden gebaut und sorgsam geerntet. Dieser Sesam darf aber nicht mit dem Sesam des Orients (*Sesamum orientale*) verwechselt werden. Dieser ist eine Leifrucht, während jener ein Hauptnahrungsmittel für die Bewohner des südlischen tropischen Afrika darstellt und zu den bekannten Tragantkräutern (*Astragalus sesameus*) gehört, welche Verwandte unserer Bohnen sind. Die Frucht bringt man auf länglichen, in einem Winkel von etwa 60° geneigten Gestellen von etwa 20 F. Länge und 12 F. Höhe zum Trocknen unter, so daß die Samenkapseln auf einer einzigen Seite liegen und den Gestellen das Ansehen colossaler Büschen geben. Die Speicher sind entweder ein mit Rohmist bestrichenes Flechtwerk auf 4 Pfählen und mit einem Strohdache gedeckt, oder ein Flechtwerk aus Schilf, welches einer colossalen Cigare gleich, deren Stiel eine 20 F. lange Stange ist, um welche herum der Same aufgeschüttet ist. Mit solchem Flechte verbindet sich auch sogleich ein hoher Wehlsand, der seinerseits wiederum höchst vortheilhaft auf den menschlichen Charakter einwirkt. Schoa, sagt Baker, war ein Land, wo Milch und Honig floß. Hühner, Butter, Ziegen waren im Ueberflusse vorhanden und lächerlich wohlfeil. Perlen fanden in hohem Werthe, da noch wenige bis in dieses Land gelangt waren. Die Frauen strömten in Scharen herbei, um Frau Baker zu sehen, brachten Geschenke an Milch und Mehl und erhielten dafür Perlen und kupferne Armbänder. Die Menschen waren in Sprache und Gestalt zwar genau wie die von Dbbo und Faradioko, aber überaus mild in ihrem Benehmen und eifrig bemüht, mit uns auf gutem Fuße zu stehen. Auch Baker fühlte sich in der reinen Luft dieses Landes so gestärkt, daß er wieder einmal die fröhliche Aufregung einer Abfahrt nach unbekannten Ländern genoß.

Nur noch kurze Zeit währt der geschilderte Charakter der Landschaft. Schon 8 Meilen von Schoa steigt man bei dem Dorfe Fatiko einen malarischen Feigenbügel herab und blickt nun in ein ganz verändertes Land. Ein unendliches Meer von Prairien liegt vor uns, und diese bedecken bis zum Horizonte eine Reihe sanft wellenförmiger Erhöhungen und Vertiefungen, welche sich von Osten nach Westen neigen. Bäume gibt es nicht; nur gestreckt in weiten Zwischenräumen drücken sich Dolap-Palmen auf der heiligen Oberfläche des hohen Grases auf. Offenbar verhebt Baker hierunter die bekannte Delap-Palme (*Borassus Aethiopus*), welche in Innerafrika eine so große Rolle spielt. Trotz ihres Daseins gibt es hier kein Brennholz, so daß der Reisende hungrig die Nacht verschlafen muß. Zugleich ist die Strahlung der Ebene höchst bedeutend; die am Tage hohe Temperatur sinkt des Nachts auf die empfindliche

Tiefe von 10°, 22' N. Und doch befindet man sich, bei 2° 45' 37", dem Aequator so nahe! Ebenso wenig darf der Reisende auf vegetabilische Nahrung rechnen. Nur zahlreiche Elefanten durchkreuzen die Prairie. Wird sie angezündet, so erscheinen ganze Flüge von Ruffarden und Giegefsänigern, um, ganz in der Weise, wie man es in Rußien zu sehen gewohnt ist, die unzähligen Insekten zu erbeuten, die dem nahenden Feuer zu entkommen suchen. Beweis genug, daß die Prairie zugleich ein Sumpfland in den Vertiefungen ist.

Erst am vierten Tage gelangte Baker aus der Prairie zu einem herrlichen Walde. Aber auch dieser war so von hohem Gras verflochten, daß man nur durch Anjünden desselben freie Bahn bekam. Gras, Ströme und tiefe Sümpfe lagen nun meist hinter ihm, vor ihm die Bindungen des von Speke und Grant so benannten Sommerschiffes oder des weißen Victoria-Nils. Etwa 80 F. über dem Fluße befand er sich auf einer Höhe von 3864 F. Doch hat der Wald kein Ende. Wo er von den Eingeborenen seines Grases durch Anjünden beraubt ist, sprossen eben die jungen Schößlinge der Weinstöcke hervor. Stacheligen Spargel gibt es in Menge. Nichts aber geht über die Schönheit der Landschaft. Der herrliche Wald läuft parallel mit dem Fluße, der sich zur Rechten des Wanders in eine Reihe von Stromschnellen und Wasserfällen zwischen hohen Klippen auflöst, die theilweis mit Pinien von Bananen und Palmenarten begirt sind. Unter den letzteren erscheint auch die prächtige wilde Dattel (wahrscheinlich *Phoenix spinosa*), das sichere Zeichen einer Aasch oder eines Flusses. Der Sommer ist hier etwa 450 F. breit, an vielen Stellen mit Felseninseln geschmückt, auf denen sich Dörfer und Pfanzahne ebenso befinden, wie sie sich zahlreich in die Klippen des Ufers gedrängt haben. Schon diese eine Thatsache drückt einen Theil des Charakters des Landes, wenn auch keinen freundlichen aus, indem er auf ewigen Krieg deutet. Eine zweite Thatsache offenbart sogleich das Klima des Landes; denn was in Obbo nur ein Anfang dazu war, kommt hier in Ungoro, bei 2° 15' n. Br. und 3996 F. Erhebung, zu voller Entfaltung. Wir haben wohlgekleidete Männer vor uns, welche Röcke von Rindenzug tragen und diese wie die arabische „Tobe“ oder die römische toga umwerfen. Die Frauen kleiden sich in nette Röcke mit doppeltem Saum; viele tragen den Busen bloß, während Andere ein Stück Rindenzug plaidartig über Brust und Schultern schlagen. Das Zeug ist das Produkt eines Feigenbaumes, dessen Rinde in großen Stücken abgeschält, im Wasser erweicht und mit einem Schlägel zu einer Art geriebenen Lebers zurechtgeschlagen wird. Die feineren Sorten fühlen sich eigenthümlich weich an, als ob sie aus Baumwolle gewebt wären. Jeder Garten ernährt darum eine Menge dieser wohlthätigen Bäume, und es ist nationale Regel, daß ein Mann, wenn er heirathet, eine Anzahl von ihnen pflanzt, welche später als die Kleiderlieferanten für die sich erweiternde Familie dienen. Es erinnert dieser erste Versuch zu einer vollständigen Bekleidung ganz und gar an Tahiti, woselbst der verwandte Papiermaulbeerbaum in seiner Rinde den Stoff zur Tappa liefert. Schade darum, daß Baker es versäumte, uns den merkwürdigen Baum näher kennen zu lehren. Nach den etelhaften nackten Stämmen, unter denen er mehr als 12 Monate lang gereist war, empfand er es als eine erfreuliche Abwechslung, sich in einer verhältnismäßigen Civilisation zu befinden. Jedenfalls bildet derselbe ein wichtiges Glied in der Stufenleiter zur Civilisation, die wir vom unteren Weissen Nil bis zu seinen Quellen Schritt für Schritt verfolgen können.

Diese Thatsache ist so interessant, daß sich auch Baker ihrer ganz bewußt wird. Denn mit der anständigen Kleidung verwandeln sich augenblicklich die übrigen Industriezeugnisse. Die Grobgeschmiede bedienen sich nicht mehr der steinernen Hämmer, wie die Latuka's, sondern der eisernen. Aus dickem Kupfer- und Messingdraht, den sie von Zangbar empfangen, gleiten sie feinen Draht. Nur ihre Blasbalge — kupferne Geschüre mit thierischen Gelen bedeckt — sind noch die bisherigen; doch ihre Töpferarbeit selbst übertrifft alles Vorangegangene. Fast alle Weiden, sagt Baker mit Recht, haben einen Begriff von Stein; aber die Stufe des Fortschrittes, die ein Land zwischen dem Zustande der Wildheit und der Civilisation einnimmt, läßt sich in der Regel nach seiner Töpferarbeit bestimmen. Das Urgeschick des afrikanischen Weiden ist der Kürbis, dessen Schale den Napf bildet, den ihm die Natur als die erste Idee darbietet, nach welcher er modelliren soll. Kürbisse mit außerordentlich harten Schalen, die halbiert Napfe geben, wachsen nicht nur wild, sondern große und niedliche Spielarten bilden auch natürliche Flaschen von allen Größen. Die wildesten Stämme begnügen sich in ihrer Stumpfheit mit diesen Spenden der Natur oder beschränken doch ihre Inbegriffe auf einen rohen, halbgekannten Krug zum Wassertragen. Die Halbweiden von Ungoro aber fangen schon an die Natur nachzubilden. Sie verfertigen eine schöne Art von schwarzem Steingut und bilden daraus vorzügliche Tabakspfeifen, die mit Zugerundelung des kleinen eiförmigen Kürbisses äußerst fein gearbeitet sind. Ebenso stellen sie aus demselben Materiale außerordentlich hübsche Napfe und Flaschen dar, welche den Spielarten der Glasen-kränze nachgemacht werden. Es ist ein Stück unserer eigenen Urgeschichte. Selbstverständlich wird auch der Feldbau ein umfangreicher, und Alles steht in genauem Verhältniß zu der Größe der Bevölkerung, die sofort wächst, wie des Menschen Fleisch sich steigert. Paradiesfeigen, Bananenweizen, (Marawa), Bataten und Eier kommen in großen Massen zum Verkauf. Denn mit der Steigerung der Industrie bildet sich der Mensch auch sogleich zum Kaufmann aus, weil er Freude an seiner Thätigkeit empfindet. Das Princip der anständigen Kleidung springt in Ungoro auch sofort

auf diesem Gebiete hervor. In Allem, was der Eingeborene thut, ist er sauber. Nichts bringt er zum Verkauf, ohne daß es in die saubersten Paquete gewickelt wäre. Pisana und Schiff, als Hülle dienen, unterstügen dieses Streben in einem so ausgeübten Grade, daß selbst der Tabak höchst sorgfältig eingepackt wird. Die Maraua kommt in Krügen zum Verkauf, deren Oeffnungen mit einer franzenähnlichen Matte aus reinen, weißen Winken, die in schmale Streifen gespalten sind, verschlossen sind, während ein Strohrohr bis zum Boden reicht, durch welches man im Stande ist, den ganzen Inhalt behaglich auszutrinken. Auf diese Art sind die Krüge, namentlich auf Märkten, äußerst bequeme; der Verschluß repräsentiert einen Kork und doch braucht derselbe nicht umständlich herausgenommen zu werden, im Gegentheil verhindert er die Verschüttung beim Schenken. Es wäre sonderbar, wenn nicht das Alles schon eine höhere Stufe der Civilisation im Laufe der Zeit bewirkt hätte. In der That begnügt sich der Bewohner von Unporo recht mehr mit der Rindenkleidung. Schon hat er gelernt, Ziegenhäute so schön zu gerben, daß sie die Weichheit des Samischleders erreichen. Diese werden in vieredrige Stücke geschnitten und so nett zusammengeknüpft, daß die Arbeit selbst einem europäischen Schneider alle Ehre machen würde. Das Produkt ist ein Mantel, der wegen seiner Dauerhaftigkeit weit höher als ein Rindenmantel geschätzt wird. Sogar die Nadeln fabriciren sie selbst; doch bohren sie das Leder nicht, sondern stellen es dadurch her, daß sie das Ende zu einer feinen Spitze schärfen und umbiegen, während sie die äußerste Spitze in einen kleinen im Körper der Nadel befindlichen Einschnitt kämmern, damit sich dieselbe beim Nähen nicht einbale. Diese Virtuosität haben sie auch auf die Molote, d. h. jene Hute ausgedehnt, mit welcher die Neger ihre Felder bearbeiten; die Bewohner Unporo's haben dieselbe für ihre tief bearbeiteten Bataten selber sehr verbessert.

Außer den genannten Culturpflanzen gibt es noch Sesam, Bohnen, Tulladun, Durra und türkischen Weizen. Der Tulladun ist wahrscheinlich, da es eine Getreideart sein soll, eine Art des Holcus oder der Penicillaria, die so häufig in Centralafrika gebaut werden. Auch der Pisana gibt zu denken; denn da sein Stamm gegen 25 bis 30 F. hoch und dabei schwarz wird, so haben wir es wohl mit einer eigenthümlichen Art zu thun, die sich vielleicht der Musa Livingstoniana Südafrika's nähert. Die grünen Früchte dienen wie Kartoffeln; die Pisanafrüchte werden den Zwieben und Alles, was sich daraus verkraften läßt, so daß die Eingeborenen sehr geschickt in der Verfertigung von Stricken, Boeten, kleinen Taschen u. s. w. werden. Tamarinden kommen in diesem Hochlande nicht mehr fort; bei 2°5'32"

liegt der Flußspiegel 4056 F. ü. M. Tropdem gibt es noch Bäume, welche der Bacaua von Mauritius gleichen und eine Art Nacis geben. Unter dem Namen Bacaua versteht man auf Mauritius eine Pandangart (Pandanus utilis), von welcher man ebenfalls eine Gasse gewinnt; es ist also wahrscheinlich, daß hier eine ähnliche Art oder die schon erwähnte Sansevieria guineensis darunter zu verstehen sei. Kaffee wird aus Urumbi zum Verkaufe gebracht; doch haben die Bewohner sonderbarer Weise keine Vorstellung von unserm Gebrauche, da sie die kleinen und schön geformten Bohnen roh als Reizmittel kauen. Im Ganzen genommen, ist das Land ein mit Dörfern untermischter Wald, der sehr nerselt, besonders in der Nähe des Sommersees, auch wies der sehr unheilvoll auf den Menschen einwirken muß. In der That ist es ein Fieberland, und nirgend erhebt man um das Leben Baker's und seiner Gattin so sehr, wie hier, wo sie, bis zum Tode krank, sich kräftlos am Fieber hinschleppen. Man versteht das um so mehr, wenn man hört, daß die Temperatur von 21°,34 bis 23°,11 R. am Tage steigt, während sie des Nachts auf die Hälfte herabsinkt. Dieser Nachtheil, bei einer jeßmonatlichen Regenperiode, macht sich nicht allein in dem Fehlen von edlen Baumfrüchten, sondern auch darin nur zu bemerkbar, daß die Eingeborenen von Unporo, trotz ihrer soeben gekündeten Vorzüge und trotz der Thatfache, daß sie nur ganz reine Nahrung genießen und auch das Krokodil nicht essen mögen, doch schmutzige Wohnungen besitzen. Ziegen und Hühner theilen die sonst geräumige Hütte mit dem Menschen und begraben sie zu einem Bleihalle, der ebenso stark nach Menschen, wie nach Vieh riecht. Alles schläft auf Stroh, der Mensch auf einem erhöhten Stöcker, der in der Nacht mit einem zugereichten Felle bedeckt wird.

Das Land gegen Süden hin sehr dem regnerischen Klima die Krone auf. Auch hier sinkt es zu einer Ebene herab, doch vom Sommersees und Kofur, seinem Nebenflusse, trägt durchströmt, zur Regenzeit nichts als eine ungeheure Marsch, einen Fiebersumpfbildet. An den Ufern wuchern Papyrus und Lotus um die Wette, während die Luft von Mosquito's wimmelt. Was Baker, vor ihm Speke und Grant, hier aufzufinden hatten, wo ein infamer Häuptling (Kamrasi), der bekannte Frauenmörder, Alles an Habgier und Grausamkeit überbot, was Baker bisher erlebte, fällt den Leidensreichen dieser Reisenden so, daß man bei der Lectüre dieser Erlebnisse wirklich gern auf die Entdeckung der Nilquellen verzichten möchte, wenn nicht ein gütiger Stern dennoch das große Werk begünstigt hätte, nachdem es Jahre hunderte lang vergebens versucht war. Das ist die Reue seit einer Civilisation, die in Centralafrika nicht an den Quellen des Nils sich bewegt!



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Bereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Jatz.

N 15.

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, S. Schwesb'scher Verlag.

14. April 1869.

Inhalt: Baker's Reifewerk, von Karl Müller. Vierter Artikel. — Kasun und seine Feinde, von Wilhelm v. Waldrühl. Erster Artikel. — Was man von der Sonne weiß, von Hermann Klein. Sechster Artikel. — Literarische Anzeige.

## Baker's Reifewerk.

Von Karl Müller.

Vierter Artikel.

Wenn man vom Kasur und seiner Mündung in den Sommersee (Victoria-Nil) nach Süden aufbricht, kehrt auch das alte Ueud des Weißen Nil wieder. Die Gegend ist eine ungeheure Fläche Grasland, mit kleinen Dörfern und Batatenflecken untermischt. Die Bataten selbst haben bei dem wässerigen Boden eine nur geringe Güte, die Dörfer sind erbärmlich. Mit außerordentlich schönem Mimosenwalde, welcher Ende Februar in voller Blüthe steht, wechseln Moräste der ausgedehntesten Art. Bei 1° 19' 31" läuft der Kasur mitten durch einen solchen hindurch und bedeckt sich mit einer jener schwimmenden Brücken, die aus einer Massenvegetation von Wasserkräutern erzeugt, schon im ersten Artikel umständlich geschildert worden sind. Auf dieser sich wellenförmig bewegenden schwankenden Fläche von etwa 240 Fuß Breite — die Breite des tiefen Kasur, —

ausgesetzt der glühendsten Aequatorialsonne und den Fieberdämpfen des Flusses, führt der Weg zu dem entgegengesetzten Ufer.

Kein Wunder, daß Baker inmitten dieser trügerischen Pfades das Schlimmste erleben mußte: Frau Baker bekam mitten auf dem Flusse den furchtbaren Sonnenstich der Aequatorialländer und war eben im Begriffe, in ihrem Zustande wie festgenagelt an die Stelle, durch das 2. F. mächtige Unkraut langsam zu versinken, als Baker noch rechtzeitig die Gefahr bemerkte und die Bejammernswürthe mit Hilfe seiner Mannschaft vom Untergange rettete. Gebrochenen Herzens zieht er weiter dem unbekannten Ziele entgegen, einen vollen Tag lang durch wilde Parklandschaften und Etröme, durch dichten Urwald und marstige Gründe, über wellenförmige Hügel und Thäler mit schlanken Papp-



rus-Winsen, die über dem Tragbrett wie die schwarzen Federn eines Leichenwagens zusammenschlagen. Den zweiten Tag dasselbe Leid, dann streömender Regen und Hungersnot! Sieben Tage lang währte die furchtbare Gehirnentzündung der Frau Baker, und sieben Tage lang mußte sie auf einer Tragbahre durch ein Land getragen werden, dessen Lieblichkeit forden hinreichend flüchtig ist. Fünfmal in der Minute athmete die Kranke, ohne sich sonst zu rühren; dann trat eine Verwirrung des Verstandes ein, ihr Auge in Wahnsinn hülden, endlich bestiger Krampf. Schon schloßen sich die Träger an, ihr ein Grab zu bereiten; allein, die außerordentliche Günst des Schicksals, welche Baker trotz der größten Widerwärtigkeiten so auffallend begleitete, ließ auch diesen Keich an ihm vorübergehen. Als Frau Baker nach so langer Zeit aus einem ruhigen, todesähnlichen Schlummer erwachte, blickte ihr Auge ruhig und klar, — sie war gerettet.

Diese schreckliche Episode spricht wohl lauter als Alles für das Wesen von Land und Klima, aber auch für das Verbleib der Baker'schen Entdeckung, die nun nicht lange mehr auf sich warten lassen sollte. Wenn auch noch immer die Thäler, versperret von riesengroßem Papirus, ein Sumpfland der vorigen Art darstellten, so etab sich doch das Terrain, ein Vergnügen von Gneis und Quarz. Auf den Felsen prangt ein großes Fuderroth der blauen Spezialart (*Sacciarum violaceum*?), in den Wäldern stellt sich wilder Kaffee ein. Alles spricht dafür, daß sich die außerordentliche Aushauer des Baker'schen Ehepaares bald auf das Glanzjensei belohnen werde. Am 14. März 1884 schreibt Baker in sein Tagebuch: „Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als ich meinem Chesen die Sporen gab und dem Führer nachschaltete, den, weil ich ihm bei der Ankunft am See eine doppelte Hand voll Perlen versprochen, die Begehrigkeit des Augenblicks ergiffen hatte. Der schöne, heitere Tag brach an, und nachdem wir ein zwischen den Hügelu liegendes tiefes Thal überschritten hatten, arbeiteten wir uns mühsam (weil fieberhaft!) den gegenwärtigen Abhang hinauf. Ich eilte auf die höchste Spitze. Unser prachtvoller Preis sprang mir plötzlich in die Augen! Dort lag, gleich einem Quecksilbermeer, tief unten die großartige Wasserfläche des Mututan Njige ober der Aldert N'panga, wie Baker das große Sammelbecken des Welken Nils nannte, — im Süden und SW. ein grenzenloser Seeozigont, glänzend in der Mittagssonne, und im Westen erhaben sich, in einer Entfernung von 50 bis 60 Meilen, blaue Berge aus dem Busen des Sees bis zu einer Höhe von etwa 7000 F. über seinem Wasserstand. Den Triumph jenes Augenblicks zu beschreiben, ist unmöglich; hier lag der Lohn für alle unsere Arbeit, für die jahrelange Mühseligkeit, mit welcher wir uns durch Afrika hindurchgeplagt hatten. England hatte (im eigentlichen Sinne freilich nicht!) die Quellen des Nil erobert!“

Wie dieser großen Ertrungenschaft ist aber auch Ba-

ker's Kraft so ziemlich erschöpft. Was er uns über die Natur des colossalen, in weite, unbekannte Länder nach Süden zu sich erstreckenden Wasserbeckens lehrt, hat mehr ein geographisches, als ein naturhistorisches Interesse. Hier nach ist der See eine ungeheure Einsenkung weit unter das allgemeine Niveau, von hohen Klippen umringt, im Westen und SW. von hohen Bergketten begrenzt, ein Behälter, in welchen alles Wasser in großem Umkreise abfließen muß, eine ungeheure Zersplitterung, aus welcher der weisse Nil, die eigentliche Lebensader des Nil, sofort als ein Riese entspringt. Der von Speke entdeckte Victoria N'yanza im Osten des Albert N'yanza sendet ihm, als das höhere Becken von ähnlicher Gestalt und Bedeutung, den Sommersee oder den Victoria-Nil zu, welcher in mehreren bedeutenden Wasserfällen von seinem Hochlande nach und nach 1276 F. hoch herabstürzt. Der bedeutendste ist der Murchison-Wasserfall, der sich in einem einzigen Sage 120 Fuß tief großartig herniederschürzt und mit seinem Wasserschnellprall gegen die dunklen Klippen abstößt. Ein intensiv grünes Laubwerk drängt sich zwischen diese Klippen ein, die den Fluß wie Mauern einengen, während grasige Palmen und Pflanze eine Hochvegetation erzeugen. Am Fuß des Wasserfalles tummeln sich Schaaren von Krokodilen, die aus den Sandbänken gleich Baumstämmen neben einander ruhen, als ob sie wie Bauholz zur Einschiffung bereit lägen. Auch die Klippen des Seebekens, schroffe Felsen aus Granit und Gneis, an vielen Stellen mit rothem Porphyrmarmor gemischt, bedecken sich mit schönen, immergrünen Gewächsen von allen Farben. Besonders zeichnen sich riesenhafte Euphorbien, die wie Vertreter der Cacteen in Afrika, darunter aus, und wo nur immer ein flüßigen oder eine Quelle durch das dunkle Laubwerk einer Schlucht herabkommt, da zeigt sich auch die grasige und federartige wilde Dattel. Im Wasser spielen große Herden von Flusspferden; aber noch größere Schaaren von Mosquito's durchschwimmen die Luft. Am Uferade baden sich zahlreiche Elephanten in dem klaren Wasser und gießen mitleidig über Köpfe ein Sturzbad über Rücken und Schulter. Graubirne Klippen dagegen werden von Ziegenherden abgeweidet; doch ist das Land ringumher nur dünn bevölkert, wenig ergiebig und noch weniger gastfreundschäftlich.

Das ist der Coarcter des offenen Seebekens. Ganz anders erscheint er in den Buchten, wo der See sich verengen, die Form eines riesigen Flußes annimmt. Das reine Kieselgelschiefer hat unangehören Bänken von Schilf Platz gemacht. Diese Bänke sind eigentümlich genau; denn das Schilf wächst auf einer schwimmenden Pflanzendecke, die etwa 3 F. tief, so zäh und fest ist, daß man auf ihr herumgehen kann. Mitunter reist ein furchtbarer Windstoß, mit einer schweren See verbunden, große Stöße ab; die Winde wehen den zu Segeln und treiben somit die Stöße wie schwimmende Inseln von dem Umfange einiger Acker auf dem See umher, um sie irgendwo abzuliegen, wo sie zufällig

hängen bleiben. Es ist dieselbe Vegetationsmilch, die wir schon am untern Weißen Nil fanden, nur großartiger. Sie bezeichnet den Austritt dieses Flusses auf weite Strecken; denn auch die Nierengasse, durch welche er langsam abfließt, ist nichts als eine ungeheure Binsenmilch. Kein Wunder, daß bei so viel verdaulicher Nahrung auch ein reiches Fischleben sich einstellt. Der Baggers, ein riesiger barschartiger Fisch, gilt als einer der delikatesten und wird gegen 100 Pfd. schwer. Doch gibt es mehrere Arten von 200 Pfd. Ganz sonderbar ist der Lepidosiren annectens, ein Mittelglied zwischen Ial und Salamander. An dem Unterleibe hat er keine Flossen, wohl aber vier lange Füßchen, welche gleich Ansätzen von Beinen erscheinen. Man kennt übrigens das seltsame Geschöpf auch vom Gambia, selbst von Moambique her und weiß, daß es im Stade ist, tiefergraben im ausgetrockneten Schlamm die trockene Jahreszeit zu überdauern, wie es gewisse Reptilien anderwärts pflegen. Zu diesem Behufe sind ihm von der Natur doppelte Athmungsorgane verliehen worden: Kiemen für das Wasserleben und Lungen für das Erdleben. Ähnliche Geschöpfe kommen auch am Amazonasstrom vor und bilden die eigentliche Gattung Lepidosiren oder Schuppenmolch; das afrikanische Geschöpf vertreibt eine eigene Gattung: Protoporus. Baker hat den merkwürdigen und zugleich eckbaren Fisch abgebildet. Wenn aber diese Abbildung richtig ist, so dürfte die Art des Albert N'anga ein völlig neues Geschöpf darstellen, da ihm die großen, dunkeln Fische und die breite Schnauze des Gambia-Thieres fehlen, während ihm sehr garte Tüpfel und eine rüsselartige Schnauze eigenthümlich sind. Auch im untern Weißen Nil erscheint ein merkwürdiger Fisch, der Stachelbauch (*Tetraodon physa*), aus der sonderbaren Ordnung der Haisfische und der Familie der Aqualische. Ein Mittelglied zwischen Fisch und Schildkröte, bietet ihm Baker Lungen, welche mit Oeffnungen unter den Flossfedern in Verbindung stehen sollen, die sich bei der Athmung durch halbe Umdrehung aufheben und schließen. Davon ist jedoch bis jetzt in der Zoologie nichts bekannt, wohl aber davon, daß der Fisch mittelst der fleischigen Zunge eine Menge Luft in einen Vorrathsaum pumpt, wodurch er im Stade ist, sich zu einem Ballon aufzublähen, dessen schwarze Grundfarbe von gelben Streifen unterbrochen wird. Da der Nil bei seinen Ueberschwemmungen diese Fische zahlreich auf das Land setzt, so belustigt sich die ägyptische Jugend schon seit Jahrtausenden an dieser Eigenthümlichkeit, wobei der Fisch eine Menge von Stacheln auf der äußerst dehnbaren Haut hervorreibt; man spielt mit den Stachelballons wie mit Globulumbällen, läßt sie auf dem Wasser treiben und läßt die todtten Fische wieder auf, bis die Luft an diesem seltsamen Spielball ein Ende hat.

Auch Baker's Reise nach dem Süden hat ein Ende. Er darf sich gestehen, der Geographie des Nilandes einen glänzenden Dienst geleistet zu haben. Der Nil, von seinem

Geheimniß befreit, löst sich in einen verhältnißmäßig einfachen Strom auf. Sein wirkliches Beden liegt etwa zwischen 3° f. Br. bis 18° n. Br. und zwischen dem 22° bis 39° östl. L. Der ganze Wasserreichtum dieses ungeheuren Raumes kommt dem Nil allein zu Gute. Der Weiße Nil ist seine Hauptader; denn dieser hat beständig Wasser, während die abessinische Zufuhr nur eine zeitweilige ist. Das kommt aber daher, daß innerhalb 3° n. Br. der Regenfall 10 volle Monate, vom Februar bis Ende November dauert, und das sichert dem eigentlichen Nil seine beständige Wassermasse. Den fruchtbaren Schlamm aber führt ihm Aethiopien durch den Atbara und den Blauen Nil zugleich in den Uferschwemmungen zu. Denn dieser Schlamm ist nichts anderes, als das Verwitterungs- und Erosions-Produkt eines vulkanischen Bodens, wie er in Aethiopien einen großen Theil der hochgelegenen Gashänder bildet. Das wußte schon Rüppell, und daß es nicht anders sein kann, hat Baker dadurch bestätigt, daß er den Weißen Nil bis zu seiner Quelle fast durchaus nur als einen höchst trägen Strom kennen lernte, der nicht im Stade sein könnte, so viel Schlammtheile nach Aegypten zu führen, als nothwendig zur Bildung eines Delta's waren, wie es die Erde nicht wieder zum zweiten Male kennt.

Die geologische Formation Centralafrika's ist Unerbittlich, das am Besten des Nil ein Hochland von durchschnittlich 4000 F. Erhebung bildet, meist aus Granit und Sandsteinen aufgebaut. Jahrtausende hindurch lag Centralafrika, wie Baker meint, weder von Vulkanen noch von Wasser verändert, unter der Einwirkung des Verwitterungsprocesses. Dadurch sind seine Granitfelsen in Bruchstücke gespalten, während der aufgelöste Theil durch Auswaschung eine sandige Grundfläche zurückließ. In andern Fällen zeigen aber die Berge eine so harte und unverwundte Oberfläche, als ob sie eben erst aus der Gießerei der Natur hervorgegangen wären. Da Centralafrika — schließt daraus Baker — nie unter Wasser gesetzt wurde, so müssen die Thiere und Menschen ebenso alt und vielleicht älter sein, als irgend welche auf der Erde. Möglicherweise liegt diese ganze Schöpfung der unsrigen so fern, daß sie der adamitischen Schöpfung vorausging. Ich will Baker nicht in seine Vermuthung folgen, da sie sich größtentheils auf den religiösen Standpunkt des Nigers beziehen. Allein, ich schließe mich der Ansicht vollkommen an und glaube sie schon hinreichend für Südafrika aus der Pflanzenwelt in meinem „Buche der Pflanzenwelt“ (S. 273 und 276) bewiesen zu haben. Ich hätte nur nicht geglaubt, daß sie sich auch auf Centralafrika ausdehnen lasse. Jedenfalls deutet Alles darauf hin, daß Afrika seinem größten Theile nach, ähnlich wie Neuholland, eines der ältesten Länder der Erde ist. Mit dieser Annahme steht aber auch sofort der schwarze Mensch als völlig von uns unabhängige Creatur da; und wenn nicht Alles trügt, so fällt die afrikanische Schöpfung in ihrem Alter größtentheils mit der Neuhollands

zusammen. Selbstverständlich können diese Annahmen für heute nur interessante Perspektiven sein; selbst das steht dahin, ob sie je eine unumstößliche Gewissheit erlangen werden. Allen das Eine geht schon jetzt als volle Wahrheit daraus hervor, daß der afrikanische Mensch ein Urgebilde seines eigenen Erdtheils ist. Nicht ohne Absicht habe ich den Pisang immer treu erwähnt, wo Baker dazu Gelegenheit gab. Es scheint sicher, daß sich in den Hochlanden Afrika's mehrere verschiedene Arten finden, die nicht zu der albekannten, über den halben Erdball durch den Menschen verbreiteten eigentlichen Paradiesfrucht (*Musa paradisica*) gehören. In den abessinischen Hochländern ist die *Pinset* (M. Ensete) eingeboren, obwohl sie gegenwärtig bis zum Roten Meere geht und auch in Algerien vorkommt. Auf dem Wege Baker's bis zum Albert N'anga scheint sie ebenfalls vorkommen, aber die von ihm gesehenen wilden Pflanzen bilden eine, wenn nicht zwei besondere Arten. Ob die Livingstone'sche, von seinem späteren Begleiter Dr. Kirk als selbständig aufgestellte Banane Südafrika's mit einer von ihnen zusammenfällt, ist unbekannt. Am Klimamarscharo nehmen ebenfalls Bananen die untere heiße Region ein. Dies und das Daphn von Palmen mit eßbaren Früchten begünstigte unschätbar die Entstehung eines eigenen Menschensammes, da diese vegetabilische Nahrung schon zubereitet über dem Haupte des Menschen hing. Da aber

auf dem langen Wege von Abyssinien bis nach Südafrika sehr verschiedene Bananen- und Palmen-Arten auftreten, so liegt schließlich auch die Annahme nahe, daß der afrikanische Mensch an sehr verschiedenen Punkten seines weiten Erdtheils die günstigsten Bedingungen zu seiner Schöpfung fand, daß, mit andern Worten, die afrikanische Menschenrasse höchst wahrscheinlich an sehr verschiedenen Punkten gleichzeitig geschaffen wurde. Daß sie aber bis zum fernsten Süden so merkwürdig homogen, wenn auch im Einzelnen nach Land und Klima sehr heterogen, antritt, ist dieselbe Erscheinung, die wir auch im Thier- und Pflanzengreiche wiederfinden. Nilpferd, Elefant, Giraffe, Büffel, Zebra, Antilope u. s. w. geben vom Nil bis zum Kap; ebenso der Affenbroddbaum, Pappus, Tamarinde und andere Pflanzen. Ja, das ganze innere Afrika scheint nur eine einzige homogene Vegetationsstufe zu sein; und sicher ist, daß der Landschaftscharakter im Norden und Süden des Äquators derselbe bleibt: ein Naturpark, voll Wäldern, Büschen, Prärien und Wäldern, in welchem die Mimose die charakteristische Form bleibt!

An der Hand solcher Gesichtspunkte, ist das Baker'sche Reisevermerk ein Buch von seltener Anregungskraft. Möge es in seinem deutschen Gewande die Aufmerksamkeit finden, welche es in so hohem Grade auch durch die Schlichtheit und Treueberzigkeit seines Erzählers nebenbei verdient!

## Avalon und seine Feinde.

Von Wilhelm v. Waldbühli.

Grßer Artikel.

Das Avalon oder Avalon der mittelalterlichen Dichtung wird gewöhnlich als das Land der Fern erklärt, das man bald in dieser, bald in jener Richtung suchen, wenn nicht gar über unserer Erde annehmen wollte. Genauere Forschungen über die Verehrung der Feen haben uns aber belehrt, daß jene überirdischen Wesen mit den mittelalterlichen Gottheiten zusammenfallen, denen die über religiöse Vorurtheile erhabenen Römer am Rheine eine Menge von Altären errichteten. Auf diesen Altarsteinen, von denen viele auf unsere Zeiten gekommen sind, stehen gewöhnlich 3 Frauen abgebildet, von denen die erste eine Blume, die zweite einen Apfel, die dritte eine Spinne führt. Der Apfel war also eine Gergabe, eine Gabe der mittelalterlichen Gottheiten, und das Land, wo der Apfelbaum blühte und der Apfel reifte, war das Feenland, der Apfelhain; Apfelund und das durch die französische Sprache verästelte Avalon bedeutet ein und dasselbe. Dieses Land der goldenen Früchte, der köstlichen Äpfel, ist also am Rheine zu suchen, wo die Denksteine der mittelalterlichen Gottheiten gefunden wurden, namentlich von der Einmündung des Rheins bis zum Ausfluß in das Nordmeer. Wir wollen jedoch hier nicht dessen Grenzen feststellen, wollen vielmehr, so weit dessen goldene

Früchte nur reichen, alle seine Götter und alle seine Bewohner zum Kampfe aufrufen gegen einen Wurm, welcher dessen edelste Erzeugnisse in Frage stellt. Wenn es den Kampf gegen einen Riesen der Schöpfung gälte, wenn ein Elefant, einer jener unweltlichen Behemoten oder Saurier zu besiegen wäre, würden wir uns mit den Waffen der neueren Wissenschaft rüsten und rasch und vernichtend dem verderblichen Ungethüme entgegenrücken. Leider aber bedroht keines jener riesenhaften Ungethüme, sondern nur ein winziges, kaum in's Auge fallendes Wesen unsere Döbthaine, aber eines, welches durch seine Kleinheit und seine außerordentliche Vermehrung uns zu einem viel gefährlicheren Feinde erwächst, wie Drache und Leu. Ich rede hier von der Wollentlaus oder der Blutlaus, wie sie in einigen Gegenden unseres Vaterlandes genannt wird, von der aphid lanigera. Dieses Kerbtier gehört zum Geschlechte der Blattläuse, ist aber bei weitem verderblicher, weil es nicht, wie jene, die sich ersessenden Blätter, sondern die Rinde der Bäume angreift und von einem Baume nicht eher abzulassen pflegt, als bis es denselben vollständig zu Grunde gerichtet hat.

Das Unthier hat eine Geschichte. Anfangs dieses Jahres

hunderts war es in unsern Baumgärten und Baumschulen unbekannt. In unserer rheinischen Heimat tauchte es zuerst im Jahre 1840 auf und meines Wissens in den Baumpflanzungen des längst verstorbenen, aber noch in gutem Andenken stehenden Rathes Deock in Opladen, wolschem Rheinmütheim und Düsseldorf. Nach Vermuthungen dürfte das verderbliche Kerbtier mit Pflöpfreisern aus den Niederlanden oder aus Nordfrankreich in die rheinischen Lande eingeschmuggelt worden seyn; es kann aber ebenso gut sich durch die Winde fortbewegt haben, die ihm, wie wir weiter unten zeigen werden, Flügel verleihen. Die Winde streifen ja, wie dieses Ungeziefer gewöhnlich, einen großen Theil des Jahres von Westen nach Osten. Es zeigte sich zuerst an den feineren Aepfelarten, besonders den Kantäpfeln (Kalvillen), welche an Gittern (Spallieren) gezogen wurden und daher wohl die zarteste und saftreichste Rinde boten. Wir hatten Gelegenheit, es bei dem genannten Pomologen gleich beim ersten Erscheinen, wie auch die Mittel kennen zu lernen, welche der ehrwürdige Gartenfreund gegen dasselbe in Anwendung brachte.

Was diese Erscheinung betrifft, so gewahrte man anfangs unten am Stamme der bedrohten Bäume kleine, weiße Fledchen, wie sie wohl durch den Unrath kleiner Vögel vorkommen können. Durch die Zahl der Fleden und durch ihre Ausdehnung aufmerksam gemacht, bemerkte man bei gründlicher Untersuchung, daß der Stamm mit einer feinen, blendend weißen Wolle überzogen war. Diese Wolle häuften sich besonders dort, wo die Rinde am zartesten erschien, wo z. B. Wunden der Rinde oder abgeschnittene Aeste im Verlaufe begriffen standen, wo eben deshalb der reichlichste Zufluß der Säfte stattfinden mußte. Nach und nach bedeckte sich aber der ganze Baum mit dieser Wolle und rückte dieselbe am Stamme hinauf, haftete den Ästen an und verflieg sich bis in die äußersten Zweige.

Bevor diese geschehen konnte, hatte der Pomolog schon die Entdeckung gemacht, daß die Wolle nur die Hülle eines Kerbtieres sei, welches in großer Menge den Stamm überzog und von dem Saft, welchen es der Rinde entzog, lebte. Die Wunden, welche dadurch verseht wurden, stellten sich zu heilen und zu schließen, aber da die junge, neu sich schlängelnde garte Rinde dem Ungeziefer eine desto beliebtere Nahrung bot, mehrten sich gerade an dieser Stelle die Schmarotzer und misshandelten dort den Baum in der Weise, daß die Äste immer dichter Knorren ansetzten, später sogar austrockneten und abstarben. Da dann die Kerbtiere sich auf die andern Theile des Baumes warfen und, wie gesagt, bis in die Zweige flogen, wurde der Baum binnen wenigen Jahren fastlos, und es bildeten sich an den Zweigen Äugeln von der Dicke der Walnüsse, so daß der ganze Baum allmählig abstarb und verrottete.

Freilich ließ Rath Deock dies nicht ohne Kampf geschehen. Er versuchte Alles, was er als Mittel gegen Ungeziefer kannte, und was er von andern Obstpflegern anem-

pfohlen bekam; Eisenlauge, Tabakslauge und andere scharfe Absude wurden aber vergebens angewandt oder dienten meistens nur für kurze Zeit gegen das Ungeziefer. Die meisten Spallierbäume wurden infessen von demselben zu Grunde gerichtet, und bald standen auch die hochstämmigen davon bedallen. Nicht lange währte es, so war das verheerende Thier durch das Wuppertal bis Elberfeld vorgebrungen, wo ein anderer Pomolog, Postdirector Schulz, gegen dasselbe auftrat, doch auch, ohne demselben Einhalt gebieten zu können. Bäte das Thier größer gemessen, und wären die Verheerungen desselben rascher von Statten gegangen, so hätte die Menge sich vielleicht eines Besseren belehren lassen, während so die Ungebildeten über die Verschönerungen der Unterrichten lachten, und selbst gebildete Gartenfreunde die Furcht vor den kaum sichtbaren Feinden mindestens für übertrieben hielten. Immer weiter verbreitete sich die Rindenlaus. In den fünfziger Jahren glaubte der verstorbene Volksovertreter Kolshoven, der in der Umgegend von Köln wohnte und sowohl ein tüchtiger als auch ein denkender Landwirth war, in dem Ueberflühen der Bäume mit Kalk ein wirksameres Mittel gefunden zu haben. Der als Wachsienebauer wie Pomolog und durch seine weiten Reisen bekannte Heinrich Uthhorn in Gerwenbroich bediente sich nach mehreren Versuchen mit andern Stoffen des Terpentinspiritus, ein Krebser der Gärner empfahl Petroleum (Steinöl) und der Gartenfreund Rontanus (Zuccalmaglio) in Gerwenbroich Holzessig gegen die Verheerungen, gegen die man in ganz neuester Zeit Steinkohlentheer und Gasmasser anzuwenden will.

Es ist wirklich schon außerordentlich viel gewonnen, wenn man dem Ungeziefer eine Zeit lang Einhalt thun kann, und wenn man dessen gänzligen Sieg verhindert. Um die Aepfelbäume vor ihm zu erhalten, wird man zeitweise nachsehen, im Herbst oder Frühling aber eine Hauptreinigung vornehmen müssen. Hierbei fällt es denn gänzlich, daß die meisten Obstsorten gewöhnlich an Gittern und niedrigen Stämmen gezogen werden, die man zu jeder Zeit am gründlichsten nachsehen und reinigen kann, was bei Hochstämmen, sobald diese über und über bis in die Zweige bedeckt sind, kaum möglich ist.

Leider aber hat die Wollenlaus in den letzten Jahren sowohl in Westphalen wie am Mittelrhein überhand genommen. In ersteren Gauen sind die Pflanzungen, in ihrer Vereinzlung durch Gebirge und Wäldungen getrennt, nicht in dem Grade ausgebreitet wie am Rheine, dessen Thal ein fortlaufender Obsthain genannt werden kann und der Vertheilung des Ungeziefers also auch keine Schranke setzt. Der Wanderer, welcher diese herrlichen Obsthaine des Mittelrheines durchzieht, wird finden, daß die jetzt noch grünen Bäume einen großen Theil bläuerer Äste und Zweige tragen. Er wird Bäume sehen, welche augenscheinlich im Begriffe stehen abzustarben, wird sogar viele antreffen, welche dürr und abgestorben sind und von keinem Frühling

mehr belaubt werden. Fragt er den Landmann nach der Ursache, so wird es heißen, die dürren Jahre hätten diese Obstbäume verdorben und trügen die Schuld des noch fortwährenden Kränkels. Mit ziemlicher Gewißheit läßt sich aber dagegen anführen, daß das Ungezeirte, daß die Blut-

laus (die Rindenlaus) Schuld an der Verkümmernng, wie an dem Absterben jener Bäume ist. Es läßt sich sogar besfürchten, daß unser rheinisches Ahalun, ja, daß hinter ihm unser ganzs deutsches Ahalun diesen Eindringlingen gegenüber in Frage steht.

### Was man von der Sonne weiß.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Beobachtungen während der totalen Sonnenfinsternis am 18. Aug. 1908.

Von Herrn J. Klein.

Schüler Astril.

Der Leiter der britischen Expedition, Major Tennant, hat an den Königl. Astronomen in Greenwich ein Schreiben gerichtet, in welchem die hauptsächlichsten Ergebnisse der Beobachtungen berichtet werden. Die Engländer beabsichtigten gleichzeitig photographische Aufnahmen und spectralanalytische Beobachtungen anzustellen. In Beziehung auf den ersten Punkt sind sie nicht ganz so sehr vom Glück wie unsere Beobachter begünstigt gewesen. Am Tage der Finsternis bildeten sich nach einem heiteren Morgen dünne Cumulostratus-Wolken, die zwar das Sehen nicht deschränkten, aber die chemische Intensität des Sonnenlichtes der Art beeinflussten, daß es unmöglich wurde, jedes Negativ genau während der richtigen Zeit zu exponieren, so daß die Bilder Manches zu wünschen übrig lassen. Zudem hatte die Wärme das salpetersaure Silber in dem Grade concentrirt, daß die sarte Zeichnung der Corona siefdig wurde. Der norddeutschen Expedition in Aden ist Derartiges nicht passiert und zwar gewiß deshalb zum Theil, weil sie theoretisch und praktisch gebildete Photographen zu Mitglieberten hatte.

Major Tennant berichtet ferner, daß nach Kapitän Bransfill's Beobachtungen das Licht der Protuberanzen unpolarisirt war, während dasjenige der Corona sehr starke Polarisation zeigte und zwar in einer durch den Sonnenmittelpunkt gebenden Ebene. Von der Corona erhielt Tennant ein continuirliches Spectrum, „von einer Protuberanz dagegen ein Spectrum mit hellen Linien.“ „Ich glaube sogar“, sagt Major Tennant, „behaupten zu können, daß die Linien vom Spectrum der Protuberanz den Linien C, D und b des Sonnenspectrums entsprechen. Ich sah ferner im Grün eine helle Linie in der Nähe von Fraunhofer's Linie F; indeß verschwand sie im Sonnenlicht, ehe ich sie messen konnte. Schließlich glaube ich auch im Blau nahe bei A Spuren einer Linie gesehen zu haben.“ Die von Tennant untersuchte Protuberanz war etwa drei Minuten hoch und schmal, „sie war zickzackartig wie ein Blitz.“ Warren de la Rue macht darauf aufmerksam, daß auch er in seinen Photographien der Sonnenfinsternis vom 3. 1860 eine spiralförmige Protuberanz erhalten habe, und die Beschreibung Tennant's eines zickzackförmigen Gebildes dieser Art mit dem Aussehen übereinstimme, daß eine offene Spirale darstellt. Bei einer späteren genaueren Un-

tersuchung der Photographien mit entsprechender Vergrößerung fand Major Tennant, daß die von ihm auch spectralanalytisch untersuchte Protuberanz sich als ein Lichtstreifen darstellte, der spirall um ein halbdurchscheinendes Centrum gewunden ist.

Schiffsleutnant Herschel beobachtete im Auftrage der Königl. Gesellschaft zu London die Sonnenfinsternis in der Nähe von Jamaika. Er hat mit sehr lebhaften Farben die Eindrücke geschildert, welche das seltsame Phänomen und das glückliche Gelingen der Beobachtungen auf ihn gemacht. Nachdem er genaue Positionsbestimmungen der ersten auftauchenden Protuberanz angestellt, kehrte er zum Spectrescop zurück. „Ein einziger rascher Blick des Auges“, sagt der Beobachter, „gab mir in ausgedehntem Maße die Lösung des Problems. Drei lebhafte Linien, roth, orange, blau! Keine andere, keine Spur eines continuirlichen Spectrums! Ich glaube, daß ich in diesem Augenblicke etwas überreizt war; denn ich tief mit Lebhaftigkeit und ohne Nothwendigkeit meinem Secretaire zu: Roth, grün, gelb, mit der Uebersetzung, ich habe gesagt: Roth, orange, blau. Ich verlor indeß keine Zeit und machte mich daran, die Messungen auszuführen.“ Leider war es der vielen Wöthen wegen schwierig, die Lage der hellen Linien mit aller wünschenswerthen Genauigkeit fixiren zu können. Von der Linie im Orange glaubt Herschel, daß sie nicht mit Fraunhofer's Linie D (der Natriumlinie) zusammenfalle; ebenso erachtet er auch die Identität der blauen Linie mit F des Sonnenspectrums (Wasserstoff) durch seine Beobachtung keineswegs für erwiesen. Was die rothe Linie anbelangt, so fällt sie im Sonnenspectrum in der Nähe von C (Wasserstoff) und nicht ganz bis B.

Einen genaueren Bericht über die Ergebnisse der französischen Expedition hat Stephan, der Director derselben, von der Station Batonne aus an die Akademie zu Paris gerichtet. „Der Morgen des 18. August“, heißt es in demselben, „war ziemlich schön, aber gegen 9 Uhr wurde das Wetter beunruhigend. Große Wöthenmassen wälzten sich gegen das Zenith und zogen mit Schnelligkeit in die Richtung von Südwest nach Nordost dahin. Der erste Contact war unsichtbar. Die Wöthen begannen sich immer mehr

und mehr anzuhäufen, und Alles deutete auf Unwetter; ja es regnete schon in der Ferne. Einen Augenblick gab ich Alles verloren. Schon war die Finsterniß beträchtlich vorgeschritten; allein kaum vermochten wir die durch augenblickliche Lücken zwischen dem Gewölke zu constatiren. Glücklicherweise blieben die Wolken ungefähr 20 Minuten vor Beginn der Totalität fast plötzlich an, zerstreuten sich nach und nach, und 10 Minuten später war der Himmel auf einer ziemlich ausgedehnten Strecke rings um die Sonne wolkenfrei. — Nachdem der letzte Sonnenstrahl entschwinden war, erschienen — wie man sagt, selbst dem bloßen Auge sichtbar — die Protuberanzen, die Corona und die strahlende Glorie um die Sonne. Die ersten zeichneten sich im großen Teleskope sehr scharf ab und bildeten vier Gruppen. Ihre Farbe war ein mit Violett vermishtes Korallenroth. Sie standen fest auf dem dunklen Rande, schwebten also nicht frei über demselben, wie ähnliche Beobachter bei früheren Finsternissen gelegentlich wahrgenommen haben. Die größte Protuberanz hatte eine Höhe, welche etwa dem zehnten Theil des Sonnendurchmessers gleich kam. Während ich mittelfst des von Hrn. Billarceau für die Sonnenfinsterniß in Spanien errichteten Micrometers die Position der Protuberanzen aufnahm, und Hr. Tisserand mittelfst seines am Aequatorial befindlichen Positionsmicrometers ebenfalls Messungen dieser Art ausführte, constatirten die Herren Rayet und Haert mittelfst des Spectroscops, daß das Spectrum der Protuberanzen aus hellen Linien bestand. — Der zweite Contact war keineswegs von einem plötzlichen Verschwinden alles lebhaften Lichtes begleitet. Nach dem Verschwinden des Sonnenrandes erschienen Hrn. Tisserand und mir, etwa während einer Viertelminute, der Mond noch wie umfäumt von einer hellen, wenig dichten Contour, deren Glanz dem Sonnenlichte vergleichbar war. Dieser Ring war der Art brillant, daß er leicht zu einem Irrthum begfällig des wahren Augenblicks des Contactes führen kann. Die eigentliche Sonne scheint sonach von einer feinen, diaphanen Schicht umhüllt zu sein, die einen sehr lebhaften Glanz besitzt. Unabhängig von dieser Umhüllung, hat die Corona ihren gewöhnlichen Anblick. — Nach dem dritten Contacte wurde der Zustand des Himmels wieder ungünstig, und es war nicht möglich, die vierte Berührung zu beobachten. Ich muß noch der Selbstgegenwart Erwähnung thun, mit welcher Herr Rayet das Spectrum der großen Protuberanz beobachtet hat, indem er den Spalt des Spectroscops in zwei senkrecht gegen einander stehende Positionen brachte, der Art, daß er die Ueberzeugung gewann, das erhaltene Spectrum sei wirklich der Protuberanz zuzuschreiben und nicht etwa irgend einem andern Theile der Sonne. Was den Einfluß der Finsterniß auf Thiere und Pflanzen betrifft, so war er fast Null. Die Dunkelheit wurde überhaupt nicht sehr groß, und der Schatten des Daches unsrer Hütte, in der wir beobachteten, war ununterbrochen auf dem Boden sichtbar. Man sah im

Ganzen 5 Sterne, vielleicht wegen der zu starken Verdunklung. Die polarisoscopischen Beobachtungen der Herren Lezourneur und Bédic haben ein negatives Resultat ergeben."

Die österreichische Expedition in Aden hat drei Protuberanzen beobachtet. Die bemerkenswerthe von ihnen hatte eine halbkugelförmige Gestalt und eine sehr glänzende carminrothe Farbe. Ihre Höhe wurde zu  $\frac{1}{4}$  des Sonnensdurchmessers geschätzt. Sie blieb nicht allein während der ganzen Dauer der Verfinsternung sichtbar, sondern verschwand erst eine Minute nach dem Ende der Totalität und auch dann nur wegen sich anhäufender Wolken. Die Corona bot große Ähnlichkeit mit der in Spanien am 18. Juli 1860 beobachteten Erscheinung dar; indeß konnte sie wegen hindurchlichen Gewölkes nicht ganz nach Wunsch beobachtet werden. Die spectroscopischen Beobachtungen ergaben im Augenblicke der Totalität ein plötzliches Verschwinden sämtlicher dunkler Linien, und das Spectrum nahm eine schwache, aber immer sehr gut sichtbare continuirliche Gestalt an. Gegen Ende der Totalität, als ein Wolkenschleier die Sonne bedeckte, und nur die Protuberanzen sichtbar blieben, verschwand der merkbarste Theil des Spectrums fast vollständig, und es blieb nur eine Reihe rother, durch breite Zwischensäume von einander getrennter Bänder übrig.

Außer den bis jetzt mitgetheilten Beobachtungen — von jenen Janssens wird noch die Rede sein — sind noch eine Anzahl anderer veröffentlicht worden, die indeß dem Bekannten nichts Wesentliches hinzufügen und daher an dieser Stelle übergangen werden können.

Sehen wir nun zu, welche Resultate die Gesamtheit dieser Untersuchungen geliefert hat. Wir haben oben mitgetheilt, daß Arago die Protuberanzen für Wolken hielt, die in der Sonnenatmosphäre schwimmen, also erleuchtete Massen seien. Wir suchten gleichzeitig nachzuweisen, daß diese Annahme vielen Wahrnehmungen durchaus widerspreche. Die spectralanalytischen Beobachtungen haben nun definitiv allen Zweifel gehoben. Die Anwesenheit heller Linien im Spectrum der Protuberanzen gibt einen Beweis dafür, daß diese Gebilde glühende Gase sind. Diese Thatfache kann gegenwärtig durchaus nicht mehr angefochten werden; allein die Beobachter haben sich in den Verichten, welche wir oben mitgetheilt, keineswegs entschieden ausgesprochen, welcher Natur jene glühenden Gase seien. Hier tritt nun Janssen ein, dessen neueste Verichte die Thatfache als feststehend verkünden, daß hauptsächlich Wasserstoffgas das wirksame Princip in den Protuberanzen sei. Im Allgemeinen hat sich Kirchhoffs Theorie der Sonne gegenüber der alten Ansicht sehr gut bewährt; doch bemerkt Janssen, daß sie noch einiger Modificationen bedürfe. Was aber den Beobachtungen Janssens vor allen andern eine ganz vorzugsweise Wichtigkeit verleiht, ist der Umstand, daß er praktisch und mit Glück eine Methode in Anwendung gebracht hat, die Protuberanzen jeder Zeit beobachten

zu können. Auf diese Weise ist es ihm bereits gelungen, nachweisen zu können, daß diese Gebilde, die in vielen Fällen eine wahre Höhe von 10—15,000 geographischen Meilen besitzen, ihre Gestalt sehr schnell ändern, überhaupt einem ununterbrochenen Formenwechsel unterworfen sind. Auf diese Weise ist der directeste Beweis geliefert, daß der Sonnenball ein ungeheures, in ununterbrochenem Wellenschlage befindliches Stuthmeer ist, und daß die alten Vorstellungen — Herschel meint, die Sonne befände sich im Zustande eines perpetuirlichen Nordlichtes — so fehlerhaft als möglich waren.

Aber wovon wird dieser furchtbare Sonnenbrand seit Jahrtausenden unterhalten? Wo befindet sich die Quelle, aus der die Kraftvorräthe, welche in jeder Secunde von der Sonne aus in den Weltraum fließen, erneuert werden? Mit Bestimmtheit wissen wir auf diese Frage gegenwärtig noch nicht zu antworten.

Die verschiedenen Hypothesen, welche man in dieser Beziehung bis jetzt aufgestellt hat, können hier nicht wohl einer eingehenden Besprechung unterzogen werden. Nur eine von ihnen, welche die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat, soll kurz skizzirt werden.

Helmholtz sieht die Ursache der Sonnenwärme in der fortwährenden Verdichtung des Sonnenkörpers selbst. Jedoch ist es nicht diese Condensationswärme allein, welche die Quelle der Sonnenwärme bildet, sondern hierzu kommt noch die beträchtlichere Wärmequantität, welche die Sonne ursprünglich besaß, als sie im Zustande eines ungeheuren Gasballes sich befand, und das Planetensystem als solches noch gar nicht existirte. Seit jener Zeit hat unser Centrakörper an Wärme fortwährend durch Ausstrahlung verloren und verliert noch jeden Augenblick. Die fortschreitende Verdichtung muß aber einmal eine äußerste Grenze erreichen und damit die Quelle neuer Sonnenwärme versiegen. Wann dies geschieht, wer will es berechnen? Das es aber einß geschehen wird, sofern nicht neue, und ganz unbekannte Kräfte der Sonne neue Wärme in beträchtlicher Menge zuführen, ist ungewisselhaft. Sterne tauchen auf und verschwinden am Himmelsgewölbe, unsere Sonne kann keine Ausnahme beanspruchen. Aber wir wollen hier der Phantasie nicht die Zügel schießen lassen und uns ein Bild von dem Zustande ausmalen, dem unsere Erde dann mit schnellen Schritten entgegengeht, wenn die Sonne, die Quelle aller Kraft für uns, zu scheinen aufgehört hat.

## Literarische Anzeige.

### Aus Ferdinand Hirt's Bibliothek des Unterrichts.

#### Für den Anfangs-Unterricht in der Naturgeschichte.

Schilling's kleine Nat.-Geschichte. Kleinere Ausgabe von Schilling's *Grundriß der Naturgeschichte des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs*. Zweifache, wesentlich verbesserte und vermehrte Bearbeitung. Vollständig in einem Bande. Mit 799 naturgetreuen Abbildungen. 1869. Dem ersten Male besuchs freigelegter Wahl in doppelter Ausgabe:

A. Mit dem Pflanzenreiche nach dem Linné'schen System; 27 1/2 Sgr.

B. Mit dem Pflanzenreiche nach dem natürlichen System; 27 1/2 Sgr.

Diese zwölfte Bearbeitung des „kleinen Schilling“ versucht es, allen neuerdings von Lehrkreisen angeregten Verwünschungen nach Möglichkeit zu genügen; sie ist die erste, welche es, in Mitten der schwelenden Frage der Bevorzugung des einen oder des anderen Systems für den botanischen Anfangs-Unterricht, freigestellt, das Schilling'sche Buch, wie zeitlich, mit dem Pflanzenreiche nach Linné (Ausgabe A) oder nach dem natürlichen System (Ausgabe B) bei völlig gleichem Preise zu wählen.

Schilling's *Nat.-Atlas der Naturgeschichte*. In nahe an 1200 Abbildungen aus dem Thier-, Pflanzen- und Mineralreiche. Zur Belebung und Förderung der vergleichenden Anschauung in dem Gebiete der drei Reiche der Natur. Ein Ergänzungsbuch zu jedem Lehr- und Lernbuche der Naturgeschichte. Vollständig in einem Bande. Carl. 27 1/2 Sgr.; oder in zwei Abtheilungen, deren erste das Thierreich, deren andere das Pflanzen- und Mineralreich umfaßt, zum Preise von je 15 Sgr.

Jede Sortiments-Buchhandlung des In- und Auslandes übernimmt zu genau denselben, anerkannt billigen Preisen die Vierung meines Schulverlages, dessen neuer Katalog überall herabfolgt und auf Verlangen von meiner Verlags-Handlung nach New-York's postfrei gesandt wird.

Preislaun, Königsplatz 1.

Obern, 1869.

Ferdinand Hirt,  
Königlicher Unterrichts- und Verlags-Buchhändler.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 25 Sgr. (1 fl. 50 Kr.)

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verleger: Schönlank'sche Buchdruckerei in Halle.



# Die Natur

## Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

N 16.

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, S. Schwetschke'scher Verlag.

21. April 1869.

Inhalt: Die Leuchtbarkeit der Gesteine, von Otto Ule. — Vulkan und seine Feinde, von Wilhelm v. Waldbrohl. Zweiter Artikel. — Die Uffel, von Ph. Birzgen. Erster Artikel.

### Die Leuchtbarkeit der Gesteine.

Von Otto Ule.

Unter den neueren Eroberungen der Naturwissenschaft hat mit Recht kaum eine andere so großes Aufsehen erregt, wie die sogenannte Spectralanalyse, die uns in den Stand setzt, selbst über die Natur der Stoffe, aus welchen die Sonne oder der Sirius oder sonst ein ferner Fixstern besteht, ein sicheres Urtheil zu gewinnen. Es war von um so höherer Bedeutung, als wir uns gewöhnt hatten, überall, wo das Licht die einzige Quelle unser Erkenntniß bildete, nur Beschreibungen zu erwarten. Waren doch selbst die großartigsten Entdeckungen auf diesem Gebiete, Mikroskop und Teleskop, nur gleichsam Verbesserungen unseres Auges, wodurch es möglich wurde, Bilder von Gegenständen in größerer Nähe zu betrachten, als es sonst die Einrichtung des Auges gestattete! Immer aber blieben es nur Umrisse, Formen, über die wir ein Urtheil gewannen, und selbst diese

blieben uns verschlossen, wo ungeheure Entfernungen, wie bei den Welten des Himmels, uns nur Punkte statt ausgedehnter Bilder erblicken ließen. In das Innere der Dinge vermochte das Auge sich nicht zu vertiefen. Es war schon ein gewaltiger Fortschritt, als die Entdeckung der Lichtpolarisation und die Möglichkeit gewährte, eignes Licht von erborgtem, reflectirtem zu unterscheiden. Jetzt ist erreicht, was die kühnste Phantasie nicht träumte. Wie erfahren durch das Licht, daß ein Körper ausstrahlt, ob dieser Körper fest oder gasförmig sei; wir erfahren, ob es Eisen oder Kupfer, ob Natrium oder Kali, ob Wasserstoff oder Kohlenstoff sei, dessen glühende Dämpfe uns das Licht zusenden; wir entdecken selbst neue, bisher der feinsten chemischen Analyse unzugänglich gebliebene Stoffe durch die Eigenthümlichkeiten des Lichtes, das sie erzeugen: und das



Alles gleichviel, ob wir den Körper in Händen haben oder ob er in unmeßbaren Fernen schwebt, ob er ein Staubkorn oder eine Rifsenwelt ist.

Unsere blickttrige, jetzt so glänzend durchbrochene Nachtlosigkeit dem Lichte gegenüber verräth sich in Nichts deutlicher als in dem Unvermögen, die Stärke eines Lichtes zu messen oder die Helligkeit verschiedener Lichtquellen zu vergleichen. Wir sehen uns hier auf das schwankende Gefühl, auf die Empfindung unseres Gehirns angewiesen, und damit ist Alles gesagt. Wir, die wir mit solcher Sicherheit die Bahnen der Gestirne messen, die wir auf Secunden und Zehntelsekunden den Ort jedes Gestirns zu jeder Zeit zu bestimmen vermögen, sind nicht im Stande, zu entscheiden, ob dieser Stern die doppelte oder 3fache Leuchtkraft besitze als jener, ob das Licht der Sonne Tausende oder Millionen Mal das Licht des Vollmondes übertriffe. Wir sind diesen leuchtenden Strahlen der Sonne und der Gestirne gegenüber viel schlimmer daran, als den gleichzeitig mit ihnen ausgehenden, erwärmenden und chemisch wirkenden Strahlen. Allerdings vermag uns das Gefühl auch über die Wärme kein sicheres Urtheil zu bilden; der Eine erklärt für warm, was dem Andern kalt erscheint, und dieselbe Person sogar urtheilt anders über die Wärme des Wassers, in welches er den Finger, und in welches er die ganze Hand taucht. Aber wir haben einen Gegenstand außer uns, der unabhängig von den Schwankungen unseres Gefühls ist und gleichwohl die Wirkungen der Wärme empfindet und uns äußerlich sichtbar macht. Wir haben das Thermometer, dessen steigende oder fallende Quecksilbersäule uns die Temperaturen messen läßt, wir haben das noch empfindlichere Thermoelectroskop, das durch den Ausschlag der Magnetnadel uns selbst die kleinsten Wärmeunterschiede anzeigt. Die chemischen Strahlen des Sonnenlichts zu messen, ist freilich schon mit größeren Schwierigkeiten verbunden. Aber wir haben doch wenigstens an ihrer Wirkung auf eine Mischung von Chloroaz und Wasserstoffgas, in den Mengen der sich bildenden Salzsäure ein annäherndes Mittel die Menge der vorhandenen chemischen Strahlen unbeeinflusst von unserm Gefühl zu messen. Für die leuchtenden Sonnenstrahlen haben wir nur das Auge, allerdings ein sehr empfindliches Instrument, das die leuchtenden Strahlen des Sirius noch erkennt, wo kein Mittel Wärme oder chemische Strahlen nachzuweisen vermag, das dem Lichte mit Hilfe des Fernrohrs selbst in die fernsten Nebelwelten folgt, aber doch ein völlig ungeeignetes Instrument, wenn es gilt, die Grade der Helligkeit zu messen. Es ist darum zu diesem Zwecke so ungeeignet, weil es sich ohne unser Wissen und Willen beständig verändert, um sich dem Lichte anzupassen, dessen Wirkungen es ausgesetzt wird. Treten wir in einen dunklen Raum ein, so erweitert sich unsere Pupille, läßt mehr Licht ein, und bald erscheint uns der Raum nicht mehr so dunkel als im Anfange. Betreten wir einen hellereleuchteten Raum, so sind

wir nur im ersten Augenblick geblendet; schnell zieht sich die Pupille zusammen, und das Auge empfängt nun weniger Licht, als uns nicht mehr fließt.

Wir wissen wohl, daß ein Raum, in welchem ein Duzend Gasflammen brennen, heller ist, als ein anderer, der durch eine einfache Kerze erleuchtet wird; aber um wie viel die Helligkeit des einen die des andern übertrifft, vermögen wir nicht zu schätzen, viel weniger zu messen. Allerdings haben schon vor 100 Jahren Bouguer und Lambert Methoden erfunden, um verschiedene Lichtquellen in Betreff ihrer Helligkeit zu vergleichen, indem sie die Entfernungen ermittelten, in welchen zwei verschiedene Lichter entweder weiße Flächen gleich hell erleuchteten oder schmale Stäbe gleich dunkle Schatten werfen ließen. Der ältere Herschel versuchte es sogar, das Licht eines Sternes mit einem künstlichen zu vergleichen, indem er die Objectivöffnung des Fernrohrs so lange verkleinerte, bis das von dem durchgehenden Lichte erzeugte Bild des Sternes dem künstlichen Lichte gleichgeschätzt werden konnte. Von einer wirklichen Lichtmessung konnte natürlich nicht die Rede sein; es blieb eine Schätzung, und das Auge war der Richter, der sich zumal in einer sehr bedenklichen Lage befand, da er die beiden Lichter, die er vergleichen sollte, nicht neben, sondern nur nacheinander zu sehen bekam. Diesem letzten Uebelstande ist zwar später durch Spiegelvorrichtungen abgeholfen worden, so daß nunmehr beide zu vergleichende Lichter, Sterne oder Flammen, nebeneinander in dem Gesichtsfelde eines Fernrohrs erscheinen, und namentlich können die von Seidel und Schwersch erfundenen Methoden als erhebliche Verbesserungen bezeichnet werden. Aber eine Vergleichung der Lichtstärken, die, was Genauigkeit und Sicherheit betrifft, mit einigem Rechte eine Lichtmessung genannt werden kann, ist doch erst in neuerer Zeit durch Zöllner in Leipzig möglich geworden.

Zöllner's Methode der vergleichenden Lichtmessung der Himmelskörper beruht im Wesentlichen auf der Erzeugung eines künstlichen Sternes in der gleichen Ebene mit dem Bilde des natürlichen Sternes, so daß man überhaupt nur helle Punkte zu vergleichen hat. Durch Einstellung von Linsen werden nämlich ebenso die Lichtstrahlen der Himmelskörper wie die flächenartige Flamme in Lichtpunkte verwandelt. Man sieht die Sonne oder den Mond oder einen Planeten nicht mehr als Scheibe, sondern als Stern, und dieser Stern erscheint unmittelbar neben dem Lichtpunkt, der als Maß dient. Als Maß benutzt Zöllner die Flamme einer gut construirten Photogenlampe, die nach den sorgfältigsten Versuchen ein Licht gibt, das wenigstens für die Dauer einer Messung sich völlig gleich bleibt. Um nun die Helligkeit eines solchen Lichtpunktes zu bestimmen, wird derselbe durch Polarisation unter Anwendung dreier Nicol'scher Prismen so weit abgeschwächt, daß er genau dem als Maß dienenden Lichtpunkte gleich kommt. Aus der Größe der Drehung dieser Prismen läßt sich die Ab-

schwächung, welche erforderlich war, berechnen, und daraus ergibt sich dann, um wie viel in Wirklichkeit die eine Lichtquelle die andere an Helligkeit übertrifft. Jedemfalls hat keine andere Methode eine ähnliche Sicherheit der Lichtmessung ermöglicht, wie diese, deren Abschägungsfehler immer nur in engen Grenzen eingeschlossen bleiben können.

In der Anwendung freilich treten auch dieser Methode noch manche erhebliche Schwierigkeiten entgegen; man darf einmal nicht glauben, daß es ein Kinderspiel ist, die Lichter des Himmels zu messen. Mancher Umweg muß eingeschlagen werden, oft muß die Rechnung ausbessern. So wird das vom Monde und den Planeten zurückgestrahlte Licht beim Durchgange durch die Atmosphäre bedeutend geschwächt, und diese Schwächung ist überdies eine sehr verschiedene je nach den Stunden des Tages und der Nacht, nach den verschiedenen Zuständen der Luft und nach der verschiedenen Höhe der Gestirne über dem Horizont. Auf alles das muß Rücksicht genommen werden, wenn man die Leuchtkraft der Gestirne vergleichen will, und die Rechnung muß das zu untersuchende Gestirn daher stets in das Zenith versetzen, wo die Lichtschwächung am geringsten ist. Merkur und Venus bieten uns überdies, weil sie der Sonne näher stehen als die Erde, niemals ihre vollen Scheiben dar, und sogar den wirklichen Vollmond bekommen wir niemals zu sehen, weil jedes Mal, wenn die Erde genau zwischen Sonne und Mond steht, eine Mondfinsterniß stattfindet. Was der directen Beobachtung entgegen ist, muß die Rechnung ergänzen.

Rechnung und Beobachtung im Bunde liefern aber bei Anwendung dieser Zöllner'schen Methode höchst wichtige und interessante Resultate, die zum Theil sehr wesentlich die Ergebnisse der berühmten Spectralanalyse ergänzen. Sie schaffen uns zunächst ein der Wirklichkeit nahe kommendes Bild von den Lichtverhältnissen des Himmels, das bedeutend von unsern gewöhnlichen Vorstellungen abweicht. Die Sonne bleibt nach wie vor die Königin des Himmels. Vergleiche man ihren Glanz mit der Lichtstärke eines der schönsten Fixsterne unseres nördlichen Himmels, der Capella im Sternbilde des Fuhrmanns, so ergibt die Messung, daß die Leuchtkraft der Sonne nicht weniger als 55,760 Millionen mal die dieses Sternes übertrifft. Auch unserm Monde

gegenüber ist der Sonnenglanz ein weit mächtigerer als man denkt, wenn man von der Tageshelle einer Mondnacht sprechen zu dürfen glaubt. Schon Bouguer gab im Jahre 1725 die Helligkeit der Sonne als 300,000 mal größer, als die des Mondes an. Wenn aber auch die von Wollaston im J. 1799 für dieses Verhältniß ermittelte Zahl 801,072 eine übertriebene ist, so bleibt doch immer nach Zöllner's Beobachtungen das Licht der Sonne 619,600 mal stärker, als das des Vollmondes. Nicht weniger als 619,600 Vollmonde müßten also zugleich am Himmel stehen, wenn sie die Nacht mit Tageshelle erfüllen sollten. Aber das ganze Himmelsgewölbe bietet nur etwa für 82,000 Vollmonde Platz, und wenn also auch das ganze Firmament im Glanze des Vollmondes leuchtete, die Nacht würde noch immer fast 8 mal weniger hell sein als der sonnenbeleuchtete Tag. Vergleiche man die Planeten in Betreff ihres Lichtes mit ihrer strahlenden Königin, so sind es nur fast unfassbare Zahlen, die dieses Verhältniß ausdrücken. Der Glanz der vollen Sonnenscheibe übertrifft die Helligkeit des Mars nicht weniger als 6094 Millionen mal, die des Jupiter 5472 Millionen, die des Saturn 130,980 Millionen, die des Uranus 8 Billionen und 486 Millionen mal, die des Neptun sogar nahezu 80 Billionen mal.

Zwei Gesichtspunkte sind es besonders, aus denen diese Lichtmessungen von Wichtigkeit werden. Einmal sind wir im Stande da, wo die Himmelstörper Flächen darbieten, wie Mond und Planeten, aus Verschiedenheiten der Lichtstärke, welche die Messung für einzelne Theile dieser Flächen ergibt, auf die physische Beschaffenheit der lichtstrahlenden Flächen Schlüsse zu ziehen. In wie weit dies bereits geschehen, wird bei einer späteren Gelegenheit mitgetheilt werden. Dann aber sind wir auch endlich im Stande, ein annähernd genaues Bild von den Lichtverhältnissen des Fixsternhimmels der Nachwelt zu überliefern, wie wir es bisher nur von den Ortsverhältnissen vermochten, und die Nachwelt wird im Stande sein, ebenso die Lichtveränderungen am Himmel zu erkennen, wie wir bereits die Ortsveränderungen erkannt haben, und ebenso daraus Schlüsse über physische Veränderungen der Fixsterne abzuleiten, wie wir bis jetzt nur Bewegungen und Bewegungsgesetze ableiten konnten.

## Avalun und seine Feinde.

Von Wilhelm v. Waldbrahl.

Zweiter Artikel.

Wenn der Gartenfreund sich beduften an Stücken Kinde abschneidet, auf welchem er die erwünschten weißen Flecken bemerkt, oder einen Zweig abtrennt, an welchem solche haften, so wird er, wenn er diese Flecken, die, wie gesagt, aus Woll befehen, mit einem feinen Werkzeug, z. B. einer Nadel, beseitigt, mit bloßem Auge schon

eine Anzahl kleiner Thiere finden, welche hier verborgen, wie in einem Neste zusammengedrängt, gefressen haben. Die größeren, ausgemachten von ihnen sind nicht größer wie der Knopf einer gewöhnlichen Stachelnadel, so daß die ganze Länge eines Thieres etwa eine halbe Linie, die Breite eine Viertel Linie betragen mag. Die kleineren, noch nicht aus-

gewachsenen Thiere sind mit bloßem Auge kaum bemerkbar, erscheinen lediglich wie Stäubchen. Weil die Farbe des Thieres braunroth ist und sich deren Leib, wenn man ihn zerbricht, als eine braunrothe Flüssigkeit, die geronnenem Blute ähnlich ist, kund gibt, hat man ihm den Namen Blutlaus gegeben. Der Name Rindenlaus bezieht sich auf die Rinde, von welcher sie sich nährt, der andere Name Wollenlaus auf die weiße Wolle, in welcher wir das Thier fanden.

Bringt man das Thier unter bedeutende Vergrößerungsgläser, so zeigt sich der Leib beinahe von der Gestalt eines Eies. Nach hinten läuft er wie ein Kegel aus, vorn sitzt ein Kopf ohne bemerkbaren Hals oder Brustabhebung plump an dem Kumpfe. Das Thier hat zwei kleine lebhafte Augen, neben denselben zwei Fühlhörner, dann statt des Mundes einen starken, jungensförmigen, sich nach unten neigenden Küssel. Im Küssel selbst scheint ein spitzer Stachel verborgen, den das Thier hinausschieben und womit es die Rinde anbohren kann. Es bewegt sich auf sechs mehrfach gegliederten Beinen, an deren unteren Enden kleine Haken sich regen, mit welchen es sich an der Rinde festzuhalten pflegt.

Wenn die Wolle beseitigt ist, zeigt sich das Thier, wie gesagt, von braunrother Farbe. Ueber dem Leibe werden mehrere Rippen bemerkbar, welche denselben gürtelweise umgeben. Nach dem Kopfe zu zeichnen sich diese Gürtel bedeutender aus, als an dem unteren Theile. Wenn man ein solches der Wulle geraubtes Thier längere Zeit hindurch beobachtet, gewahrt man, daß es sich gleich wieder einguillen trachtet, und daß ihm dazu die Wolle aus dem eigenen Leibe nachwächst, etwa in der Weise, wie den Spinnen die Fäden zu ihren Gespinnissen entwachsen. Zuerst sprießen diese Wollfäden aus den Drüsen des Afters und zwar steifenweiße. Wenn dieser ziemlich leicht bemerkbare Büschel längerer Fäden hervorgegeschossen ist, wird auch in den Rippen der Gürtel ein weißer Staub sichtbar, der nach und nach zunimmt, als ob das Thier über und über mit Mehl bestreut wäre. Zuletzt wird das ganze Thier dann unter der weißen Wulle unsichtbar. Anfangs scheinen die sprießenden Büschel schlicht und gerade zu sein, später aber kräufeln sich besonders die längeren Fäden und verfilzen sich über dem Thiere. Wahrscheinlich wird das Ungeziefer an dieser Wolle von dem Binde ersaft, und durch die Fülle getragen, reißt es in der Weise, wie die kleinen Spinnenarten im Herbst zu reifen pflegen. Unzählbare werden dann wohl hingeworfen, wo sie aus Mangel an Futter umkommen müssen. Wenn aber nur wenige in einen Nesthof getragen werden, genügen sie, um hier wieder zu unzählbaren Schaa ren anzuwachsen und später nach anderen Richtungen ihre Pflänzlinge auszusenden.

Die Blutläuse sitzen immer in dichten Nestern zusammen gedrängt, den Kopf nach unten an der Rinde, den Hinterrheil in die Höhe gerichtet. Beständig sind sie

mit Anbohren der Rinde beschäftigt und trinken von deren Saft.

Das Thier bringt lebendige Junge zur Welt und vermehrt sich äußerst rasch. Die Jungen sind anfangs von Kugelförmigkeit und von heller, rother Farbe. Man kann ihnen die Beine wachsen sehen und mit einiger Geduld beobachten, wie sie sich strecken, und wie ihr schöner, rother Farbenton in einen gelben übergeht. Erst erwachsen nehmen sie die braunrothe Farbe an, und erst dann scheinen sie sich mit Wolle zu schmücken. Die Jungen scheinen im Pelze der Ästen zu gebären.

Wie leicht sich das Thier zerdrücken und tödten läßt, so jähre hält es sich gegenüber den bisher angewendeten Mitteln, lebendig und thätig. Es dringt z. B. mit seiner Wolle unter einer Lage von Strickholztheer hervor; auch nach angewandtem Drucke, z. B. nach dem Reinigen der Rinde mit scharfer Bürste oder mit änder Seifenlauge, sieht man nicht selten wieder neue Büscheln hervorsprießen, wahrscheinlich weil einzelne unsichtbare Sprößlinge dieses Ungeziefers sich in tieferen Stellen oder in Spalten der Rinde geborgen haben und nun beginnen eine neue, frische Sippe zu gründen. Heinrich Uthhorn hat sogar bemerkt, daß diese Schmarotzer sich in der Erde an den Wurzeln der jungen Bäume einnisten.



Wenn man die Rinde des Baumes an der Stelle, wo sie eine Zeit lang gelebt haben, untersucht, so bietet diese, welche früher glatt und eben war, den Anblick einer Schale, die aus dem Hfen kommt, oder eines vulkanischen Stein es dar; sie ist rauh und festslos, und der Splint selbst zeigt Spuren der Verwundung. In der nebenstehenden Abbildung stellt Fig. 1 ein erwachsenes Thier in 75facher Vergrößerung dar, Fig. 2 dessen Kopf und Küssel in Seitenansicht. In Fig. 7 ist der Küssel nochmals vergrößert mit der zeitweise erscheinenden Spitze abgebildet. Fig. 6 zeigt das Thier auf dem Rücken liegend, wie es im Begriffe ist, einen Büschel Wolle aus dem After sprießen zu lassen. Fig. 3 zeigt ein halberwachsenes junges Thier und Fig. 4 ein todes geborenes, gleichfalls in 75facher Vergrößerung. Fig. 5 soll schließlich dem Leser, welcher das Glück hat, das Thier nicht aus eigener Anschauung kennen lernen zu können, die Art und Weise veranschaulichen, wie diese Thiere in der Wolle auf der Baumrinde zu sitzen pflegen, nachdem man die obere Wolle beseitigt hat, welche sie vollkommen unsichtbar macht.

Wir überlassen es einem Siebold oder Vogt, durch das Mikroskop tiefer in die Natur des Wesens, das wir aus guten Gründen ein Unwesen zu nennen wagen, hinabzuweisen und die Gewohnheiten und Lebensbedingungen desselben zu erforschen. Wir besinnen, daß wir hier nur den einzigen Zweck haben, dem Freunde des heimischen Paines die Gefahr zu schildern, die ihm droht, daß wir ihn auffordern wollen, auf Mittel zu sinnen, die geeignet sind, den Verheerungen ein Ziel zu setzen. Die bisher genannten haben

leider nicht durchgreifen wollen und den Fortschritt des Ungeziefers von W. nach O. nicht aufhalten können. Ein neues, welches vor Kurzem empfohlen wurde, scheint uns etwas abenteuerlich zu sein. Das Ungeziefer dieser Art, versicherte uns der Erfinder, könne nur durch die Natur selber, durch Vögel oder andere Kerfthiere in Schranken gehalten werden. Von den in Deutschland einheimischen Vögeln wollen aber keine bis jetzt die Wollenlaus angrei-

enblich, vom Hunger getrieben, auch mit dem fraglichen Ungeziefer aufräumen.

Wir hoffen, daß es den thätigen Naturforschern Deutschlands, daß es den Gartenfreunden dieses großen Landes gelingen werde, ein besseres und wirksameres Mittel gegen das verheerende Thier ausfindig zu machen, als die, welche wir bereits angegeben, damit die Rettung unseres Ahalun nicht länger in Frage gestellt bleibe. Gewiß dürfte es an-



Die Wollen- oder Wolllaus.

fen; von den Kerfen, welche andere Blattläuse zu vertilgen pflegen, will keine sie als gute Beute nur anrühren; deshalb mußte man die Ameisen zwingen, die Brut zu verspeisen. Man bewerkstelligte dieses folgendermaßen. Man mache die Bäume, auf welchen dieses Ungeziefer zu vertilgen sei, mit einem Reifen oder Ringe von Theer am Stamme für Ameisen unzugänglich. Dann lege man Lumpen in ein Ameisen-nest und hänge diese mit den hineingetrocknen Thieren rasch auf die fraglichen Bäume. Die Ameisen, welche sich nun in die Lumpen verbißen und verflochten haben, würden sich über den Baum verbreiten, dann es aber nicht wagen, über den Theerstreifen von demselben fortzukriechen. Sie würden also auf dem Baume ausstarren müssen und

zumpfen sein, daß die Obrigkeit gleichzeitig alle Besitzer von Baumhöfen und Obstgärten zur Mitwirkung aufreufe und nöthigenfalls zwingt, da hier alle gleichpflichtig und solidarisch verhaftet sind, weil sich das Ungeziefer aus den Gehöften eines nichtmitwirkenden Widerspenstigen gleich wieder in die gereinigten Pflanzungen aller Fleißigen verbreiten würde. Sicherlich werden die ersten Jahre einen angestrengten, rastlosen Kampf erfordern. Wie jedes Gift in der Welt der Arzneikunde sein Gegengift hat, wie jede Krankheit durch gewisse Heilmittel zu bewältigen ist, so wird dieses winzige, aber daher auch um so schrecklichere Ungeziefer zuletzt auch einem Gegenmittel erliegen müssen. Mögen diese Zeilen hinreichen, die Besitzer von Obstgehö-

ten, Bungalerten und Baumschulen auf den Schaden aufmerksam zu machen, der ihnen von dieser Seite drohen kann.

Dem Fachgelehrten bleibt es denn auch vorbehalten, ob das ähnliche Ungeziefer an andern Pflanzen nähere oder weitere Verwandte des eben beschriebenen Thieres bilde, welches unsern Apfelbaum den Untergang droht. Ein ebenso ausgerüstetes, freilich viel kleineres und in kürzerer Wollte verklecktes Thier bemerkten wir hin und wieder auf dem Pisanbaum (der Nuss), wie an andern ausländischen Gewächsen, welche in unsern Treibhäusern gezogen werden. Ein größeres, doch mit noch kürzerer Wollte, wie das unseres Apfelbaumes, fanden wir schon vor Jahren auf der Weimouthskiefer (pinus strobus). Wir sahen diesen Schmarog in Süden wie im Norden Deutschlands so zahlreich, daß die Stämme davon wie mit Lünche überzogen schienen. Durch die zahlreichen Wunden des Rüssels gelangt das Harz, das nicht so schnell aufgezogen werden kann, zum Ausfließen, so daß auch diese Bäume zu leiden haben und bei Vermehrung des Ungeziefers bedroht stehen. Freilich wäre deren Aussterben für uns eher zu verschmerzen als das des heimischen Apfelbaumes. Auch an den Lärchenbaum (pinus larix) habe ich ein ähnliches, wenn auch kleineres

Insekt beobachtet. Heinrich Uhlhorn, welcher in Frankreich den Apfelbaum von der größeren Sattung der Blausäule bedroht schildert, bemerkte, daß in Spanien gleichfalls die Drangen und Limonen von einem ähnlichen Ungeziefer schwer zu leiden haben, das sich auf der Rinde, auf den Blättern, ja auf den Früchten dieser Bäume so zahlreich zeigt, als ob diese mit Mehl bedeckt wären.

Wären Fachgelehrte genauer die verschiedenen Sattungen des Schmarogers feststellen und untersuchen, wo dessen Heimat zu suchen ist, wie es sich ferner in unsere Gegend, wo wir früher kein ähnliches Thier kannten, einschmuggelte, und wie es unsern rauen Winter auszuhalten vermag. Mögen sie feststellen, ob hier ein Eindringen aus einer fernern Gegend stattgefunden, oder ob eine Neubildung vorliegt, an welche die Wissenschaft bisher nicht glauben wollte. Möge vor Allem ein Schutzmittel gefunden werden, das die edelste Blüthe unsers Palms rettet. Der Ausfall, ja nur die Minderung des Apfelbaumes würde unsern Frühling seines Reizes berauben, würde den Nachtheil jeder Tafel empfindlich treffen und jeder Hauswirthschaft Verlegenheit bereiten. Aualun ist in Gefahr, die edelste Gengabe soll uns verkrümmert werden; leiste darum jeder, was er kann, das Unheil abzuwenden!

## Die Eifel.

Von Ph. Wirtgen.

Erster Artikel.

Wenn wir den Charakter und den Ruf der meisten Gebirge Mitteldeutschlands betrachten, so finden wir einen Glanz über sie ausgegossen, der über ihre Grenzen weit hinaus strahlt. Welch' ein Sagenreichtum ist über das Riesengebirge, den Böhmerwald und den Harz verbreitet! Welch' ein geschichtlicher Zauber ruht auf dem Thüringer Wald, der rauhen Alp und dem Teutoburger Wald! Wie glänzen Schwarzwald und Vogesen in Sagen, Geschichte und landschaftlichen Reizen!

Dagegen sind die Gebirge des Mittelrheins oder das rheinische Schiefergebirge besitzt eine sehr bedeutende Ausdehnung in die Länge und Breite. Wenn wir von Süden, von Mainz und Frankfurt hindurch zu wandern beginnen, so werden wir im Norden erst die Düren und Eifelsteine und noch viel tiefer in Westphalen unseren Wanderstab niederlegen

können. Beginnen wir im Westen bei Trier und Aachen, so endet unsere Wanderung erst bei Friedberg in der Wetterau oder bei dem wichtigsten Kriegsknoten des westlichen Deutschlands, dem Ederkopf, dem nach allen Weltgegenden Flüsse entspringen.

Das ganze Gebirgsland gehört seiner Entstehung und Bildung nach einem der ältesten neptunistischen, dem devonischen Systeme an. Nur das flutische System besitzt ein höheres Alter.

Als der berühmte Begründer der Lehre von den verschiebenen paläozoischen Systemen, Sir Roderik Murchison, die rheinischen Gebirge musterte und beschrieb, glaubte er in der Grauwacke und dem Thonschiefer derselben ein Glied des von ihm in England und von andern Geologen in Böhmen und Rußland aufgefundenen flutischen Systems zu erkennen. Nur den Eifelkalk hielt er dem devonischen Systeme angehörig.

Er hat es in einem seiner Werke so dargestellt, und durch die Uebersetzung dieses Werkes von F. Leonhard ist der Irrthum noch weiter verbreitet worden. Aber von den Geologen in Bonn erhoben sich schon sehr bald die entschiedensten Zweifel, und als Ferdinand Römer seine vor treffliche Monographie des rheinischen Übergangsgebirges der Welt übergab, da hätte schon die Ungewißheit endigen

müssen. Aber ein öffentlich eingeführter Irrthum ist sehr fest. Der erste und gründlichste aller rheinischen Geologen, Herr von Dechen, hat es wiederholt ausgesprochen, daß das rheinische Schiefergebirge dem devonischen System angehört, und ebenso haben die paläontologischen Untersuchungen von den Gebrüdern Sandberger, Kranz, Zeiler und dem Verfasser dieses auf das Bestimmteste nachgewiesen, daß nicht eine Verfeinerung der rheinischen Gebirge dem silurischen System angehört, und daß namentlich die zahlreichen Trilobiten, welche Barand in den silurischen Gebirgen Böhmens aufgefunden hat, im rheinischen Gebirge auch nicht durch eine Species vertreten seien; daß das gegen von den wenigen Trilobiten des Rheinlandes die meisten in der Grauwacke und dem Eifelkalk, der überall als wirkliches devonisches Glied gilt, zugleich enthalten seien. Dasselbe gilt auch von zahlreichen anderen Petrefaktenarten. Dennoch aber gehört das rheinische Uebergangsgebirge zu den ältesten Erhebungen aus dem Meere der Urwelt.

Unser Gebirge besitzt nun als devonische Bildung verschiedene Glieder, die sich nach den darin enthaltenen versteinerten Thieren der Vorwelt und nach ihrer Lagerung in drei Abtheilungen unterscheiden lassen, die unteren, die mittleren und die oberen Schichten. Zu den unteren devonischen Schichten gehört die eigentliche rheinische, die Coblenzer Grauwacke, das „Coblenzien“ des belgischen Geologen DuRoi, und der verfeinertere Ardennenkieser. Das „Ardenn.“ desselben Geologen ist damit zu verbinden, da es sich von demselben um kein Haar unterscheidet. Diese rheinischen Schichten bestehen aus Quarzit, der Grauwacke, dem Grauwackenkieser (Spiriferen-Sandstein der Gebrüder Sandberger) und dem Thonschiefer; der Taunusschiefer (Sandberger's Sericiteschiefer) gehört ohne Zweifel dazu.

Zu den mitteldeutschen Schichten rechnen wir die muldenförmigen Ablagerungen des sogenannten Uebergangs- oder Eifelkalks, deren sich eine große Anzahl in dem rheinischen Gebirge vorfindet, und aus welchen an vielen Stellen mächtige Dolomitstufen, ehemalige Atolle, schroff und jagdig hervorragen. Die meisten und bedeutendsten derselben befinden sich in dem nordwestlichen Gliede der ganzen Gebirgsmasse, der Eifel, auf die wir noch näher eingehen werden; der südwestliche Theil ist arm daran; auf den rechtsrheinischen Gliedern des Gebirges sind sie wieder und in weiterer Ausdehnung durch den Kennerschiefer vertreten. Sie zeichnen sich, besonders der Eifelkalk, durch zahlreiche und charakteristische Petrefakten aus.

Die oberdevonischen Schichten sind von den mannigfaltigsten Bildungen und Namen und durch zahlreiche Verfeinerungen genau bezeichnet. Es gehören dazu der Verneulschiefer, der Kramenzel und Jülich, welchen Soniaten- und Wissenbacherschiefer noch beizugebort werden.

Das ganze Gebirge ist reich an Metallen, besonders an Eisen und Blei; Silber, Kupfer, Zink, Antimon, Kob-

balt kommen an einzelnen Punkten mehr oder minder reichlich vor. Die Grauwacke selbst ist ein vortrefflicher Baustein und der eigentliche Thonschiefer in seinen reineren Formen als Dach- und Tafelschiefer von bedeutender technischer Wichtigkeit.

Das mitteldeutsche Schiefergebirge ist aber in späteren Perioden der Bildung unserer Erde nicht unverändert geblieben. Ungeschichtete oder plutonische Bildungen, namentlich Trachyt, Basalt, Porphyr, Melaphyr, Diorit, Gabbro, Hyperit und andere Feismassen, sind in mehr oder minder Mächtigkeit aus demselben emporgetreten. Das Steinkohlengebirge, sowie die sekundären Formationen des Buntsandsteins, des Muschelkalks und Keupers, auch Juragebilde (im Luxemburgischen), haben sich denselben meist an seinen Rändern an- und aufgelagert. Namentlich findet sich die Steinkohle in bedeutender Ausdehnung auf dem ganzen West- und Nordrande des Gebirges. Außerdem finden sich zahlreiche Ablagerungen des Kreidegebirges, wie der tertiären Bildungen, vielfach zerstreut oder in größerem Zusammenhange, vor; besonders ist die Braunkohle, namentlich auf dem Westwalde, reichlich vertreten, und die Eifel ist durch vulkanische Eruptionen zerfurcht. Bis zu einer Höhe von ungefähr 1000 Fuß absoluter Höhe stellen sich häufig Diluvial- und Alluvial-Niedererschläge dar. Der Fels ist nicht der verbreitetsten Gebilde dieser Art und enthält gar nicht selten noch Reste der ungeborenen Thiere aus der älteren Diluvialperiode oder dem Ende der Tertiäreit.

Das rheinische Schiefergebirge, stellt sich also in seiner Bildung und Zusammensetzung geologisch als ein Ganges dar. Es findet jedoch durch Erhebung einzelner Rücken, durch die tiefen Furchen, welche die Flüsse gezogen, u. s. w. in orographischer Beziehung mancherlei Störung statt. Das Gebirge, von N.D. nach S.W. streichend, ist beinahe genau in seiner Mitte durch den Rhein in zwei Theile geschieden. Die ostrheinische Hälfte, im Süden von dem Main, im Norden von der Ruhr begrenzt, wurde durch Lahn und Sieg in drei Theile gerissen: zwischen Main und Lahn erhebt sich der Taunus, zwischen Lahn und Sieg der Westerwald und zwischen Sieg und Ruhr das sauerländische Gebirge. Beide letztere schließen sich an der Leppe, Sieg- und Lahnquelle dem Ederkopfe an, von dem nach S.D. der Vogelsberg, nach Norden das Rothlagergebirge ausläuft. Auf der linken Rheinseite ist das Gebirge durch die Mosel in den Hundsrück und die Eifel geschieden ersterer im Süden von der Nahe und im Westen von der Saar umspült und letztere mit niedrigem Hügellande nach Norden in das niederdeutsche Flachland abfließend.

Die größte Plateauhöhe übersteigt, nicht 2000 Fuß. Doch zieht über den südlichen Theil des Taunus ein mächtiger Rücken, die Höhe, hin, deren höchste Punkte sich in dem großen Feldberg bis zu 2414 Fuß, in dem kleinen Feldberg zu 2345 Fuß, dem Aletönig zu 2457 Fuß, dem Stöcker

zu 2347 und dem Steinkopf zu 2320 *J.* a. *H.* erheben. Quarzit und Sericitischiefer ist das Grundgestein dieses Zugels. Zwischen Rüdesheim und Kämmerhausen, am Bingerloch, ist die Quarzmasse durch den tiefen Einschnitt der mächtig dahin strömenden Wogen des Rheines unterbrochen; sie erhebt sich aber auf der linken Seite in dem süblichen Theile des Hundsrücks zu einem ganz ähnlichen Bergzuge, der durch mehrere tiefe und schroffe Thaleinschnitte in Sonnmäld, Lüsselsoos, Iddar und Hochwald geschnitten, sich allmählig in dem letzteren in dem Erbkopfe zu 2320 *J.* über dem Meere erhebt.'

Von geringerer Höhe und Bedeutung sind die Glieder des Westerwaldes und des Sauerlandes, die auch hier nicht in Betrachtung gezogen werden sollten. Ueber die Eifel aber wollen wir uns hier gerade weiter aussprechen.

Wenn ein Landfrüch die Ungunst der Geschie, wie sie die Welt- und Völkergeschichte ergibt und das Vorrath der Menschen hervorruft, auf eine traurige Weise zu tragen bestimmt war, so trieb dies die Eifel in einem hohen Grade. Zu der Zeit der Römerherrschaft ist sie höchst wahrscheinlich ein gut kultiviertes, vielleicht auch stark bewaldetes Land gewesen. Zahlreiche römische Niederlassungen, sogar prächtige Paläste, ausgedehnte Heerstraßen vom festen Bau, eine weitgehende Wasserleitung und überall zahlreiche Münzen und Werkzeuge, geben die überzeugendsten Beweise für das große Gewicht, welches die Römer der Eifel belegten.

Zu einem noch höheren Glanze erhob die Eifel sich im Mittelalter durch die Blüthe zahlreicher Dynastengeschlechter, die sich meist auf den bedeutendsten Höhen angesiedelt hatten, und deren einst so großartige Wohnungen noch jetzt in ihren Trümmern unser Staunen erregen. Fast auf jeder Meile Weges finden wir, oft in den kühnsten Lagen, solche Ruinen. Da waren die Grafen von Ahr, von Aremberg, von Blankenheim, von Birenburg, von Manderscheid u. A., die ihre Herrschaft weit ausbreiteten, sich im Laufe der Zeit in mehrere Linien verzweigten oder auch sich unter einander verbanden und durch Heirathen die Besitzungen vereinigten. So sind zuletzt die Grafen von Aremberg das mächtigste und jetzt noch blühende Geschlecht geworden.

Aber gerade der Glanz dieser Geschlechter mag den Grund zu dem späteren traurigen Zustande der Eifel gelegt haben. Bedeutende Kirchenfürsten, Erzbischöfe und Churfürsten von Mainz, Trier und Köln, sowie große Fürstbischöfe des Mittelalters gingen aus ihr hervor. Welche Sum-

men mögen sie in das Ausland getragen, und für welche Summen mag die zu Hause wohnende Familie zur Hebung ihres äußeren Glanzes Material aus dem Auslande bezogen haben! Die armen Unterthanen, die Leibeigenen, wurden sicherlich zur Aufbietung aller ihrer Kräfte angetrieben, die Wälder wurden deforestiert, als mit der Morgenröthe der neu beginnenden Zeit viele der Geschlechter untergegangen waren oder andere ihrer Erhaltung wegen zu noch größerem, äußerem Glanze strebten. Als aber die Raubzüge Ludwigs' XIV. eintraten, als Hunderte von rheinischen Städten und Dörfern verbrannt und die Burgen zerstört wurden, da brachen die Zeiten der Noth und des Elends herein, die sich noch steigerten, als die Neustanten zu Ende des vorigen Jahrhunderts das Land in Besitz nahmen, ungeheure Contributionen eintrrieben, die Herrschaften und Klöster einzogen und ihr Vermögen zu Spottpreisen veräußerten, wodurch jedoch viele Millionen Franken aus dem Lande gezogen wurden. Auch die nach den Kriegen Ludwigs' XIV. noch übriggebliebenen Burgen wurden auf den Abbruch veräußert.

Endlich kam die Eifel so weit herunter, besonders als die Wälder auch noch weiter ausgeraubt wurden, daß man sie als den Inbegriff alles Unsegen betrachtete, sie das rheinische Sibirien nannte und Beamte, Geistliche und Leiber für schlechtes Verhalten nicht absetzte, sondern zur Strafe ihnen Stellen in der Eifel anwies. So war es noch in den ersten Zeiten der preussischen Herrschaft, und tiefer konnte das schöne, romantische Land nicht sinken.

Da traten die Zeiten der Besserung ein! aber sie konnte nur langsam vorangehen. Regierung und Vereine wetteiferten bald, den Zustand des Landes zu heben. Wälder wurden in gutes Ackerland umgelegt; viele Tausend Morgen von Halben wurden bewaldet, und die Wiesen der Thäler meistens in Kunswiesen umgewandelt; zahlreiche Heerstraßen wurden erbaut, und Pösten durchziehen nun in regelmäßiger Lauf das Land. Endlich wird bald ein Schienenweg die Eifel von N. nach S.W., von Düren nach Trier durchziehen, und sehr zu wünschen würde es dann für viele noch unerschlossene Gegenden sein, wenn auch ein solcher von Hien nach Westen, von Coblenz nach Lütich jenen durchkreuzte.

So hat denn das Streben der Neuzeit und unsere für den Wohlstand des Landes so eifrig sorgende Verwaltung das ganz verfallene Land so gehoben, daß kein Bewohner derselben mehr, wie ehemals, erröthend, sondern mit Stolz sagen kann: Ich bin aus der Eifel!

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Gr. (1 fl. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 17.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Hall, G. Schwetschke'scher Verlag.

**28. April 1869.**

Inhalt: Der Schlaf, von Karl Müller. — Beiträge zur Naturgeschichte der Rothfüßhähnen, von B. Hausmann. — Die Eifel, von Ph. Witten. Zweiter Artikel. — Literarische Anzeigen. — Literaturbericht.

## Der Schlaf.

Von Karl Müller.

Wer hätte nicht schon die Frage bei sich aufgeworfen, wozu man denn eigentlich schlafte? Seine ganze Lebenszeit im Schlummer bewußtlos verbringen, ist allerdings eine Thatfache so ernster Art, daß man sich nicht wundern kann, wenn ihr der denkende Mensch bereits seit den ältesten Zeiten seine höchste Aufmerksamkeit schenkte. Worüber man sich aber wohl mit Recht wundern kann, ist die anderweitige Thatfache, daß wir mit dieser Jahrtausende alten Aufmerksamkeit bis auf die neueste Zeit nicht weiter gekommen sind. Der Schlaf, sagte noch vor wenigen Jahren ein ausgezeichnete Diätetiker, ist das heilige Myristerium der Natur, in dessen Schleiher sie ihr eigentliches Schaffen vor unsern Augen verbirgt. Das heißt kurz und bündig: wir wissen nicht, was der Schlaf ist. Die meisten Physiologen, setzt er hinzu, glaubten dies Räthsel dadurch zu lösen, daß sie eine Steigerung des bildenden Lebens während der Hemmung der

bewegenden Kräfte (der Empfindung und willkürlichen Bewegung) im Schlafe annehmen; allein er betont mit Recht, daß die meisten Funktionen des bildenden Lebens (Verdauung, die meisten Absonderungen, Athembolen etc.) im Schlafe entweder ganz ruhen oder doch sehr langsam von Statten gehen. Kein Wunder, daß man in der Naturforschung über die Erkenntniss der äußeren Erscheinungen des Schlafes wenig hinauskam, daß der Schlaf mehr Gegenstand der Dichter blieb, als der Forscher wurde. Das Alles scheint seit Kurzem eine bessere Wendung zu nehmen, seit Emil Sommer versucht hat, eine neue Theorie des Schlafes aufzustellen, von der wir in der That sagen können, daß sie eine wirklich physiologische Grundlage besitzt. Da aber dieselbe, noch nicht ein Jahr alt, bisher in sehr engen, bescheidenen Grenzen blieb, so werden es uns unsere Leser vielleicht danken, wenn wir sie mit derselben näher bekannt



machen; um so mehr, als sie, unseres Erachtens, so klar und verständlich ist, daß sie jeder naturwissenschaftlich Gebildete selbst zu prüfen vermag.

Offenbar konnte es sich bei einer physiologischen Theorie des Schlafes nur um die Thatfachen handeln, welche als die hauptsächlichsten chemischen Vorgänge während des Schlafes und Wachens angesehen werden müssen. Denn soviel ist doch von vornherein klar, daß der Schlaf eine Kraftquelle, das Wachen ein Kraftverbrauch sein muß. Wo ist denn nun diese Kraftquelle? Man kann sich keine Kraft ohne Stoff denken; folglich muß sich, wenn sich während des Schlafes Kraft anhäuft, geradezu Stoff anhäufen. Wer aber ist dieser Stoff? Das war eben die Frage, die sich der Theoretiker aufzuwerfen hatte; um sie zu beantworten, hatte er sich einfach an die Thätigkeit der Lungen zu halten, weil diese allein die Regulatoren und Träger des Lebens sind. Hier nun gab es eine längst bekannte Thatfache, die nämlich, daß Vögel und Menschen beträchtlich mehr Sauerstoff einathmen, als sie davon in Form von Kohlensäure wieder aushauchen. Die Summe dieser ausgehauchten Kohlensäure vergrößert sich nur im wachenden Zustande nach der Größe der Arbeit und des bedeutenderen Stoffwechsels im Körper; umgekehrt verringert sie sich im Schlafe. Folglich muß des Nachts offenbar mehr Sauerstoff eingeathmet werden, als nöthig wäre, um den doch viel langsameren Stoffwechsel bei gänzlich aufgehobener Arbeit im Gange zu erhalten. Aber wir können hier selbst mit Zahlen reden. Nach den Versuchen mit dem Pettenkofer'schen Respirationsapparate ergibt sich, daß von dem durch die Lungen binnen 24 Stunden eingeathmeten Sauerstoff nur  $\frac{1}{5}$  während des Tages,  $\frac{2}{5}$  aber während des Schlafes eingeathmet, von der gebildeten Kohlensäure 42 Proc. während der Nacht, 58 Proc. aber während des Tages ausgeathmet werden. Wo bleibt nun der übrige Sauerstoff und warum bleibt er?

Das war nun die Frage. Jedenfalls ist sie eine inhaltsschwerere, und ihre Beantwortung wird zeigen müssen, daß der Sauerstoff, welcher in solcher Menge übrig bleibt, nicht etwa als unausführbarer Rest, sondern zu höchst wichtigen Verrichtungen notwendig zurüchbleibt. Mit Recht legte Sommer hierauf das größte Gewicht. Denn jene Zahlen, sagte er sich, liefern den Beweis, daß das Blut, und in ihm wahrscheinlich die Blutzellen, oder auch die Gewebe selbst, die Eigenschaft besitzen müssen, den eingeathmeten Sauerstoff in großer Menge aufzuspeichern und ihn bei der Arbeit nach Bedürfnis wieder abzugeben. In dieser Beziehung würde die eingeathmete Sauerstoff nicht allein als der Stoff daselben, welcher die Nahrungstoffe in Wärme überzuführen hat, sondern er würde zugleich selbst als Nahrungsstoff angesehen werden müssen. Freilich kann er immer nur ein Umbildner anderer Stoffe sein; aber er vollführt das in allen Körpertheilen, nicht in den Ernährungsorganen allein, auch in dem Muskelegewebe, wie in den Nerven und

Gehirnsubstanz. Daß der Sauerstoff wirklich diese Rolle spielt, geht daraus hervor, daß während der körperlichen Thätigkeit und Arbeit von ihm viel mehr verbraucht wird, als im Zustand der Ruhe. Womit ist er die Triebkraft, welche den ganzen Organismus in Spannung und Thätigkeit erhält; mit seiner Verringerung im Körper muß naturgemäß eine Erschlaffung eintreten, wenn nicht neuer Sauerstoff wieder angesammelt wird.

Damit ist aber die Theorie des Schlafes von selbst gegeben. Nach diesen unwiderräthlichen Thatfachen kann der Schlaf nichts Anderes sein, als ein Zustand der Sauerstoffarmuth, folglich ein Zustand, in welchem neuer Sauerstoff wieder aufgehäuft wird, um die alte Spannung des Körpers aufs Neue zu bewirken. Weil der ganze Organismus sauerstoffarm geworden ist durch die Thätigkeit des Tagelbens, darum können auch die Functionen des Körpers während des Schlafes nicht mehr in ihrer alten Energie nach sein. Das Gehirn ruht oder unterhält nur ungeordnete Vorstellungen, ähnlich einem Muskel, welcher erlahmt, kraftlos, unsicher, schwankend, gleichsam schlaftrunken ist. Die Auscheidungen der Nieren und Lungen gehen um Vieles langsamer vor sich; das Maas der ausgeschiedenen Harns und der ausgeschiedenen Kohlensäure während des Schlafes ist gleich den verminderten Functionen der Blutbildung und des Athmens, gerade so niedrig wie der Kraft- und Stoffverbrauch. Nur die Athmung fährt ununterbrochen, wenn auch schwächer, fort, neuen Sauerstoff dem Körper zuzuführen; aber nur ein kleiner Theil wird zur Wärmebildung verwendet und in Form von Kohlensäure ausgehaucht. Demnach wird auch der Schlaf so lange dauern, bis die gehörige Menge von Sauerstoff wieder in dem Körper, und zwar in den Blutkörperchen angesammelt ist. Daher auch die stete Müdigkeit und Kraftlosigkeit bleichsüchtiger Frauen, die man allgemein für blutarm erklärt. Das kann eben nichts Anderes heißen, als daß ihr Blut nicht Blutzellen genug enthält für die Ansammlung von Sauerstoff. Der unter gewöhnlichen Umständen im Wachen, in der Arbeit eingeathmete Sauerstoff reicht eben zur Hervorbringung der Vorgänge, eines kraftvollen Stoffwechsels nicht aus; der Körper verfällt, wie bei einem neugeborenen Kinde, in Schlaf. Um wirklich etwas Lebthliches zu erzielen, d. h. Sauerstoff aufzuhäufen, bedarf es im wachenden Zustande der Ruhe. Darum die Erquickung des Ausruhens nach statigehabter Wanderung oder Arbeit. Umgekehrt bedürfen Solche, welche sich nicht besonders anstrengen, oder Solche, welche krank im Bette liegen, weniger Schlaf, weil eben Ruhe genug für diese Ansammlung von Sauerstoff vorhanden ist.

So glaubte Sommer den Schlaf einfach erklären zu müssen, und es liegt wohl auf der Hand, daß seine Theorie auf den ersten Blick ungemein anpspricht. Er hat es versucht, eine Menge von bekannten Thatfachen mit ihr in Einklang zu bringen, und auch dieser Versuch scheint uns ein wohlgeunger zu sein. Unter Anderem erklärt

sich aus seiner Theorie höchst einfach, warum der erste Schlaf der ruhigste, tiefste, equidendste und traumloseste, warum umgekehrt der Worgenschlaf der leichste, unruhigste und traumbeladene ist. Dort ruht alle Lebens- und Nerventhätigkeit, hier beginnt sie sich wieder zu regen, sowie die Ansammlung von Sauerstoff zur Genüge vorgeschritten ist. Ein unruhiger Schlaf kann folglich ebenso davon herrühren, daß der Sauerstoff noch nicht ganz verbraucht ist, und daß er in Folge dessen die körperlichen Functionen noch lange noch erhält, wie auch davon, daß eine Menge äußerer oder innerer Ursachen, eine allzugroße Hitze, unbequeme Lage, welche die Athmung erschwert, starke Geräusche, Bedauungsbeschwerden, Blutstodungen u. s. w. — auf den Körper einwirken. Die Träume selbst betrachtet Sommer als schwache Vibrationen des Gehirns, die ohne Zusammenhang bleiben, weil die Schicksalsträfte während des Schlafes fast gänzlich aufgehoben ist. Auch die Dauer und Häufigkeit des Schlafes, besonders das ungleiche Schlafmaß in den verschiedenen Lebensaltern erklärt sich hiernach ebenfalls leicht. Das erhöhte Schlafbedürfnis im jugendlichen Alter erklärt sich aus derselben Ursache, aus welcher Kinder und junge Leute mehr und öfter essen, d. h. aus dem im jugendlichen Organismus stattfindenden rascheren Stoffwechsel, der seinerseits wieder im Wachthume begründet ist. Es ist kein Zweifel, sagt Sommer ganz richtig, daß die Prozesse der Neubildung und des Aufbaues der Organe, der Erzeugung von Muskel-, Hirn- und Nervensubstanz auf chemischen Vorgängen beruhen, an welchen der Sauerstoff als mächtigstes Agens des gesammten Chemismus einen hervorragenden Antheil nimmt, daß folglich die Körperzunahme eines im Wachthum begriffenen Menschen nicht nur eine gesteigerte Zufuhr und Consumtion fester und flüssiger, sondern auch gasförmiger Nährstoffe (Sauerstoff) nach sich zieht. In Folge dieses vermehrten Sauerstoffverbrauches verfallen daher auch Kinder in den jüngsten Lebensaltern nach mehrstündigem Wachen stets in Schlaf, welcher so lange fortdauert, bis das Blut aufs Neue eine hinreichende Menge Sauerstoff aufgenommen hat, um den Stoffumsatz und die Thätigkeit in den Geweben wieder zu beleben und für einige Zeit zu unterhalten. Möglicherweise — sagt Sommer hinzu — rührt dieses öftere Schlafen kleiner Kinder theilweis auch davon her, daß deren Blut, vielleicht in Folge eines weniger reichen Gehaltes an Blutzellen, in diesem Alter ein geringeres Vermögen besitzt, Sauerstoff zu absorbiren und aufzuspeichern, wodurch allerdings eine öfter wiederholte Zufuhr und Auffpeicherung desselben nöthig werden müßte. Daraus würde sich umgekehrt auch erklären, warum es Personen in reiferen Lebensaltern gibt, die nur 4 bis 5 Stunden Schlafes bedürfen, während Andere gegen 7—8 Stunden gebrauchen. Man braucht nur einen größeren Reichthum an Blutzellen bei den erstern, einen geringeren bei den letztern anzunehmen, und die Folgerung kann nur die sein, daß jene die nöthige Menge Sauerstoff in kürzerer, diese nur in län-

gerer Frist erlangen. In der That scheinen ältere Personen in umgekehrter Weise ganz für die Richtigkeit dieser Annahmen zu sprechen. Alte Leute verhalten sich wie Kinder insofern, als sie leicht wieder in Schlaf verfallen, besonders am Tage nach Anstrengungen, welche einen größeren Stoffverbrauch voraussetzen. Dagegen haben sie des Nachts einen kurzen Schlaf. Es kann daraus nur gefolgert werden, daß die Menge des während des Schlafes freibaren Sauerstoffes im Greisenalter entweder in Folge von Blutarmuth, Verminderung der Anzahl der Blutzellen, oder auch in Folge von Veränderungen des Blutes beträchtlich vermindert und damit die Dauer des Schlafes abgekürzt wird, daß aber auch ein mehrfach wiederholter Schlaf dazu gehört, um das den Anstrengungen entsprechende Maß von Sauerstoff wieder zu erlangen. Das Blut nimmt eben nicht genug von ihm auf während des kurzen Schlafes und kann nicht genug aufnehmen, um den Körper den ganzen Tag über in Spannung zu erhalten. Darum gesellt sich auch einer Verminderung der Sauerstoffaufnahme ein Nachlassen der Kräfte zu, weil gleichzeitig mit jener eine Verengerung des Stoffumsatzes verbunden ist.

Das etwa sind die Fundamente, auf welche Sommer seine Theorie des Schlafes aufgebaut hat. Ich habe sie möglichst treu wiederzugeben versucht, und habe es darum vermieden, mehr Eigenes hinzuzuthun, als nöthig war, seine Theorie in diesem kurzen Rahmen klar darzulegen. Sie ist in der That die erste, welche einen wirklich wissenschaftlichen Boden unter sich hat, und darf darum das Recht der Beachtung in Anspruch nehmen. Ein bedeutlicher Einwand scheint der zu sein, daß Menschen von nervöser Natur nach sehr starken Anstrengungen trotz des Schlafbedürfnisses doch nicht schlafen, obgleich gerade nervöse Menschen in der Regel eines langen Schlafes bedürfen, wie Mont von Napoleon I. zeigte. Allein die Theorie nimmt ausdrücklich an, daß der verbrauchte Sauerstoff auch im Zustande des bloßen Ausruhens wieder ergänzt werden kann. Auf die Dauer würde freilich bei dieser Art der Ergänzung der Körper schließlich doch zu Grunde gehen. Warum? Darüber läßt uns die Theorie im Dunkeln, ebenso darüber, woher es komme, daß manche Kranke mehrere Tage im Schlafe liegen können, wie es namentlich in nervösen Zittern häufig vorkommt, oder woher es kommt, daß das selbst Sekunden nach großen Aufregungen passiren kann, wie es Napoleon passierte, daß er nach der verlorenen Schlacht von Aspern und Eplingen volle 36 Stunden auf seinem Feldbette eingeschlafen war. Kann es geschehen, daß der Sauerstoff bis auf das letzte Atom verbraucht und nun ein so langer Schlaf nothwendig wird, um die gänzlich verfestigte Krafttaule wieder aufzulauern? Wie erklärt es sich ferner, daß übermüdete Menschen im Schlafe maraschiren, wie das mit den Preußen der Fall war, die, vor Ligny geschlagen, sofort auf das Schlachtfeld von Water-

leo zu marschiren hatten, wobei ganze Kotten mechanisch im Schlafe vorwärts gingen? Kann hier die Schlaftrunkenheit den Zustand des Ausruhens ersetzen? Oder, wie kommt es, daß ein höchst schlaftrunkener, also des Schlafes höchst bedürftiger Mensch, der vielleicht schon über seine eigenen Beine hinwegfällt, durch plötzlichen Schreck oder dergleichen Ursachen doch wieder zur vollen Mächtigkeith, ja, zur höchsten Energie erwachen kann, wie das mit jenen Preußen auf dem Schlachtfelde sicher doch auch geschehen sein muß, wie es aber bei Feuerbrünken sehr häufig vorkommt? Darf man annehmen, daß doch nicht aller Sauerstoff verbraucht war, oder daß er vielleicht aus einigen Körpertheilen in solche wandert, die seiner in diesem Augenblicke ganz besonders bedürfen? Solche und ähnliche Fragen harren noch der Beantwortung. Dagegen hat Sommer den sogenannten Winterschlaf der Thiere mit Recht

von der Theorie ausgeschlossen. Er beruht auf Temperaturverhältnissen und kann beliebig aufgehoben oder wieder herbeigeführt werden, wie man sich an Murmeltieren überzeugen hat. Ich habe das Gleiche bei Schildkröten beobachtet. Auch der durch narкотische Mittel hervorgebrachte schlafähnliche Zustand ist eher alles Andere, als Schlaf und abnormals mit Recht von der Theorie ausgeschlossen worden. Was aber unbestreitbar bleibt, ist die Ansicht Sommer's, daß, wenn man den Schlaf wirklich den Bruder des Todes nennen will, man sich wenigstens dahin verständigen muß, daß, da der Schlaf in Folge einer Entsaureffung eintritt, der Tod entschieden in vielen Fällen kommt, weil das Blut die Fähigkeit verloren hat, neuen Sauerstoff aufzunehmen. Je mehr diese Fähigkeit des Blutes versiegt, um so mehr nimmt das Absterben des Menschen mit dem Hinfalle seiner Kräfte zu.

## Beiträge zur Naturgeschichte der Rothfußfalken.

Von W. Hausmann.

Unstreitig hängt Niemand mehr vom Zufalle ab, als der ornithologische Forscher und Sammler; begünstigt ihn dieser nicht, ach, so macht er so viele Gänge vergebens, dann ist so manche Mühe und Anstrengung umsonst. Dafür aber auch gibt es nichts Erfreulicheres, als wenn Zeit und Umstände einmal zusammentreffen und dem Forscher gestatten, eine längst gewünschte Rade in seinem Wissen auszufüllen. Die seltener erscheinenden Wander- und Zugvögel sind natürlich am schwersten zu beobachten, da sie oft, einem Meere gleich, kommen und verschwinden. Ueber einen dieser Frühlingsgäste wollen wir im Folgenden sprechen, wobei wir zugleich in allgemeinen Umrissen eine Beschreibung des Beobachtungsterrains geben.

Das hochromantische, malderiche, von der erhabenen Gebirgskette der Karpathen umgürtete Siebenbürgen schliefet auch Ebenen von ziemlich bedeutender Ausdehnung ein. Keine kommt aber an Schönheit, Fruchtbarkeit, mannigfacher Abwechselung und Großartigkeit der im östlichen Theile des Landes gelegenen Burgenländer-Ebene gleich, deren weite, grüne Flächen, von der Hand fleißiger Sachsenbauern bearbeitet, wirklich einem „Meer von Aehrenwogen“ gleichen. Die tiefen Dittavial- und Aluvial-Eschichten, welche hier weithin aufgelagert sind, zeigen mit ihren kleinen Wasserschnedenresten, welche weit verbreitet sich finden, daß einst hier wirklich ein großer See seinen blühenden Spiegel ausbreitete. Dieser ist nun freilich schon längst verschwunden; jetzt werden diese Ebenen nur von klaren, kalten und reisenden Gebirgsküffen durchfurcht. Auf weite Strecken hin ist hier oft kein Baum, kein Strauch zu sehen; sobald man aber die Ufer eines der erwähnten Flüsse erreicht, so findet man wieder Schatten und labende Kühle nach dem anstrengenden Marsche über das heiße, eintönige

Blachfeld. Ein dichter Gürtel von Erlen, Ulmen, Buchen, und Birken, oft untermischt mit allerlei Beeren tragenden Sträuchern, die in dem fetten Boden oft eine erstaunliche Entwidlung erlangen, zieht sich an beiden Ufern hin. Auch die meisten Vogelarten ziehen sich gern nach diesen Distrikten, weil sie dort Schutz und Nahrung finden. Oft mag freilich wohl die Menge der Gasse gerade auch ihre Feinde anlocken. Wir trafen selbst den riesigen Steinadler, den Habicht, Wanderfalken und Sperber hier oft häufiger an, als im Gebirge.

In der Burgenländer-Ebene beobachteten wir nun auch zu verschiedenen Malen und durch mehrere Jahre den noch nicht überall bekannten niedlichen Rothfußfalken. —

Sobald die Frühlingssonne ihre wärmenden Strahlen über unsere nördlicheren Gegenden ergießt, und die Insektenwelt sich mehr und mehr regt und belebt, dann erscheinen auch viele Vogelarten wieder, die uns in den rauhen Wintertagen verlassen, um in südlicheren Breiten die schlimme Zeit zu erleben. Viele dieser Frühlingsgäste sind bekannt und beliebt in allen Schichten des Volkes. Genaue Beobachter können fast den Tag bestimmen, an dem sie wieder erscheinen werden; mit Reichtigkeit kann man sie bei geeigneter Lokalität beobachten und sich an ihrem muntern Treiben ergötzen oder die prächtigen Farben bewundern, mit denen Mutter Natur oft so herrlich ihr Hochzeitskleid schmückt. Bei manchen Vogelarten gehört dagegen ein besonderes Glück dazu, um sie erscheinen und weggehen zu sehen. Zu diesen schnellfliegenden, ungewissen Fremdlingen gehört auch unser kleiner Rothfußfalk. In manchen Jahren bemerkten wir, trotz fleißiger Umschau, nicht einen einzigen, in andern Jahren höchstens einige Paare. Dagegen hatten wir das Glück, im Jahre 1865 g. B., einen

ziemlich zahlreichen Flug zu beobachten, und erlegten mehrere Exemplare in wenigen Stunden. Am 20. April des genannten Jahres trieben sich die muntern Vögelchen auf dem Theil der Ebene umher, welchen die Straße von Kronstadt nach dem alterthümlichen Fleden Marienburg durchschneidet. Da gerade die Bauern damals große Brachäder umflürzten, so fanden die Rothfußfalken reichliche Nahrung an den herausgewühlten Engertlingen, Käfern und Eidechsen, welche sie eifrig auflesen und mit Behagen verschlang. Da hier weit umher keine Bäume sich finden, so schaukelten sich die vom Fluge ermüdeten oder gesättigten beständig auf dem Telegraphendrahte, oder sonnten sich nachlässig auf einer Erdscholle sitzend. Andere jagten sich spielend und laut quiekend in allerlei gewandten Evolutionen in der klaren, blauen Frühlingsluft umher. Nach drei Tagen war nicht ein Falke mehr in der Umgegend zu sehen. Alle waren in nördlicher Richtung weiter gezogen.

Die Rothfußfalken bilden eine

Ausnahme von der Regel, wozu sonst meist bei der Gattung Falco Männchen und Weibchen ziemlich gleich gefärbt sind. Die Rothfußfalken unterscheiden sich in Farbe und Zeichnung ganz bedeutend von einander. An Größe sind sie einer Hausstaube beinahe gleich, nur ist der Schwanz länger und keilförmiger und die Flügel sind noch schlanker und spitziger geschnitten, als bei den Tauben. Die vorderen Füße sind kurz, mit schwachen, weißlichen Nägeln besetzt; der Schnabel ist klein, mit rundern Niesenlöchern

rother Wachshaut und einem sehr deutlichen Ausschnitt (Zahn). Die Männchen sind vorherrschend dunkel blaugrau gefärbt, der Schwanz ist schwärzlich; Hosen, Steiß und Unterschwanzfedern sind schön rostroth. Die Weibchen sehen dem Thurnsfalken sehr ähnlich; auch sie sind vorherrschend rostbräunlich, Flügel und Schwanz mit vielen Querbinden,

auf dem Rücken dunkelgrau gemellt. Im Uebergangsleibe haben auch die Männchen auf Flügel und Schwanz Querbinden; die Brust ist in großen Flecken braun und grau; auf dem Rücken und Oberflügel sind die einfach grauen mit quergemellten braunen Federn vielfach untermischt. Die vier mittleren Schwanzfedern eines jungen Männchens, welches wir erlegten, sind normal schwärzlich gefärbt, während die andern die regelmäßig verlaufenden Bänder und bräunliche Farbe zeigen, wie man sie nur am Weibchen sieht; auch sind diese Federn um  $\frac{1}{2}$  Zoll kürzer als die mittleren Federn, wodurch der ganze Vogel ein sehr sonderbares Ansehen bekommt. Alle so abnorm gefärbten



Der Rothfußfalk (*F. rupestris*).

Vögel wurden innerlich, frisch geschossen, untersucht, und als Männchen erkannt.

Am 6. Mai 1867 hatten wir das Glück, am Ufer der rauschenden Weidenbach, welche dem südlich sich bis 8000 Fuß erhebenden Bergriesen Bucegetz entspringt, eine überaus große Anzahl Rothfußfalken beobachten zu können. Schon seit einigen Tagen hatten sie sich dort aufgehalten, um auf die zahllosen Maitäfer Jagd zu machen, welche damals sich besonders in den Weidenbäumen eingenistet

hatten, welche hier zahlreich zwischen wilden Apfelbäumen, Erlen und Ulmen wachsen. Auch diese Weidenbäume erreichen hier, unbelästigt von der fliegenden Art, eine erstaunliche Größe. Einen prächtigen Anblick gewährte es nun, zwanzig bis fünfundzwanzig dieser schönen Falken auf einem Baume sich ausruhen zu sehen; Männchen und Weibchen saßen gemischt durcheinander. Stolz und zuversichtlich schienen sie aus ihrer Höhe auf den Beobachter unten herabzusehen und erlaubten eine ziemliche Annäherung, ehe sie sich entschlossen aufzufliegen und ihren lustigen Ruhezug zu verlassen. Für einige Zeit gestellten sie sich dann den Kameraden bei, welche unaufhörlich in den elegantesten Wendungen und Schwankungen über den Baumspitzen dahinsegelten, wobei sie eben unvorsichtig umhersturenden Malkäfer abhingen und in wenig Augenblicken in den ohnehin schon überfüllten Kropf beförderten. Die günstige Gelegenheit, diese sonst schwer zu erlangenden Vögel zum Zwecke näherer Beobachtung zu schießen, durften wir nicht unterlassen vorübergehen lassen. Nach jedem Schusse, wenn einer der Kameraden getroffen herabtaumelte, erhob sich die ganze Gesellschaft und umkreiste einigemal laut quielend den Ruheflügel, ließ sich aber bald wieder nieder, und so konnten wir diesmal vom selben Baume sechs bis acht Stück herunterschießen, ehe sie ganz wegblieben. Auf freistehenden Bäumen oder auf der Erde sitzend, sind sie aber viel vorsichtiger und gestatten es selten, sich ganz schußmäßig anzuschleichen.

Nach längerem Bemühen gelang es, uns ein Pärchen dieser Falken lebend zu erlangen, welches wir durch längere Zeit zum Behufe besserer Beobachtung im Zimmer hegte. Freilich saßen sie meist den ganzen Tag ruhig auf einem keulenartigen Gestelle von Haselholz nebeneinander. Eifrig ordneten sie oft mit Schnabel und Klaue ihr Gefieder oder ließen sich begählig von der Sonne beschämen. Anfangs fütterten wir sie mit Malkäfern, die sie gar bald aus der Hand nahmen. Später bekamen sie ausschließlich Fleisch; Ammen, Finken und andere kleine Vögel fraßen sie sehr gern und verschluckten eine Menge kleinerer Federn, welche

sie, wie andere Raubvögel, nach beendeter Verdauung als zusammengeballtes „Gewölle“ wieder auswürgten. Mit einer Radsfeder ließen sie sich sehr gern das Gefieder streichen; kam man aber dem Schnabel in die Nähe, so bissen sie stets nach der Feder oder dem Finger, ohne aber besondern Schaden machen zu können; auch ihre kleinen Fänge durchbringen kaum die Haut, und selten fließt Blut nach solcher Verwundung. An fremde Menschen gewöhnten sie sich bald, nur bei der Annäherung von Hunden flatterten sie ängstlich umher und konnten sich oft lange nicht beruhigen. Das Männchen zeigte sich stets geduldiger und sanftermüthiger als das viel kleinere Weibchen, welches selbst den Pfleger biß und kratzte, so oft sich die Gelegenheit dazu bot. Nach solchen jörnigen Aufregungen packte es auch wohl das Männchen bei den Kopffedern und schüttelte es so derb, daß es schrie, und nur selten widerstand sich dieses solchen ungerathenen Angriffen, sondern suchte lieber sein Heil in der Flucht und überließ dem zänkischen Weibchen allein den Platz. Bei solchen Streitigkeiten quielten Beide oft aus Leidestritten. Hielt man Weiden einen Vogel hin, so daschte das Weibchen ihn sicher dem Männchen vor dem Schnabel weg; hatten Beide zugleich angefaßt, so riß es wenigstens so lange, bis ihm der Löwenanteil verblieb, und das gutmüthige Männchen sich mit einigen armseligen Resten begnügen mußte. Sobald sich beide Falken allein im Zimmer glaubten, suchten sie die Fesseln, die Schnur, durchzunagen, und flatterten unruhig umher. Beim Einfangen zeigte sich das Weibchen ebenfalls am widerspenstigsten; es verkroch sich in dunkle Winkel oder setzte sich, wenn man es erwischte, mit Schnabel und Klaue tüchtig zur Wehr. — Ob sie hier im Lande brüten, ist noch nicht sicher festgestellt. Nach dem Maimonat trafen wir wenigstens niemals noch Rothfussfalken an. Daß sie ihrer Nahrung wegen zu den entschieden nützlichen Vögeln gehören, ist einleuchtend, und namentlich Malkäfer vertilgen sie in bedeutender Menge. Im freien Zustande verfolgen sie wohl nur nothgedrungen kleinere Vögel, wenigstens bemerkten wir nicht, daß sich diese vor ihnen fürchteten, oder bei ihrem Erscheinen den Warnungsruf gaben.

## Die Eifel.

Von P. v. Wirtgen.

Zweiter Artikel.

Wer von Coblenz nordwestlich nach Aachen oder von Köln südwestlich nach Trier wandert, der durchschneidet auf beiden Wegen die Eifel auf fünfzehn Meilen in ihrer ganzen Breite. Karl der Kahle maß sie ein, als er den ersten französischen Anspruch auf das linke Rheinufer zu machen gedachte und von Ludwig III., dem Sohne Ludwigs des Deutschen, am 8. October 876 auf dem Napsfelde gänzlich geschlagen, in eiliger Flucht nach Lüttich entran.

Wer aber von Coblenz bis Köln und von da nach Aachen, sodann nach Trier und von da wieder nach Coblenz ein großes unregelmäßiges Viereck beschreitet, der bat die Ränder der Eifel auf allen Seiten begangen. In Quadratmeilen angeschlagen, mag die Oberfläche derselben etwas über hundert betragen. Vier Regierungsbezirke der preussischen Rheinprovinz, Coblenz, Trier, Köln und Aachen, theilen sich fast in ihrer Mitte in dieselbe.

Unter allen Gliedern des mittlelrheinischen Gebirgslandes ist die Eifel durch ihre geologischen Verhältnisse das interessanteste, und besonders sind es die vulkanischen Gebilde, welche dem Forscher nicht allein, sondern auch jedem aufmerksamen Manne Stoff zu den mannigfaltigsten Betrachtungen gewähren. Da finden wir mächtige Eruptionkegel, umgestürzte Krater, weitreichende schwarze Lavaströme, tiefe Kesseltäler, meist von Eruptionstratzen herührend und theilweise mit Wasser gefüllt, die Hüten, einsamen Raate der Eifel bildend. Neben ihnen erheben sich als weitschauende Kegel colossale Basaltberge. Weite, raue Hochflächen, oft den Anwohnern nur spärlichen Unterhalt bietend, fast keinen Sommermonat vor Nachtteufen sicher, dehnen sich überall aus, während sie von allen Seiten von den lieblichen Thälern, mit den schönsten landschaftlichen Reizen geschmückt, tief durchfurcht sind.

Die Gliederung der Eifel bietet wenige Momente zu genauen Grenzbestimmungen dar. Da, wo acht bis zehn Meilen von dem Rheine entfernt, die Quellen der Ahr, der Mosel, der Ues und der Lieser liegen, breitet sich ein Plateau aus, dessen durchschnittliche Höhe über dem Meere 1600 bis 1700 F. beträgt. Es ist dies die hohe Eifel, die der auf deren Seiten Anwohnern nur eigentlich die Eifel genannt wissen will. Auf diesem Plateau erheben sich mächtige Basaltkegel: die Hochacht 2340', der Ahrburg 2210', der Hochfallberg 2160', der Aremberg 2000', der Hochpöcher 1780'. Wir befinden uns hier im ärmsten und unfruchtbaren Theile der Eifel, wo zwei fast ganz geschlossene Plateaus, das von Kelberg und von Wüßleimach, dem Bewohner nur sehr spärliche Nahrung reichen, und wo nur der Anbau des Hafers lohnt, der acht bis zehnfachen Ertrag liefert. Die traurigste Partie ist hier die zwei Stunden lange, von der Coblenz-Lütticher Straße durchzogene Vorderer Halbe, westlich von Kelberg.

Südwestlich an die hohe schließt sich die vulkanische Eifel an, welche von Südosten nach Nordwesten einen mächtigen, sechs Meilen langen und höchstens eine Meile breiten Spalt in dem Gebirge bildet. Hohe Kraterkegel drängen sich vorzüglich um Daun, Hillesheim und Gerolstein zusammen; aber noch südwärts über Lutzerath zieht sich dieselbe bis Varrick, nahe zur Mosel, während sie westlich bis Ormond reicht, an der nördlichen Spitze der Schneifel. Vereinzelt liegt noch die großartige vulkanische Partie von Wanderscheid, während einige kleinere Portionen zwischen Kelberg und Wachen, in der hohen Eifel, sich erheben.

Im Westen schließt sich an die vulkanische Eifel zwischen Bockheim und Prüm ein Plateau von 2000 F. absoluter Höhe, über welches sich von Südwesten ein zwei Meilen langer, eine halbe Meile breiter, 2—300 F. hoher Gebirgssattel hinzieht, der zum Theil torfig-sumpfig, zum

Theil mit ausgedehnten Waldungen bedeckt ist. Dieser Landsattel heißt die Schneifel, vielleicht Schneeweise, und ist eine der unfruchtbaren Partien dieses Landes. Eine sandfeinartige Grauwade, nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt, bildet den Untergrund, und wenn auch rings umher an den Rändern ansehnliche Trischaffen liegen, so findet sich doch an der beinahe drei Meilen langen Landstraße nicht ein Dorf. Einige kleine Hütten, Schneifelhäuser, und eine Försterei bieten dem müden Wanderer einige Erquickung.

Nördlich unmittelbar an die Schneifel anschließend, erhebt sich das 2170 F. hohe Plateau des Weißensteins, von welchem die Ahr nach Osten, die Dur nach Süden, die Warge nach Westen und die Ues nach Norden abfließen.

Nordwestlich bis zur belgischen Grenze und nahe bis Aachen erstreckt sich die hohe Veer, ein ausgedehntes, waldbarnes, torfig-sumpfiges Hochland, oft wochenlang von dichten Nebeln bedeckt. Auf weite Entfernungen hin unterscheidet man auf dem Plateau oft keinen hervorragenden Punkt. Nur wenige Straßen ziehen hindurch, und die Verbindungswege der Trischaffen sind nicht selten so sumpfig, daß das Wasser sich in den eben eingedrückten Fußspuren sammelt. Deutsche und französische Wallonen bewohnen dünn die Veer in Dörfern, die sich oft Viertelstunden lang hinziehen, oder in einzelnen Höfen, die rings von hohen Hainbuchenwäldern umgeben sind. Die Sprache der französischen Wallonen ist eine eigenthümliche Mundart, die zwar französisch klingt, aber von keinem Franzosen verstanden wird; dagegen verstehen und erlernen die Wallonen (wahrscheinlich die Nachkommen der alten Eburonen) sehr leicht die französische Sprache. Der Menschenschlag ist stark und kräftig, meist mit bledem Schädel und groben Gesichtszügen, auch wohl etwas erb in seiner Weise. Die Frauen rauchen Tabak aus kurzen Pfeifen und tragen dicke Strohhüte, an denen sich hinten ein Schleier befindet, der den Nacken gegen Wind und Wetter schützt. Direct nach Westen wandernd, kommen wir von der hohen Veer in die Ardennen, mit welchen sich auch die Schneifel durch den Söning verbindet.

Das Gebirgsland, welches südlich von der vulkanischen Eifel, der Schneifel und dem Söning nach der Mosel bis gegen Trier hin liegt, wird auch die Vorderer Eifel genannt. Dieses Land, dessen Boden vom größten Theil aus Rutschalk und Buntsandstein besteht, gewährt mehr in landschaftlicher noch geologischer Beziehung bedeutendes Interesse. Die ganze nördliche Eifel, aus welcher die Erft nordöstlich zum Rhein, die Roer mit vielen Zuflüssen nordwestlich zur Maas fließt, dacht sich allmählig zur nieder-rheinischen Ebene ab. Drönscher Kalk und Kohlenlager, Buntsandstein, Grünsand- und Krebgebilde lagern sich auf und an, und der Bergbau liefert, besonders bei

dem berühmten Bleiberg zu Gommern und Mochers nicht, den die Eisfahbahn jetzt durchschneidet, reichliche Ausbeute.

Wer vom Rhein aus nach der Eifel reisen will und nach deren Lage sich erkundigt, wird häufig weit nach Westen gewiesen, und ist er in dieser Richtung weit fortgeschritten und befragt er sich wieder, wenn er sein Ziel erreicht zu haben glaubt, so weist man ihn weit nach Osten, wo die Eifel liegen soll. Das schöne Land ist so recht unerschuldet in den Ruf gekommen, daß Niemand gern in ihm wohnen mag. Wer aber nicht anders kann, dem ist sie denn auch als seine Heimat schön genug, und er liebt sie, wie der Schweizer seine Alpen und der Grönländer seine Eisfelder.

Der südböchstliche Theil des Eisfgebirges, aber landschaftlich durchaus nicht mehr zur Eifel gebührend, ist einer der schönsten und fruchtbarsten Landstriche des Rheinlandes, der sehr dicht bevölkert ist, den vorzüglichsten Ackerbau dat und sich von einer Plateauhöhe von 800 F. über dem Meere allmählig in das Rheinthale, in das Coblenz-, Neuwieder Becken, abdacht. Die Kette, in der hohen Eifel entspringend, fließt von Westen nach Osten, ein nicht sehr tiefes Thal bildend, durch das Mosfeld. Besonders merkwürdig ist dasselbe durch die zahlreichen erloschenen Vulkanen, welche sich darauf befinden. Die Diluvialablagerungen mit den vulkanischen Produkten, Luff, Asche, Bimsstein, Lava, Kapillit, vermischt und verbunden, geben einen ausgezeichneten fruchtbaren Boden, für dessen Erträge die nahe gelegenen Städte Coblenz, Neuwied, Andernach und Mayen, leichte Absatzwege darbieten. Außerdem haben die Vulkanen in der Mendiger Mühlfteinlava, in den Keller Badofensteinen und in den ausgedehnten Trassablagernngen ein sehr bedeutendes Material zur Gewerthätigkeit der Bewohner niedergelegt, das ihnen reiche Nahrungsquellen fließend gemacht hat. Dem Mosfeld, so ausgezeichnet und so nahe bei Coblenz liegend, werden wir einen eingehenderen Artikel widmen.

Unmittelbar an das nordwestliche Ende des Mosfeldes schließt sich der Laacher See, das größte und schönste aller Eisf-Maare an. Weiter nördlich finden wir das Troththal, durch seine reichen Kohlen- und Erbsalatlagen und durch seine mächtigen Luffsteinablagernngen berühmt. Der kleine Landstrich von hier bis zur Ahr wird durch keinen besonderen Namen bezeichnert.

Nördlich der Ahr bis in die Nähe von Rheindach nordwestlich und Bonn nordöstlich, liegt ein von vielen basaltischen Kegeln unterbrochenes Plateau von 500—600 Fuß abf. Höhe, als Besisthum der ehemaligen Grafen von Hochstaden die „Grafschaft“ genannt. Braunkohlen treten hier, gleich wie in dem gegenüber, rechts des Rheines gelegenen Revier des Reberggebirges, in bedeutenden Quantitäten auf. Dieses Plateau läuft mit dem von zahlreichen Dörfern belebten Vorgebirge, das fast ganz aus Diluvium besteht, von Bonn bis Köln, in die niederbheinische Ebene aus.

## Literarische Anzeige.

In der C. F. Winter'schen Verlagsabandlung in Leipzig und Heidelberg ist soeben erschienen und in allen Buchabandlungen vorräthig:

# Chemische Briefe

von

## Justus von Liebig.

Wohlfeile Ausgabe. 8. geh. Preis 1 Thlr. 18 Ngr.

Unter allen populären naturwissenschaftlichen Büchern nehmen Liebig's chemische Briefe unumwandelbar die erste Stelle ein. Dieselben sind nach Fassung, Ordnung und Inhalt für Jedermann geschrieben, er mag Chemiker oder Nichtchemiker sein, und sind Jedem verständlich, für Jedem schätzbar. Sie haben den Zweck, die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt auf die Bedeutung der Chemie und den Antheil zu lenken, den die Wissenschaft an den Fortschritten der Industrie, Mechanik, Pflanzkunde, Agricultur und Physiologie genommen hat.

## Literaturbericht.

**Jahrbuch des Österreichischen Alpenvereins. Viertes Band. Mit 7 Beilagen. Wien 1863, bei Carl Gerold's Sohn. 8. 452 S.**

Mit demselben Vergnügen, das uns die drei früheren Jahrgänge bereicherten, versehen wir das Geschehen dieses Jahres. Denn schon die Bergbesteigungen aus diesem eine bedeutende Rolle spielen, so finden sich doch auch viele Arbeiten eingefügt, welche die wissenschaftliche Kenntniss der Alpenwelt wesentlich vergrößern. In dieser Beziehung haben wir hervor: die See'n in den Alpen, von Heinrich Ballmann; Höhenbestimmungen in den Illerthaler Alpen, von Carl v. Sonklar; barometrische Messungen am Salzberg, von Carl Freisch; die Höhe der mittel- und südeuropäischen Hohegebirge,

von A. Kerner; Österreichs klimatische Verhältnisse mit besonderer Rücksicht auf den Sommeraufenthalt, von Ignaz Rabe u. s. w. Unter den Notizen interessiert uns die Mittheilung, daß man von Kals aus beabsichtigt, einen Weg nach der Spitze des Großglockner zu bahnen, wodurch Kals notwendig der Mittelpunkt für alle Glocknerbesteigungen werden muß. Diese Wegbahnung soll den kleinen Glockner und mit ihm auch die höchst gefährliche Schneide zwischen beiden Spitzen links liegen lassen, also unmittelbar aus der großen Glockner führen. Veranlassung dazu gab der Bau einer Hütte am Glockner in der Höhe von 9000 F. durch den Kaufmann Stöckl aus Prag. — Höchst dankenswerth endlich ist die von Ferdinand v. Hellwald besorgte „Bibliographie der alpinen Literatur, von 1867 bis 1868.“

A. R.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 35 Cr. (1 fl. 30 Kr.) Alle Buchabandlungen und Verleger nehmen Bestellungen an.

Verleger: C. F. Winter'sche Buchdruckerei in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 18.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetfchke'scher Verlag.

**3. Mai 1869.**

**Inhalt:** Till Eulenspiegel im Pflanzenreiche. — Eine Biographie aus alten Quellen, von Ernst Krause. Erster Artikel. — Die zweite deutsche Nordfahrt, von Otto Ule. — Der Elton-See in Rußland, von G. Schmeling.

## Till Eulenspiegel im Pflanzenreiche.

Eine Biographie nach alten Quellen.

Von Ernst Krause.

Erster Artikel.

Unser bekannter norddeutscher Spatzvogel, der es sich zur eigentlichen Lebensaufgabe gemacht hatte, unaufhörlich neue Neckereien zu ersinnen, um seine Mitmenschen zu foppen, besaß sein älteres Urbild in einem Pflanzengebilde, welches man versucht ist den Schall aller Schälte zu nennen. Während Eulenspiegel doch nur an den Kruten mit Mitteln verstand seine Küstchen ausließ, hat sein Pendant im Gemächreiche es auf die Weisen abgesehen und die Gelehrten aller Disciplinen nacheinander an der Nase herumgeführt. Den Philosophen stellte es sich dar als der Weltgeist und die Urmaterie, durch welche Alles, was lebt, Wachsthum und Gedeihen erhält. Die Astronomen meinten die leuchtende Substanz der Sterne vor sich zu haben, die Aerzte eine Universalmedicin, die Chemiker jene Ur-

tinktur, welche alle Metalle in Gold verwandle, die Physiker das Substrat der Feilichter, die Erdgelehrten den belebenden Hauch des Bodens und die Botaniker mit den Zoologen — ach, was haben die nicht Alles hinter dem Hüpfenden, fliegenden Dinge gesucht!

Heute soll nun der Botaniker darüber Aufschluß geben. „Ja, wo soll ich den Lückebold suchen?“ entgegnet der Befragte, „diese Pflanze, welche überhaupt keinen Standort hat, diesen Ueberall und Nirgend, dieses richtige fahrende Genie?“ Kaum hat er die frevelnden Worte ausgesprochen, da flücht er zur Strafe dafür lang in's Gras. Er war auf einer schlüpfrigen Gallerie ausgeglitten, die rings in zollgroßen Klumpchen auf dem Wege liegt. Aber nun mit der Nase darauf gestoßen, gesteht er vorlegen, den-



noch keine bestimmte Auskunft geben zu können, weil diese Gallette gar keinen deutlich ausgesprochenen Charakter zeige. Wer könne wissen, ob das Nostoc, Collema, Tremella, Lithalium oder was sonst vorstelle; nur das Mikroskop könne entscheiden, ob wir eine Alge, eine Flechte, einen Pilz, oder eine Kolonie kleiner Thiere vor uns haben. Sorgfältig wird die gitternde Masse in ein Stück Papier gehüllt; aber siehe da, am Ende des langen Spargelganges ist Alles verschwunden, ein paar dünne Membranen find Alles, was von dem Eulenspiegel zurückgeblieben.

Wir wollen das Ding vorläufig Nostoc nennen, nämlich mit dem Namen, unter welchem es am häufigsten genannt ist, und nun seine wunderbaren Streiche und Schicksale mittheilen.

Seine älteste Erwähnung glaube ich bei zwei alten Schriftstellern antzutreffen, dem Naturhistoriker Aelian und dem jüdischen Geschichtschreiber Flavius Josephus. Ersterer in seiner Thiergeschichte, dieser in seiner Geschichte des jüdischen Krieges sprechen von einer Pflanze, die sie Aglaopholis und Baaras nennen, welche die Tage nicht von andern Gewächsen zu unterscheiden sei, aber Nacht wie eine Fackel oder ein Blitz leuchte. Sie verschwinde so gleich vor dem, der sie angesehen wolle, wenn sie nicht schnell von ihm mit einer hier nicht nennbaren Flüssigkeit besprenge werde. Aber auch jetzt dürfe der Finder, wenn ihm sein Leben lieb sei, diese von Dämonen brachte Pflanze nicht ausreißen, er müsse sie ohne Berührung rings umgeben, den Schwanz eines jungen, schwarzen Hundes anbinden und diesen mit einem Stückchen Fleisch locken. Sowie der Hund die Pflanze ausgerissen habe, falle er todt zu Boden und werde mit Feiertlichkeiten begraben. Die Pflanze selbst könne aber jetzt auch vom Menschen ohne alle Gefahr ergriffen werden.

Ganz ähnliche wunderliche Ceremonien schreiben die Alten für die Einsammlung anderer Zauber- und Heilpflanzen vor. Man lese, was Plinius und Andere über die Einsammlung des Atracyn, Eisenkraut, der schwarzen Nieswurz, der Pönie u. s. w. berichtet haben. Man findet hier ebenfalls das Umgraben, Besprengen mit Flüssigkeiten, den schwarzen Hund u. s. w., und es liegt also darin kein Grund, die Baaras-Pflanze, wie die meisten Botaniker gethan haben, für den sagenreichen Atracyn zu halten. Vielmehr stimmen die meisten Eigenschaften, welche Josephus seiner auf dem Libanon unter Cedern wachsenden Pflanze beilegt, genau mit dem überein, was später das Mittelalter vom Nostoc fabelte und hoffte. Die Pflanze Baaras wird nämlich als wunderbares Heilmittel gerühmt; sie habe die Kraft, alle Metalle in Gold zu verwandeln, weshalb die Araber sie Goldkraut nennen; sie ernähre sich von Erdbarz und steße bituminösen Geruch aus; ihre Blätter entschläpfen und verschwinden aus dem Tuche, wohin man sie geschlagen u. s. w.

Es ist leicht zu begreifen, wie die eben erwähnte Ansicht der Araber schnell die größte Aufmerksamkeit der Alchemisten erregte mußte. Wie sie und die Aerzte, welche das „Lebenselixir“ suchten, damit gearbeitet, geht am klarsten aus dem Auszuge hervor, welchen Delandine aus einem alten Manuscripte der Loner Bibliothek über die „Universal-Medizin“ veröffentlicht hat. Es heißt darin: „Um sich von allen Uebeln zu befreien und ein ewiges Leben sich zu verschaffen, handle es sich, sagen die Alchemisten, darum, nach Verwendigung des Mondscheins im April und Mai, eine halbbedeckte (entrefeuillée), dicke, durchscheinende Masse zu finden, welche der Samen der Erde ist. Sie ist ohne Wurzel, Blume oder Samen. Ihre Gestalt gleicht dunkelgrün gefärbten Wollknoten (weich) wie helles Wachs. Diese Masse ist der Universalgeist, welcher Wesenheit den Bäumen, Pflanzen und Metallen verleiht, sowie überhaupt allen Dingen, welche aus der Erde entstehen. — Es reicht hin, davon 40 Pfund zu sammeln, um es in Steingutzäßen mit so viel Thauwasser zu übergießen, daß dieses fünf Finger hoch darüber steht. — “

Ehe wir weiter sehen, was mit der Masse geschieht, sei es uns erlaubt, hier einzuschleichen, was im J. 1672 le Gallois in den Conferenzen der Pariser Academie, über das Verhalten des Nostoc's gegen Wasser veröffentlicht hat, wobei wir zugleich bemerken, daß dies die älteste Erwähnung eines exacten Naturforschers über den Nostoc ist, wenn wir Theophrastus Paracelsus und die Alchemisten nicht dahin rechnen. „In Languebec“, berichtet le Gallois, „habe ich eine Art freilebende, wurzellose Pflanze gesehen, welche nur an trocknen dürrten Orten (man findet sie nämlich am häufigsten auf Sandwegen) vorkommt. Sie gibt keinen Saft von sich, zerfällt aber wie Salz, wenn man sie in eine Flüssigkeit legt, und löst sich ganz im Wasser auf, was beweist, daß sie sehr schleimig ist. Sie werden sehen, daß sie weder Hefe noch Abfatz bildet und zugleich ersichtlich sinkt.“ —

Nachdem wir hinzugefügt, daß diese Angaben durchgängig genau sind, daß aber der üble Sumpferuch nicht so schnell eintritt, wenn der Nostoc lebend in Wasser eingesetzt wird, können wir den weiteren Proceß am besten aus dem poetisch geschriebenen „grünen Quell“, einem alchemistischen Werke des Grafen Bernbard, kennen lernen. Nachdem sich der Nostoc zu einer schwach grünlichen, oben etwas schaumigen Flüssigkeit aufgelöst hat, ohne daß eine Spur metamorpher Bildung bleibt, wird die Flüssigkeit in Zuckergläsern ruhig an die Sonne gestellt oder durch die concentrirten Strahlen eines Brennpiegels zugleich beleuchtet und erwärmt. Bald klärt sich der ganze Inhalt des Glases ohne Niederschlag, und das Grün der Flüssigkeit geht allmählig in das dunkelste Purpuroth über. Endlich beginnt ein leichter, weißer Niederschlag sich einzufallen, und die Farbe der Flüssigkeit geht zugleich in Weiß über, welches zuletzt die Sättigung des tiefsten Weingelb annimmt.

Jahrelang wird so diese Masse von den Liebhabern der geheimen Wissenschaft gehalten, fließt der Sonne ausgelegt und die ältesten Häuser mit nussangefüllten Vorräthen immer wieder aufgefüllt, wobei von Zeit zu Zeit die gelbe Farbe wieder in Purpur zurückkehrt. Inzwischen wächst fortwährend der Bodensatz, welcher nach langjähriger Arbeit im Feuer geglätt, endlich das vielgesuchte Metall aus sich erschließen soll.

Der bekannte Botaniker Rees von Esenbeck erzählt, daß er vor vielen Jahren das mehr als hundertjährige Tagebuch solcher Arbeiten, das in einer Familie vom Vater auf den Sohn übergegangen war, zugleich mit dem noch nie vernachlässigten uralten, immer neu aufgefüllten Stoff gesehen und den Farbenwechsel der Nostockflüssigkeiten verschiedenen Alters bei diesem gebildigten aller Adepten öfters beobachtet habe. Man erzählt ihm, daß eine Wesserspize voll jenes Niederschlages nach dem Glühen, einem gefährlich Kranken gereicht, diesen zwar geheilt, aber in so entseßliche Anfälle gestürzt habe, daß man nie wieder wagen werde, es einem Kranken zu geben.

Die außerordentlichen Hoffnungen, welche die Alchemisten seiner Zeit auf den Nostock gesetzt, bestätigt auch Magnol, der erste Fachbotaniker, der das Gewächs beschrieben hat, sowie auch Réaumur, welcher sagt, daß man in ihm den Weltgeist erblickt habe, der die Metalle in Gold verwandle.

Was bei jener faulen Gährung der Nostocklösung alles entstehen mag, die verschiedenen Farbenwechsel u. s. w. sind kaum ohne Selbstuntersuchung zu deuten. Die chemischen Untersuchungen geben wenig Anhalt. Der bekannte Chemiker Braconnot hat im J. 1817 einen Nostock analysirt, welcher alkalische Reaction zeigte. Destillirt lieferte er ein dicklich braunes Oel und eine gelbe alkalische Flüssigkeit, die aus einer Lösung von kohlenstoffem und etwas essigsaurem Ammoniak bestand. Der Rückstand enthielt kohlenstoffem und phosphorsaurem Kalk, neben Spuren von kohlenstoffem und schwefelsaurem Kali und Chloralkalium. 200 Gramme frische Substanz lieferten beim Austrocknen 13 Theile einer gummiartigen Masse, wie Bastoragummi; 1 Theil schleimige und färbende Materie, die durch Metallsalze niedergeschlagen wurde, und 1 Theil Salze: in 100 Theilen also nur  $1\frac{1}{2}$  Theile feste Substanz. Man bezeugt nun, wie beim Trocknen der Stoff nichts übrig bleiben kann, als eine leichte Membran, die übrigens meistens die Fähigkeit behält, durch Wasser wieder aufzuleben und zur dicken Gallerte aufzuschwellen. Dies erklärt zugleich, auf welche Weise es möglich ist, daß nach einem warmen Gewitterregen plötzlich so große Massen des Nostock's an Stellen gefunden werden, an welchen vorher keine Spur desselben zu sehen war.

Bunzellos, wie er ist, hielt man ihn deshalb bald für verarbeiteten aus der Luft, bald für hervorgequollen aus der Erde. Man kann den Ursprung und das Wesen dieser An-

sichten in den mit Absicht so dunkel wie möglich gehaltenen Schriften des Paracelsus (1493–1541), sowie seiner Ausleger und Zeitgenossen deutlich erkennen. Von Paracelsus scheint auch der Name Nostock (damals Nostoch geschrieben), dessen Ableitung unbekannt, herzufließen. Er nennt ihn ein Produkt der Luft. Wie die verschiedenen Arten Honig- und Mehl-Thau, die er mit den mystischen Namen Terenadiab, Tronus, Tronossa, Lorchia u. s. w.) bezeichnet, wie die verschiedenen Mannaforten (Melissa, Locusta u. s. w.), fällt der Nostock nicht bloß vom Himmel herab, sondern er entsteht auch in der Luft, wird von ihr ernährt, lebt darin wie ein Vogel und vereinigt deshalb in sich alle himmlischen und irdischen Eigenschaften. Und wie die Alchemisten die Luft als die Quintessenz aller Dinge betrachteten, so vermutheten sie auch ihre Kräfte in dem Nostock gleichsam vertheilt. Denn man hielt dafür, daß er, wie die Säden des Altenweiderformers, mit denen er in den Schriften jener Zeit einige Male verwechselt wird, aus verdichteten Dämpfen entstehen sei. Darauf bezieht sich der von Paracelsus öfter gebrauchte Name Himmelsblume (Coeliflos) für Nostock. Mit dem Beinamen Blume bezeichneten nämlich die Alchemisten diejenigen Substanzen, welche sie in pulverförmiger oder flockig kristallinischer Form aus ihren Dämpfen verdichtet hatten. Die noch heute gebrauchten Namen Schweißblüthe, Zink- und Benzoe-Blumen haben denselben Ursprung. Ähnlich dürfte auch die ebenfalls bereits von Paracelsus gebrauchte Benennung Himmelsblatt (Coelifolium und Caelefolium) zu verstehen sein, der wenig blattartige Gestalt wegen, welche die grünen Nostockmassen häufig annehmen. Alle diese Namen kann man genau erörtert finden in dem Lexicon, welches Roc le Bailly den Schriften des Paracelsus angehängt hat, sowie in den älteren chemischen und medicinischen Wörterbüchern von Johnson und Castelli.

Ein ander Mal nennt der niemals in seinen Ansichten gleiche oder klare Paracelsus den Nostock Flos Terrae, Erdblume, etwa in demselben Sinn, wie noch heute eine bekannte, auf der Gerberleibe erscheinende Schleimmasse als „Kobblume“ (französisch: Fleur de Tan) bezeichnet wird. Paracelsus theilte nämlich mit van Helmont den Glauben an gewisse, die erdige Substanz organisierende und in Thier- oder Pflanzensubstanz umwandelnde Erddämpfe, sogenannter Efflas. Trüffeln und andere Erdpilze, sagt Helmont, seien nichts, als mit Efflas durchdrungene und überindete Klumpen geballter Erde. Diesen lebenden Erddunst also dachte man sich ebenfalls im Nostock verdichtet, daher er in der oben angeführten Stelle als der Weltgeist und Urflüßlein gefaßt wird, der alle organischen Wesen hervorbringe. Deshalb nennt auch Paracelsus den Nostock eine in „reinen Leim“ umgewandelte Erde, ein „Gesicht der Erde“; was aus ihm hervorgehe, sei aber „Gabe des Heuers“. Wahrschein-

lich gehört auch hierher die Angabe des berühmten Baco von Verulam, daß aus geballtem, faulendem Schnee eine bitter-schmeckende Pflanze, Flomus genannt, entstehe.

Eine weit verbreitete, noch heute geglaubte Ansicht, daß der Nostoc die Substanz der Sternschnuppen sei, ist ebenfalls auf Paracelsus und seine Zeit zurückzuführen. Seine astronomischen Vorstellungen sind sehr hausbackener Art. In seinem Tractat über die Meteorologie denkt er sich die Nebensonne aus Messing gemacht und die Sterne als lebende Wesen, welche eine gewisse astralische Speise zu sich nehmen, verdauen und einige Ueberbleibsel wieder von sich geben. Seine vielerlei Arten Manna und Homigtheu, der Kuckuckspeichel, vor Allem aber der Nostoc sind ihm Speichel, Schneuze oder sonstige Purgatio der Sterne. Die fallenden Sterne (noch heute Sternschnuppen genannt) sind also das leuchtende Herunterfallen dieser Schleimmassen. Johnson spricht diese Auffassung sehr deutlich aus, indem er sagt: „Nostoc ist der Fall irgend eines Sternes oder vielmehr dessen auf die Erde herabgeworfene Purgation. Er wird 'am häufigsten im Juni, Juli und August auf weiten Feldern und Wiesen gefunden, gleichend einem großen Pilze oder Schwamm, lächerig, leicht, gelblich, eine zusammengeballte, durch Berührung zerdrückbare Masse.'“ — Er fügt hinzu, was auch Roc le Wallis erwähnt, daß

der Name Nostoc bei den Chemikern häufig nur metaphorisch Wachs bedeute, wie andererseits der Nostoc wegen seiner durchsichtig weichen Masse auch Wachsblatt (Cacrefolium) genannt wird.

Diejenigen, welche von Paracelsus lernten, haben seine verworrenen Ansichten noch mehr zusammengeworfen. Conrad Gesner, fast noch sein Zeitgenosse, spricht häufig, besonders in seinem Werke über die „Wasserflüß“, von einem „Luftleim“, der aus den Sternen herabfalle, wegen seiner Gistigkeit für das weidende Thier Luftreagat genannt; aber man kann meistens nicht unterscheiden, ob er Nostoc, Honigtheu oder eine Art Manna im Sinne habe. Wenn er dagegen sagt: „Ebenso schädlich soll jene Art Luftleim (so nenne ich ihn, weil ich einen andern Namen nicht weiß) sein, welcher als gelbliche, geronnen weiche Masse zuweilen an Mauern und Kräutern hängend gefunden wird. Die Landleute sagen, er werde von den die Luft durchkreuzenden Sternen erzeugt, und dem Graße, welches damit beschmutzt werde, könne selbst Regen nicht das empfangene Gift abspülen.“ — so kann man ziemlich deutlich den in Rede stehenden Herbstbau (Seirone nennt ihn Johnson) als einen jener sogenannten Schleimpilze erkennen, zu denen die oben erwähnte Lohblüthe gehört.

## Die zweite deutsche Nordfahrt.

Von Otto M.

Der deutschen Nation, die seit Jahrhunderten im Kampfe für die idealen Güter des Lebens ihre politische Machtstellung zu demahren und wiederzugewinnen mußte, selbst wenn sie durch staatliche Zerrissenheit und klapptlose Regierung verloren war, braucht wahrlich nicht erst der Beweis geführt zu werden, daß Anstrengungen und Opfer für solche ideale Güter und vor Allem für die Wissenschaft geeignet sind, ein Volk zu heben und zwar ebenso in seinem eignen Gefühl, wie in der Achtung der Welt, daß sie geeignet sind, erquickend und lebend auf die gesammte wirtschaftliche Arbeit eines Volkes zurückzuwirken. Dieser dem Deutschen angeborene Zug zum Idealen war es, der im vorigen Jahre eine deutsche Nordfahrt möglich machte. Die größten seefahrenden Nationen hatten Jahrhunderte hindurch ihre Kraft an der Erforschung des arktischen Polargebietes erschöpft, sie waren ermüdet von den vergeblichen Anstrengungen, und dies „Volk von Landratten“, wie man uns Deutsche in England nennt, unterlag sich, das abgebrochene schwierige Forschungswerk wieder aufzunehmen. Keine Regierung, keine Admiralität, nicht einmal eine große wissenschaftliche Körperschaft, sondern ein einzelner Gelehrter war es, von dem der kühne Gedanke ausging. Daß die Gelder zur Ausführung des Unternehmens nicht auf den ersten Ruf zusammen flossen, gereicht uns Deutschen

nicht zum besondern Vorwurf. In Frankreich sammelte man bereits seit länger als 3 Jahren die Mittel für eine Nordpolfahrt, und noch sind sie kaum zur Hälfte ausgebracht. Der Gedanke einer deutschen Nordfahrt war den Meisten zu neu, man mußte sich erst daran gewöhnen, mußte erst die ganze Bedeutung derselben erfassen, mußte erst warm werden für eine That, wie sie nur seit der nationalen Wiedergeburt des Vaterlandes möglich gedacht werden konnte. Daß aber Dr. Petermann es wagen durfte, noch vor Beschaffung der erforderlichen Mittel, nur im Vertrauen auf die Einsicht der deutschen Nation und auf ihre Begeisterung für Thaten, die dem Vaterlande zur Ehre und der Wissenschaft zum Nutzen gereichen, das Unternehmen in's Werk zu setzen, ein Schiff zu kaufen und auszurüsten, Führer und Mannschaften zu werben, das ist gewiß das beste Zeugniß für den deutschen Charakter.

Die erste deutsche Nordfahrt hat freilich ihre Aufgabe nicht zu lösen vermocht. Sie hat weder den Dreiecksigürtel durchbrochen, der das unbekannte arktische Gebiet umschlingt, noch den Verlauf der grönländischen Ostküste erforscht, noch irgend eine erhebliche geographische Entdeckung gemacht. Einerseits waren es die ungewöhnlichen Eiderhörschiffe des vorigen Jahres und die mehr als je sich der Schifffahrt in jenen Meeren entgegenstellenden Schwierigkeiten, welche den



Die innere Einrichtung ist aus der vorstehenden Skizze ersichtlich. Außer dem Maschinenraum und den Kohlenbunkern, die 30 Tons Kohle halten, außer Kajüte, Logis, Combüse, Waschküche und Badezimmer, Raum für Wasser, Interlecten und Kacheln, bleibt noch ein Laderaum von 3370 Kubikfuß übrig, von welchem 1920 Kubikfuß zur Unterbringung von 40 Tons Kohlen benutzt werden, die übrigen 1450 Kubikfuß für Proviant, Reservegut, Pelze, Decken, Zelte, Schlitten, Instrumente u. s. w. dienen sollen. Die Besatzung des Schiffes wird im Ganzen aus 17 Mann bestehen, nämlich dem Commandanten, 2 Steuerleuten, einem Maschinisten und einem Feiger, einem Koch, Zimmermann, Steward, 5 Matrosen und endlich 4 Gelehrten.

Als Physiker und Astronom sind bereits die Herren Börgen und Copeland von der Königl. Sternwarte in Göttingen zur Mitfahrt bereit; für Zoologie und Geistesforschung ist der berühmte Hochberg'scher Oberleutnant Payer in Wien, gewonnen, und in Betreff eines Arztes, der zugleich Zoologie und Botanik vertreten soll, finden bereits Unterhandlungen statt.

Proviant wird für 1½ Jahre mitgenommen. Da möglichst auf solche Nahrungsmittel Rücksicht genommen wird, die bei wenig Umfang einen bedeutenden Nahrungsgehalt besitzen, so dürfte der dafür vorhandene Raum von 1260 Kubikfuß vollkommen ausreichen sein. Das Material zur Erbauung eines Winterhauses kann theils an Deck, theils zwischen den Deckbalken verlastet werden.

Die für die wissenschaftlichen Forschungen nothwendigen Instrumente werden mit der größten Sorgfalt ausgewählt, und es befinden sich darunter außer Barometern, Thermometern, Neolometern und Chronometern auch ein Reichenstein'sches Universalinstrument, ein Basismaßapparat und ein kleines Passageninstrument. An Pelzen, Decken, Zelten, Schlitten wird mitgenommen, was nur irgend die früheren Erfahrungen als ratsam erscheinen lassen; ebenso wird für Waffen und Munition genügend gesorgt, und namentlich werden die schon von der vorjährigen Expedition benutzten Jüdnabelgewehre mitgenommen. Drei Boote, ein größeres und zwei kleinere, alle stark gebaut und vorn mit Eisenblech beschlagen, vollenden die Ausrüstung des Expeditionsdampfers.

Die Yacht „Grönland“, welche hauptsächlich als Transportschiff für Kohlen dienen soll, hat eine Länge von 36 F. 2 Z., eine Breite von 18 F. 8 Z. und eine Tiefe von 9 F. 9 Z. Sie erhält nur eine Besatzung von 3 Mann, nämlich Kapitän, Steuermann, Koch, Zimmermann und 4 Matrosen, vielleicht auch noch einen wissenschaftlichen Begleiter. Sie nimmt auch nur Proviant für 6 Monate und die nothwendigsten Instrumente mit und hat überhaupt nach ausgeführter Landung ihrer Kohlenladung nur die Aufgabe, die bis dahin erzielte wissenschaftliche Ausbeute der Expedition nach Bremen zurückzubringen und nur im Falle besonders günstiger Umstände selbständig weitere wissenschaftliche Forschungen auszuführen. Die 70 Tons Koh-

len, welche die „Grönland“ führt, werden mit den auf dem Hauptschiff untergebracht den letzteren für 800 Stunden eine Fahrt mit voller Dampfkraft gestatten. Dies erscheint völlig hinreichend, da die Zeit für Forschungen und Entdeckungen überhaupt nur eine kurze ist, etwa 2 Monate währt, und das Schiff voraussichtlich auch nur die Hälfte dieser Zeit, nämlich im Eise, bei Windstille oder widrigen Winden, zu dampfen hat. Uebrigens ist in dem Localcomité in Bremen der Wunsch laut geworden, daß die Expedition noch auf ein drittes Jahr, also eine zweite Ueberwinterung ausgedehnt werden möchte. Für diesen Fall würde freilich statt der „Grönland“ ein größeres Transportschiff erworben werden müssen, womit dann auch wieder eine Vermehrung der Kosten des Unternehmens verbunden sein würde. Das Letztere scheint in Bremen kein großes Bedenken zu erregen, da man sich wirklich bereits mit der Auffuchung eines solchen Schiffes beschäftigt.

Die Expedition soll nun womöglich in der ersten Woche des Juni ihre Fahrt antreten und ihren Lauf direct auf die Insel Jan Mayen richten, von dort aber längs der Rante des Eises hinfahren und zwischen 74° und 76° n. Br. eine Oeffnung zur grönländischen Küste suchen. Erreicht sie die Küste und findet sie dort längs des Landes schiffbares Wasser, so soll dies benutzt und das zu erreichende Kohlendepot so weit als möglich nach Norden hinausgeschoben werden. Während dann die „Grönland“ umkehrt, setzt die „Germania“ ihre Forschungen längs der Küste fort, so lange die Jahreszeit und die Eisverhältnisse es gestatten. Wo die Ueberwinterung stattfinden soll, wird von den Umständen abhängen. Gelängt es nicht, die Küste bis zur Mitte des August zu erreichen, so soll Grönland für dieses Jahr gänzlich aufgegeben und dafür der Versuch gemacht werden, weiter östlich bis gegen Nowaja-Semlja hin bessere Erfolge zu erzielen.

Kann auch das volle Gelingen dieses Unternehmens bei der Wandelbarkeit der Eisverhältnisse im Norden nicht mit Sicherheit verbürgt werden, so ist doch eine bedeutende wissenschaftliche Ausbeute unter allen Umständen zu erwarten. Noch aber bedarf es des opferwilligen Handelns der deutschen Nation. Noch ist von den Kosten des Unternehmens, die auf 50,000 Thlr. veranschlagt werden, mehr als die Hälfte aufzubringen. Aber schon manchmal sind größere Summen für kleinere Zwecke vom deutschen Volke aufgebracht worden. Hier aber gilt es die Unterstützung einer nationalen That, die jedes deutsche Herz erwärmen muß, die der neu gewonnenen Wachtstellung des Vaterlandes ebenso wie dem alten deutschen Sinne für Wissenschaft und geistige Forschung gleicht. Hier reiche der Eifer dem Norden die Hand, hier steure der Hohn der Niedrigkeit! Es ist eine Steuer zur Ehre des deutschen Namens, die er leistet! \*)

\*) Die Redaction der „Natur“ ist gern bereit, Beiträge für die zweite deutsche Nordfahrt entgegenzunehmen und zu vermitteln.

## Der Elton-See in Rußland.

Von C. Schmetling.

Das russische Reich ist, wie dies schon sein bedeutender Umfang ohne weiteren Beweis ergibt, ein an Hülf-

quellen und Mitteln zur Erhaltung einer bedeutenden Bevölkerung fast unerschöpfliches, namentlich sich selbst ergän-

gendes Ländergebiet. Dieser Umstand ward jedenfalls früh von Peter I. erkannt und dahin gerichtet, daß er auf denselben die völlige Unabhängigkeit des Landes von andern Staaten und Völkern gründete, insofern sie demselben nicht durch Ausfuhrhandel Gewinn gewürdet, und daß er in seinem Testament einen Erbsatz ausstellte, der nichts Geringeres sagen will, als daß sich die von ihm reformirte Staat unter Umständen mit der ganzen Welt messen könne.

Peter I. hat sich, wie dies auch großen Männern ergoßen kann, in gewisser Hinsicht aufgeführt; er lebte zu sehr für die Gegenwart, um die Zukunft und ihre Möglichkeiten gehörig in's Auge zu fassen; er verkannte auch den Grad der Intelligenz des slavischen Menschengeschlechtes und verzweifelte sich durch seine Feindschaftstellung auch noch in dem Mittel, ein Ziel zu erreichen, welches unter solchen Umständen sogar dem anerkannt strebsamsten Volkstamme der Germanen unerreicht hätte bleiben müssen.

Peter I. that indeß nach Maßgabe seiner Auffassung der Sache, was er thun konnte, seinen Zweck zu erreichen, und versuchte namentlich die Produkte der einzelnen Provinzen zum Allgemeingebrauch der Bewohner des Landes kommen zu lassen, als erstes Fundament zur weiteren Befolgung seiner Bestrebungen. Die noch heute bestehenden Einrichtungen des schnellen Postwesens zur Personbeförderung, die Anlage von Hauptstrassen, welche in allen Richtungen durch das Land führten, namentlich aber die Wasserverbindungen zwischen dem schwarzen und dem kaspischen Meer und der Asie, welche er sich so sehr angelegen sein ließ, sind sein Werk, und viel war durch sie bereits gewonnen.

Von seinen Nachfolgern ging indeß nur Katharina II. ganz in seine Fährten ein, innigere Verbindungen der Landestheile zu schaffen und, wie Peter I., Kolonien dort anzulegen, wo es zweckmäßig erschien und noch unkultivirtes Land Ausbeute versprach. Außer Katharina II. wendete noch Kaiser Nikolaus seine Aufmerksamkeit diesem Gegenstande zu, so weit ihn nämlich seine andere, vielseitige Thätigkeit dazu kommen ließ.

Die Hindernisse, welche sich den Absichten Peter's I. entgegenstellten, sind mannigfaltig und verschiedener Natur. Vor allen Dingen lagen sie in der Fesseln und noch bis heute unzureichender Bevölkerung des Landes, sodann im Nationalcharakter des Russen oder der russischen Stämme, in dem Fehlen eines freien Bauernstandes und eines bürgerlichen Elements, welches sich nicht ausschließlich dem Handel widmete, in dem durch Peter I. selbst hervorgerufenen Miseregeheimnissen und endlich in der ebenfalls zum Theil durch ihn angewiesenen Bahn, auf welcher sich die äußere wie innere Politik Rußlands fortbewegte, von denen die erstere fast immerwährende Keige bedingte.

Es kommt es denn, daß ein großer Theil des russischen Reichthums an Naturprodukten nicht ausgebeutet und derselbe sogar da, wo er zu Tage gefördert wird, wegen mangelnder Verkehrsstrassen nicht verwerthet werden kann. Aus diesen Gründen mußte Rußland dem Auslande für Erzeugnisse tributpflichtig bleiben, die es bei weitem mehr als andere Länder besitzt, und zu diesen gehört besonders das Salz.

Es gibt kein anderes Land, welches denselben Salzreichtum wie Rußland aufzuweisen hätte; ja das ganze

übrige Europa hat vielleicht nicht so viel Salzgehalt wie das russische Reich, gewiß wenigstens nicht so viel vollkommen von der Natur fertig gelieferter, gleich brauchbares Salz. Demungeachtet macht die mangelhafte Kommunikation zunächst noch Salzfabriken nöthig, von denen die Permischen die bedeutendsten sind und jährlich gegen 6 Mill. Pud (à 40 Pfd.) liefern. Ausser diesen sind noch vorhanden: die Siebischen von Starajarussa an der Komat, die Wologa'dischen, die Sibirischen, die Archangel'schen, Nischnje gorod'schen, Kostroma'schen, Gerasim'schen und Sologal'schen. Diese Siebischen, welche, wie die Perm'schen, theils der Krone, theils Privatleuten gehören, stellen 1,590,000 Pud jährlich her, deren Zubereitung natürlich viel Arbeitskraft und Kapital erfordert, sich aber immer noch billiger herausstellt, als das ohne Mühe gewonnene fertige Salz durch die Transportskosten. Das ganze Uralgebiet hat Steinsalzlager von unberechenbarer Mächtigkeit; sie können jedoch nicht ausgebeutet werden, weil durch den Transport das Pud, welches nach dem Bruche 25 Kopeken Herstellungs-kosten erfordert, am nächsten Vertriebsorte bereits auf 52 Kopeken zu stehen kommt, Perm'sches Siebsalz jedoch überall schon zu 44 Kopeken verkauft wird. Der größte Salzreichtum Rußlands befindet sich jedoch in seinen südlichen Steppen, in den Keim'schen Salzseen und in den Astrachanischen Steppen zwischen Don und Ural, welche durchweg salzhaltig und voll stets neu produzierender Salzseen sind. Um einen Begriff dieses Reichthums zu geben, möge hier nur einer der Seen, dessen Salz gebrochen wird, näher beschrieben werden. —

Der Eiten-See nämlich liegt ungefähr 49° n. Br. und 64° ö. L. von Jertso in der Astrachanischen Steppe jenseits der Wolga und 102 Werst von Dubrowka, nach welchem Orte und den Städten Kamyschin und Zarinsk die Abfuhr des aus ihm entnommenen Salzes stattfindet, um von ihnen aus auf der Wolga verschifft zu werden. Der See befindet sich in einer vollständig ebenen Steppe, welche 6 Tscheten tiefer als der Wasserspiegel der Wolga und 9 Tscheten höher als derjenige des kaspischen Meeres liegt. Der Weg von Dubrowka zu dem See führt, 7 Werst von jener Stadt entfernt, durch das Dorf Maschinka; später finden sich noch einzelne Viehhöfe, dann aber wird die Steppe öde und verlassen, und nur Brunnen sind am Wege gegraben, an welchen die Salzfuhrleute ihr Vieh tränken.

Bis zum Anfange des 18. Jahrhunderts war der Eiten-See im ausschließlichen Besitze der hier zu jener Zeit nomadischen Kalmücken, welche ihn den „goldenen See“ nannten. Russen, welche mit diesem Handel trieben, es hielten die Erlaubnis, ihm ebenfalls Salz zu entnehmen. Seit dem J. 1705 begannen die Städte Saratow und Kamyschin ihren Bedarf dort zu holen, verkauften auch wohl weiter, was Streitigkeiten mit den Kalmücken und Uebervälle derselben von Folge hatte und die Regierung demog, den See in Besitz zu nehmen, sowie ein Commando Soldaten bei denselben zu stationiren. Seit dem J. 1780 wurden die Nomaden aus der Gegend verwiesen und die Ausbeute des See's für die Krone begonnen.

Der Eiten-See hat eine ovale Gestalt; seine verschiedenen Durchmesser betragen 20 und 16 Werst und sein Umfang 47. Das Ufer hat eine Höhe von 3 bis 7 Tscheten; doch ist bis zum Rande des Wassers noch ein schlammiges Vordland vorhanden, welches mit rothfarbten Salzpfannen

bedeckt ist. Noch schimmert auch die Wasseroberfläche des See's, wenn die Strahlen der Abendsonne auf denselben ruhen. An seinem nördlichen Rande wächst Schilf, in dem sich viel Enten aufhalten. Eine Menge kleiner Flüsse, alle mit salzigem oder bitterem Wasser, ergießen sich von allen Seiten in den See.

Zur Bewachung desselben befinden sich im Sommer ein Trupp Kosaken, eine halbe Compagnie Artillerie und ein Detachement Invaliden in den neben dem See errichteten Kasernen. Im Winter bleibt nur einer der Verwalterbeamten und das Militär dort, während die übrigen Beamten im Herbst davon gehen. Die baulichen Anlagen bestehen in einer Kirche, zwei Häusern für die Beamten, einem Prediger- und einem Krankenhaufe und vier Kasernen, von denen eine für die im Sommer anwesenden Arbeiter bestimmt ist. Alle Gebäude, sowie auch noch sechs Speicher und ein Zeughaus, sind von Holz mit Ausnahme des Kassenlokals, welches massiv gebaut ist.

Zum Zweck der Arbeit und Gewinnung des Salzes sind Brücken über das schlammige Vordland in den See gebaut. Die Arbeiter bekommen einen Antheil des gewonnenen Salzes, der ihnen jedoch von der Krone vergütet wird, und man berechnet, daß 125 Männer genügen, im Laufe des Sommers eine Million Pud Salz zu brechen und an's Ufer zu bringen. Man bedient sich zur Arbeit wie zum Transport der Boote. Die Mächtigkeit des auf dem Boden des See's lagernden Salzes ist um so weniger berechenbar, als man nur an einer Seite bricht und der Grund in der Mitte des See's noch gar nicht untersucht ist. Ein Versuch, den man zwei Werk vom Ufer bei zwei Tausen Wassertiefe anstellte, ergab, daß man durch hundert verschiedene Ablagerungen, welche eine Stärke von 1 bis 5 Wertschock hatten, drach. Hierauf folgte jedoch eine Schicht, die so fest war, daß die Werkzeuge, deren man sich bediente, zerbrachen, und die Arbeit aufgegeben werden mußte. Das Salz selbst ward übrigens, je weiter man kam, desto klarer und besser. Die ganze Tiefe der durchbrochenen Salzlage betrug gegen 12 Fuß. Rechnet man nun den Grund zu 180 □ Werst oder einigen 20 □ Meilen, so gibt dies schon ein Lager von ungeheuren Dimensionen, dessen Quantum alljährlich um 1 bis 1½ Wertschock steigt. Berücksichtigt man nun, daß im den Elton-See noch kleinere See'n liegen, die auf ähnliche Weise Salz bilden, daß ferner nicht weit von ihm der größere Salzsee Kaschatski, dessen Salz, obgleich besser als das des Elton-See's, gar nicht benutzt wird, sich befindet, und daß auf der ganzen Fläche, vom den die zum Balchash-See in Sibirien und dem Kaspischen, dem kaspischen Meer und Ural-See bis zu den Anfängen des Ural-gebirges, alle Steppen eine Anzahl solcher See'n und Salzflüsse enthalten, so ist dagegen die Ausbeute des Elton-See's nicht allein gar nicht in Anschlag zu bringen, sondern auch der ganze Salzverbrauch Russlands, so bedeutend er ist, kaum in Betracht zu ziehen.

Das Quantum Salz, welches gegenwärtig alljährlich dem Elton-See entnommen wird, beträgt 13 Millionen

Pud, die vom See aus mittelst Achsenfuhrwerken nach Saratow und Kamschkin transportirt werden, wodurch die Auslagen zur Gewinnung des Salzes in erstem Orte sich auf 30 1/2, in letzterem auf 23 1/2 Kopeken stellen. Die Vergrößerung verkauft das Pud Elton-Salz in den Niederlagen der gedachten Orte und in Nikolajewskaja mit 1/4 Silber-Rubel. Der weitere Transport erhöht jedoch diesen Preis der Art, daß Elton-Salz später zu 48 Kopeken das Pud verkauft wird, also immer noch um 4 Kopeken theurer als das Perm'sche Siebelsalz. Der Transport aller Salze aus dem Süden und Osten nach den nördlichen und westlichen Provinzen Russlands würde dasselbe noch um das Doppelte steigern, und somit ist für Russland genöthigt, für Finnland und die Kaiserprovinzen Salz vom Auslande zu entnehmen und zwar von England gegen 4 Mill. Pud, von Preußen und Oesterreich zusammen gegen 830,000 Pud, also den siebenten Theil seines Verbrauchs, da derselbe auf ungefähr 35 Mill. Pud veranschlagt wird, wofür immerhin zwischen 5 bis 6 Mill. Thlr. in das Ausland gehen.

Es ist hier absichtlich nur einer der gewöhnlichsten und billigsten Verbrauchsgegenstände gemäht worden, um den Nachtheil des Mangels gehöriger Verkehrsstraßen für ein so großes Land wie Russland zu zeigen. Erzeugnisse der Industrie, von diesem Standpunkte betrachtet, geben noch ein ganz anderes Resultat, und es wird im Ganzen die Ausfuhr Russlands gegen die Einfuhr kaum einen Ueberschuß gewähren. Die Erhöhung der Dampfschiffahrt auf allen Wasserstraßen im Innern des Landes, Anlage von Kanälen zur weiteren sich kreuzenden Verbindung der großen Flüsse und endlich ein Eisenbahnnetz über das ganze Land könnten allein dies wiederum ändern. Doch diese Dinge zu schaffen, wäre wiederum ein Genie und ein Wille wie derjenige Peter's I. nöthig, und fraglich bliebe es noch immer, ob derselbe heute ausreichend wäre.

Die freie Thätigkeit und Speculationslust hat in Amerika durch Savannen, Wälder und Wälder Bahnen gebrochen, doch die ungewisse Beschaffung von Kapital und Arbeitskraft würde wohl nicht leicht die Resultate freier Bewegung und Concurrenz erreichen, um so weniger, als in Russland nirgends Ueberfluß an Menschenhänden ist, welche durch lohnendere Arbeit auf einem andern Punkt als dem Orte, welchem sie angehören, in Thätigkeit versetzt werden könnten. Den Zug von außerhalb haben aber die Russen seit längerer Zeit durch unangemessene Behandlung der Einwanderer selbst gehemmt, und so ist die Größe des Ländergebietes ein Hemmschuh für den Aufschwung des Reiches, dessen bestbevölkerte Provinzen mit ihren schwinbar steigenden Kulturbedürfnissen eigentlich nur Auswüchshilder sind, ohne einen richtigen Maßstab für das Ganze zu liefern. Der Mangel neuer, schneller Verkehrsmittel in entsprechender Zahl und Länge für das Land wird Russland wiederum auf lange hinter dem reisenden fortschreitenden übrigen Europa zurückbleiben lassen, wodurch das Ziel, welches Peter I. seiner Schöpfung stellte, auf's Neue in weite Ferne gerückt ist.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

N 19.

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, C. Schwetschke'scher Verlag.

12. Mai 1869.

**Inhalt:** Das deutsche Salzland, von Karl Müller. 1. Allgemeine Charakteristik des Salzlandes. — Ein Ulkenpiegel im Pflanzenreiche. Eine Biographie aus alten Quellen, von Ernst Krause. Zweiter Artikel. — Kleinere Mittheilungen. — Literaturbericht. — Einladung, gerichtet an die Feder der Mathematiker etc.

## Das deutsche Salzland.

Von Karl Müller.

### 1. Allgemeine Charakteristik des Salzlandes.

Keine Bodenart wirkt so verändernd auf den Ausdruck der Pflanzendecke ein, wie der Salzboden. Wo Kochsalz mit den begleitenden Stoffen zur Oberfläche der Erde dringt, da verschleucht es mehr oder weniger, je nach seinen Mengenverhältnissen, die alte Flor, und fremdartig tritt eine neue auf, die im Allgemeinen einen vollkommen abweichenden Charakter trägt. Es bleibt sich gleich, ob wir das an der Meeresküste, auf Inseln oder im Binnenlande beobachten; überall sondert sich die Salzflor als eine eigenthümliche von der ferneren Umgebung ab, unbeschränkt herrschend, soweit der Natriumgehalt des Bodens intensiver reicht.

Dieser Charakter spricht sich deutlich schon in der Färbung aus. Ein bleiches Grün oder ein graues Colorit

lagert über dem Ganzen; manche Salzpflanzen (Halophyten) erscheinen wie von Mehl bestäubt, andere bereift. Lebhaftere Farben besitzen selbst die Arten nicht, welche doch eine prächtige Blume hervorbringen, wie der Strandaster (*Aster Tripolium*); fast alle Farbentöne sind unbestimmte, und nur selten erhebt sich eine Art zu einem lebhaften Colorit, wie z. B. das Milchkraut (*Glaux maritima*). Selbst manche Gräser, welche doch im Ganzen davon unberührt bleiben, verfallen diesen grauen Tönen, z. B. *Glyceria distans*. Es gibt nichts Traurigeres im deutschen Binnenlande, als eine ganze Wiese dieses Graues, dessen Fahlgrau einen wahrhaft eintönigen, melancholischen Eindruck auf das Gemüth hervorbringt. Nur wenige Arten machen hiervon eine Ausnahme; z. B. *Euphorbia Paralias*, die an



den Küsten des adriatischen Meeres häufig das Ufer mit einem lebhaften grünen Gürtel bekleidet. Sonst macht auch der Süden keine Ausnahme; die weiten Salzsteppen Spaniens erscheinen in keinem andern Gewande.

Diese bleiche Färbung ist um so auffällender, als die Salzpflanzen eine große Neigung zum Zitterbewen bisseigleisige Stengel- und Blattotheile entwickelt z. B. der Bieschmalz (*Salicornia herbacea*) in einer Weise, daß die Pflanze lebhaft an manche Cacteen-Formen (*Rhipsalis*) erinnert. Selbst das Wildkraut zeigt diese Neigung; vor allen andern Pflanzen aber ist sie eigen: den Köstlichkeitskräutern (*Cochlearia*) und andern Cruciferen (*Cakile maritima*, *Capsella procumbens*, *Crambe maritima*), den meisten Aiskneen (besonders *Halianthus pepioides*), den Plumbaginaceen (*Statice*), Plantagineen (besonders *Plantago maritima*), den Chenopodiaceen (*Salsola*, *Salicornia*, *Obione*, *Atriplex*) und den Juncagineen (*Triglochin maritima*). Selbst viele andere Pflanzen, welche durchaus nicht dem Salzboden angehören, verfallen dieser Neigung auf solchem Boden und erhalten fleischigere Blätter als andernorts: *Sagina procumbens* p. *maritima* Fr., *Mollis* dentata, *Tetragonolobus siliculosus* p. *maritimus*, *Linaria vulgaris*, *Senecio vulgaris* p. *squalidus*, *Chrysanthemum inodorum* p. *maritimum*, *Plantago major* p. *scopolorum* Fr., *Polygonum aviculare* p. *illorale*, *Atriplex latifolium*, *Viola tricolor* p. *syrtica* u. A.

Uebrigens wirkt der Salzboden oft sehr verändernd auf nicht salzliebende Pflanzen ein. Indem er namentlich eine stärkere Behaarung erzeugt, verstärkt er nur das sachte Grün seiner Pflanzendecke. Arten, welche diese Veränderung erleiden, sind z. B.: *Ranunculus polyanthemos*, *Anthyllus Vulneraria*, *Trifolium pratense*, *Taraxacum officinale*, *Sonchus oleraceus*, welche drüsig behaarte Blumenstiele erhält, *Artemisia campestris*, *Galeopsis Tetrahit*, *Euphrasia officinalis*, *Atriplex latifolium* u. f. w. Selbst Gräser zeigen diese Einwirkung, so daß manche (z. B. *Festuca rubra*, *ovina*, *Lolium perenne* u. A.) in ihrer behaarten Form von der Stammform gänzlich abweichen.

Ebenso merkwürdig begünstigt der Salzboden das Wachsthum einiger Arten außerordentlich (*Chondrilla juncea*, *Asparagus officinalis*), während andere Arten mehr oder weniger auffallend verkümmern, d. h. eine geringere Verzästelung erzeugen: *Centunculus minimus*, *Erythraea puchella*, *Polygonum aviculare*, *Bupleurum tenuissimum*, *Capsella bursa pastoris*, *Jasione montana*, *Sonchus arvensis*, *Centaurea Jacea* u. f. w. Einige Arten erhalten schmälere Blätter (*Veronica longifolia*, *Taraxacum officinale* u. A.); andere (*Hippuris vulgaris*) entwickeln eine geringere Anzahl von Blättern (meist nur 4), als auf normalem Boden; eine Verringerung der Organe, welche selbst auf die Blumentheile übergehen kann, wie *Cerastium semindecandrum* bezeugt, das von 5 Blumenblättern und

5 Staubbeutel auf 4 herabsinkt. Das ist um so sonderbarer, als doch wieder andere Pflanzen (z. B. *Ranunculus polyanthemos*) größere Blumen, wenn auch bei ununterbrochenem Wuchs, hervorzubringen vermögen.

Jedenfalls hat man alle diese Eigenthümlichkeiten des Salzbodens von der geringeren oder größeren Verwandtschaft der betreffenden Pflanzen zu der Bodenabrtung bezugleitet. Leider kennen wir noch nicht die näheren Umstände, unter denen diese Veränderungen vor sich gehen; wir können z. B. noch nicht sagen, ob das Fleischigwerden so vieler Pflanzenarten auf Salzboden von dessen Natrongehalte oder von seinen anderweitigen Stoffen herrührt. Nach Beobachtungen von Dr. Dicie (Chem. Ges. Jan. 1843) enthält die Grasnelle des Meeresstrandes (*Statice Armeria*) Jod und größere Mengen von Natron, während sie im Binnenlande das Natron vorherrschend durch Kall ersetzt. Solche und ähnliche Beobachtungen sind Alles, was wir bis jetzt von dem Einflusse des Salzbodens auf die Pflanzen kennen. Wahrscheinlich gehört auch eine individuelle oder eine artliche Anlage dazu, wenn jene Veränderung überhaupt stattfinden soll; denn es gibt eine Menge Pflanzenarten, welche den Salzboden ohne jegliche Veränderung ertragen, und jede Salzgegend hat ihre eigenthümlichen indifferenten Pflanzen. Diesem Umstande verdanken wir es wesentlich, daß unser Vaterland nicht die ausgedehnten Salzsteppen kennt, wie wir sie in Spanien, in Rußland u. f. w. kennen. Freilich haben wir auch nicht jenen concentrirten Salzboden aufzuweisen, den diese Länder besitzen; hätten wir ihn, so würden selbst jene indifferenten Pflanzen zu höchst empfindlichen gegen das Salz werden. Die Anklänge an den Salzsee sehen wir auch bei uns. Genau so, wie in den östlichen und andern Steppenländern Wermuthkräuter den Boden überleben, das bildend, was auf dem Sandboden das Heidekraut vollzieht, ebenso treten auf manchen unserer Salzweiden ähnliche Arten auf und gestalten, wo sie mit ihren hölzernen Wurzelscheiden den Boden vorzugsweise einnehmen, die Weide mindeßens zur Salzweide um. Bei Arten z. B. (in der Goldenen Aue oder dem Heime-Unkrautthale) zog sich eine solche Leiste ehemals von der Stadt Artern bis nach dem Dörfchen Kahlstedt in ununterbrochener Folge. Wer sie vor ihrer Urbarmachung sah, bemerkte überrascht eine große Aehnlichkeit mit einer Heideleiste; der Boden war trocken und brachte nur eine kargliche Grasdecke hervor, während zahlreiche Hügelchen von drei verschleierten Wermutharten (*Artemisia maritima*, besonders aber *A. rupestris* und *laciata*) in Besitz genommen waren, und höchstens niederliegende Salzkräuter (*Capsella procumbens*) den mageren Grassteppich durchstochten. Die Erinnerung an das Heidekraut trägt noch ihre besondere Bedeutung in sich; denn wie dasselbe auch auf den Moorboden als Bewohner übergehen kann, ebenso bewohnen die beiden zuletzt genannten Zwerg-Wermuthsträucher in der Umgegend von Staßfurt am östlichen Hange das Moor von Rathmannsdorf. Drnt

man sich nun den Boden mit einer größeren Menge von Salz durchdrungen, als es am Ärenen der Fall war, so würde die Salzkruste eine vollkommene gewesen sein; das Salz würde die Grasbede hinweggebeist, nur Salzkräuter würden den flachen Boden, Wermuthkräuter als Halbkrauter die ehemaligen Kaulwurfsbügel eingenommen haben.

In Wahrheit kann man das concentrirte Salzland wohl eine Zeige nennen. Wie eine Insel erhebt es sich im Binnenlande mitten aus seiner Umgebung, eine fremdbartige Welt. Ist der Boden beständig feucht erhalten, dann schließt diese Insel fast Alles aus, was nicht auf Salz zu leben vermag; nur Salzpflanzen überziehen den Boden, gänzlich in sich abgeschlossen. Die meisten Arten bilden Colonien, die wiederum andere Arten ausschließen; gefällig allein unter sich, vermögen sie den Boden nicht zu decken, weil jedes Individuum für sich wieder exclusiv ist. Nach und nach bildet der Boden durch den Pflanzenteppich hindurch, und dieser erscheint wie eine Sammet- oder Plüschbede, deren Sammet und Plüsch an vielen Stellen abgerieben ist, so daß das Aufzugsgewebe, der Grund und Boden der Decke durchscheint. Um so häßlicher wird dieser Anblick, wenn der Boden trocknet und nun das Salz auf der Oberfläche des Bodens als schmutzig-weiße Kruste efflorescirt; noch häßlicher, weil in der Regel solche Stellen einen künftigen Thonboden verrathen, einen Boden, den man an der Nordsee unter dem Namen Kiepboden (engl. clay = Thon, Lehm) kennt. Wenn die Sonne des Sommers Boden lang ihre Strahlen auf ihn senket, dann trocknet dieser Boden nicht allein ein, sondern er zertheilt sich klaffend in ein Netz von Feilerchen, einem Schlammoraste gleich, der ausgetrocknet wie eine Wüste erscheint. Das sind gewöhnlich die Stellen, wo die Salicornie zuerst sich ansiedelt, unfähig, eine zusammenhängende Pflanzenbede zu bilden. Wie sich dennoch eine solche durch Hinzutreten neuer Arten erzeugt, habe ich schon früher ausführlicher bei der Schilderung des deutschen Graslandes (vgl. Bildung der Salzweiden, Jahrg. 1867) dargehan.

Man kann diese Region des Salzlandes recht wohl seine Marsch nennen. Sie findet sich nicht allein an den Küsten unserer Meere, sondern der Nordsee, sondern auch im Binnenlande, und ist auch hier auf dieselbe Weise hervorgebracht, wie am Meeresstrande, nämlich durch die Niederschläge überfluthenden, von Schlammtheilen gesättigten Wassers. Solche Regionen suchen viele Pflanzen vorzugsweise auf: manche Cruciferen (*Cochlearia*), sämmtliche Asteineen des Salzlandes, manche Compositen (*Aster Tripolium*, *Isula crithmoides*, *Sochus maritimus*, *Trigopogon floccosus*, *Crepis bulbosa*), Gentianen, *Erythraea*-Arten, Primulaceen (*Glaux*, *Samolus*), alle Plumbaginaceen (*Statice*), alle Plantagininen (*Plantago*), einige Chenopodiaceen (*Sarcocornia herbacea*, *Beta maritima*, *Obione*, *Atriplex*), die Polygonaceen (*Rumex maritimus*, *Polygonum*

*maritimum*), die Juncaginaceen (*Triglochin maritima* und *palustris*), einige Juncaceen (*Juncus maritimus*, *Gerardi*, *acutus*, *paniculatus*), alle salzbewohnenden Cyperaceen (*Cyperus*, *Schoenus*, *Scirpus*, *Carex*, *Blysmus*), einige Gräser (*Spartina*, *Poa*, *Glyceria*) und wenige andere. Das gilt sowohl für das Binnenland, wie für die nördlichen Küsten und das adriatische Meer. Alle diese Pflanzen sind geeignet, einen dauernd von Salzwasser getränkten Boden zu vertragen. Es gibt aber auch andere, welche nur einen zeitweilig inunndirten lieben, welche einen trockeneren Boden dem Schlamme vorgeben. Sie deuten eine zweite Region des Salzlandes an, die sich von der Salzmarisch nur durch eine bündigere Ackerkrume unterscheidet. Zum Theil barren auch noch die vorigen in ihr aus; einige andere Arten kommen neu hinzu: besonders Cruciferen, Papilionaceen, Umbellifereen, Labiaten, einige Chenopodiaceen (*Schoberia*, *Kochia hirsuta*), Euphorbiaceen (*Euphorbia Peplis*, *Paraliss*) u. A. Diese Region kann, je nach der geognostischen Beschaffenheit der Umgegend, eine geognostisch sehr verschiedene sein; im Charakter bleibt sie sich überall gleich und nähert sich in demselben am meisten der Flor der Schutthaufen, weshalb sie am besten als Ruderalregion des Salzlandes bezeichnet wird. Wo nur noch eine Spur von Kochsalz den Boden durchbringt, da erscheint auch als eine der gewöhnlichsten Formen dieser Region die salzgraue *Glyceria distans*, und es ist bezeichnend genug, daß diese sich auch an die Schutt- und Misthaufen der Umgegend verliert, weil hier ebenfalls eine Menge von Kochsalz vorhanden ist, das mit dem Harne von Thieren und Menschen in den Boden gelangt. Uebrigens ist es höchst wahrscheinlich, daß selbst das Ammoniak in diesen Bodenarten eine ebenso große Rolle spielt, wie es an den Schutt- und Misthaufen geschieht. Ein reiches Thierleben aus den niedersten Klassen, das hier sein Leben vollbringt, spendet es. In beide Regionen kann sich eine dritte Region anknüpfen, die aber auch selbständig im Binnenlande erscheint: die Region des Salzmoors. Diese ist stets die ärmste an Salzpflanzen, weil diese die Humussäuren nur wenig vertragen. Ich habe schon oben in den beiden Wermuthkräutern ein Paar charakteristische Pflanzen dieser Art genannt; aber auch der Sellerie (*Apium graveolens*) gehört hierher, *Samolus Vallerandi*, *Triglochin*, *Aster Tripolium*, *Carex extensa*, und manche andere Art des Schlammorastes. Selbstverständlich können diese drei verschiedenen, aber unter sich verwandten Regionen auch vielfach in einander übergehen. Das geschieht besonders auf salzigen Wiesen, die, der Ueberschwemmung häufig ausgesetzt, mit der Zeit einen Moorboden entwickeln. In der Nähe des Meeres zeugen hiervon die Lagunenmoore, deren Schilderung ich ebenfalls schon früher (vgl. das deutsche Bruch- und Moorland, 5. Kap. Jahrg. 1868) versuchte. Wo jedoch eine dieser Regionen bleibender Morast oder Sumpf wird, da geht eine so ununterbrochene Zersetzung der mit dem Kochsalz verbundenen

schwefelsauren Salze (Gips) von Salzen, daß sich in dem Boden eine ungläubliche Menge von Schwefelwasserstoff entwickelt. Ein gauchemartiger, überfließender, bläulicher Schlamm, ein milchig getrübbtes Wasser ist das Produkt dieses Vorganges, den man mehr im Binnenlande, in Tümpeln salziger Seen, d. h. mehr im Brackwasser, als an dem intensiv gesalznen Meeresstrande beobachtet. Ein Saum von Schilf (*Phragmites vulgaris*), oft verbunden mit hohen Binsen und Sinsen, die den Salzboden lieben, und unter denen nicht leicht die Meerstrandsumme (*Scirpus maritimus*) fehlt, umgibt in der Regel diese exklusiven Regionen.

Eine vierte Region ist die des sandigen Salzlandes. Sie gehöret vorzugsweise dem Meeresstrande an und wird im Binnenlande von den fliegigen Ufern salziger Seen vertreten. Nur, wo sie sich mit klepartigen Niederschlägen mischt, beherbergt sie einen Theil der Pflanzen der drei vorigen Regionen; wo sie frei und ungemischt auftritt, erhält sie ihre eigenen Arten. Hier ist der Sammelplatz zahlreicher Gräser, die es jedoch so wenig zu einer zusammenhängenden Grasdecke bringen, so wenig die vorigen Regionen einen gleichmäßigen Pflanzenteppich zu bilden vermochten. Obenan stehen Sandhalme (*Ammophila*) und grassenartige Formen (*Triticum*, *Elymus*, *Hordeum*); die übrigen sind meist nur Einschießer. Auch Binsen treten vielfach hinzu, oft von kräftlichem Wuchse und wie bei den Gräsern mit weithin reichenden Wurzelstöcken (*Juncus Balticus* an der Küste u. A.). Von dicotylischen Pflanzen stellen sich manche charakteristisch ein, besonders Crucifereen

(*Cakile* und *Crambe maritima*), manche Papilionaceen (*Plasum maritimum*), Umbellifereen (*Eryngium maritimum*, *Bupleurum tenuissimum*), Windenartige (*Convolvulus Soldanella*) und manche Chenopodiaceen (*Salsola*). Baudreiste pflegen viele der Gräser und manche der dicotylischen Arten zu erscheinen; das Saftige der Stengel und Blätter reißt zerküß, das Störche hervor. Selbst die Artenzahl verringert sich; Alles entspricht dem unsuchbaren Sandboden, den keine Lehmbelastung düngend macht. Schließlich geht das Sandland in das Dünenland über, in welchem sich die letzten Spuren des Kochsalzes verlieren, wo nicht mehr die flüchtige See ihre Wogen über dasselbe hinwegwölgt.

Je nach diesen Regionen des Salzlandes wählen die Salzpflanzen ihren Boden mit derselben Befähigkeit, die wir an den empfindlichsten Pflanzen gewohnt sind. Wie sich der Boden mischt, so auch gestaltet sich die Pflanzendecke des Salzlandes; jede Lokalität ist ein Pflanzenerb für sich, der in Verbindung mit dem Klima seinen eigenthümlichen Ausdruck annimmt. Bei aller Feinheit hat die Küste der Ostsee ihre Besonderheiten vor den Küsten der Nordsee voraus und umgekehrt; an den Ufern der Adria stellt sich wiederum ein anderes Bild ein, bis es im Binnenlande auf das Mannigfaltigste mit den Formen der Umgegend gemischt wird. Oft kündigt hier nur eine einzige Salzpflanze den Salzboden an, in der Regel *Glaux maritima*, *Samolus Valerandi* oder *Aster Tripolium*; allein jede dieser Einzelercheinungen genügt, dem Küniglein zu verrathen, was vielleicht tief im Schooße der Erde verborgen liegt.

## Zill Culenspiegel im Pflanzenreiche.

Eine Biographie nach allen Quellen.

Von Ernst Krause.

Zweiter Theil.

Man geräth in einen eigenthümlichen Zustand zwischen Zweifel und Vertrauen, wenn man die große Anzahl von zum Theil ganz glaubwürdigen Nachrichten liest, welche von schleimigen Massen erzählen, die unmittelbar nach dem Falle leuchtender Meteorite an den betreffenden Orten beobachtet sind. Ich führe eine Anzahl der glaubwürdigsten hier auf, die zum Theil in dem berühmten Werke Chladni's über Feuermeteore, zum Theil in Gilbert's Annalen und andern Zeitschriften verzeichnet sind.

Kießer, Gosat und Scheuchzer erzählen, daß im 15. Jahrhundert in der Nähe von Lugern ein „feueriger Drache“ einen Stein und mit ihm eine schlüpfrige Masse, ähnlich geronnenem Blute, herabgeworfen habe. Ein ähnliches Niederschlagen von geronnenem Blute ähnlichen Massen aus einer zerplatzenden Feuerkugel berichtet Spangenberg's Mansfelder Chronik aus dem J. 1548.

Im Mai 1652 sah Christl. Wenzel auf einer Reise zwischen Rom und Siena eine leuchtende Sternschnuppe ganz in seiner Nähe niederfallen, die ihren Glanz bis zur Erde beibehielt. Er fand an der Stelle eine durchsichtige, flebrige Substanz, von der er eine Portion mitnahm und im eingetrockneten Zustande lange aufbewahrte.

Barthowicz in seiner „Rindischen Reise“ erzählt, daß an einem Märzabend 1718 auf der Insel Orthe ein großer, feuriger Klumpen herabgefallen sei und die Erde mit einem sehr heftigen Knall berührt habe. Am andern Tage sah man an dieser Stelle einen Haufen gallertartiger Materie, fast wie Silberstaub glänzend.

Am 8. März 1790 war in der Doro-Laufst ein weit sichtbares Meteor in der Nähe der Dörfer Storde und Lauffe angeblich auf einer weiten Höhe (Feld) niedergefallen. An der betreffenden Stelle fand man Erde und

Heideltraut auf einem elliptischen Raume von 10 Ellen Länge und 6 Ellen Breite mit einer gelbschäumigen, klebrichten, nach Eiskern riechenden Masse bedeckt, die, Anfangs fast trocken, leicht, wie schwach gebadener Wiscuit, bald darauf zu einem braunen Supp zusammenfloß und dabei im Volumen abnahm. Die Vertheilung war so, daß die Substanz am stärksten gehäuft in dem ersten Drittheil des Raumes lag, gleich als wenn das Meteor, im schiefen Stöße kommend, dort das Meiste zurückgelassen habe. Letzter wurde die Masse nicht chemisch untersucht; sie löste sich nicht in Del oder Spiritus, besser in Terebenthinöl und brannte wie Kampher. Der Beschreibung nach war sie den mehrerwähnten Schleimpilzen, Aethalium oder Spumaria- Arten, ähnlich.

Im Juli 1811 beobachtete Apotheker Scherb am Abend über der Landstraße bei Heidelberg eine Feuerkugel, die sich erst erhob, dann Funken sprühend senkte und etwa manns hoch über der Erde verschwand. Während der Beobachtung am Abend an der Stelle keine Spuren des Meteors entdecken konnte, fand er am andern Morgen daseibst beschmutzte poröse Schleimstücken mit gewerbartiger Bildung, die, wie er später erfuhr, ein vor ihm gekommener Spaziergänger mittelst eines Stodes aus größeren schäumigen Massen abgerissen hatte.

Scherb eigenthümlich ist die Mittheilung eines Chemikers Rufus Graves aus Dartmouth (in New-Hampshire, America), der an einem Augustabend 1819 in einem Garten, in welchem ein Feuermetor niedergefallen sein sollte, eine scheibenförmige Masse, mit wolliger, lebergelber Oberflache, innen gelblich seifenartig, von höchst widrigem, Ekel und Schwindel erregendem Geruche fand. Die Substanz wurde an der Luft schnell dunkelbraun, zerfloß zu einem Kleister, und nach 2 bis 3 Tagen war von dem 8 Z. im Durchmesser haltenden Klumpen nur ein Häufchen braunen Pulvers übrig, das kaum einen Fingerhut ausfüllte. Die Beschreibung, sowie die chemische Untersuchung deutet auf eine Art der sogenannten Schleimpilze.

Dagegen geht wieder mehr auf Noctoc die Beschreibung einer kinderkopfgroßen Gallertmasse, die nach Benzenberg's Bericht als Feuerball in der Nähe von Eresford herabgefallen und so schlüpfrig anzufühlen war, daß sie den Händen entglitt.

In Rosenäster's „Aus der Heimath“ findet sich aus dem J. 1862 die Beschreibung einer mit Lichtschein auf dem Stadtwall niedergefallenen „Kugel“, die noch „warm“ war, stark phosphorescirte und durchdringend roch. Man sieht, die Schilderung der Sternschnuppen im Ganzen:

Aus der Höhe stieß ich her,  
Mit Stern und Feuerkeine,  
Liegte nun im Grase aar,  
Wer blickt mir auf die Beine?

ist völlig der Volksanschauung consequent.

Ness von Esenbeck in seiner Abhandlung: „Ueber das organische Princip in der Atmosphäre“, welche sich dem ersten Bande von Rob. Brown's vernünftigen botanischen Schriften angehängt findet, ruft bei Erwähnung jener Sternschnuppen-Gallerie aus: „Ja, wer vermöchte wohl auf der unbedingten Behauptung fest zu verharren, daß Gewächse, wie Aethalium und Spumaria, nicht wirklich meteorischen Ursprungs sein könnten? Diese Geburten des Augenblicks, schnell und mächtig oft in Massen von großem Umfange hervortretend, wo man vorher nicht ihre Spur sah!“ — In Bezug auf diese Erscheinungen, sowie diejenigen des „rothen Schnees“, welche schon Lichtenberg die Idee von „Luftzoophyten“ aufgedrängt hatten, gelangte Esenbeck, wie vor ihm der Kapitän Wrangel, zu der kühnen Vermuthung, diese Keime könnten direct aus ihren gasartigen Urbestandtheilen gebildet sein, sei es durch Einfluß von Kometen oder Planetenstellungen, sei es durch die Berührung „stoffwandelnder Meteor“, sei es durch die belebenden electrischen Einflüsse, wie denn Noctoc am häufigsten nach Gewitterregen auftritt. — Diese kühnen Combinationen müssen ohne Weiteres in das Bereich der Träumereien verwiesen werden. Ich sehe nur eine Annahme, jene Beobachtungen, ihre theilweise Wahrheit vorausgesetzt, zu erklären. Man kann zwar die Möglichkeit nicht in Abrede stellen, daß jene kleinen Weltkörper (Meteoriten) organisches Leben ernähren mögen, aber man muß die Wahrscheinlichkeit bezweifeln, daß solches ungetrört auf unsrer Erde anlangen könne. Schon im J. 1835 fand Verzeilus bei Untersuchung eines Meteorsteins eine braune, humusartige Masse, die ihm die Frage abpreßte: Enthält dieser Stein wohl Spuren organischer Bildung? Gibt das möglicher Weise einen Wink über die Gegenwart organischer Bildungen auf andern Weltkörpern? — Ebenso fand im J. 1857 Böhler in einem Meteorstein, der in Ungarn gefallen war, einen Kohlenwasserstoff, bei welchem er zweifelhaft war, ob er denselben als Ueberbleibsel organischer Bewohner desselben vor seinem Erglühen oder als aufgenommen in unsrer Atmosphäre betrachten sollte. Man kann dabei unbedenklich zugeben, daß es den Verhältnissen durchaus nicht entgegen ist, die Existenz der niedersten Thiere- und Pflanzenformen (zu denen die sogenannten Schleimpilze und der Noctoc gehören) auf jenen kleinen Weltkörpern anzunehmen, während es durchaus unwahrscheinlich ist, daß sie beim Niederfallen mit voller Lebendigkeit und Keimfähigkeit zur Erde gelangen könnten. Sollte dies dennoch möglich sein, so würde, bei der rapiden Vermehrung und schnellen Entwicklung dieser Lebensformen, ihr Aufgefundenwerden in großen Massen bald nach dem Falle nicht unglaublich sein.

Wehr innere Wahrscheinlichkeit liegt einer andern Hypothese bei, nach welcher die Luft, die sehr leichten Keimzellen dieser Organismen nicht bloß, wie sie es mit so vielen derselben thut, mit sich führen, sondern ihnen auch in

oberen feuchten Regionen eine gewisse Entwicklung gestalten möchte, so daß sie der Regen alsdann in gallertförmiger Gestalt herabbringend könnte. Diese Annahme würde mehr Zulässigkeit für den Nostoc, als für die sogenannten Schleimpilze besitzen, welche sich mehr an Jahreszeit und Standort gebunden zeigen. Der Nostoc dagegen wird frei auf jeglicher Unterlage gefunden, und viele seiner Verwandten leben in Bistrickeit nur von feuchter Luft. Möglicher Weise sind es auch die von der Luft weggeführten leichten Membranen, die, unterwegs Wasser aufnehmend, herabfallen und im Moment des Auflebens zu phosphoresciren anfangen. Man würde sich alsdann vorstellen können, daß dieses Leuchtenwerden solcher Luftweisen erst in den untersten Luftschichten dicht an der Erdoberfläche eintreten könnte, und dies erinnert uns an gewisse auf der Erde hüpfende Lichterscheinungen.

Es gibt zwei Beobachtungen, deren eine beinahe unantastbar ist, nach welchen auch das Vorkommen der überhaupt noch unerklärten Irtrichter zuweilen auf nostocartige, in der Luft fliegende Schleimmassen zurückzuführen wäre. Dechales erzählt im vierten Bande seines *Mundus mathematicus*, Robert Fludd habe einst ein Irtricht verfolgt und zu Boden geschlagen, worauf er eine schleimige Masse, wie Frohschlaich, gefunden habe. Dasselbe erzählt der berühmte Physiker Eshadmi in seiner Abhandlung: „Ueber den Ursprung einiger Eisenmassen u.“. Eshadmi sah im J. 1781 an einem Sommerabend in der Dämmerung nach einem Regen in einem Dreieck Garten viele leuchtende Punkte im nassen Gras hüpfen, welche sich nach der Richtung des Windes bewegten, und deren einige sich an die Ränder der Wagen setzten. Sie flohen bei der Annäherung, und es war schwer, sie zu erfassen. Diejenigen aber, welche Eshadmi fing, zeigten sich als kleine gallertartige Massen, dem Frohschlaich oder gedehntem Sago ähnlich. Sie waren geruch- und geschmacklos, vom Ansehen moderner Pflanzentheile. Die vorstehende Beobachtung hatte Goethe im Auge, als er im Faust die Verse schrieb:

Irtrichter fort! du leuchtest noch so stark,  
Du bist geholt ein alter Wälderquack,  
Was kletterst du, weißt du mich paden?  
Wo liebt wie Pech und Schwefel mit im Naden.

Wir wollen jetzt zum Schluß sehen, wie sich die klaffsicheren Naturforscher dem methischen Nostoc gegenüber verhalten haben, und was unser positives Wissen über denselben enthält. Wie schon erwähnt, ist der erste Fachbotaniker, der des Nostoc's deutlich erwähnt, Peter Ragnoi, Professor zu Montpellier gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Er nennt den Nostoc ein häutiges, flüchtiges, fettes Moos (*Muscus luxag membranaceus pinguis*). Worison citirt Ragnoi's Worte, Tournefort beschreibt ihn in seiner Flora von Paris als „*Nostoch cluissorum*.“ Von da ab findet man ihn ziemlich regelmäßig in den einschlä-

gigen botanischen Werken aufgeführt; Linné in seinen „*Species plantarum*“ nennt ihn *Tremella Nostoc*. Im Innern der mit seiner Membran überzogenen, glasig-grünen Gallerte hatte schon Reaumur die kleinen Sporenkugeln bemerkt, welche den Nostoc fortpflanzen. *Caradori* beobachtete am Anfange unseres Jahrhunderts die zahlreichen Formenveränderungen, welche der Nostoc mit der Verschiedenheit der Witterung, seiner Fundorte und seines Alters durchläuft, wobei ihm eine Reihe verschiedener Namen beigelegt worden sind. Lamarck, De Canolle und Ventenat beschäftigten endlich seine inzwischen vielfach angeweihten Pflanzennatur und wiesen ihm im System eine Stelle zwischen den niedrigen Urtörner-Algen (*Prolococcus* Arten, die meist von feuchter Luft leben) und den Schwingeladen-Algen (*Oscillatorien*) an. Die Nostochinen oder Schleimalgen leben theils auf feuchtem Boden, theils in süßem oder salzigem Wasser. Wenn man den gemeinen Nostoc (*Nostoc commune* der Botaniker), von welchem bisher die Rede gewesen, genauer untersucht, so bemerkt man in der grünlichen, strukturlosen, schleimigen oder gitternden Gallerte harte, geschlingelte Fäden eingebettet, die sich, bei genügender Vergrößerung, als Zellenketten erweisen. Die runden oder ovalen Zellen sind wie Perlen an einander gereiht, deren Glieder sich häufig trennen, wobei alsdann jede einzelne Zelle zu einem neuen Faden auswachsen kann. Eigentlich zur Fortpflanzung bestimmt sind jedoch gewisse größere Zellen (Sporen), von denen sich an jedem einzelnen Faden nur einige wenige ausbilden. Die ganze Schleimmasse ist mit einer dünnen Membran umgeben, welche sie vor dem Zerfließen schützt. Nach der Form ihres Umrisses, der Größe, Farbe u. s. w. hat man neben dem *Nostoc commune* Vauch. noch eine Anzahl anderer Arten unterschieden.

Man sieht, es fehlt dieser Pflanze an deutlich in die Augen springenden Charakteren, und begreift, wie Cassini und andere Botaniker dazu gekommen sind, sie mit der Leimflechte (*Collema*) zu verwechseln, deren ähnlich aussehendes Lager jedoch auf seiner Oberfläche deutliche Fichtenschüsseln (Apothecien) entwickelt. Einige Botaniker haben deshalb den Nostoc für eine unfruchtbare *Collema* gehalten.

Ebenso, wie man die Zellfäden der *Oscillatorien* ruckweise hin und her schwingen sieht, und die Sporen der meisten Algen liebt vor ihrer Keimung umherzuschwärmen, hat man auch an den Zellfäden und Sporen des Nostoc's häufig ähnliche Bewegungen bemerkt. Ältere Beobachter haben daher den Nostoc zu den Thieren rechnen wollen. Ingenhousz bereits wollte ihn als ein Verbindungsglied der Pflanzen- und Thierreichs betrachten wissen, Fontana, Corri und Scherer hielten ihn für eine Colonie im Schleime lebender Infusionsthierehen, Ehrentrans und Vaucher für eine den Seeschwämmen ähnliche

Polypencolonie ohne hartes Gerüst. Antonio Bivona, welcher im J. 1815 den Nostoc sehr aufmerklich beobachtet und die schwingenden Bewegungen seiner Fäden und Epochen sehr genau beschreiben hat, glaubte hier, wie bei Collema, eine Anzahl fadenförmig gegliederter Polypen wahrzunehmen, welche gemeinschaftlich in einer schleimigen Masse leben. Wir wollen hierbei nicht unterlassen, zu bemerken, daß die oft mit dem Nostoc verwechselten Schleimpilze (Myxomyceten) von neueren Beobachtern (de Bary u. A.) für gemeinschaftlich lebende Thiere der niedrigen Art (Amöben) gehalten werden, eine Ansicht, die freilich von andern Forschern lebhaft bekämpft wird.

Einzelne haben dem Nostoc sogar alle und jede Organisation abgesprochen, wie P. Bernise, der ihn im J. 1776 in der Academie zu Dijon für eine leblose Pflanzengeneration erklärte. Auch Ehrenberg beschrieb eine in der Berliner mineralogischen Sammlung befindliche „Sternschnuppenmasse“ als dem Ansehen nach faulig geklossene Pflanzensubstanz.

Dr. Carus erklärte eine derartige Sternschnuppenmasse im J. 1828 für Froschringelweide und Dr. Vogel 10 Jahre später ähnliche im Januar, Februar und März auf feuchten Wiesen gesunde Gallertmassen für die Produkte von Kröten und Fröschen, welche einige Male die schon befruchteten Ovarien als schwarze Punkte enthielten.

Es ist ja auch ganz wahrscheinlich, daß die verschiedenen Naturbeobachter alter und neuer Zeit oft recht verschiedene Dinge in Händen gehabt haben mögen, und der französische Naturforscher Ballot, welcher im J. 1821

einen interessanten Aufsatz über die „in Wasser zerfließende Pflanze“ (Nostoc der Alchemisten) veröffentlicht hat, kam darin endlich zu dem Schlusse, daß Nostoc ehemals nur ein allgemeiner Ausdruck für die verschiedensten aus der Luft fallend geglaubten Substanzen gewesen, und daß Tournefort Unrecht gethan, den Namen auf eine bestimmte Pflanzenspecies zu beziehen. Daraus ist aber zu erwidern, daß der Nostoc der Alchemisten nach allen seinen beschriebenen Eigenschaften nur die noch heute Nostoc genannte Alge sein kann. Dagegen können allerdings Zweifel bestehen, ob die sogenannten Sternschnuppen-gallerte mit Recht auf ihn zu beziehen wären, denn einige Schilderungen scheinen deutlich auf Schleimpilze u. dgl. zu deuten. Dennoch sehe ich nicht ein, mit welchen positiven Gründen Ehrenberg behauptet, die Sternschnuppenmasse beziehe sich niemals auf Nostoc oder Collema, sondern auf die damit verwechselte Tremella meteorica alba, einen Pilz, den er im Januar und Februar, Kenned in den Herbstmonaten häufig beobachtet habe. Auch eine fernere Behauptung Ehrenberg's, das Herabfallen der Massen aus der Luft sei eine meteorische Mythe, möchte ich nicht unbedingt unterschreiben.

Es würde darum auch heute noch festzustellen bleiben, ob die leuchtende Gallerte Chladni's und anderer Beobachter auf Nostoc, Palmella, Tremella, Collema oder noch andere Formen zurückzuführen sei. Sollte der Zufall einmal oder dem andern meiner Leser eine solche phosphorescirende Gallerte vor Augen bringen, so ist derselbe freundlichst ersucht, dieselbe, in einem Gläschen gut verpackt, dem Schreiber dieser Zeilen (Charitéstraße Nr. 2 in Berlin) einzusenden zu wollen.

## Kleinere Mittheilungen.

### Der Blumenmarkt des Covent-Gardens im Winter.

Es ist bekannt, daß das Weihnachtsfest in England sehr allem und glänzend gefeiert wird. Der Markt vom Covent-Garden zu London zeigt am Tage vorher ein Schauspiel, welches, aus der verschiedenen Produkte wegen, die in dieser Jahreszeit dort zu sehen sind, einer besonderen Erwähnung wohl werth ist (Revue horticole. 1868. p. 58—60). Lange vor Anbruch des Tages bringen eine Menge Karren das Land verschiedenster Räume, welches zur Ausschmückung der Wohnungen der Reichen dient; besonders aber werden von der Mistel (Viscum album) große Zweige mit weißen Früchten beladen, vielfach an den Markt gebracht und theuer bezahlt. Diese Pflanze, welche von unsern Voreltern als ein Symbol der Kraft hoch verehrt und bei religiösen Festelichkeiten gebraucht wurde, weil sie, als Schwarzwurzler auf der Erde wachsend, diesen König des Waldes sich sogar unterthan zu machen weiß; diese Pflanze, welche die aralten Druiden bei Menschenopfern gebrauchten, hat bei den späteren Sitten der Gegenwart eine andere Bestimmung erhalten. Junge Leute suchen sie überall und besitzen sie, dieselbe ihnen Räubchen zum Geschenk anzubieten, während dieselben Räubchen, welches einen Kistzweig in der Hand hält, mit diesem Symbol bekränzt, den Kistzweig, der ihr unter den jungen Männern am besten gefällt.

Eine Menge Früchte, besonders Trauben der besten Sorte und Paeleüsse, die diesem Feste eigenthümlich sind, werden überall zum Kauf ausgesetzt; aber außerdem sieht man Ananas, Citronen, Citrus medica, Citrus doumiana, indische Feigen (besonders die Frucht von Opuntia ficus indica, einer Actus-Art, die in Mägen viel gezeigelt wird), Bananen oder Pfäung, welche neben zahlreichen Sorten von Apfeln und französischen Birnen liegen. Die französische beurré d'Hardenpout, ausgezeichnete weiße Calvillen werden oft für 15 bis 20 Schill. das Stück verkauft, und der Schreiber dieser Zeilen in „Revue horticole“ hat in dem Laden von Salomon einzelne ausgezeichnete große Birnen (belle Angévine) für 32 Schill. pro Stück ausbieten sehen. Es ist ein Akt der guten Gabe, eine solche ausgezeichnete Frucht nebst einem Vorberzweig, auf dessen Ästern ein kurzer Glückwunsch zu Weihnachten und Neujahr mit gelben Buchstaben prangt, Freunden zum Geschenk zu machen.

Starke gezeigene Gemüse ist nicht so reich vertreten, dennoch sehen schon Exemplare von Crambe maritima, Abaccherberpfelen, grünen Gurken und einer hübschen rosenrothen Sellerie-Art nicht, welche in Frankreich vollständig fehlt.

Außerdem bemerkt man trotz der ungünstigen Jahreszeit einen Ueberfluß von Blumen: Crocus, Tulpen (Duo von Tol), Erica's, glückliche Primeln, unter den letzteren zahlreiche Varietäten mit

großen, bunten Kronen u. s. w. Unter die den englischen Blumen ihren eigenen hübschen Blumen gehört die Poinsetta pulcherrima, eine Endorhiza-Art aus Mexico.

Man sieht also, wie weit unsere Nachbarn es in der Kunst der

Pflanzgucht gebracht haben, und was die Kunst, wenn sie vom Reichthum unterstützt wird, aus den Produkten der Natur machen kann, auch in der ungünstigsten Jahreszeit und an dem nördlichsten Strande Großbritanniens. D. R.

## Literaturbericht.

**Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Landwirtschaft und der in dieselbe einschlagenden industriellen Gewerbe und Hilfswissenschaften des Jahres 1867.** Reicht vollständiger Bibliographie. Begründet und herausgegeben von Dr. William Eddé. 14. Jahrgang. Stuttgart, Götzen und Risch, 1868. 8. 318 S. 27 Sgr.

Es ist für den praktischen Landwirth sicher von der größten Bedeutung, Alles zusammengefaßt zu haben, was im Laufe eines Jahres durch Erfahrung und Studium für sein Bereich erworben wurde; nicht damit er augenblicklich das Alles bei sich einführe, was Andere für zweckmäßig fanden, sondern damit er eine Anregung empfangt, mit der Zeit geistig fortzuschreiten und wachsen. Die praktischen Resultate werden sich dann von selbst bei ihm einstellen, je nach diesen geistigen Nachschüben. Er muß es darum mit Dank anerkennen, wenn die vielfach gestreuten Erfahrungen übersichtlich zusammengestellt werden, nachdem sie von dem anhängenden Unwesentlichen, gleichsam von der Syre getrennt werden sind.

Der vorliegende Jahresbericht namentlich muß ihm um so mehr

interessiren, als er, hauptsächlich für den praktischen Landwirth berechnet, das Wissenswürthige in Kürze klar und verständlich mittheilt und diese Mittheilungen über eine große Reihe von Ertragszweigen ausdehnt. Der Jahresbericht umfaßt 23 verschiedene Gebiete: Düngung, Ernte und Productenpreise; Bodenkunde; Urdarmachungen und Bodenverbesserungen; Düngerehre und Statistik; Ackerbestellungslehre; landwirthschaftliche Maschinen und Geräthe; allgemeinen und speciellen Pflanzenbau; Weidenbau und Viehwirtschaft; Pflanzenzucht und Pflanzenkrankheiten; Ernte, Dreschen und Aufbewahren; allgemeine und speciell Viehzucht, incl. Milchwirthschaft, Züchtung und Seidenzucht; Fischerei; Thierheilkunde; Obst-, Gemüse- und Blumenzucht; Weinbau, landwirthschaftlich-industrielle Gewerbe; Naturwissenschaft; Baukunde; Betriebslehre; Vereine; Versammlungen; Versuche und Prüfungskationen; Börsen; Ausstellungen; Unterrichtsweisen; Personalien, und schließlich die Bibliographie. — Dies Alles auf 20 Druckbogen für den Preis von 27 Sgr. zu erhalten, ist gewiß ganz außerordentlich und begünstigt die weiteste Verbreitung des Buches.

R. R.

## Einladung,

**gerichtet an die Lehrer der Mathematik und Naturwissenschaften an den Seminarien, Real- und Volksschulen Deutschlands.**

Zur bevorstehenden XVIII. allgemeinen deutschen Lehrerversammlung in Berlin (d. 18., 19., 20. Mai) wird auch die in Hildesheim 1867 von dem Unterzeichneten gegründete mathemat.-naturw. Section, welche in Cassel 1868 bereits getagt hat, (s. d. Protok. ders. in d. allgem. d. Lehrzeitung 1868 Nr. 39) wieder zusammentreten. Da der Zweck dieser Section, „**kräftige Vertretung und Pflege der Methode des mathem.-naturw. Unterrichts**“, für die Schule höchst wichtig und heilsam zu werden verspricht, so ergeht an alle Lehrer jener Fächer, besonders an die noch wenig vertretenen Real- und Volksschullehrer die ergebene Einladung: **recht zahlreich** an unsere Versammlung in Berlin **sich zu betheiligen** und beabsichtigte Vorträge noch rechtzeitig bei dem Unterzeichneten anzumelden.

Freiberg i. S., im April 1869.

**J. G. B. Hoffmann,**

Gymnasiallehrer,

beigeil. Vorstand d. m.-n. Section d. allgem. d. Lehrer-Vers.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 35 Sgr. (1 fl. 30 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Schauer. Schriftführer Buchdruckerei in Halle.



# Die Natur

Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

N<sup>o</sup> 20.

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwetschke'scher Verlag.

19. Mai 1869.

Inhalt: Das deutsche Salzland, von Karl Müller. 2. Die Einzelpunkte des Salzlandes. — Die Thäner, von Otto Ule. — Die Uffel, von Ph. Wirtgen. Dritter Artikel.

## Das deutsche Salzland.

Von Karl Müller.

### 2. Die Einzelpunkte des Salzlandes.

Die höchst allmähliche Bildung der mitteleuropäischen Länder ist daran schuld gewesen, daß lange Zeiträume hindurch einzelne Meeresbecken, lagunenartig gleich besondern Mulden abgeschlossen, der Verdunstung ausgesetzt waren. Vom Jechstein herauf bis zum Keuper und in den östlichen Regionen bis zum Tertiärgebirge (Bielitzka) finden wir Salzquellen in den verschiedensten Gebirgsarten, und diese weisen darauf hin, daß sich innerhalb der Zeiträume, in denen jene Gebirgsarten niedergeschlagen wurden, auch mehr oder weniger mächtige Steinsalzlager durch die Verdunstung der Gewässer jener Meeresbecken bildeten. Sie sind über ganz Deutschland zerstreut und würden, wenn sie zusammenhängen, ein höchst bedeutendes Areal einnehmen. In Wirklichkeit ziehen sie sich, oft auf weite Strecken wahrscheinlich lose zusammenhängend, laberintisch durch den

Schoß der Erde und geben von ihrem Dasein nur dadurch Kunde, daß sie an vereinzelten Orten Soolquellen empor senden.

Karsten, dem ich zum Theil folge, hat sie in seinem „Lehrbuche der Salinentkunde“ weitläufig geschildert. Nach ihm zähle ich von den bekannteren und meist benutzten Soolquellen hundert und einige zwanzig für Deutschland und die Schweiz, so daß auf jenes Land etwa 115, auf dieses etwa 10 fallen. In der norddeutschen Ebene treten sie unter sehr wechselnden Bedingungen zu Tage und bilden, wenn das Wasser keinen künstlichen Abfluß hat, stehende Salzflümpfe oder sogenannte Wildmoore von geringem Salzgehalt, der sie indess befähigt, einer Menge von Salzpflanzen die Bedingungen zu ihrer Existenz zu geben. So finden wir es in Holstein, Mecklenburg, Pommern, Mark-



brandenburg, Posen, West- und Ostpreußen, selbst in Lithauen. Es kann hierzu bemerkt werden, daß alle Soolquellen der südbaltischen Ebene von gleicher chemischer Zusammensetzung sind, daß sie nämlich außer Gips keine andern schwefelsauren Salze, wohl aber Chlorkalium und Chlormagnesium in veränderlicher Menge enthalten. Westlich der Elbe finden wir das Gleiche in den westbaltischen Soolen, sowie südlich in der Soolquelle zu Homburg v. d. Höhe wieder. Doch bezieht sich das nicht auf das großartige Steinsalzlager am östlichen Fuße im Magdeburg-Halberstädter Becken, das bei reichem Gehalte an Kochsalz noch mehr Chlormagnesium, dann Chlorkalium, schwefelsauren Kalk (Gips), schwefelsaures Kali und schwefelsaure Talkerde (Bittersalz) in den zu Tage tretenden Soolquellen besitzt. Das ist um so wunderbarer, als dieses mächtige Steinsalzlager, wenn man will, an den westlichen Ufern des südbaltischen Beckens liegt. Es ist noch wunderbarer, sofern man bedenkt, daß dieses Lager höchst wahrscheinlich mit dem Steinsalzlager von Niederböhmen, d. h. mit dem von Aetern in der Goldenen Aue zusammenhängt und hier außer Gips nichts von den übrigen schwefelsauren Salzen bemerkt wird. Es liegt folglich auf der Hand, daß die einzelnen Salzpunkte höchst verschieden zusammengesetzt sind und in Folge dessen auch eine verschiedene Salzflor ernähren müssen.

Im Allgemeinen fallen von diesen Salzpunkten auf Pommern 1, auf Mecklenburg 4, auf die Provinz Brandenburg 2, auf Pommern 3, auf Schlesien (Oberschlesien) 3, auf die Provinz Sachsen 13, auf Westphalen 9, auf die Rheinprovinz 2, einige andere auf West- und Ostpreußen sowie auf Posen, so daß das alte Preußen etwa 44 mehr oder weniger benutzte Soolquellen zählt. In der Provinz Hannover kennen wir 11, in Braunschweig 4, in Schwarzburg-Rudolstadt 1, in Lippe-Deimold 1, in Waldeck 1, in Nassau 1, in Hessen-Nassau 1, in Meiningen 3, in Weimar 2, in Gotha 1, in Ruß-Schwarz 1, in Kurheffen 8, im Großherzogthum Hessen 4, in Württemberg 10, in Baden 3, in Baiern 7, in Deutsch-Fürstenthum 7. Das aber sind gleichsam nur die Centralpunkte, um welche herum oft zahlreiche andere Soolquellen auftreten, die, weil nicht künstlich gefaßt, ihren Inhalt über die nächste Umgebung ergießen und dadurch das Dasein einer Salzflor mehr begünstigen, als die salinisch bekannten oder benutzten Quellen, sofern ihre Soole nicht gradirt wird.

Deutschland hat alle Ursache, sich dieses Salzreichthums zu freuen; es stellt sich damit unter die reichsten Salzländer, ohne deren Nachtheil zu haben, indem es nirgends Salzsteppen bildet. Ebenso ist es durch die große Gleichmäßigkeit in der Vertheilung dieser Salzquellen höchst bevorzugt. In Pommern liegen die beiden Salzpunkte bei Döbels und Segeberg; jener ein Salzmeer, dieser ein Gipsstod, welcher bis zum Jahre 1866 nur als solcher bekannt war. Erst seit dieser Zeit hat man bei einer Tiefe von

472 Fuß eine stark gesättigte Soole angetroffen, bei 485 Fuß das längst vermutete Steinsalzlager angetroffen. Beide Punkte gehören dem Ostseegebiete der Trave an. Die vier Salzquellen Mecklenburgs fallen auf Schulinburg, Sülz, Sülten und Sülte, die schon in ihren Namen darauf hindeuten, obwohl die Quellen nur schwach sind. In der Nähe von Sülz im Herzogthum Güstrow liegt die Saline von Medlenburg-Schwerin, während die von Marlow, ebenfalls an der Rönne, eingang. Sülten unweit Brül, Sülz oder Sülte im Amte Ebnena, Soltow und Zimkenburg in der Zeibau, selbst einige Orte in der Halberstern mit schwachem Salzboden ernähren ihre eigenthümlichen Salzpflanzen und sinken in der Haide bis auf eine Art (Glaux) herab. — Die Pommern'schen Salzpunkte fallen auf Richtenberg, Greifswalde, dessen Soole Brom und Jod enthält, und auf Colberg mit mehreren Quellen; die von West- und Ostpreußen sind nur der Vollständigkeit wegen aufzuführen. In der That ist der Salzreichthum der Ostsee nicht unbedeutend; wie die Ostsee selbst ein salzarmes Binnenmeer ist, ebenso haben die bisherigen Salinen der baltischen Küste niemals den Bedarf jener Länder vollständig decken können, — eine Thatsache, welche es erklärt, daß alljährlich etwa eine Million Centner Salz aus England dahin geschifft wurde. In der Provinz Posen dürfte sich derselb wiederholen, was man in Pommern aus Segeberg, durch Gips geleitet, in Erfahrung brachte; auch hier taucht ein Gipsstod im Inowrazlaw in der Nähe von Thorn auf, der sicher auf Salz deutet. Viel reicher ist die Provinz Brandenburg an Salz. Seine Quellen erscheinen bei Bellig, Trebbin, Saarmund, Brandenburg, Uch bei Potsdam, Seibelang, Pessin bei Nauen, Birsowow in der Uckermark und bei Storkow. Sie alle aber scheinen ihren Zusammenhang mit einem einzigen großen Steinsalzlager zu besitzen, dessen Erfindung seit dem J. 1866 durch Bohrversuche im Gips bei Sperenberg nachgewiesen wurde. Schon bei einer Tiefe von 283  $\frac{1}{2}$  F. zeigte sich eine Salzsoole, worauf man die Ende März 1869 ein 700 F. mächtiges, vollkommen reines Steinsalz-lager bis zu 1050 F. durchsenkte. Die Provinz Schlesien besitzt ihre Salzpunkte in den oberbaltischen Kreisen Pless, Rybnik, Ratibor und Leobschütz, ohne es jedoch zu einer nennenswerthen Salzflor zu bringen. Glaux, Plantago und Triglochin maritima sind Aues, was man in Schlesien von ächten Salzpflanzen verzeichnet, und diese fallen nicht einmal auf Oberschlesien, sondern auf ein Paar salzhaltige Biesen im Regierungsbezirk Breslau.

Ganz anders in der Provinz Sachsen. Hier, wo die Soolquellen dem Becken, welcher den bunten Sandstein, Muschelschell und Krupper umgibt, entspringen, tauchen uraite Soolquellen vielfach auf und bringen zum Theil eine höchst mannigfaltige Salzflor hervor. Die Punkte fallen auf Schönebeck und Eimern, auf Staßfurt, Halle, Dürrenberg, Traubitz, Kötschau, Kösen, Aetern und Erfurt, wo die Soole verwendet wurde oder noch verwendet wird; aus

derweitige Quellen befinden sich zu Dobendorf, Soblen und Erbeborn. Am letzten Orte gibt die Salzquelle Gelegenheit zum Daseln eines salzigen Sees, von dem ich noch besonders zu sprechen haben werde: Mit diesen Punkten hängen auch noch einige andere zusammen: mit Staßfurt eine ganze Reihe von Salzgruben und Salzmooren, die sich nicht allein über den preussischen, sondern auch über den anhaltinischen Antheil verbreiten, mit Schönebeck die Salzpunkte von Salbte und am Bläming die von Dttmannsdorf und Kropfschäde, mit dem Steinsalzlagern von Atern die Salzpunkte von Frankenhäusen, Auleben und der Rumburg bei Heeringen, mit Erfurt die Saline von Stotternheim im Weimarischen, die Saline Ernstthal bei Buxleben im Gotha'schen und wohl auch die von Salza, die ihrerseits wieder den Zusammenhang mit Kösen und den übrigen sächsischen Salzpunkten längs der Saale vermittelt. Diese ganze Reihe von Salzpunkten scheint überhaupt in einem innigeren Zusammenhange unter sich zu stehen, so daß man sie wohl alle von einem und demselben, wenn auch vielfach gegliederten Steinsalzlagere abzuleiten haben dürfte.

Gleich der baltischen Tiefebene hat auch die Nordsee-ebene ihre vielfachen Salzpunkte. Den Südrand der Rünster'schen Mulde umsäumen die fünf Salinen von Königsborn bei Unna, Jassenhof, Werl mit Newerk, Westerkotten und Salzkotten, den nord- und südwestlichen Rand die Salinen von Gottsegabe bei Rheine und Neusalzwert bei Rehme. Wahrscheinlich hängen damit auch die Salzpunkte von Salzhausen im Lippischen und von Dröbde bei Pyrmont zusammen, was fogleich aus einer Betrachtung der hannövr'schen Salzquellen hervorgeht. Dort erscheint bei Lüneburg noch im Halbegebiete ein ähnlicher Gipsstock, wie wir ihn schon mehrfach in der baltischen Ebene fanden, bei Salze zwischen Geile und Bergen ein Salzpfuhl. Rängs der Erhebungseichtung des Harzes von NW. nach SO. aber tauchen eine ganze Menge von Soolequellen auf, die zum Theil auf das braunschweigische Land fallen. Eine erste Reihe zieht sich von Westen nach Osten von Lünden bei Hannover über Salzbadlum, Schöningen und weiter in einigen unbenutzten Soolequellen in der Magdeburger Gegend bis Elmen bei Schönebeck. Eine zweite Reihe beginnt bei der Saline Soodorf und Rasch bei Rodenberg, um über Münster, Eldagsen, Herxsen, Salzlebenhall und in derselben Richtung mit einer Menge noch unbenutzter Soolequellen im Halberstädt'schen bis nach Staßfurt zu gehen. Eine dritte Reihe zieht sich von Neusalzwert bei Rehme über Hasperde, Salzhermannsdorf, Salzbesfurt, Salzgleite und, in Verlängerung dieser Linie, über Juliusthal bei Neustadt am Nordbafall des Harzes. Eine vierte Reihe endlich geht von Salzhausen über Pyrmont, Rüdten, Salzverbeiden und Salbte zum nordwestlichen Saum des Harzes. Alle genannten Orte besitzen ihre eigenen Soolequellen.

Nach Süden hin dürfen dieselben wieder mit den Quellen der mitteldeutschen Zechsteinmulde zusammenhängen. Die Vermittelung hierzu übernehmen die Salzpunkte des Wesergebietes bei Garlsbafen und Bodensfeld, sowie in der Grafschaft Schaumburg bei Soodorf und Rasch im Amte Rodenberg, endlich die Salzpunkte des Werragebietes bei Sooden und Alendorf. Alle vereinigt, mögen wohl östlich wieder mit der großen thüringischen Zechsteinmulde zusammenhängen; doch pflanzen die Werra-Soolequellen ihre Linie direct nach Süden fort und zwar über Kreuzburg (Wilhelms-Glücksbrunn) im Weimarischen, über Salzungen im Reiningischen, Schmalkalden im Hessischen, nach Friedrichshall bei Lindenau in der Gegend von Römth. Deftlich hiervon taucht vereinigt die Saline Heinrichshall im Kreis-Schleisschen auf. Westlich dagegen, im Süden des Rhön-gebirges, leitet die Soolequelle von Kissingen vereinigt über zu den Zechstein-Salzthonen der südlichen Wetterau: zu den Soolequellen von Leb, Eoden a. d. Saale und Saalmünster nördlich von Einhausen, westlicher zu den schwachen Quellen von Bleichenbach, Bidingen und Salzhausen bei Nidda im Oberhessischen, südlicher zu den Salinen von Naubheim. Krennach, (Äggedershall) a. d. Nahe und Wimpffen am Neckar sind die letzten beiden hessischen Salzpunkte.

Damit sind wir unmittelbar in die Ächt süddeutschen Salzgebiete eingetreten, die allerdings sich nicht mit denen von Norddeutschland messen können. Die Württembergischen Salinen befinden sich theils im Neckarthal (Salz, Friedrichshall, Wilhelmshall bei Schwemningen, Wilhelmshall bei Rottweil, Eimemshall bei Offenau), theils im Bereiche des Kocher (Hall, Weißbach, Schwäbisch-Hall, Westheim). Baden ist verhältnismäßig arm an Soolequellen; von seinen vier Salinen (Bruchsal, Mosbach, Ludwigsfalle bei Dürkheim und Ludwigsfalle bei Rappennau) bestehen nur noch die beiden letzten. Die bayerische Rheinsalz hat den Centralpunkt ihrer Salziederlage am Dürkheim (Philippsthal), wo zahlreiche Salzquellen austreten. In den altbayerischen Ländern sind Rosenheim, Traunstein, Reichenhall und Berchtesgaden hochberühmte Salzorte, die ihre Naturverhältnisse zum Theil mit Deutschösterreich gemeinschaftlich besitzen. Hier, wahrscheinlich in der Formation des Keupers, darf man vom ganzen Salzgebirgen reden, die bekanntlich ausgeglaue werden. Ebenfer, Jistl, Hallstadt, Hallein, Hall und Aulfer sind die Centralpunkte der Salzgewinnung im Salzkammergute, im Salzburgerischen und in Steiermark, und vielfach sind die Namen, welche in diesen Gegenden an das Daseln von Salz erinnern.

In der Schweiz kennt man nur wenig Salzquellen; was man davon besitzt, beschränkt sich auf Schaffhausen, Egglisau im Canton Zürich, Scherzgerhall und Augst in Baselschaffschaft, Schweizerhall im Canton Aargau, auf die Salinen Dorens und Brevier bei Ber im Canton Waadt

und auf Jurasteinsalz. Doch kommt die Schweiz in Bezug auf die Salzflor gar nicht in Betracht; sie hat keine einzige ächte Salzpflanze aufzuweisen, und selbst gemeine, salzhaltige Pflanzen, wie der Meerstrandsampfer (*Rumex maritimus*), werden nur am Egersee bei Thäingen im Canton Schaffhausen angetroffen.

Ueberhaupt versichert doch Dasen eine Soolquelle noch keineswegs das Dasein von Salzpflanzen. So z. B. sind die fünf Salinen am Südrande der Mulde von Münster äußerst arm an Salzpflanzen; ebenso ist es bei Schönebeck der Fall, während Eimen den umgekehrten Charakter zeigt. In der Vaccolina fand Herbig trotz einzelner Salzquellen und eines Salzbadches keine Spur von Salzpflanzen, und Galling besitzt nach ihm nur das *Lepidium medium*. Die Salinen des Saalgebietes zeigen entschieden eine große Ar-

muth an Halophyten, während der schwachsalzige See von Mansfeld eine wahre Musterflora derselben ist, und die Salinen des Unstrutgebietes, besonders Actern, große Eigenthümlichkeiten aufweisen. Worin dies begründet liegt, ist schwer zu sagen. Es läßt sich allenfalls behaupten, daß, je später die Soolquellen austauchten, um so köstlicher die Zahl der Salzpflanzen werden mußte, daß sie folglich gänzlich austielen; sobald die Quellen nach der Schöpfung der jetzigen Pflanzenbede hervortraten. Auch habe ich schon die Meinung ausgesprochen hören, daß sich die Salzpflanzen nur da häufiger einstellen sollen, wo Grabirreue sind. Das trifft allerdings an einigen Orten zu, an andern aber nicht. Nur das wissen wir mit Sicherheit, daß auch die Salzpflanzen oft höchst eigensinnig verbreitet sind. Ich werde auf diesen Punkt noch ganz besonders zurückkommen.

## Die Thräne.

Von Otto Mit.

Es ist für den Naturforscher nicht immer gerathen, in eine andere Domäne, am wenigsten aber, in die des Dichters hineinzuergreifen. Er muß es sich gefallen lassen, daß man ihn in einen unliebsamen Gegenstand zu diesem stellt und ihm manchen nicht sehr schmeichelhaften Titel anhängt. So höre ich auch hier schon fragen: Was haßt du, was hat der Naturforscher in seiner erschrecklichen Nächternheit mit der Thräne zu schaffen? Ich weiß nun freilich nicht das Lob der Thräne zu singen, wie es Dichter und Dichterlinge zu thun pflegen, weiß auch nicht von blutigen Thränen des Schmerzes noch bitteren der Reue oder von süßen wonniger Liebe zu sprechen, kenne noch weniger die Thauperlen des Menschenherzens. Ja, ich muß sogar mit dem entsetzlichen Gedanknis beginnen, daß ich nur salzige Thränen kenne, und daß die Thräne für den Naturforscher nur eine wässrige Flüssigkeit ist, welche Spuren einer organischen Substanz und etwas weniger als 1 Proc. Salz, namentlich Kochsalz, phosphorsauren Kalk und phosphorsaures Natron, aufgelöst enthält.


Aber ich habe doch vielleicht einige Kleinigkeiten über die Thräne mitzutheilen, die selbst den Dichter mit dem Naturforscher ausöhnen können. Der Naturforscher hat es einmal vor andern Menschen voraus, daß er die Dinge im Zusammenhange schaut, und daß er in seinem Bestreben, überall den Dingen auf den Grund zu gehen, hinter manches stille Geheimniß der Natur kommt. Daß die Thräne aus dem Auge fließt, weiß freilich Jeder; aber welche Bedeutung die Thräne für das Auge, dieses christe und fest, dasste Organ des Menschen, hat, ist doch wohl Wenigen bekannt. Denn daß die Thräne etwa bloß die Bezeichnung hätte, die der Dichter ihr beilegt, das Herz zu erleichtern oder die Gefühle zu verrathen, davon kann doch unter civilisirten Menschen kaum die Rede sein, abgesehen davon,

daß gerade diejenigen, welche am leichtesten und häufigsten Thränen vergießen, nicht zugleich die fühlendsten der Menschen zu sein pflegen. Ueberhaupt ist es ja auch der Mensch nicht allein, der weint; es gibt auch noch andere Thränen, andere sogar, als die Krokodilstränen, die der Dichter noch gelten läßt. Offenbar muß also wohl die Thräne in einer sehr innigen Beziehung zu dem Auge stehen, denn sie die Natur gesellt hat, und in dieser Beziehung allein wird sie denn auch ihre nützliche und das ist, ihre wahre Verwendung finden.

Die Thräne entfließt nicht eigentlich dem Auge selbst. Sie ist die Absonderung einer ziemlich großen Drüse, die zwar in der Augenhöhle, aber außerhalb des Augapfels und zwar über demselben, unterhalb des oberen Augenlides an der nach der Schläfe gewandten Seite liegt. Von dieser Drüse, die man auch die Thränenbrüse nennt, gießen sich 6 oder 7 ungemein feine Kanäle unter der Oberfläche des Augenlides hin, die ihren Inhalt ein wenig oberhalb des garten Korneels, welcher das Augenlid fließt, in das Auge ergießen. Doch so wenig sie ihren Ursprung im Auge haben, so wenig gelangen die Thränen überhaupt in das Auge. Sie können es nicht einmal; denn das eigentliche Auge, der Augapfel, liegt gar nicht frei zu Tage. Eine äußerst feine Schleimhaut, die sogenannte Bindehaut, welche die Augenhöhle auf ihrer inneren Fläche bekleidet, setzt sich von dieser auf die vordere Fläche des Augapfels fort und überzieht diese vollkommen, indem sie auf der Hornhautfläche selbst durchsichtig wird. In dieser Bindehaut verlaufen die feinen Gefäße, welche man auf der Oberfläche des menschlichen Augapfels sieht. In ihr befinden sich auch die eigenthümlichen Endköpchen der Tastnerven, die der Grund der heftigen Schmerzen sind, welche uns fremde, edige Körper verursachen, wenn sie zwischen die Augenhöhle gelangen.

Ueber diese Bindehaut, die den Augapfel nach außen abschließt, ergießt sich nun die Salzluth der Thränen; sie desständig feucht und schlüpfrig zu erhalten, ist ihre Hauptaufgabe, und jenes leuchtende, schmelzartige und klare Aussehen des Augapfels, das eines der charakteristischsten Anzeichen der Gesundheit ist, ist ihr Werk.

Eben darum fließen aber auch die Thränen keineswegs nur in gewissen Augenblicken und bei besonderen Veranlassungen, wie man gewöhnlich meint. Unaufhörlich, Tag und Nacht rinnen sie sanft durch die zarten Schleißen und verbreiten sich in Folge des dichten Anschlusses der Augenlider an den Augapfel gleichmäßig über die ganze Bindehaut. Wenn im Augenblicke des Erwachens unwillkürlich das obere Augenlid sich hebt, so verdunstet freilich die Feuchtigkeit an der freiliegenden Augenfläche. Das Auge würde also bald trocken werden; damit dies aber nicht geschehe, hat



Die Augenlider von hinten gesehen.

a Hebe-muskel des oberen Augenlides; b senkrechte Schließ-muskel; c Thränen-drüse; d Mündungen ihrer Kanäle; e Thränen-sack; f hintere Wand der Augen-lider mit den Seelen-nerven.

die Natur dem Menschen, wie überhaupt allen in der Luft lebenden Thieren nicht gestattet, die Augen ununterbrochen offen zu halten. Sie hat zu dem Zwecke zwei Wächter neben das Auge gestellt, die Endzweige zweier Nervenpaare, welche die Bewegung des Schließmuskels der Augenlider, wie des Aufhebemuskels des oberen Augenlides bewirken, und die man als Schließer und Öffner des Auges bezeichnen hat. Beide Nervenpaare sind unser Willkür unterworfen, wirken aber meist ohne den Einfluß derselben und unüberwacht. Der Dienst des einen, des Schließers, besteht darin, das Auge ununterbrochen bedeckt zu erhalten; aber dies gelingt ihm nur während des Schlafes. Beim Erwachen steht das andere Paar, der Öffner, auf seinem Posten und bemüht sich im Gegentheil, so lange das Gehen seinen vollen Einfluß geltend macht, das Auge dem Lichte bloß zu stellen. Aber der Öffner ist nicht eigensinnig; bei dem geringsten Gefühl von Trockenheit am Auge, wie bei der geringsten dem Auge drohenden Gefahr gibt er nach, und dieses Nachgeben erfolgt so blitzschnell, daß selten ein fremder Körper das Auge erreicht, bevor es das schützende Augenlid bereits wieder bedeckt hat. Ebenso blitzschnell

ergreift er aber auch wieder die Zügel der Herrschaft; wir meinen ununterbrochen einen Gegenstand zu betrachten, während doch fast in jedem Augenblicke die Betrachtung zum Zwecke einer Befruchtung des Auges unterbrochen wird.

Wenn aber die Thränen wirklich unaufhörlich fließen, so wird man fragen, woher es komme, daß sie sich nur über die Bindehaut des Auges verbreiten, und daß wir sie nur bei besonderen Veranlassungen überfließen und die Wangen herabrinnen sehen. Zunächst hat die Natur gegen diese Thränenfluth einen Damm aufgerichtet, den sie nur übersteigt, wenn sie zu ungewöhnlicher Höhe anschwillt. Diesen Damm bilden die Augenlider, deren Wimpern nicht bloß wie ein Gitterzaun das Auge umgeben, sondern deren Ränder überdies noch mit den Mündungen kleiner Schleimdrüsen besetzt sind, die durch ihre ölige Absonderung die Thränen zurückhalten. Vom äußeren Augenwinkel herkommend, ergießen sich also die Thränen, ohne einen Ausweg zu finden, über die Bindehaut, bis sie in den inneren Augenwinkel gelangen. Hier weichen die beiden Augenlider-ränder auseinander, verlieren ihre schützenden Wimpern und schließen sich auch nicht mehr dem Augapfel an. So ent-



Die Thränenwege des Auges.

a Thränen-drüse, b halbmondförmige Falte, c Thränen-sackchen, d Thränen-sack.

steht hier ein kleiner Raum, der von den Thränen erfüllt wird und nun der Thränensee heißt. Aber damit in dem Damm, welcher gegen den Thränenfluß aufgerichtet ist, hier keine Lücke sei, schmiegt sich eine Falte der Bindehaut, die bei dem Menschen sehr klein, bei andern Thieren aber, namentlich bei den Vögeln, oft sehr bedeutend ist, hier an den Augapfel an, und an dieser halbmondförmigen Falte sitzt ein weiches, rothes Körperchen, der sogenannte Thränen-trunkel, der wieder mehrere Schleimdrüsen enthält, deren Mündungen auch wieder mit feinen Härchen besetzt sind, und Schleim und Härchen wirken auch hier schützend gegen die Thränenfluth. Dieser Thränenfluß aber sind andere Auswege gebahnt. Genau an der Stelle der Augen-liderränder, wo sie zur Bildung des Thränen-sees auseinanderweichen, wird man oben und unten eine kleine, aber sehr deutliche Oeffnung bemerken. Diese Oeffnungen, die sogenannten Thränenpunkte, sind die Eingänge zweier kleiner Kanäle, welche die im Thränensee angesammelten Thränen aufsaugen und in den Thränen-sack leiten, welcher wieder durch den die Nasenhöhle durchbohrenden Thränen-gang in die Nasenhöhle selbst ausmündet. An der Mündung dieses Thränen-ganges befindet sich zugleich eine Klappe, welche wohl das Abfließen der Thränen in die Nase gestat-

ter, aber jedes Aufsteigen einer Flüssigkeit in entgegengesetzter Richtung verhindert.

Alle Thränen fließen also für gewöhnlich, wenn sie die Augenlider verlassen haben, in die Nase. Das ist freilich kein sehr poetisches Ende; aber ein heftiges Weinen genährt auch wegen des doppelten Gebrauchs des Taschentuchs, den es nöthig macht, überhaupt keinen sehr poetischen Anblick. Nur wenn der Thränenquell in überreicher Fülle sich ergießt, oder wenn durch Krankheit die Thränengänge vergeschlossen sind, fließen die Thränen über und an den Wangen herab.

Aber was ist es denn, was diese Thränen überfließen macht? Sollte nicht wenigstens ein geheimnißvoller poetischer Hintergrund bleiben, der nichts mit Thränenbrüße und Thränenpunkten, mit Thränenkarunkel und Thränenfackel zu schaffen hat? Ich will es nicht leugnen, daß hier, wo die innersten Tiefen des Lebens, der wunderbare Zusammenhang zwischen Drüsen und Nerven und noch mehr mit Empfindung und Willen ins Spiel kommen, noch lange nicht alle Räthsel gelöst sind. Aber zunächst können es doch sehr prosaische Veranlassungen sein, welche das Ueberwallen des Thränenquells bewirken. Sind die Thränen dazu bestimmt, das Auge in der Welt voll Staub und Schmutz vor dem Schicksal einer ungelinigten Fensterscheibe zu bewahren, hat die Natur ihm diesen freundlichen, immerfließenden Strom gegeben, um es zu waschen und zu erfrischen, so mußte sie auch dafür sorgen, daß dieser Strom reichlicher fließt, sobald eine reichlichere Waschung nöthig wird. Jedes Staubkorn, jede Mücke, die in das Auge geräth, macht in der That sofort die Augenlider sich mit überfließenden Thränen füllen, und

diese Thränen mildern, indem sie die Reibung verringern, nicht allein den Schmerz, sondern führen auch den fremden Gegenstand, wenn er klein genug ist, durch die Thränenpunkte hinweg. Jeder starke Reiz überhaupt, sei er durch Rauch, durch zu lebhaftes Licht oder zu heftige Kälte erzeugt, bewirkt eine kräftigere Absonderung der Thränen, und diese Thränen bewahren das Auge vor den schädlichen Folgen des Reizes.

Wenn aber Wehmuth oder sonst eine tiefe Gemüthsbewegung unser Auge mit Thränen füllt, dann ist es im Grunde doch auch nur dieser heftige Reiz, der durch den plötzlichen Andrang des Blutes zum Kopfe oder durch eine starke Nervenerrregung auf die Thränenbrüße einwirkt. Darum sind die Thränen am häufigsten bei Frauen und Kindern. Von Männern weinen am leichtesten die Sanguiniker; ihre Thränen können zwar echt sein, aber sie fließen nicht viel und sind schnell vergessen. Gute Schauspieler können die Thränen nach Willkür hervorrufen, indem sie sich künstlich in einen Zustand gewaltiger Erregung hineinarbeiten. Wenn man aber einen ernsten Mann von heilerischem oder blüthigem Temperament weinen sieht, dann kann man überzeugt sein, daß er in den innersten Tiefen seines Herzens ergriffen ist, da nur eine gewaltige Empfindung seinem Willen die Fägel entreißen konnte. Denn auch den Thränen gelehrt die Wille. Hier aber beginnt das Geschäft des Dichters, hier, wo es sich um den Streit zwischen Wille und Empfindung handelt, wo es gilt die Thränen nach ihrem Werthe zu wägen. Denn nicht alle Thränen wiegen gleich viel, und nicht alle sind einmal im Sinne des Dichters Thausperlen des Herzens.

## Die Eifel.

Von P. H. Wirtgen.

Dritter Artikel.

Wenn man von Coblenz aus auf der Trierer Straße die sanften Bergeänge auf der linken Moselseite ersteigt, so erreicht man, wenn man kaum drei Wegstunden zurückgelegt hat, ein Plateau von c. 1000 F. a. M. Es ist der höchste Theil des Moselfeßes. Folgt man dieser Höhe in nordnordwestlicher Richtung, so bleibt man eine längere Strecke auf der Wasserscheide der Netze (Rhein) und Elz (Mosel) bis zu dem 1600 F. hohen Maxener Stadthalbe. Von hier aus folgen wir, fortwährend nach Westen wandernd und nur zu geringen Ausbiegungen nach Norden oder Süden genöthigt, die Coblenz-Kütticher Landstraße. Wir durchwandern Boos, Kelberg, erreichen die 2000 F. hohe Vorderberger Haide, umgeben die tiefe Einsenkung des Dreifler Weibers und winden uns auf der Wasserscheide von Liefers und Ahr bis gegen Hilsheim durch. Dann erheben wir uns zu dem bedeutenden Hochrücken, der zwischen Koll und Ahr sich ausdehnt, und erreichen auf demselben nördlich

von Losheim den schon erwähnten Weissenstein, den Hauptknoten zwischen den Gebieten des Rheins, der Mosel und der Naas.

In dieser Linie haben wir die zusammenhängende Hochfläche der Eifel, die Wasserscheide zwischen allen in der Eifel entspringenden größeren Zuflüssen des Rheins und der Mosel beschrieben. Sie bildet keinen eigentlichen Hochrücken; sie läßt sich im Allgemeinen auch nicht leicht in der Natur erkennen; wer aber mit offenem Auge die Eifel betritt, der wird sie nicht schwer, freilich auf sehr krümmungsvollen Pfaden, auffinden. Aber auch auf einer guten Spezialkarte wird man sich dieselbe gut bemerkbar machen können. Dieses Plateau besitzt eine durchschnittliche absolute Höhe von 1500 F., sinkt aber auch zuweilen darunter und steigt an einzelnen Stellen wieder auf 1800 und 2000 F., bis es am Weissenstein, zwischen Schneifel, Zitterwalb und Hochvern mit 2170 F. seine größte Höhe erreicht. Ds beträgt

die Erhebung, welche die Quellen zweier größeren Bäche scheidet, nur wenige Fuß, so auf der Bopberger Haide, von welcher alle Rieselchen nördlich der Landstraße nach der Ahr und südlich derselben nach der Lieser abfließen. Auch die Quellen der Riß und der Elz liegen bei Kelberg fast auf gleicher Höhe.

Alle Gewässer, welche südlich der genannten Linie entspringen, die Elz, die Endert, die Ues, die Alf, die Lieser, die Kpfl, die Nims, die Prüm und die Durte, bringen entweder direct oder indirect der Mosel ihren Tribut dar; alle, welche nördlich derselben liegen, wie die Rette, die Ahr und die Erft, fließen dem Rheine oder, wie die Moer mit der Dieff, Dur und Inde, der Naas zu.

In ihrem oberen Laufe geben diese Flüßchen, deren Lauf eine Entwicklung von sechs bis zehn Meilen besitzet, über das Plateau, meist auf sumptigen Wiesen, in unregelmäßigen Krümmungen langsam dahin, durchschneiden aber in ihrem mittleren und unteren Laufe das Gebirge in tiefen, engen Thälern, häufig mit überaus Schroffen Gehängen. Nur die mittlere Alf, zum Theil auch die Kpfl und untere Ahr, so wie die in der niederbernhimschen Ebene der Naas ausfließenden Gewässer machen Ausnahmen. Die beiden erst genannten durchbrechen den Buntsandstein, der den herabströmenden Wassermassen nur geringen Widerstand entgegenzusetzen vermochte.

In manchen Thälern haben jedoch die vulkanischen Eruptionen mit ihren Lavaströmen die sanften Gebänge wieder gänzlich befeigt und schroffe Felsmassen auf einander gethürmt. Die in nördlicher Richtung abziehenden Gewässer gehören nur in ihrem oberen Laufe in das Gebiet der Eifel und haben hier auf kurze Strecken tiefe Thäler gebildet, während sie in ihrem mittleren und unteren Laufe der niederbernhimschen Ebene angehören.

Das bedeutendste aller Eifelflüßchen, mit Ausnahme der ihr nur zum Theil angehörenden Moer, ist die Kpfl, die in ihrem fast zwölf Meilen langen Laufe die anmuthigsten und wildesten Thälerungen oft in den mannigfaltigsten Windungen durchkreuzt und eine Meile unterhalb Trier in die Mosel mündet. In ihrem oberen Laufe geht sie durch ein weites, offenes Thal, wo kaum eine Meile von ihrer Quelle die 300 F. hohen Felsen, welche Kronenburg tragen, sich majestätisch erheben. In ihrem mittleren Laufe eilt sie durch bewachsenen Kalk und prächtige Dolomite, wie aber sehr häufig durch vulkanische Massen in ihrem Laufe gebremst oder zu wilden Sprüngen über dieselben genöthigt, während die Abhänge schroff anstehen, oft mit dichtem Laubwalde bemacht. Die schönste Parthie ist die von Gerolstein in 1000 Fuß absoluter Höhe mit seinen grauen, schroffen Dolomitmauern und malerischen Ruinen. Der mittlere Lauf endet bei Kpflburg, das, von der Kpfl mehrfach umschlungen, eine der anmuthigsten Parthien der Eifel bildet. In ihrem unteren Laufe wendet sie sich durch den Muschelkalk, während sie an manchen Stel-

len wieder, wie oben, den Buntsandstein durchbrochen hat, der in schroffen, oft senkrechten Wänden ansteht.

Wenn die übrigen der Mosel ausfließenden Eifelbäche auch nicht eine ganz so große Zahl von reizenden Landschaftsbildern und vorzuführen vermögen, so ist es doch leicht, in einem jeden derselben einzelne vortheilhafte Punkte aufzufinden. Die Prüm, welche in die Durte und mit derselben in die Sauer mündet, begrüßt in ihrem Laufe die durch die Karolinger historisch wichtige, in einem reizenden Thale um so überraschender liegende Stadt Prüm, als gerade die umgebenden Plateaux zu den größten Einöden der Eifel gehören. In dem Städtchen Neuerburg bildet die Prüm einen prächtigen Wasserfall, einen der wasserreichsten und bedeutendsten der Provinz.

In dem Thale der Nims bildet Schöneck mit seinen ausgebeugten Burgtrümmern eine überraschende Parthie.

Die Lieser, welche in ihrem oberen Laufe die Kavalen, worauf das Kreisstädchen Daun liegt, bespült und den merkwürdigsten aller Eiselberge, den Rüfberg, in dessen Schooß vier tiefe Kesseltäler liegen, drei selbst noch klare Wasserspiegel enthaltend, umströmt, dann zwischen den mächtigen Ueberbleibseln Vulkanen sich hindurchwindet, erreicht in ihrem mittleren Laufe Manderscheid, wo sich die großartigsten Scenerien der Eifel und darstellen. Die Lieser hat hier in den wunderbarsten Krümmungen einen Weg durch das Grauwackengebirge gesucht, wodurch in der Mitte des Thales ein über 500 F. hohes Felseneck mit senkrechten Wänden sich gebildet hat. Dieses Kliff wurde bei der Thalbildung dergestalt zerissen, daß die eine Hälfte mit dem rechten, die andere mit dem linken Ufer in Verbindung blieb. Auf diesen beiden schroffen Felsköpfen liegen die Ruinen der Burgen Ober- und Niedermanderscheid, die einst der Elz eines mächtigen Grafsanges schloß waren. Unten in dem Thale an die Felsmände gelehnt, liegen die selten von der Sonne besienenen wenigen Häuser von Niedermanderscheid, während oben auf lustiger Bergeshöhe der Fiedern Obermanderscheid sich ausbreitet. Bei Wittlich tritt die Lieser in ihrem unteren Laufe, immer noch 500 F. ü. M., in die lachenden Gefilde der Eifel Pfalz ein, eine weite Mulde im Buntsandstein, wo bereits Wein und Tabak gedeihen.

Die Ues entströmt dem höchst gelegenen aller Eiselsmaare, dem Wobdrucher Weiher, dessen Spiegel über 1500 Fuß absoluter Höhe hat. Auf ihrem sechs Meilen langen Laufe bildet sie, fortwährend das Schiefergebirge durchjagend, Laufende von Krümmungen, und ihr Spiegel liegt bei Lutzerath, wo die Goblens-Trierer Straße sie überschreitet, mehr als 800 F. tiefer als das anliegende Plateau. Es ist die tiefste, von Eiselstraßen durchzogene Senkung. Unterhalb derselben treten wunderliche Gebilde auf. Die sogenannten Siebenbäche zeigen hier mitten in dem tiefen Thale mehrere 30 bis 60 F. hohe Felsköpfe, die fast in einander verschlungen, durch spitzförmige Krümmungen

des Baches umflossen und von einander getrennt sind. Ueberaus wild ist das Thal von hier die Betrich, wo an vielen Stellen der Bach, lange Quarsfeldmassen umfließend oder durch feste Eismassen aufgehalten, Kesseltäler aufgespült hat, in deren Mitte, oft malerisch gruppiert, isolierte Felsentöpfe stehen geblieben sind. Hierzu kommen noch die sehr auffallenden Einwirkungen der Vulkanität. Drei Krater liegen 700 F. hoch über dem Thale auf dem Plateau, die ihre Lavaströme in das Thal ergossen und dasselbe höchst auffallend umgebildet haben. Eine der interessantesten Partien ist die in ihrer Art einzige Kasseotte, aus Säulen von aufeinander gethürmten Kugelfalsten gebildet, an deren Wänden und über deren Trümmer der Erniebach sich in das Uthal hinabstürzt. Betrich hat eine Thermie von  $25\frac{1}{4}^{\circ}$  R. und könnte ein sehr stark besuchter Bad sein, wenn bessere Kommunikationsmittel vorhanden wären. Es ist einer der lieblichsten Badoerte, wo neben und auf den Lavaströmen der üppigste Raubwald gedeiht und die Felsen von dem häufig vorkommenden Buchsbaum und unzähligen Gärtnertütern auch im Winter grün sind.

„Wie schön ist's hier! wie atmet süßer Friede  
In dieses Heilathals' wildem, liebem Thal!  
Der Körperfranke, wie der Seelenmilde  
Sucht nicht umh'n die Zirkung seiner Qual.  
Denn was die Thermie mildt den Gleißen spendet  
In lauem Bad mit südem Tranke schaffst,  
Wird heilsam wird's dem Geiste zugewendet  
Aus der Umgebung wunderbarer Kraft.“

Nachdem die Ues noch deinahe eine Meile ein freundliches Wiesenthal mit dunkel bewaldeten Bergabhängen durchfließen, mündet sie in die Alf, welche nach kaum einer Viertelstunde weiteren Laufes sich mit der Mosel verbindet. Die Alf, meist in einem weiten Thale durch Grauwade oder Buntsandstein fließend, bietet ein geringes Interesse dar, und doch ist ein Punkt bei der Strohn Mühle, wo ein gewaltiger Lavaström von dem Wartenberg sich in das Thal ergossen hat, wenn auch nur auf eine kurze Strecke, einer der ausgezeichnetsten malerischen Punkte der Eifel.

Die Endert, welche bei Cochem mündet und zwischen Kaiserfisch und Lägerath von der Coblenz-Trierer Landstraße durchschnitten wird, bietet hier eine überaus wilde Waldgegend dar, die in früherer Zeit oft der Schauplatz gräßlicher Raubmorde war, woher das Thal auch das Marderthal genannt wird, obgleich es eigentlich nach einer Kapelle des heil. Martin Martinthal heißt. Im untersten Theile liegt die prächtige Winneburg, das Stammschloß der Fürsten von Metternich, auf einem ungeheuren Grauwadefelsen.

Die Elz, in der Nähe des Hochfelsens entspringend, hat einen Lauf von fünf Meilen, bildet sich auf dem Plateau der Eifel aus vielen Quellschichten und schneidet dann tief in das Gebirge ein, doch ist pittoreske Scenerien bildend. Das enge Thal, aus welchem sich auf grauem Gestein die grauen Trümmer von Montcalen erheben, die prachtvolle Partie von Premont mit einem ansehnlichen Wasserfall, die tiefe Schlucht mit der ansehnlichen Burg Elz auf einem Hügel, gehören zu den interessantesten Punkten der Eifel. In der Hochselt, in der Nähe der Hochacht und der Würzburg, entspringen die Bäche Netze und Niz, welche sich eine Stunde oberhalb Mayen vereinigen. Der Lauf der Netze beträgt sechs Meilen, und ihre Mündung liegt der

freundlichen Rheinstadt Neuwied gegenüber. In dem Rhine thale sind Birneburg und St. Joß und in dem Mettertale Kempenich, Mayen und Barmesd sehr werthe Punkte. Besonders anziehend ist die Umgebung der noch erhaltenen Burg Mürrerheim, wo beide Bäche, Niz und Netze, sich vereinigen, und hoch darüber sich der erloschene Krater des 1780 J. hohen Hochsimmer erhebt.

Die Brohl hat einen kurzen Lauf von nicht drei Meilen; das Thal ist aber durch seine Zuflüsse von großer Wichtigkeit, und an schönen Punkten fehlt es ihm auch nicht. Besonders sehenswerth sind die Trümmer von Disbrück mit der ausgebreiteten Aussicht und das liebliche Thal von Tönningstein.

Rein Eifelthal aber bietet malerischere, wildere und ausmuthigere Landschaften dar, als das der Ahr; keins ist so kannter und besuchter, aber auch keins ist leichter erreichbar und zugänglich, da es größtentheils von guten Landstraßen durchzogen ist. Der Lauf der Ahr, welche bei mehr als 1400 F. a. h. zu Blankenheim in sehr interessanter Gegend entspringt, besitzt eine Entwicklung in einer Länge von zehn Meilen. Anfangs durch bewaldeten Kalk gehend, schneidet sie bald tief in die Grauwade ein, bei Aremberg 700 bis 1000 F. hohe Abhänge bildend. Der Basaltkegel, welcher die Trümmer der ehemals ausgebreiteten Burg Aremberg trägt, erhebt sich zu 2000 F. a. h. Später tritt die prächtige Partie von Schuld ein und endlich die von Akenabr mit ihren fast senkrechten Felswänden, ihren grotesken Bergformen und ihren wunderlichen Krümmungen. Diese Partie hat eine Ausdehnung von drei Stunden und schließt bei Ahrweiler, worauf das Gießbüsch in das Rheintal eintritt, nachdem es noch höchst anmuthige Gefilde besitzt ab. Doch erheben sich auch hier die 1000 F. hohen Basaltkegel des Neuenahr und der Landstrome. Die warmen Quellen von Neuenahr, am Fuße des gleichnamigen Berges entspringend und erst in neuerer Zeit entdeckt, sind zu sehr heilkräftigen und schnell in Ruf gekommen Fäbren eingerichtet.

Nach Norden entströmen der Eifel nur zwei ansehnliche Flüßchen, die Eist und die Roer, die ihr auch nur zu einem kleineren Theile angehören. Die Eist entspringt am Fuße des 1870 F. hohen Basaltkegels, der die weithin sichtbare Michaelskapelle trägt, durchschneidet den bewaldeten Kalk, durchfließt das freundliche Städtchen Mülser-Eifel und tritt bald nachher, oberhalb Querschen, in die niederdeutsche Ebene ein, um sich unterhalb Rues mit dem Rheine zu verbinden.

Die Roer erhält ihren Ursprung aus zahlreichen Rieselchen der wasserreichen hohen Ahr, die sie trägt in mannigfachen Windungen durchzieht. Bei Katterberg schneidet sie tief in das Schiefergebirge ein, geht die Montjoie durch ein tiefes, felsiges Thal, das weiter unterhalb bei Heimbach und Niedeggen landschaftliche Reize entwickelt, woran ihre Zuflüsse Elff und Ues auch nicht arm sind; namentlich hat das Thal von Schieren liebliche Partien. Bei Düren tritt die Roer in die Ebene, nimmt die das reiche Kohlendünen von Eschweiler durchziehende Inde auf und ergießt sich nach längerem Laufe bei Roermünde in die Naah.

Die Schilderung der interessanten Eifelscenen mehr in's Einzelne zu führen, gestattet hier der Raum nicht.





# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Kie und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 21.** [Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

**26. Mai 1869.**

**Inhalt:** Das deutsche Salzland, von Karl Müller. 3. Die Grundbestandtheile der Salzflor. Die Gifel, von Ph. Wirtgen. Vierter Artikel. — Ueber die Natur der Arbeit. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Menschen, von N. G. Grandjean. Dritter Artikel.

## Das deutsche Salzland.

Von Karl Müller.

### 3. Die Grundbestandtheile der Salzflor.

Wenn man alle diejenigen Pflanzen bezeichnen soll, welche dem Salzboden angehören, so kommt man einigermaßen in Verlegenheit, weil nicht alle Salzpflanzen sind, welche auf Salzboden erscheinen können. Ich habe dergleichen Arten schon im ersten Artikel aufgezählt. Es gibt offenbar drei Klassen von Pflanzen, die eine Salzflor zusammensetzen: solche, die zufällig in sie gerathen und doch in ihr ausbauen können, wenn die Salzflüssigkeit schwach genug ist (salzvage); solche, die das Salz lieben, aber auch ohne dasselbe vegetiren (salzholde); solche endlich, die nur an das Salz gebunden sind (salzstete). Jedenfalls hat man die beiden letzten Klassen zusammenzufassen, die erste Klasse auszuscheiden. Hiernach gestaltet sich das Bild der deutschen Salzflor, von den nordischen Meeresküsten bis zur Adria gerechnet, folgendermaßen:

1. Ranunculaceen.
1. Delphinium Staphysagria.\*
2. Crucifern.
2. Cochlearia officinalis.
3. — Danica.
4. — Anglica.
5. Malcolmia maritima.\*
6. Lobularia maritima.\*
7. Cypripedium Jonckheapi.\*
8. Lepidium latifolium.
9. Capsella procumbens.
10. Cakile maritima.\*
11. Crambe maritima.
3. Ellenaceen.
12. Silene vespertina.\*
4. Alfineen.
13. Sagina maritima.\*
14. Spergularia salina.\*
15. Spergularia marginata.\*
16. Honckeyna peploides.\*
5. Malvaceen.
17. Althaea officinalis.
6. Linaceen.
18. Linum striatum.\*
19. — maritimum.\*
7. Papilionaceen.
20. Medicago maritima.\*
21. — littoralis.\*
22. Melilotus dentatus.
23. Trifolium maritimum.\*
24. Pisum maritimum.
25. Lathyrus inconspicuus.\*
8. Tamaricaceen.
26. Tamarix gallica.\*
27. — africana.\*



9. Umbelliferen.  
 28. *Eryngium maritimum*.†  
 29. *Fethuophora spinosa*.\*  
 30. *Apium graveolens*.†  
 31. *Bupleurum tenuissimum*.†  
 32. *Critium maritimum*.\*
10. Dipsaceen.  
 33. *Scabiosa veronica*.\*
11. Compositen.  
 34. *Aster Tripolium*.†  
 35. *Inula cithoides*.\*  
 36. *Artemisia rupestris*.  
 37. — *laciniosa*.  
 38. — *maritima*.  
 39. — *coarulescens*.\*  
 40. *Sonchus maritimus*.\*  
 41. *Crepis bulbosa*.  
 42. *Tragopogon floccosus*.†
12. Necteebladen.  
 43. *Cynanchum acutum*.\*
13. Krocneen.  
 44. *Apocynum Venetum*.\*
14. Gentianeen.  
 45. *Erythraea linariaefolia*.  
 46. — *pulchella*.  
 47. — *maritima*.\*  
 48. — *spicata*.\*
15. Genteebladen.  
 49. *Convolvulus Soldanella*.†
16. Scrophulariaceen.  
 50. *Linaria littoralis*.\*  
 51. — *odora*.  
 52. *Stachys maritima*.\*  
 53. *Teucrium scordoides*.\*
17. Acanthaceen.  
 54. *Acanthus mollis*.\*  
 55. — *longifolius*.\*
18. Primulaceen.  
 56. *Samolus Valerandi*.†  
 57. *Glaux maritima*.†
19. Plumbagineen.  
 58. *Statice maritima*.  
 59. — *Gmelini*.  
 60. — *Linum*.†  
 61. — *globulariaefolia*.\*  
 62. — *caspia*.\*
20. Plantagineen.  
 63. *Plantago maritima*.†  
 64. — *Coruui*.\*  
 65. — *recurvata*.\*  
 66. — *Cornopus*.†  
 67. — *Cynops*.\*
21. Chenopodiaceen.  
 68. *Scleroderia frutescens*.\*  
 69. — *maritima*.†  
 70. *Salsola Kali*.†  
 71. — *Soda*.\*  
 72. *Salicornia herbacea*.†  
 73. — *frutescens*.  
 74. *Corsipermum intermedium*.  
 75. — *Marschallii*.  
 76. *Kochia scoparia*.\*  
 77. — *hirsuta*.  
 78. *Beta maritima*.†  
 79. *Obola portulacoides*.†
22. Obione pedunculata.  
 80. *Atriplex littoralis*.†  
 81. — *basaltum* (*salifolium*).  
 82. — *Polagoneen*.  
 83. *Rumex maritimus*.†  
 84. *Polygonum maritimum*.  
 24. Elaganeen.  
 85. *Hippophae rhamnoides*.†  
 25. Euborbiaceen.  
 86. *Euphorbia Paralias*.\*  
 87. — *Pepis*.\*  
 26. Juncagineen.  
 88. *Triglochin maritima*.†  
 27. Potameen.  
 89. *Potamogeton maritimus*.  
 90. *Ruppia maritima*.†  
 91. — *rostellata*.  
 92. *Zannichellia pedicellata*.  
 93. — *polycarpa*.  
 28. Najadeen.  
 94. *Zostera marina*.†  
 95. — *asna*.  
 29. Eiliaceen.  
 96. *Allium Chamaemoly*.\*  
 30. Juncaceen.  
 97. *Juncus maritimus*.†  
 98. — *acutus*.\*  
 99. — *pauciculatus*.\*  
 100. — *Balticus*.  
 101. — *Gerardi*.†  
 31. Hypericeen.  
 102. *Cyperus glomeratus*.  
 103. *Schoenus mucronatus*.\*  
 104. *Scirpus parvulus*.†  
 105. — *littoralis*.  
 106. — *maritimus*.†  
 107. *Carex hordeistichos*.†  
 108. — *extensa*.†  
 109. *Blasmus rufus*.  
 32. Gramineen.  
 110. *Phleum arenarium*.†  
 111. *Spartina stricta*.  
 112. *Polygonum littoralis*.\*  
 113. *Amphipolia arenaria*.†  
 114. — *Baltica*.  
 115. *Poa loliacea*.\*  
 116. *Glyceria procumbens*.  
 117. — *festuaceiformis*.\*  
 118. — *maritima*.  
 119. — *distans*.†  
 120. *Dactylis littoralis*.\*  
 121. *Tricolum junceum*.†  
 122. — *strictum*.  
 123. — *acutum*.†  
 124. — *rigidum*.  
 125. — *pungens*.  
 126. *Elymus arenarius*.  
 127. *Hordeum maritimum*.†  
 128. *Lepurus incurvatus*.†  
 129. — *illiformis*.†  
 130. — *cylindricus*.\*  
 33. Juncaceen.  
 131. *Ophioglossum Lusitanicum*.\*  
 34. Raubmoose.  
 132. *Potia Heilmii*.

Nach dieser Liste gibt es 33 Familien der Gefäßpflanzen, welche 131 ächte Salzpflanzen liefern. Obenan stehen

die Gräser mit 21 Arten; dann folgen die Chenopodiaceen mit 15, die Cruciferen mit 10, die Compositen mit 9, die Euphoraceen mit 8, die Papilionaceen mit 6, die Plumbagineen, Plantagineen, Umbelliferen, Potameen und Juncaceen mit je 5, die Alismen und Gentianeen mit je 4, die Lineen, Tamariscineen, Scrophulariaceen, Labiaten, Acanthaceen, Primulaceen, Polgoneen, Elaganeen und Najadeen mit je 2 Arten; die Ranunculaceen, Elicaceen, Malvaceen, Dipsaceen, Atriplexaceen, Apocynaceen, Convolvulaceen, Elaganeen, Juncagineen, Eiliaceen und Juncaceen mit je 1 Art. Folglich bilden auch bei uns die Weidengewächse unter den dicotyledonischen Pflanzen den Hauptbestandtheil der Salzflora, wie sie ihn überall in allen Salzsteppen bilden. Nur bemerken wir sehr wenige strauchartige Pflanzen darunter, obgleich gerade die Weidengewächse sehr reich an diesen Formen sind. Auch fallen, mit Ausnahme von *Obione portulacoides*, ihre Strauchformen (*Scleroderia frutescens* und *Salicornia frutescens*) auf den Süden, so daß sich selbst unter der geringen Zahl von Salzpflanzen unseres Florenzgebietes das Geseß auffallend zeigt, wie erst nach dem Süden zu die holzartigen Pflanzen zunehmen. Die wenigen anderen Sträucher des Salzlandes (*Tamarix gallica*, *africana*, *Plantago Cynops* und *Hippophae rhamnoides*) machen davon keine Ausnahme, denn obgleich der letztgenannte Art, der bekannte Audorn, sich im Norden, besonders auf der Küste des Samlandes, in Dipsyrien und auf Sigeland eingebürgert hat, so gehört er doch, streng genommen, mehr dem Süden an. Dagegen überwiegen die dicotyledonischen Gewächse um ein Bedeutendes, da sie mit 87 Arten 43 monocotyledonischen gegenüberstellen, folglich genau das Doppelte betragen. Das ist um so bemerkenswerth, als die Monocotyleen erst gegen den Aequator zunehmen, und entspricht genau dem Charakter unserer gemäßigten Zone, in welcher die Dicotyleen überwiegen. Andererseits hat diese Thatsache noch das besondere Interesse, daß, im Widerspruch hiezu, nur monocotyledonische Arten im Salzwasser selbst bei uns leben; wie die oben aufgeführten 7 Potameen und Najadeen bezeugen. Auffallend ist die Armuth des Salzlandes an troptogamischen Gefäßpflanzen; es besitzt nur ein einziges Juncaceenkraut und auch das erst im Süden. Von den höchsten Juncaceenpflanzen ist mit bisher nur ein einziges Raubmoos (*Potia Heilmii*) vorgekommen, dessen Salznatur ich über allen Zweifel stellen kann. Nur die einsackigen Juncaceenpflanzen, die Agrosten und Protophyten, dürfen als der eigentliche Reichtum des Salzwassers angesehen werden. Da sich jedoch deren Existenz mehr an die Steinschicht und nicht an das Salzland bindet, so muß ich sie an diesem Orte von unsrer Betrachtung ausschließen.

An und für sich bilden die 131 Gefäßpflanzen des mitteleuropäischen Salzlandes genau  $\frac{1}{10}$  aller Gefäßpflanzen unseres weiten Florenzgebietes oder  $\frac{1}{100}$  aller Gewächse Deutschlands. Doch sind dieselben höchst ungleich vertheilt. Gegen 56 Arten kommen nur dem Süden zu, und diese sind in

der obenstehenden Liste mit einem \* bezeichnet worden. Sollten sich also Zweifel dagegen erheben, daß man die Salzpflanzen des abriatischen Nordens noch zu dem deutschen Biotengebiet rechnen könne, so würden die achtdeutschen Halophyten auf etwa 74 Arten herabsinken. Gegen 43 Arten theilt außerdem der Norden mit dem abriatischen Meerestande; rechnet man auch diese ab, so bleiben für den Norden nur etwa 30 Arten als eigenthümlich übrig. Die Pflanzen, welche er mit dem abriatischen Gebiete theilt, habe ich in der obigen Liste mit einem † versehen. Daraus folgt aber, daß der Süden mit 56 eigenthümlichen Arten eine reichere Salzflor überhaupt besitzt, als der Norden. Von diesen nordischen Arten erscheinen aber nicht alle gleichmäßig an der Nord- und Ostsee. Etwa 6 Arten sind schon von vornherein abzuheben, weil sie nur im Binnenlande vorkommen: *Kochia scoparia*, *Artemisia rupestris*, *lacinolata*, *Capsella procumbens*, *Potamogeton marinus* und *Carex hordelstichos*. Dann fallen auf die Nordseeküste 58, auf die Ostseeküste 65 Arten, und letztere hat vor der erstern 7 Arten voraus. An und für sich selbst aber hat die Ostseeküste 12 Arten, welche der Nordseeküste nicht zukommen: *Lepidium latifolium*, *Crambe maritima*, *Althaea officinalis*, *Melilotus dentatus*, *Tragopogon floccosus*, *Linaria odora*, *Corispermum intermedium*, \**Marschallia*, *Obione pedunculata*, *Scirpus parvulus*, \**Glyceria procumbens* und *Trilecium striatum*, unter denen die mit einem \* bezeichneten nur als unbekannte Wanderpflanzen angesehen werden können. Sie sind fast durchgehends solche, welche einen schwächeren Salzgehalt des Bodens vorsehen. Dagegen hat die Nordseeküste nicht mehr als 7 Arten, welche sich der Ostseeküste zwar nähern, aber ihr nicht angehören: *Convolvulus Soldanella*, *Statice maritima*, *Beta maritima*, *Zostera nana*, *Triticum pungens*, *Hordeum maritimum*, *Lepturus filiformis*.

Von diesen nordischen Meerstrandpflanzen verlassen 34 Arten niemals freiwillig die Ufer des Meeres, oder sie wandern nur unbedeutend in das Binnenland einwärts: *Cochlearia Danica*, *anglica*, *Cakile* und *Crambe maritima*, *Lepidium latifolium*, *Honckenya perfoliata*, *Pisum* und *Eryngium maritimum*, *Tragopogon floccosus*, *Convolvulus Soldanella*, *Linaria odora*, *Statice maritima*, *Limonium*, *Corispermum intermedium*, *Marschallia*, *Kochia hirsuta*, *Beta maritima*, *Atriplex littoralis*, *Zannichellia polycarpa*, die *Zostera* :Arten, *Juncus maritimus*, *Balticus*, *Carex extensa*, *Ammophila Baltica*, *Glyceria procumbens*, *maritima*, sämtliche *Triticum* :Arten, *Hordeum maritimum* und die *Lepturus* :Arten. Es gehören folglich dem Binnenlande 40 Salzpflanzen an: *Cochlearia officinalis*\*, *Capsella procumbens*\*, *Sagina maritima*\*, *Spergularia salina*, *marginata*, *Althaea officinalis*, *Melilotus dentatus*, *Apium graveolens*, *Bupleurum tenuissimum*, *Aster Tripolium*, *Artemisia maritima*\*, *rupestris*\*, *lacinolata*\*, *Erythraea linariaefolia*, *pulchella*,

*Samolus Valerandi*, *Glaux* und *Plantago maritima*, *Pl. Coronopus*\*, *Schoberia maritima*, *Salsola Kali*\*, *Salicornia herbacea*, *Kochia scoparia*\*, *Obione pedunculata*\*, *Atriplex hastatum*, *Rumex maritimus*, *Triglochin maritima*, *Potamogeton marinus*\*, die *Ruppia* :Arten, *Zannichellia pedicellata*\*, *Juncus Gerardi*\*, *Scirpus parvulus*\*, *maritimus*, *Carex hordelstichos*\*, *Blysmus rufus*\*, *Phleum arenarium*\*, *Ammophila arenaria*, *Glyceria distans*, *Elymus arenarius*. Daß von diesen 40 Pflanzen 6 nur dem Binnenlande zukommen, ist schon oben erwähnt worden. Doch sind sie nicht an allen Salzpunkten zugleich vertreten. Etwa die Hälfte der Arten kommt nur höchst zerstreut vor und bildet an den betreffenden Wohnorten deren charakteristische Eigenthümlichkeiten. Ich habe sie durch einen \* ausgezeichnet. Die übrigen Halophyten können allein zu den kosmopolitischen Arten gezählt werden. Die vorigen dagegen überspringen oft eine Menge von Orten und weichen oft so aufeinander, daß man um einen Erklärunggrund verlegen werden möchte. So reihen sich z. B. doch die Standorte des niedlichen *Scirpus parvulus*, der, kaum spanienlang, schwerlich verschleppt wird, von Schleswig bis zum Stranbgebiete der Insel Rügen ziemlich dicht aneinander; im Binnenlande aber erscheint er nur an den beiden Mansfeldischen Seen bei Eisleben und erst nach langer Unterbrechung am Littorale bei Wustfalken. *Kochia scoparia*, sonst nur im Süden vom Littorale bis nach Mähren und Böhmen vordringend, kam vor einem halben Menschenalter noch an dem salzigen Mansfelder See vor. *Obione pedunculata* überspringt von den nordischen Küsten alle Salzorte und erscheint nur in den Salzmulden von Artern und Waageburg. *Cochlearia officinalis* geht nur westlich durch Westphalen in das Binnenland. Die garte *Capsella procumbens* beschränkt sich im Norden auf die Salzmulden von Artern und Staffurt, um dann plötzlich wieder in Südtirol, im Riesengau aufzutreten. *Sagina maritima*, an der nördlichen und südlichen Meeresküste zugleich, erscheint im Binnenlande blos am Staffurt bei Großsalsa an den Salinen. *Artemisia maritima* springt von den nordischen Küsten bis zu den Salinen von Artern und bis an den salzigen See bei Eisleben; *A. rupestris*, auch auf Irland, hat sich im Rineburg'schen bei Klein-Gußborn, bei Artern und bei Staffurt niedergelassen, während es erst in Tirol wieder auftaucht; *A. lacinolata* kommt sogar nur bei Artern und Staffurt vor, hat aber ihren Centralpunkt in Sibirien. *Plantago Coronopus*, obgleich an der Nord- und Ostsee, geht mit der Eins von der Nordsee bis zur Münster'schen Mühle bei Rheine, überspringt die Gens Iles und taucht erst wieder bei Triest auf. *Potamogeton marinus* beschränkt sich auf Land- und Salzseen der daltischen Ebene und tritt dann im Süden bei Klagenfurt auf. *Ruppia maritima* springt von, der Nord- und Ostsee in das Fürstenthum Göttingen zum Denkerbus-

fer Sumpfe, erscheint aber erst an der Atria wieder. *R. rostellata* macht denselben Sprung bis in die Soolgräben von Atrera, Frankenhäusen, der Rumburg und bis zum Salzsee von Cisleben. *Juncus Gerardi* fehlt einer Menge von Salzorten, obschon er an den Meeresküsten und an andern Punkten des Binnenlandes gemein ist. Ebenso springt *Carex hordeolifolia* vom Mansfelder Salzsee bis

nach Rheinfessen mannigfach herum, wie es Blyssus rufus in der baltischen Ebene und in der Provinz Sachsen vollbringt. *Phleum arenarium* schließlich, das am Meere von Ostfriesland bis Mecklenburg reicht, wandert rheinaufwärts bis Mainz und findet erst am adriatischen Meere eine zweite Heimat wieder. Ich werde im nächsten Artikel eine Erklärung dieser sonderbaren Vertheilung versuchen.

## Die Eifel.

Von P. W. Wiegand.

Zweiter Artikel.

Vor allen andern rheinischen Gebirgen, ja fast vor allen deutschen ausgezeichnet ist die Eifel durch ihre Vulkanität.

In einer Zeit, von der uns nicht eine geschichtliche Nachweisung vorliegt, in welcher noch kein menschliches Wesen hier wandelte und keine menschliche Thätigkeit mit der erbebenden Erde zu kämpfen hatte, flammten hier zahlreiche Vulkane und ergossen ihre glühenden Lavaströme über die Rücken der Berge und in die Tiefen der Thäler. Aber diese vulkanische Thätigkeit fand an den verschiedenen Punkten der Eifel nicht gleichzeitig statt. Viele ergossen ihre Lavaströme über Berggründen, die sich jetzt nach beiden Seiten in Thäler abdachten, in welche sie sich ergossen haben mußten, wenn die Thäler vorhanden gewesen wären. Andere Lavaströme haben bei dem Abflusse des Rheins aus dem Coblenzer Neuwieder Becken sich in Höhen von 400 bis 500 F. mit den Schieferungen desselben verbunden, noch andere sind in die Tiefen schon ganz ausgespülter Thäler gestürzt und haben denselben andere Gestalt und Richtung gegeben. Endlich liegt das rodukt des letzten vulkanischen Ausbruchs, der Basaltstein, auf der letzten Diluvialabildung, dem Löss, oder mit demselben wechselnd. Die Thätigkeit der Eifel-Vulkane erstreckte sich also aus der Tertiarzeit bis in die Zeit der jetzigen Gestaltung unserer Gegend. Auch die unseren Vulkanen angehörigen Luffe enthalten Pflanzenreste der Tertiarperiode, während an anderen Punkten nur Reste der gegenwärtigen Flora in denselben enthalten sind.

Die Vulkane des gesamten Eifelgebietes kann man leicht in zwei Systeme unterscheiden, das rheinische und das Eifeler Vulkan-System.

Die rheinischen Vulkane liegen zwischen der unteren Mosel und der unteren Ahr und gehen von dem Rheine nur höchstens drei Meilen landeinwärts. Größtentheils gehören sie dem Moselle an. Das Becken des Raacher Sees ist ihr Mittelpunkt, und die Bäche Netze und Brohl durchbrechen oder berühren an vielen Stellen ihre Lavaströme oder ihre Luffmassen. Die Höhe ihrer Regel schwankt zwischen 500 und 1700 F. über dem anliegenden Spiegel des Rheines, und die Zahl derselben beläuft sich auf mehr als dreißig. Krater lassen sich noch ungefähr fünfzehn deutlich erkennen.

Außerdem besteht noch eine ganze Anzahl der hier aufstretenden Regel, die eben aufgezählten nicht inbegriffen, aus Luff oder Leucitophor oder Nephelinit oder aus Trachit und trachitischen Gebilden und andern plutonischen oder ungeschichteten Gesteinen.

Die sämtlichen hierher gehörigen Vulkane kann man in sechs Gruppen zusammen stellen: die des Carmelensberges und der Wannenköpfe südlich der Netze; die der Humeriche und der Wapener Vulkane nördlich der Netze; endlich die noch weiter nördlich gelegenen Gruppen des Raacher Sees und des Brohlthales, von welchen erstere nur theilweise am Rande des Moselles liegen, die letzteren denselben gar nicht angehören. Außerdem finden sich noch einige verzelte Vulkane zwischen dem Raacher See und dem Rheine. Von diesen liegt der Warckbühler Kopf unterhalb Andernach am weitesten nach Osten, unmittelbar auf dem Rande des Rheintals, und erhebt sich als wirthin sichtbarer Regel, 820 F. über den Spiegel des Flusses, in dessen Fluthen sich sein mächtiger Lavaström ergossen hat. Wer auf der Eisenbahn von Andernach rheinwärts fährt, kommt sehr bald unterhalb dieser Stadt bei dem kleinen Dörfchen Fornich, an den mächtigen Säulen vorbei, mit welchen der Lavaström am Bergabhang anstiegt.

Die durchschnittliche Höhe der Carmelensberger Gruppe beträgt 1000 bis 1200', die der Wannenköpfe 800—900', die der Humeriche 900 bis 950', die der Wapener Berge 1500 bis 1800'. Es erscheint auffallend, daß die meisten dieser Berge von gleichen Kräften gehoben zu sein scheinen, indem sie sich nur selten mehr als 500' über das anliegende Plateau erheben.

Der Carmelensberg, dessen 1210' hoher Gipfel sich am südwestlichen Rande des Coblenzer-Neuwieder Beckens erhebt, ist ein ganz und gar aus Schladen bestehender Regel, mit einer Kapelle gekrönt, von welcher man das Rheintal, das ganze anliegende Moselthal, über die Moselberge hin bis weit zum Hundsrück und sogar einige Gipfel der Taunushöhe überschauen kann. Mehrere minder hohe Schladensregels, der Schweinstopf, der Solomaid und der Birkelkopf schließen sich nach Osten an. In dem letzteren sind Alluvialgeschiebe mit Lava zu einem Conglomerat verbunden.

Der äußerste südöstliche vulkanische Punkt ist der Reutskopf über Winnigen an der Mosel.

Die Gruppe der Wannen, aus acht Kegeln bestehend, ist ebenfalls ganz aus Schladen gebildet und enthält drei noch deutliche Krater. Ein ungeheurer Lavaström von mehr als einer halben Meile Länge und bedeutender Breite geht von ihnen aus und senkt sich allmählig bis fast zur Sohle des Rheinthales herab, wo er, kaum eine halbe Meile vom Rheine entfernt, bei Miesenheim endet. Bei der Kaufschensmühle ist er von der Mette durchbrochen, wo die Natur mit einiger Nachhülfe der Kunst ein reizendes Landschaftsbild geschaffen.

Die dritte Gruppe, die der Humericher (landesübliche Aussprache für hoher Berg, Homerich) wird aus schönen Kegeln gebildet, von welchen drei noch sehr deutliche Krater zeigen, der Pfeidter Humerich, der Tönchberg (Antoniussberg) und der Nikenicher Weinberg, der niedrigste aller hierigen Schladenkegel. Der Kraterrand des Tönchberges ist zum größten Theil noch als deutlicher Wall vorhanden; nur ein Ahtel desselben steht wie ein vereinzelter Hügel nördlich davon im Freie. Der Krater des Kruster Humerichs (Cortersberg) ist weniger deutlich. Der Pfeidter Humerich beherrscht die Straßen der kaum eine halbe Meile auf dem rechten Rheinufer entfernt liegenden Stadt Neumied.

Die Wannenberge entfernen sich bis zu drei Meilen von dem Rheine und bilden wieder zwei Gruppen von ungleicher Höhe und verschiedenem Alter. Zunächst bei Wannen liegen die über 1200' hohen Wülenberge mit dem Gottenheimer Büden, die Ränder eines mächtigen eingestürzten Kraters; etwas weiter entfernt liegen der Hochsinner, der Sulzbusch und der Forst, alle über 1800' hoch, mit Lavaströmen von sehr bedeutender Ausdehnung und technischer Wichtigkeit.

Auf dem großen, fast kreisrunden Rande des Raacher Bodens, der sich von 100 bis mehr als 600' über den Spiegel des Sees erhebt, während dieser 700' über dem Rheinpiegel bei Andernach liegt, finden sich drei ausgezeichnete Vulkane von 600' relativer Höhe, der Reutskopf, der Kruster Efen und der Rothenberg. Ihre Lavaströme gehen in das Seeboden hinab, das als ein ungeheurer Explosionskrater erscheint. Dieser See gebiet zu den ehemals zahlreichen Maaren der Eifel und wird noch in nähere Betrachtung gezogen werden.

Die Vulkankegel des Broththales, der Kuntskopf, der Herchenberg, der Bausenberg, der Dachsbusch, erreichen eine absolute Höhe von ungefähr 1000' und zeigen noch sehr schöne Krater, deren Ränder zum Theil einwärts sind, und ausgebreitete Lavaströme. Der Reutskopf ist der niedrigste derselben, kaum 900' hoch, nahe am Rheintal und besteht ganz aus zusammen gebadenen Wapilli mit getrittenen Grauwackenflächen und Fußgeschichten, die einen sehr festen Zusammenhang haben; in den Zwischenräumen befinden sich zahllose Arragonitnadeln.

Die Producte dieser rheinischen Vulkane bestehen in Nephelin- und Augitlava, in Schladen, Tuffstein in verschiedenen Formen und Bimsstein.

Der Tuffstein (Duckstein) kommt in sehr bedeutender Bedeckung vor und bildet westlich von Raach Höhen von 1600 bis 1800'; er fällt nordwestlich von Raach das bereits tief eingeschnittene Broththal bis zu einer Höhe von über 200' und einer Länge von einer Meile, während ein anderer Strom von kaum geringerer Länge sich in südöstlicher Richtung bei Weiden in das Rheintal ergoß.

Wir kommen zu dem Eiser Vulkan-Systeme. Dieses Eisel-System besteht aber nicht aus einer großen Anzahl fast unregelmäßig durcheinander gewürfelter Vulkane oder, wenn man will, einer Centralparthie, um welche alle anderen sich herumhaaren; sondern dieses System bildet eine sieben Meilen lange, von Südosten nach Nordwesten gerichtete Spalte, die bei Bertrich in der Nähe des Moseltalles beginnt und an der nordöstlichen Spitze der Schneifel, bei Demond, endigt. Die größte Breite dieser Spalte, zwischen Birresborn und Hillesheim, umfaßt zwei Meilen. Sie ist hauptsächlich in die Gobleng-Schichten der bedonischen Grauwacke eingeschnitten; doch hat sie auch den bedonischen Eifelkalk und den Wunsanschiefer durchbrochen. Dazu find noch einige kleinere isolirte Punkte zu zählen, unter welchen der von Manderscheid der großartigste ist.

Die dazu gehörigen Kegel, oft mit den deutlichsten Kratern versehen, sind natürlich meist von bedeutender Höhe, als die rheinischen, da die Plateaus, auf welchen sie sich erheben, auch eine bedeutendere Höhe haben. Der höchste Vulkankegel ist der 2134' hohe Erenenberg, zwischen Kirchweiler und Dackweiler; in seiner Nähe liegen noch der Gouberg 1855', der Feisberg 1836', der Elerenberg 2032', der Kipfort 2022', der Reuther Kopf 2001', das Hörsfeld 1933', der Dohmberg 1916', der Schartenberg 2094' und andere.

Diesem Centralpunkte schließen sich nach Südosten die Gullenfelder Vulkane, der Maarberg, der Körnerberg und der Wartheberg, alle zwischen 1400 und 1500' hoch, an; daran reihen sich noch weiter südlich die Bertricher Vulkane, Falkenfel 1276', Hörschen 1262 und Fackerbösch 1254'. Das nördliche Ende bildet der Gouberg bei Demond 2217'.

Aus der Vergleichung der Plateauhöhe mit der Gipfels Höhe der darauf stehenden Vulkane ergibt sich, daß die Kraft, welche die Kegel empor gehoben, überall in gleichen Verhältnissen wirkte, daß aber die Wirkungen um so stärker waren, je bedeutender die Plateauhöhe war. Nur der Gouberg bei Demond macht hiervon eine sehr auffallende Ausnahme, der, auf einem Plateau von 1800' lagend, sich nur 200' über dasselbe erhaben tat. Man darf überhaupt aber auch nicht vergessen, daß die Ausbreitkräfte nicht überall gleich stark sein konnten, und daß selbst auf bedeutende auch schwache Eruptionen stattfinden konnten, wie dieses

g. B. das Breichen bei Kirchweiler ergibt, welches sich kaum 60' über das anliegende Plateau erhebt.

Die Eruptionsprodukte dieser erloschenen Vulkane sind meist Augitlava, häufig so dicht, daß sie dem Basalte ganz ähnlich ist, jedoch oft auch sehr porös und häufig durchaus schladig, namentlich auf der Spitze der Krater und auf der Oberfläche der Lavaströme. Luff tritt ebenfalls auf, aber meist in sehr geringer Bedeutung. Nur zu Weimen erreicht er eine sehr große Mächtigkeit, da der dortige Krater nur Schlammlava ergossen hat, die in zahlreichen Schichten an den Rändern des dortigen Maars, worüber wir später noch sprechen werden, aufgelagert ist. Bimsstein fehlt der Eifel ganz und gar.

Die vulkanischen Parthien von Wollmerath, von Uelmen, von Drees und von Boss bilden Verbindungsglieder zwischen dem Eifel und dem rheinischen Systeme.

Es kann unsere Absicht nicht sein, an dieser Stelle die Vulkane der Eifel mit allen ihren Erscheinungen im Einzelnen durchgehen zu wollen; nur daß sie hier vergönnt, einzelne besonders merkwürdige Parthien etwas näher hervor zu heben. Wer sich näher über die Vulkanität der Eifel unterrichten will, dem kann die vortreffliche Schrift „die Vulkane der Eifel von H. v. Dechen, Bonn, 1861.“ nicht genugsam empfohlen werden. Es spricht sich aus derselben die genaueste Kenntniß der Verhältnisse und ein möglichst bestimmtes Urtheil mit der größten Klarheit der Darstellung aus.

Der Mosenberg bei Manderscheid. Dieser Berg, nur 1628' hoch und sich also nur 400' über das 1200' hohe anliegende Plateau erhebend, ist einer der merkwürdigsten, man kann auch sagen, imposantesten Eifelvulkane; es ist dies ein Urtheil, das schon vor mehr als fünfzig Jahren von dem genauen Kenner der Vulkane der Eifel, dem Grafen Montlosier, ausgesprochen und seither häufig wiederholt wurde. Der Mosenberg, auf dem Plateau zwischen der kleinen Kyll und der Salm, westlich von Manderscheid, südöstlich von Bettenfeld liegend, tritt auf demselben wie eine große, rothbraune, jagdicke Insel aus dem prächtigen Grün der umgebenden Felder und Wälder hervor, und namentlich gewährt er, wenn man sich ihm von Süden nähert, eine großartige und auffallende Ansicht. Von bedeutender Höhe ist er nicht, denn seine höchste Spitze ragt kaum 200' über das nadeliegende Dorf Bettenfeld hinaus; jedoch erhebt er sich majestätisch aus dem Thale der kleinen Kyll, die seinen Fuß unmittelbar bespült, über 700'. Von ferne gesehen, zeichnet er sich durch vier fast gleich hohe und eine mittlere höchste Spitze aus, zwischen welchen drei sehr deutliche Krater liegen. Zwei derselben liegen ganz trocken; ein dritter, der Wangenboden, enthält ein kleines Maar von ca. 600 Schritten im Umfang, während sein Schlackenrand von ca. 50' Höhe einen Kreis von doppelter Ausdehnung beschreibt. Dieser kleine Krater liegt 200' unter der höchsten Spitze. Ein vierter Krater, das Hinkelmaar, ist eben-

falls von einem kleinen Wasserspiegel gefüllt und hat genau dieselbe Form, dieselben Dimensionen und einen fast gleichen Schlackenrand, wie der Wangenboden, nur daß es noch mindestens 60' tiefer als jener liegt und selbst in das Plateau eingesenkt ist. Von der Südwestseite des größten Kraters ging ein Lavaström aus, welcher den südlichen Fuß des Berges umfloß und eine Schlucht ausfüllte, die in das Thal der kleinen Kyll mündete. Die Länge dieses Stromes beträgt fast eine Viertelstunde; sein Ausfluppunkt hat eine Höhe von 1500' und der Spiegel der kleinen Kyll, in die er stürzte, von 900'. Der kleine Bach aber zerfiel im Laufe der Jahrhunderte den Zusammenhang dieses Stromes mit dem gegenüberliegenden Ufer, und nun führt dem Wanderer aus dem Thale eine mehr als 200' hohe Lavamwand entgegen, die, von den mannigfaltigsten Pflanzen bewachsen, eine sehr malerische Ansicht gewährt. Die interessante Stelle ist nicht eine halbe Stunde von Manderscheid entfernt und heißt der Horngarten.

Der Gerolsteiner Berg. An der mittleren Kyll zieht sich ein fast isolirter Berggücken hin, der fast ein Thal bildet und sich nur an seiner schmalen nordöstlichen Seite an das übrige Gebirge anlehnt. Die Oberfläche ist fast eine halbe Stunde lang, während ihr größter Durchmesser fast eine Viertelstunde beträgt. Ueber das seinen südlichen Fuß bespülende Kyllthal erhebt er sich 480'. Seine Felsmassen, Dolomit, erheben sich scharf und fast senkrecht, wie Festungsmauern, rings um die Spitze des Berges stehend, auf einem meist sanft geneigten Gehänge. In der Mitte dieses Berges liegt eine kreisrunde Vertiefung von ca. 50' Tiefe, die Papentaule, ganz von Schlacken, Kapilli und Asche umgeben. Sie hat eine ausgezeichnete Kraterform, ist aber ohne einen directen Lavaström. Nördlich der Papentaule erhebt sich das dolomitische Gestein noch bis zu einer Höhe von mehr als 100' und senkt sich dann plötzlich steil in das angrenzende Thal. Auf diesem Abhange liegt der eigentliche Ausbruchskrater, die Papeltaule, die als ein Seitenausbruch anzusehen ist und einen Lavaström ergoß, der nach einem Laufe von einer halben Stunde zu Gerolstorf unterhalb Gerolstein sich in die Kyll stürzte. Der Strom, früher überall sehr deutlich aus der Oberfläche hervortretend, ist durch die Kultur allmählich sehr unbedeutlich geworden. Die Dolomitfelsen dieses Berges haben nach Innen eine röthliche oder bräunliche Färbung und zeigen krystallinische Gefüge; an vielen Punkten aber erkennt man eine sehr deutliche Korallenbildung, so daß aus der Form, wie aus dem Gestein dieses Berges, so wie aus manchen andern Gründen, die noch an einer andern Stelle erörtert werden sollen, deutlich hervorzugehen scheint, daß der Gerolsteiner Berg ein Aftoll des Urmeeres gewesen ist, und daß der vulkanische Ausbruch auf demselben mit der Dolomitbildung gar nicht in Verbindung zu bringen ist. An seinem Fuße liegt, theils in altem Schlamm, theils in das Gestein eingewachsen, eine ungeheure Menge von Noctuiden des

devonischen Kalkes, die nach vielen Millionen zu zählen sein möchten; besonders schöne Crinoiden kommen darin vor. Ganz ähnliche dolomitische Bildungen finden sich an vielen anderen Orten der Eifel, ohne daß vulkanische Erscheinungen in der Nähe auftreten; die auffallendste aber findet sich noch ganz in der Nähe von Gerolstein, die Aurburg, die auf einem steil ansteigenden Kegel mehrere senkrechte Dolomitfelsen trägt, Burgruinen ähnlich.

Die Vomerather Ley. Ostlich von dem Kreisstädtchen Daun erhebt sich, nicht eine halbe Stunde entfernt, die 1514' hohe Spitze des Fimrich (Firnberg, s. Fimrich!), die sich 349' über den Spiegel der Eifer erhebt. Er war ein Vulkan, obgleich sich jetzt kein deutlicher Krater mehr zeigt, und ihm entquoll ein Lavaström, der sich in einer schwarzen Masse, wie ein großer, breiter Fächer, über den sanft geneigten Bergabhang ergoß. Nur da, wo die Senkung etwas steiler war, steben senkrechte, in Säulen gespaltene Lavamassen an, dem Basalt ganz ähnlich. Menschenhände haben dagwischen sehr thätig gewirkt, um da, wo es möglich war, die Lavablöcke bei Seite zu schaffen, Mauern daraus zu bilden und dagwischen in dem fruchtbaren Boden Gärten anzulegen. Am Ende dieses großartigen Lavaströmes liegt das Eiferthal in einer Breite von 350 Schritten. Jenseit erheben sich die Felsen, auf deren Spitze die Burg Daun liegt, und an deren südwestlichem Abhange das Städtchen Daun sich hingiebt. Die Burg, zum Theil noch bewohnt,

steht auf einer Lavamasse, welche ganz dieselbe Bildung und Eigenschaften hat, als die des beschriebenen, gegenüberliegenden Lavaströmes. Ihre Höhen stimmen auch ganz genau miteinander überein. Devonische Grauwade bildet auf beiden Seiten die Sohle des Lavaströmes und der Felsen von Daun. Die Letzteren stehen mit irgend einem anderen vulkanischen Ausbruch durchaus in keiner Verbindung, und es läßt sich auch kein Beweis auffinden, daß sie selbständig an diesem Punkte entstanden seien. Es ist daher mit voller Sicherheit anzunehmen, daß der Lavafels, auf welchem das Schloß Daun steht, das Ende des großen Lavaströmes des Fimrich ist, welcher nach dem nadeliegenden Dörfchen die Vomerather Ley heißt, und daß die Eifer nicht allein den ganzen mächtigen Lavaström, sondern auch die darunter liegende devonische Grauwade bis zu einer Tiefe von 150' durchgefagt hat. Welch' eine Zeit geht an unserm geistigen Auge vorüber, wenn wir die Ausdehnung und die Festigkeit des Gesteins mit der Wirkung des hier so unansehnlichen Vaches vergleichen!

Ganz ähnliche Erscheinungen stellen sich uns an vielen anderen Orten dar; namentlich ist die Durchbohrung des Lavaströmes, welcher zwischen Eßlingen und Birresborn von dem mächtigen Kalem herabströmte und die Koll bis zu einer Tiefe von 200' durchgefagt, noch großartiger. Leichter zugänglich und überzeugender ist aber nur der eben beschriebene Punkt von Daun.

## Ueber die Natur der Arbeit.

Eine Beitrag zur Kulturgeschichte des Menschen.

Von M. C. Grandjean.

Erster Artikel.

Wenn man die Produkte der Arbeit betrachtet, welche die civilisirten Völker im Verlaufe der wenigen Jahrtausende verrichtet haben, die wir überhaupt als den höheren Kulturbestrebungen des Menschen angehörig in Betracht ziehen können: so muß man billig erkennen über die Masse, Mannigfaltigkeit und gefesselte Aufeinanderfolge der Erzeugnisse menschlicher Thätigkeit. Auch der roheste Zustand des Menschen ist von Kunstprodukten begleitet und zeugt dafür, daß derselbe sich mitrirst derselben Nahrung und Sicherheit verschaffte. Es mußte auch so sein, denn nur in einem sogenannten Paradies konnte er sich ohne künstliche Hilfsmittel einige Zeit behaupten. Man kann deshalb auch kühn annehmen, daß es nie Menschen gegeben habe, welche sich, wie schon von sehr ansehnlichen Leuten der Wissenschaft behauptet wurde, wie die Kinder, Pferde und Schafe, von Gras nährten; wenn auch das Geblü und die Verdauungsapparate des Menschen dieses gestatten würden.

Der Mensch ist in Bezug auf seine Ernährung und Sicherheit absolut auf den Fleiß seiner Hände, die ihm, als

einigem Zweihänder, unter allen Thieren allein, welche die Natur frei gelassen wurden, angewiesen: er kann sich weder durch schnelles Laufen noch durch sonst eine Eigenschaft oder natürliche Waffe der Wildbeute bemächtigen, die er vorzugsweise zu seiner Nahrung im Stabium des Naturzustandes bedarf. Früchte kommen erst in zweiter Linie und können erst da das Fortkommen des Menschen, wenn auch nur nothdürftig, sichern, wo der Boden und das Klima zu deren kontinuierlicher oder massenhafter Erzeugung geeignet sind. Das ist aber, wenn überhaupt, nur an wenigen Punkten der Erde der Fall, — und dann bleibt immer noch, wenn das Menschengeschlecht kräftig gebildet soll, die Fleischnahrung notwendige Bedingung.

Das auf Fleischnahrung angewiesene Thier ist von der Natur mit denjenigen Werkzeugen an seinem Körper versehen, deren es zur Erlangung derselben bedarf. Ebenso ist es mit anderen Thieren, welche auf Früchte und Pflanzen angewiesen sind. Nur der Mensch allein ist hilflos gelassen, hat aber dafür freie Arme und Hände, aufrechten Gang

und höhere geistige Eigenschaften wie die Thiere erhalten. Mit Hilfe dieser letzteren ist er aber im Stande, durch die freien und meisterhaft geübten Hände sich künstliche Werkzeuge darzustellen und sie zu seinen Lebenszwecken zu gebrauchen, welche — wenn auch in der rohesten Form — ihm eine große Ueberlegenheit gegen die Thierwelt geben und die Grundbedingung zur menschlichen Arbeit und Kultur sind.

Die ersten uns bekannten Werkzeuge, deren sich der Mensch zur Jagd und Fischei, sowie zur Bekämpfung von Säugethieren bedient hat, sind so roh in der Form und Art der Zurechtung, daß es oft genug unentschieden bleiben muß, ob man es mit Natur- oder Kunstprodukten zu thun hat. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, daß ihm zuerst natürliche Naturprodukte, wie Steine und Prügel, hierzu dienten, und daß er erst allmählig darauf verzicht, ihre Unvollkommenheit durch künstliche Bearbeitung zu Hülfe zu kommen und sie zu seinen Zwecken geschikt zu machen. Die mehr oder weniger geschickte Auswahl des Materials und die zweckmäßige Bearbeitung desselben geben uns immer einen sehr annähernd richtigen Maßstab für die Stufe der Kultur, auf welcher die Vorfitter dieser Kunstprodukte standen.

Man kann läßt annehmen, daß die Vervollkommenung der Gegenstände, welche die ersten menschlichen Gesellschaften oder Familien zur Erlangung ihrer Nahrung und Sicherheit u. s. w. bedurften, kein Werk des freien Willens, sondern der Noth war. Die Seltenheit des Wildes und der Früchte bei steigender Vermehrung zwang den Menschen, auf Mittel zu sinnen, den Uebelständen abzuwehren, welche an den primitiven Kunstprodukten haften. Wenn aber dieselben schon Verzierungen zeigten, welche technisch nicht mit ihrem Gebrauch zusammenhängen, so kann man daraus sicher schließen, daß der Mensch oder das Volk, welches sie gebrauchte und verfertigte, schon einen tüchtigen Schritt in der Kultur vorwärts gethan hatte, und in einem gewissen Wohlstand lebend, den loslösen Dingen, welche diesem begründen halfen und erhielten, eine Art Cultus widmeten, in dem sich vielleicht die ersten Keime der Verehrung höherer Wesen zeigten, und aus dem sich später die Fetischdiensterei entwickelte.

Man kann nichts Ueberehreres über die Natur der Arbeit und der damit aufs Innigste verbundenen Civilisation und — wenn man diese davon trennen kann — auch der Religion finden, wie die Bibel. Wenn man auch mit dieser heiligen Geschichte der Menschheit auf unserm jetzigen Standpunkte nicht mehr in allen Dingen einverstanden sein, d. h. nicht alles, was darin steht, für richtig halten kann, so gibt sie doch in ihrem älteren Theile ein so wahres und getreues Bild der Entwicklung des Menschengeschichts, daß man erlauben muß, wie es möglich war, daß ein Volk, wie die Israeliten, nach so vielen Jahrhunderten seiner Existenz, als es erst mit einer Schrift besannt wurde, sich noch so lebhaft seiner ursprünglichen Zustände erinnern konnte. Wie würden wenig oder nichts mehr von unseren analogen Zuständen wissen, wenn nicht ältere, hochgebildete Völker uns in einer gewissen Periode gekannt und unsere damaligen Verhältnisse mehr oder

weniger genau beobachtet und aufgezeichnet hätten. Als die Römer uns aber kennen lernten, hatten wir schon einige Kulturphasen hinter uns, von denen wir nicht mehr das Geringste wissen.

In der Bibel tritt uns aber der Mensch schon bei seiner Entstehung entgegen — und wenn die mosaische Schöpfungsgeschichte auch nicht ohne Widersprüche und Unmöglichkeiten ist, so ist es doch nicht genug zu bewundern, wie in dieser fernem und dunklen Zeit eine Kosmogonie entstehen konnte, welche in der Reihenfolge der Schöpfungsakte u. s. w. solche Festigkeiten durch die neuere Wissenschaft findet. Wir sehen hier den Menschen zuerst in seinem natürlichen hilflosen Zustande, aber in einer Umgebung auftretend, welche ihm seine Ernährung und Fortpflanzung leicht machte.

Das war aber gegen die Natur des Menschen, der zwar, wenn unter beständiger harter Arbeit gehalten, sich auch beständig nach bequemer Ruhe in einem paradiesischen Schlafrastleben seht, aber wenn er es wirklich hätte, sich mit weit stärkerer Sehnsucht wieder hinauswünschen würde. Adam und Eva sind in erster Beziehung die Typen der zahllosen Mächten, in denen es mit Hilfe übernatürlicher Wesen oder Kräfte oder durch eine wunderbare Verknüpfung von Umständen und Ereignissen dem Menschen gelingt, sich aus den Mühsalen des Lebens herauszuwinden und ohne Arbeit in allen möglichen Genüssen zu schwelgen. Alle diese Genüsse sind aber immer mehr oder weniger an die Produkte der Arbeit geknüpft, und erst müssen diese dargestellt werden, ehe man jene genießen kann. A ladin's Lampe ist, im Grunde genommen, weiter nichts als ein wunderbar schnell und äußerst vollkommen arbeitendes Werkzeug, womit der Mensch durch ein Minimum von Arbeit die größtmöglichen Produktionen hervorbringt. Sie ist das Ideal einer Universalmaschine, welche der Menschheit, wenn sie vorhanden wäre, alle materielle und geistige Arbeit erspart.

Ständlicherweise wird ein solches Werkzeug nie hergestellt werden; dagegen sind all unsere Werkzeuge Leuchterlampen geringerer Leistungsfähigkeit, denn sie repräsentiren eine größere oder geringere Menge Arbeit, die der Mensch bei Darstellung seiner Produkte mehr thun mußte, wenn er sie nicht in seinen Dienst genommen hätte. Als die Werkzeuge und Kräfte, welche dem Menschen die materielle Arbeit erleichtern, sind aber Produkte seines Geistes, welche in den Materialien, aus denen sie bestehen, verkörpert erscheinen — und er würde weder auf die in ihnen liegende Idee, noch auf die Ausführung gekommen sein, wenn er nicht hätte arbeiten müssen. Erst die seine materiellen Kräfte zu sehr erschöpfende Arbeit zwang den Menschen, auf Erleichterungsmittel zu sinnen, wodurch er sich denn nach und nach die Natur- und Thierkräfte, sowie eine zahllose Masse von unorganischen und organischen Körpern dienstbar machte, durch deren Hilfe er allmählig, wenn er — woran Nichts zu zweifeln — sie geschickt zu benutzen lernt, sich dem Ideal der Universalmaschine nähern kann, welche ihm alle anstrengende körperliche Arbeit erspart und dennoch die Quellen beiteren Lebensgenusses öffnen mußte.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 22.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, S. Schwesche'scher Verlag.

**2. Juni 1869.**

**Inhalt:** Der hundertjährige Geburtstag Alexander's von Humboldt, von Otto Ule. — Die Kohlmeise, von Walter Karl Müller. — Ueber die Natur der Arbeit. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Menschen, von R. G. Grandjean. Zweiter Artikel. — Literarische Anzeigen.

## Der hundertjährige Geburtstag Alexander's von Humboldt.

Von Otto Ule.

Es ist gut, daß von Zeit zu Zeit Tage in unserm Leben kommen, die uns aus der Alltäglichkeit herausheben und unsere Blicke einer Vergangenheit zuwenden, der wir selbst und das Beste in uns entflammen, die uns, vielfach durch die materiellen Interessen des Lebens getrennt, einmal vereinen im Aufblick zu erhabenen Vorbildern und Wohltätern der Menschheit. Es sind die Gedenktage großer Männer. Und ein solcher Gedenktag steht uns am 14. September dieses Jahres bevor, die hundertjährige Geburtstagsfeier unseres Alexander v. Humboldt, den man mit Recht den Stolz unseres Jahrhunderts, den Begründer unserer heutigen Naturwissenschaft nicht allein, sondern auch unserer heutigen Naturanschauung genannt hat. Schon rüstet man sich in Amerika zur würdigen Feier dieses Tages; nur in Deutschland regt sich nichts. Sollte denn dieser unvergeßliche Mann doch schon 10 Jahre nach seinem

Tode aus dem Gedächtniß seiner Landsleute entschwunden sein? Sollten die Rehr behalten, die vor einigen Jahren, verlegt durch das freimüthige Urtheil, das er in seinen Briefen an Barnhagen über manche Personen und Zustände seiner Zeit gefällt, ihn zum Gegenstande der kleinlichsten Kritik und erbärmlichsten Splitterrichterei machten, die ihm jede wahre Größe überhaupt absprachen, weil sie selbst unfähig sind, wahre Geistesgröße zu begreifen? Ich glaube es nicht, glaube auch nicht, daß die Akademien allein ihn feiern werden, und daß das Volk sich ausschließen wird von der Feier eines Mannes, der ihm mehr als je ein Naturforscher angehörte. Aber der Anregung, der Mahnung bedarf es, und diese Mahnung darf wohl eine Stelle finden in einem Blatte, das sich „Organ des deutschen Humboldt-Vereins“ nennt, und dessen Ziel und Beruf es zu allen Zeiten war, Humboldt's Gedanken über das deutsche



Vaterland zu verbreiten, seine Geisteskräfte zum Eigenthum des Volkes zu machen und die Herzen damit zu befruchten.

Aber mit dieser Mahnung schien mir noch eine andere Pflicht verwachsen, dem Volke, das seinen Humboldt feiern soll, auch ein Bild dieses Mannes vorzuführen, ein treues Lebensbild, das sein Werden und sein Wirken, sein Wesen und seine Bedeutung für Jedermann faßlich darstellt. Dieses Lebensbild wird in wenigen Wochen dem Volke geboten werden<sup>\*)</sup>. Es wird keine Biographie im eigentlichen Sinne sein; denn eine Meisterhand wird dazu gehören, die einzelnen Züge dieses großen Mannes zu einem plastischen Kunstwerk zusammenzuschmelzen. Es macht auch keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Werth, ist nicht aus seltenen Quellen geschöpft; es will nur ein Werk sein, das Liebe geschaffen hat und wieder Liebe schaffen will, das großen Meister, zu dem es in Verehrung aufsteht. Es will seine Reize nur in seinem Gegenstande haben; und was kann es Angenehmeres geben, als den Weg zu betrachten, auf dem ein großer Mann von der Ebene bis zum Gipfel wandelte, den Gedankengang zu verfolgen, der ihm der Menschheit neue, embleme Gebiete der Erkenntniß und des Wissens eröffnen ließ? Nicht besser glaube ich bezeichnen zu können, was das kleine Buch sein will, und nicht anregender vielleicht für die Feier des Humboldtstages zu wirken, als indem ich das Vorwort meines Buches selbst sprechen lasse.

„Drei Nationen begehen in diesem Jahre das hundertjährige Gedächtnißfest der Geburt eines ihnen angehörigen großen Mannes. Wenn aber die Franzosen in ihrem ersten Napoleon den kühnen Welteroberer, die Engländer in ihrem Wellington den tapferen Kriegshelden feiern, so werden wir Deutsche das Fest eines Mannes begehen, der nur ein Mann des Friedens, der nur ein Naturforscher war, der aber auch eroberte, auch Reiche begründete und zwar Reiche von ewiger Dauer, nämlich Reiche der Wissenschaft. Unsere Feier gilt unserem Alexander v. Humboldt. Unseren Humboldt nennen wir ihn mit Genugthuung, weil er aus unserer Mitte hervorging; aber der vollendete Humboldt war nicht der Stolz des Vaterlandes allein, sondern der Stolz des ganzen Erdballs. Alle gebildeten Völker der Erde nennen ihn den ihrigen, und auch unser Jahrhundert nicht allein, noch viele spätere Jahrhunderte werden von seinem Namen und seinem Geiste erfüllt sein.

Die große Denkmünze, welche die Pariser Academie der Wissenschaften beim Tode A. v. Humboldt's prägen ließ, bezeichnet ihn auf ihrer Rehrseite als „den größten Gelehrten seines Jahrhunderts“, als den „Gründer der all-

gemeinen Physik des Erdballs“; auf der Vorderseite aber stehen zu Seiten seines Brustbildes die Worte: „mit dem Beinamen: der neue Aristoteles.“ Schärfer konnte die Bedeutung des großen Mannes für seine Zeit nicht gekennzeichnet werden. Was Aristoteles für die alte Welt, das ist in der That Alexander v. Humboldt für die neue gewesen: der Mittelpunkt aller Naturerkenntniß der Vergangenheit, der Ausgangspunkt neuer fruchtbarer Wissenschaften für Jahrhunderte. Er ist ein Weltreformer gewesen, der nicht bloß ganze Gebiete der Forschung erschloß, der nicht bloß umgestaltend auf die Grundsätze der Forschung einwirkte, dessen gewaltiger Geist auch umgestaltend in die ganze Weltanschauung der Menschheit eingriff. Was er für die Wissenschaft Großes gewirkt, wie er alle Gebiete der Natur, die Tiefen des Meeres, wie die grenzenlosen Räume des Himmels denkend durchsah, wie er, das regellose Chaos vereinzelter Erfahrungen der Vor- und Mittelwelt ordnend, das gesammte Erdenleben erkundete und die Naturwissenschaft in neue, ungelannte Bahnen wies, wie er auf dem festen Boden der Thatfachen und der Erfahrung eine Gesammtwissenschaft der Natur gründete, wie sie kaum die griechischen Naturphilosophen in ihrem Reiche der Ideen geträumt hatten, — das Alles ist in den Annalen der Wissenschaft verzeichnet. Aber kein Griffel vermag noch niederschreiben, was Humboldt für den Geist der Menschheit geschaffen. Eine neue Weltanschauung ging von ihm aus. Indem er die Geist unter der Decke der Erscheinungen begreifen lehrte, indem er die Natur in der Einheit ihrer Kräfte und Befehle, als ein harmonisches, belebtes Ganze erfassen und in dem aufgeschlagenen Buche des Lebens das Einzelne und Kleine durch das Ganze und Große erklären lehrte, indem er die gähnende Kluft zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Natur und Geist schloß, eiferte er Umwandlungen in den Begriffen und Lebensrichtungen der Menschen hervor, die ihn zu einem Reformator der Welt machten. Durch seine denkende Herz und Gemüth ersassende Natur- und Weltanschauung lenkte er den Blick des Gelehrten auf das Naturleben, erhob er die Naturwissenschaft zu einer Grundlage sittlicher Bildung, zu einem Hebel geistiger Befreiung des Volkes, eröffnete er im Umgang mit der Natur einen neuen Quell des Genußes und der Freude, der selbst in der Wüste gesellschaftlicher oder staatlicher Trostlosigkeit nicht versiehet.

So hat Alexander v. Humboldt eine Volkserkühlung erlangt, wie sie nur selten einem Gelehrten zu Theil wird. Nie sprach sich das deutlicher aus, als am dem Tage seines Begräbnißes. Tausende folgten seiner Leiche, und die ganze Bevölkerung Berlins nahm in erster, würdevoller Haltung Theil an der erhebenden Feier. An seinem Sarge beugte sich die Fürstenmacht vor der Hohheit der Wissenschaft, huldigte, was sonst gedankenlos im trüben Strom des Alltagslebens dahintrief, der Macht der Ideen. Es war ein Tag der Trauer für Jedermann, nicht

\*) Alexander v. Humboldt. Ein Lebensbild für alle Völker der Erde, von Otto Illt. Verlag von Rudolph Kiehn in Berlin.

blos für die Gelehrten oder für die persönlichen Freunde des Verewigten, nicht blos für die Akademien oder für den Hof, den er mit seinem Glanze erfüllt hatte. Die Einen vermisten die kräftige Hand, die so lange siegreich das Banner freier Forschung hochgehalten hatte, die Andern sahen den Fürsprecher hinweggenommen, der sich so lieblich der aufstrebenden Kräfte annahm, den Führer, der in bewunderungswürdiger Unermüdlichkeit mit der Leuchte seines Wissens Jedem den Weg zeigte. Alle fühlten es, daß in ihm ein Herz zu schlagen aufgehört hatte, daß in seltsamer Wärme für die Wahrheit empfand, daß in seltener Lieb-Verziehungen des Wissens zum Volke, zur Menschheit pflegte.

Wie der Tod dieses großen Mannes in schmerzlicher Trauer die Völker diesseits und jenseits des Oceans verband, so wird sein hundertjähriger Geburtstag sie in dankbarer Erinnerung vereinen. Er wird und muß ein Volksfest im edelsten Sinne, ein Fest der ganzen gebildeten Welt sein. An diesem Tage aber wird vor Jedes Seele das Bild des gelehrten Mannes treten, und dieses Bild aufzuleben, wenn es im Laufe der Zeiten dem Einzelnen verblichen oder erstückt sein sollte, hat sich mein Buch zur Aufgabe gemacht.

Ein vollkommenes Lebensbild Alexander d. v. Humboldt's zu zeichnen, ihn in seiner ganzen Bedeutung für die Welt und die Wissenschaft darzustellen, das wäre freilich die Aufgabe eines Meisters, wie er noch kommen soll. „Mein Leben sucht in meinen Schriften!“, sagte er selbst, und noch mehr, es ist zu suchen in der Geschichte der

Wissenschaft unseres Jahrhunderts. Aber ein Buch, das dem Volke gehört, darf sich mit Geringerem begnügen. Wenn nur die Liebe die Hand fährt, wird die Treue dem Bilde nicht fehlen, und statt der Tiefe wird wenigstens die Wärme der Zeichnung zu dem Herzen des Volkes sprechen. So von der Hand der Liebe gezeichnet, soll der Leser in diesem Buche ihn kennen lernen, den großen Forscher, in seiner ersten Entwicklung, in seinem ersten ahnungsvollen Streben und in den Anfängen seines großartigen Wirkens, soll ihn dann bewundern lernen, den großen Reisenden, wie er auf den Gipfeln des Altai und in den Schneegebirgen der Corbilleren, auf den Steppen Mittelasiens und in den Urwäldern an den Ufern der südamerikanischen Riesenskräme seinen forschenden Blick in die Erscheinungen versenkte und das Ferne verknüpfend die Gesetze der Natur begründete, soll ihn weiter kennen lernen, den großen Reformator der Naturwissenschaft, wie er von den stillen Räumen seines Studierzimmers aus neue Wissenschaften aufbaute und der staunenden Menschheit eine neue Welt der Schönheit und Harmonie erschloß, soll ihn endlich lieben lernen, den edelsten der Menschen, den hingebendsten der Freunde, den treuesten Sohn seines Vaterlandes.

Nur eng ist der Rahmen des Bildes, und nur flüchtig können seine Züge sein; aber wenn es mit derselben Liebe aufgenommen wird, mit der es gegeben, wird es doch seinen Zweck erfüllen: die Herzen vorzubereiten für das seltsame Fest, welches die gebildeten Völker der Erde vereinigen wird in der Feier des größten Denkers und Forschers des Jahrhunderts.“

## Die Kohlmeise.

Von Pastor Carl Müller von Alsfeld.

Wie mächtig wirken schon die Strahlen der Sonne, wenn der Februar mit blauem Himmel Abschied nimmt, und die sanfte, lauliche Luft von Süden weht! Man glaubt sich plötzlich in den vollen Frühling versetzt und denkt in wonnigem Vergessen nicht an die noch zahlreichen Tage der rauhen Jahreszeit, welche Kälte, Schnee und Stürme mit sich führen werden. Das Wasser der Flüsse und Bäche geht hoch, die Wiesen liegen theilweise überschwemmt. Die alten Weiden am Bachufer werden an ihren Stämmen von den stürbenden Wellen umspült. Der Grünspecht durchwandert munter die Reiden der faulenden Stämme und läßt sich da und dort auf einem freien Hügel oder auf dem hervorragenden Ufer nieder, in großen Sprüngen hüpfend und aufmerksam umherspähend. Das ist die Zeit, wo in seltsamem Vergessen verfunken oben auf der Spitze eines Weidenzweiges das Männchen unserer Kohlmeise sitzt, unverwandt den Blick nach dem Himmel gerichtet, und immer wieder nach ziemlich regelmäßig eingehaltenen Pausen sein fein und scharf klingendes „Zit-zit“ in die Welt hinausruft, als handle es

im Auftrag der ganzen Vogelsippchaft um sich her, das Naben des berauschenden, liebenden Frühlings zu verkünden. Es hat sich mit der Gefährten, die ihm vom vorigen Jahre her treu geblieben, von der begleitenden Gesellschaft anderer Weisen allmählig entfernt und gleichsam seine Natur verändert. Jetzt denkt es nicht daran, wie noch kurz vorher, hastig Nahrung suchend, Winkel und Ecken zu durchschlüpfen; eine Viertelstunde lang sitzt es äußerst ruhig, innerlich aber wohl um so mächtiger erregt. Unter ihm klopf das Illerze, von Zeit zu Zeit beim Fliegen von einem Zweige zum andern leise lodende Weibchen an den Stämmen und Ästen, um einer Larve sich zu bemächtigen oder irgend eine Beute versprechende Stelle zu prüfen und zu untersuchen. Weibchen scheinen sich nicht um einander zu kümmern, aber sie sind sich ihrer Nähe wohl bewußt, und mehr denn in den bisherigen unwerthlichen Tagen des Winters fühlen sie sich gegenseitig angezogen. Das sehen wir jetzt, wo das Weibchen sich um einige Bäume stromabwärts von dem Standorte des Männchens entfernt hat; denn eilend folgt ihm

das letztere und benutzt diese Gelegenheit, um eine Weile Nahrung zu suchen; dann aber erhebt es sich wieder und fñhrt seine Weife, welche der belebende Volksmund in den fñhrt den Landmann fprechenden Anruf: „Epß die Schaar“ übergießt hat, auf erhabnem Zweige weiter fort. In einer Entfernung von hundert Schritten antwortet feinem Rufe ein anderes Männchen, das eben fo ahnungsvoll von dem Gefñhle der Minne berñhrt ift.

Der Eintritt der rauhen Witterung macht das Frñhlingstheil der Koblmeife fofort verftummen und nöthigt fie, wieder in winterlicher Weife raflos dem Ernñhrungs- und Erhaltungserwerb fñh hinzugeben. Im Laufe des März aber kommt der unterbrechende Trieb der Fortpflanzung zur erneuten, verftärkten Geltung, und unter feinem beherfchenden Einfluß begibt fñh das Paar zunñchft an die beliebte Brutftätte des vorigen Jahres, um fñh hier wieder mohnlich einzurichten. Aber nicht immer will es den treuen Zuthien gelingen, das alte Kloß in Befñh zu nehmen; denn fñhe, die Rinde am Eingang hat den Rand ringfñm mehr umwurzelt, fo daß die Weifen nicht mehr einfchlñpfen können. Eins nach dem andern probirt es, fñh das Kopschen hinein und will den Leib einzwñngen, aber ohne Erfolg; das beim Zurñckziehen in Unordnung gebrachte Gefñher wird gefñhñtelt und geordnet und von Neuem vom Männchen und Weibchen der mißlungene Verfuch wiederholt. Jetzt fangen fie an unwillig zu werden; unruhig hüpfen fie um das Loch herum, hämmern mit den Schnäbeln daran, zerren kleine Rindenplättchen los und wetzen und zanken dabei zuweilen. Man fieht ihnen deutlich den Zorn an. Hat fñh das Loch nicht allzu fñr verengert, fo gelingt es ihnen endlich bißweilen, den nöthigen Raum zu gewinnen, um einzufchlñpfen. Oft aber bemñhen fie fñh tagelang vergeblich, fo daß fie fñhließlich das Weifein einftellen und eine andere Niftftätte auffuchen. Sie hüpfen dann von Stelle zu Stelle, unterfñhen Mauerlöcher und Baumhöhlen, verlaffen Eichhorn-, Elßer- und Kräbennefter oder auch kñnftlich angebrachte Staarenkñften. Hier gilt es, ein Specht-paar zu vertreiben, dort einen Kleiber, einen Staar, einen Sperling muthig in die Fñcht zu fñhlen, und in der Regel erreichen fie durch die Fñftigkeit und Ausdauer ihrer Angriffe ihr Ziel. Sagt ihnen die Hñhle ihrer Einrichtung nach zu, und dazu gehñrt vor Allem ein enges Eingangslot, fo kñmmert fie die Tiefe oder Hñhe der Lage nicht. Zuerft werden Halme, Moosbüfcheln und Wñrgeln eingetragen und damit die Nefteunterlage bereitet. Sie holen diefes Material gern in der Nñhe und fliegen oft ein Duzend Mal an eine und diefelbe Stelle, wo fie eine günftige Entdeckung gemacht haben, indem fie das Moos zurechtzupfen und auswñhlen oder Halme aufnehmen und Wñrgeln abñßen. Sie gebrauchen dabei häufig die Füße, die zur Hüße bereit find, fñbald es gilt, irgend einen jñren Widerftand zu befeitigen oder das Moos von daran haftenden Rinden- und Erbfññchen zu befreien. Ift der Grund zu

dem Nefte gelegt, dann entfernt fñh der Vogel weiter von der Brutftätte und fñht Paare von Rñden, Pferden und Wild auf. Man fieht ihn abfñddn auf den Landftraßen, auf Feld- und Landwegen hiermit befchñftigt. Von den Reiten, an denen das Wild angeftreift oder fñh gerieben und Paare gelaffen hat, ließt die emfige Weife letztere ab, um ihr Nefte damit auszufñtern. Ihrem fcharfen, aufmerkffamen Auge entgeht fo leicht kein Hñrchen oder Federn. Kommen ihr Schneidbñcken im Walde oder an Triften und Wegen oder Wollflocken an Hñden und Dornen zu Gefñht, dann macht fie auch von diefen Gebrauch. Poffirlich erfñhnt es, wenn fie die Walle mit Hñfte der Füße löfen will und fñh mit den Nägeln darin verwickelt. Wie fie dann zerrt, reißt und brñßt, im Aerger die Federn ftraußt und diefelben fñmmt den Füßen nach glñcklicher Entwicrung auf einem Aste pußt!

Nachdem das fleißige Paar das Nefte vollendet, beginnt das innigfte Erleben. Das Weibchen lodt ganz fo wie die ausgeflogenen Jungen „debede“, wñhrend das Männchen mit aufgerichtem Kopf und etwas gefñhñtetem Kopfe fñhren fñhnel hüpfend dñffte umkreift. Nach und nach mehren fñh im Innern des Neftes die auf glñnzendweißem Grunde mit vielen hellrothen und roffarbenen, zuweilen auch einzelnen grauen Flecken verfehenen Eier oft bis zur Zahl 14. Hñlt man eines diefer dünnfchalligen Eier zwifchen den Fingern gegen den Himmel, fo fieht man den Dotter durchfñhen. Acht gattenmñßig brñtet das Paar abwechfelnd 14 Tage lang und hñlt dann die nackten Jungen warm. Wñhrend des Brñtens find fie, vorzñglich das Weibchen, ähñlich den zahmen Enten, in fñhr erblñtem und aufgeregtem Zustande. Ueberrafcht man fie wñhrend des Brñtens in dem Brutloch, fo fauchen fie hörbar und deifen empfindlich in die eingewñngte Hand. Schon wñhrend der Brñtzeit ift die Emfigkeit und Sorgfalt rñhrend, mit der die Gatten fñh Futter zutragen. Das Männchen zeigt weniger Geduld zum Eiern auf den Eiern, als das Weibchen, und läßt fñh von diefem alsbald wieder ablöfen. Merkwnrdig ift es, daß die Zuthien in der nñchften Umgebung genñgende Futtermenge finden. Ich habe fie fñhnel weit von dem Nefte entfernt gefñhen. Die Jungen empfangen alle paar Minuten kleine Raupen, welche diefe, fñbald ihnen die Federn einigermaßen gemachfen find, unter fortwñhrendem „debedede“ aufnehmen. Sieht man an dem Baum- oder Mauerloch, in welchem fie fñhen, nahe vorüber, fo hñrt man fie „debede“ fñhelen, auch wenn fie nicht gerade gefñhñtet werden — wohlgefñhlich, wenn man erwñgt, daß oft 8 bis 14 junge Nimmerfette der vielgerfñhigten Korbthierfñßen daren. Oft ift das andere alte Vñgeln fñhnel mit einer neuen Gabe vor der Hñhle zum Einfchlñpfen bereit, wñhrend das eine noch darin befchñftigt ift. Die fñhne, warme Witterung begññft natñrlich das Fñterungsgefñhft, und die Eltern brauchen fñh dann nicht fo fñhr abzumñhen, als an rauhen und

stürmischen Tagen. Eines der flüggen Jungen fliegt nach dem anderen aus. Die älteren haben sich bereits von dem Rande des Lochs aus in der Weit umgesehen, während die jüngsten, die im Dunkel des Hintergrundes zurückgeblieben sind, bis jetzt nur dunkel ahnen, was draußen vorgeht. Eines Tages sind alle bis auf zwei oder eines davongeflogen. Die Zurückgebliebenen werden unruhig, wohl auch von den um die ausgeflogenen Jungen besorgten Eltern seltener als zuvor gefüttert und wagen sich, wenn auch noch nicht flügge genug, in's Freie. So kommt es, daß man diese Nestlinge zuweilen am Boden hüpfen sieht oder in irgend einem Schlupfwinkel schreien hört, wo sie leicht eine Beute der Raubthiere werden. Gar bald sind aber die jun-

gen. So geht der Wechsel der Mühen, des Auf- und Niedermarterns, des Fütterns, des Geschreies und der Gefahren vom Morgen bis zum Abend, wo sich die liebende Familie eng an einander anschließt, entweder eine schutzgebende Höhle suchend, oder die heimlich stillen, dunklen Plätzen der Gebüsch- und Bäume zur Nachtruhe wählend. Oft ruft dann noch ein nimmermüdes Junges, schon den Kopf unter dem Flügel, sein begehrtliches „Dedebe“, bis der Friede des Schlummer auch über diese Naturkinder sich ausbreitet.

Bald lernen die jungen Meisen allein fressen und werden dann von ihren Führern verlassen, die zu einer zweiten, weniger fruchtbaren Brut schreiten. Die Familien



Die Rint- oder Rothmeise (*Parus Major*).

gen Meisen mit den Zweigen der Bäume vertraut und wissen mit Sicherheit ihren Führern zu folgen. Jetzt geht aber die Quälerei erst recht an. Die gestreuten, immerzu „dedebe“ schreienden Kleinen wollen alle gefüttert, zurechtgeführt, gewarnt und beschützt sein. Da müssen die Eltern dem Zuge mit Fußem „Rintü“ die beabsichtigte Richtung geben und den Nachzügler die gehörige Rücksicht schenken. Plötzlich wird ein Feind sichtbar; mit ängstlichem „Pinkpinkpink“ stürzen sich die Alten in das dicke Gebüsch hinab und veranlassen durch diesen Warnungsgelächter und ihre Bewegung die Jungen, wie Bildsäulen auf den eben eingenommenen Plätzen sitzen zu bleiben oder von einem freien Zweige sich in das dunkle Laubwerk zu flüchten. Oder wenn die Gefahr noch entfernter scheint, mahnen die plötzlich innehaltenden Eltern mit einem feinen, langgezogenen Tone zum allgemeinen Stillstand und zu vorsichtigem Nieder-

vom Sommer bleiben gern vereinigt und suchen gemeinschaftlich die Quellen der Nahrung auf, welche hauptsächlich in Kerbthieren, Sämereien und Baumfrüchten besteht. Andere Meisen, Kleiber und Goldhähnchen ziehen im Herbst mit ihnen umher. So gesellig sie einerseits aber auch sind, so zänkisch und kampftüchtig sind sie andererseits. Schwächere, namentlich kranke und verwundete Vögel werden von ihnen angegriffen und getödtet. Ihnen spalten sie den Schädel und fressen das Hirn aus. Selbst größeren Vögeln kommen die hochhaften Kämpfer zuweilen mit Hinterlist bei und siegen über sie mittelst der Krallen und Füße. Ihre List führt sie auch im Winter an die Bienenstöcke, wo sie durch Klopfen mit dem Schnabel die Insekten veranlassen, einzeln herauszukommen, um über sie herzufallen, das Fleisch zu fressen und den Panzer fallen zu lassen. Die Noth macht sie zu Allesfressern, und mit außerordentlichem Scharf-

sinn entdecken sie die Abfälle in Höfen und auf Straßen. An den Fleischerläden picken sie Löcher in Fleisch und Speck, der Hausfrau stehlen sie ganze Stücke der vor die Fenster gehängten gerupften Gänse, auf Böden und in Kammern hämmern sie in die Säcke, welche gedörrtes Obst oder Rüsse enthalten, Löcher, um an den Inhalt zu gelangen. Offenbar leidet sie dabei der Geruch.

Aus alledem geht hervor, daß die Rehtmisse, bei aller Zärtlichkeit gegen ihre eigene Familie, doch ein streits, gant- und morbfüchtiges Thierchen ist. Ihr Muth, ihre

Ausbauer, ihr Fleiß, ihre Kühnigkeit, ihre Stickschicken in die Umstände, ihr Scharfzinn — alle diese Eigenschaften ragen in ihrem Wesen sehr hervor, und da die Natur sie mit vortrefflichen Werkzeugen in Gestalt des keilförmigen kurzen Schnabels, unterstützt und gekräftigt durch verhältnismäßig sehr starke Beißmuskeln, und der breiten, scharfnageligen Füße ausgerüstet hat, so vermag sie sich den Zugang zu den verborgenen schädlichen Larven der Gerüche zu verschaffen und stiftet dem Menschen durch Vertilgung schädlicher Kerfe einen ganz unberechenbaren Nutzen, der sie der gartesten Schonung werth macht.

## Ueber die Natur der Arbeit.

Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Menschen.

Von A. C. Grandjean.

— Zweiter Artikel.

Betrachtet man nur einen geringen Theil der zahllosen Werkzeuge und Dinge, welche dem civilisirten Menschen zur Erzeugung seiner Lebensbedürfnisse Dienste leisten müssen, so kann man einestheils nicht genug über die Arbeit erstaunen, welche die Natur verrichten mußte, um die sogenannten Rohmaterialien dazu hervorzubringen — und andernteils das Genie des Menschen nicht genug bewundern, wodurch er fähig wurde, sich derselben so geschickt zu seinen Kulturzwecken zu bedienen. Fast noch bewunderungswürdiger ist es aber, wie ein civilisirter Mensch in der verhältnismäßig kurzen Zeit seines Lebens, den Nutzen und Gebrauch der unzähligen materiellen und geistigen Hülfsmittel der Kultur und des Lebensgenußes erlernen und verstehen kann, welche das Wesen derselben bilden, und die Summe der geistigen und materiellen Arbeit von Jahrtausenden und von vielen Tausend Erfindern und Entdeckern darstellen. Das ökonomische Gesetz der Arbeitsteilung ist denn auch schon mit dem Entstehen der ersten künstlichen Hülfsmittel der Kultur oder vielmehr mit dieser selbst ausgesprochen und thatsächlich — wenn auch in weiteren Umständen, als wir sie gewohnt sind — in's Leben getreten; es hat sich aber mit der Anhäufung der Kulturmittel auch immer mehr gespalten, und wird dieses fort und fort geschehen, je mehr die Produkte und die Mannigfaltigkeit derselben mit der menschlichen Arbeit wachsen. Diesem Gesetz folgen nicht minder die rein geistigen oder wissenschaftlichen und künstlerischen Bestrebungen des Menschen; denn je umfangreicher und mannigfaltiger diese werden, je weniger kann sie ein menschlicher Geist mit Nutzen oder Erfolg bearbeiten. Es ist deshalb auch in diesen Gebieten der Kultur schon seit längerer Zeit das Specialisiren als Nothwendigkeit hervorgetreten, und es wird für die Folge keine Universalgelehrte oder Universalünstler, wie in früheren Zeiten, wo die Gelehrten zugleich Theologen, Mediciner und Jus-

tisten und die Künstler Maler, Bildhauer und Architekten u. s. w. waren, mehr geben können.

Kaum haben die ersten Menschen (nach der Bibel) den paradiesischen oder reinen Naturzustand verlassen, so treten sie, wie es der Ordnung der Kulturstufen nach sein muß, als Jäger auf. Mit Bogen, Pfeil und Schreuder wird dem Wilde nachgestellt und allmählig der Uebergang in's Nomadenleben angebahnt; denn Noah war schon ein Nomade und rettete die vorfluthliche Thierwelt und Menschenkultur in die Jetztzeit.

Diese Völkerversage von einer Sündfluth, welche so weit verbreitet ist, hat etwas ungemein geheimnißvoll Angenehmes; sie scheint der Schlüssel zu sein, der vielleicht die dunkle Pforte zu öffnen bestimmt ist, welche die Gemeinsamkeit des Menschengeschlechts in der Abstammung und in ihrem Alter noch verbirgt; sie kann aber auch möglicherweise noch wichtige geologische Fragen lösen helfen.

Je mehr sich die Völker der Bibel dem Feldbau und festen Wohnsitz nähern und unter einander durch Handel, Künste und Wissenschaften in Verbindung treten, je mehr tritt das Bedürfnis ein, die mit dieser Lebensart notwendige verbundene mechanische Arbeit an andere Kräfte zu übertragen. Das Nomadenleben hatte diesem Bedürfnis schon vorgearbeitet; denn in ihm wurden die Thiere, welche später und noch jetzt den größten Theil der Arbeit, die mit dem Ackerbau verbunden ist, übernehmen müssen, gezähmt und an den Menschen gewöhnt. Ebenso wußte sich schon der Nomade schwächere oder unwillkürliche Menschen dienstbar zu machen oder in das Joch der Sklaverei zu schmiegen.

Hierbei stößt man zuerst auf die dem ganzen civilisirten Alterthum abhängende Verachtung der mechanischen Arbeit, welche bis auf den heutigen Tag noch nicht vollständig überwunden ist. Geht man aber dieser Erscheinung,

welche uns so widerwärtig erscheint, etwas näher auf den Grund, so hat sie doch eine weit größere Berechtigung, als man dem äußeren Anschein nach glauben sollte.

Ganz abgesehen von dem in die Menschennatur gelegten und in ihrer ganzen Organisation begründeten Bestreben, die harte, mechanische Arbeit, welche die Lebensbedingungen des Menschen mit sich brachten, von sich abzuschieben und sie entweder durch leblose oder lebende Kräfte verrichten zu lassen; mußten ganz naturgemäß die Thiere, welche zuerst hierzu gebraucht wurden, der Maßstab werden, wonach aus diejenigen Menschen brauchbar wurden, welche freiwillig oder gezwungen sich solchen Arbeiten unterzogen. Da diese menschlichen Arbeitsmaschinen sich nicht mit ihren Gebietern nach den Regeln des hiermit zusammenhängenden und aus diesem Gesichtspunkte entstandenen, überall verbreiteten Kastengeistes vermischen konnten; so wurde der Charakter dieser Arbeitsmenschen erblich, und sie selbst wurden eine Sache, wie die Thiere, deren Loos sie theilten. Die größten Philosophen und humansten Geister des Alterthums fanden nichts Anstößiges oder die Menschheit Entwürdigendes in diesem Zustande, sie waren daran gewöhnt, hielten die arbeitenden Menschen für andere Arten, die nicht zu den höheren Lebensfunktionen, deren sie sich erfreuten, geboren seien. Es kann deshalb nicht verwundern, wenn die Arbeit mit demselben Maßstabe gemessen wurde, wie die Arbeiter — und es war auch in der That der Abstand zwischen den arbeitenden und gebietenden Klassen so groß, daß die geistige Weltanschauung derselben eben so weit auseinander gehen mußte und dadurch eine Annäherung oder Vermischung unmöglich oder doch sehr erschwert wurde.

Wie und wann der erste Stoß zur Emancipation der Arbeit geschah, dürfte schwer zu untersuchen und zu entscheiden sein; sie ging aber jedenfalls aus einem tiefen Bedürfnis hervor und hatte natürlich, wie alle Kulturerscheinungen, nur einen unscheinbaren Anfang. Das Bedürfnis, welches die theilweise Emancipation der Arbeit hervorrief, scheint das des Verkehrs der civilisirten Völker des Alterthums unter einander gewesen zu sein, nämlich der Handels- oder Produktaustausch, der überall und zu allen Zeiten cosmopolitischer und gemein-socialer Natur war. Der Geist der Freiheit und Gleichheit hat sich denn auch zuerst, wenngleich verschieden in Maaß und Form, wie die moderne Weltanschauung es haben will, in Handelsstaaten Bahn gebrochen, und er that dieses um so vollkommener, wenn der Handel ganz oder doch zum größten Theile auf eigene Industrie, also eigne Arbeit, gegründet war. Die mächtigen Handelsrepubliken des Alterthums und des Mittelalters kamen auf ziemlich breiter Grundlage von Freiheit und Gleichheit empor, sanken aber wieder, sobald sich eine herrschende, die Arbeit verschmähende Aristokratie in ihnen bildete, die nothwendig das Verständnis der wahren Interessen des Staates, den sie regierten

sollte, verlieren mußte. Alle diese Staaten waren aber noch weit entfernt davon, die Gleichheit aller Menschen vor Gott und dem Gesetz anzuerkennen oder die sogenannten ewigen Menschenrechte und damit die Emancipation der Arbeit zu proklamiren.

Erst als die Arbeit aus den kleinen Werkstätten heraustrat, um sich unter der Hülfe von Maschinen und dem Schuß gesetzlich geordneter Verhältnisse zur höheren Industriefähigkeit zu gestalten, nahm sie eine Form an, die ihr gestattete, sich den höheren Schichten der Bevölkerung ebenbürtig an die Seite zu stellen. Mit dem Aufkommen der großen Industrie wurde allmählig die Schiedswand entfernt, die der Kastengeist aufgerichtet hatte. Selbst die Künstler in den Städten des Mittelalters, welche einen so regen Freiheitsinn zeigten und so eifersüchtig auf das Wohl ihres Gemeinwesens sahen, hatten nur einen äußerst beschränkten Begriff von der Natur der Arbeit und den Folgen, welche ihre Emancipation herbeiführen konnte. Sie waren principmäßig gegen jede Neuerung, die nicht ihr Werk war, und suchten mit allen Mitteln diejenigen Versuche zu verhindern, welche eine freiere Entfaltung der Arbeit befürderten ließen. Und dennoch hat die Menschheit diesem verfeinerten Schematismus der Arbeit, wie er sich in den Künften offenbarte, unendlich viel zu verdanken; denn nur in diesen geschlossenen Genossenschaften, hinter Mauern und Thürmen, konnte sich der Geist des höheren Bürgerthums gegen die Gewaltthatigkeit des raublustigen Adels entwickeln und zu einer Macht erstarken, die ihm einen Theil an der Gesetzgebung sicherte und es theils gefürchtet, theils geachtet machte.

So sehen wir in dem so sehr geschmälerten, aber bekannten Mittelalter aus den meist kleinen Handels- und Industrierepubliken diejenigen Institute heranzuwachsen, welche später, aus dem beschränkten Raum der Städte heraustretend, in riesigen Dimensionen sich ausdehnten und unter dem Schutze geordneter Institutionen zu einer weltbeherrschenden Bedeutung aufschwangen. Es kann nichts Erhebenderes und Befriedigenderes für die Interessen der Menschheit geben, als wenn man den Erscheinungen folgt, welche der Emancipation der Arbeit immer zur Seite gehen. Da, wo die große Industrie und der Handel einmal Wurzel gefaßt haben und, von der Gesetzgebung geschützt, ihre Schwingen entfalten können, werfen sie in der Gestalt von Arbeit alle Schranken vor sich nieder und werden die gebietenden Mächte, deren Interessen überall an der Spitze stehen.

Ein civilisirter Staat kann aber auch nicht mehr ohne die enteignete Arbeit bestehen, denn nur diese ist im Stande, die Produkte hervorzubringen, welche dem Staat die Steuerkraft geben und erhalten, die zur Existenz eines modernen civilisirten Gemeinwesens nothwendig ist.

Arbeit, Geseßung, Freiheit und Wohlstand sind unzerrennlich — man könnte sagen, sie sind identisch! Man sagt nicht umsonst: „Arbeit macht frei“ — es muß aber freie Arbeit sein!

Es ist höchst interessant, den Weg zu verfolgen, welchen die entfesselte Arbeit genommen hat. Zuerst trat sie aus den dampfenden Werkstätten des Mittelalters, aus den lichtarmen Gassen der eingemauerten Städte in die offene, freie Natur; — sie benutzte Wind und Wasser, um den größten Theil der mechanischen schweren Arbeit diesen Naturkräften oder starken Thieren aufzubürden. Die übrige Arbeit wurde specialisirt und mehr oder minder zweckmäßig vertheilt, und es kamen dazu Vorrichtungen und Werkzeuge, welche sich nur im Großen anwenden lassen, aber dann auch Großes leisten. So wurden eine Menge von Lebensbedürfnissen auf viel billigere Weise dargestellt und auf den Markt gebracht, wie sie die gefesselte Werkstatt hervorbringen konnte. Dadurch wurden nun zwar kleine Wohlstände gesichert, dagegen aber große geschaffen. Der freie Handel und die Großindustrie sind die Erzeuger großer Kapitalien, ohne welche eine großartige Entfaltung der Produktion und Consumtion unmöglich ist. Durch die Kapitalien werden aber auch die geistigen Kräfte der Menschen befruchtet und eine Menge Naturerzeugnisse, welche früher nutzlos im

Schooße der Erde verborgen lagen, in den Kreis der Produktion, resp. Consumtion gezogen. Es werden — wenn man nur Kohlen und Eisen nimmt — durch die Einföhrung der größten Maschinen Millionen Menschen erforderlich, um allein die Rohmaterialien für die große Industrie herbeizuführen; die Nachfrage nach Menschen nimmt in großartigen Dimensionen zu, und der Verbrauch an Lebensmitteln vervielfacht sich. Das gibt auch dem Ackerbau zunächst in den Industriezweigen und dann in immer weiteren Kreisen einen neuen Impuls. Der stette Absatz und die guten Preise treiben zur Verbesserung, zur Mehrproduktion und die theuren Löhne zur Anwendung von Maschinen an. Eins folgt aus dem Andern, Eins treibt das Andere! Künste und Wissenschaften finden auch dabei ihre Rechnung, — die Einen in Vergierung und zweckmäßiger Darstellung der Produkte; die Andern in neuen Erfindungen und in Verbreitung des Wissens und der dazu gehörigen Hülfsmittel, wie Schreiben, Lesen, Rechnen, Sprache etc. Kurz, alle menschlichen Fähigkeiten, wenn auch mit Unzutraglichem gemischt, werden in diesen Laufwerke gezogen und arbeiten mit an dem großen Werke der Kultur, deren gewaltiges Triebrad das Ringen des Menschengeschlechtes nach Befriedigung seiner leiblichen und geistigen Bedürfnisse und eines beiteren oder sorgenfreien Lebensgenusses durch materielle und geistige Arbeit ist.

## Literarische Anzeigen.

Verlag von **Friedrich Vieweg und Sohn**  
in **Braunschweig**.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

**J. F. Hellmuth's**  
**Elementar-Naturlehre**  
für Lehrer an Seminarien und Volksschulen, sowie zum  
Schul- und Selbstunterrichte.  
**Ziebenechte Auflage.**

Methodisch und durchaus neu bearbeitet  
von **G. Heidert**,

Professor der Mathematik und Naturwissenschaften an der höheren Bürgerrealschule zu Hildesheim.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Rein  
Seidenpapier. geb. Erste Hälfte. Preis 20 Sgr.

## Flora marchica.

Für die beginnende Jahreszeit empfehlen wir zum Gebrauche bei  
Exkursionen:

**Dietrich, Dr. A.**, Flora marchica oder Beschreibung  
der in der Mark Brandenburg vorkommenden Pflanzen.  
Neue Ausgabe. 8. (Kadenpreis 2 Thlr. 2 1/2.)  
Für — 25 Sgr.

Berlin. Mai 1869.

Grellius'sche Buch- u. Antiq.-Handlung.

Verlag von **Friedrich Vieweg und Sohn** in **Braunschweig**.  
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

## Der Schall.

Acht Vorlesungen gehalten in der Royal Institution  
von Grossbritannien  
von **John Tyndall**,

Mitglied der Royal Society, Professor der Physik an der Royal  
Institution und an der Bergwerksschule zu London.

Autorisirte deutsche Ausgabe herausgegeben durch  
**H. Helmholtz und G. Wiedemann**.

Mit 169 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8.

Fein Velinpapier. geb. Preis 2 Thlr.

## Wichtige Novität!

So eben erschienen und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

**Dr. Thomassen,**  
**Enthüllungen aus der Urgeschichte**

oder:

**Existirt das Menschengeschlecht nur 6000 Jahre?**

Eleg. broch.

Preis 18 Sgr.

128 Seiten.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 33 Sgr. (1 R. 30 Kr.)

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verleger: G. J. Neumann, Neudammstr. 10.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 23.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetfchke'scher Verlag.

**9. Juni 1869.**

**Inhalt:** Das Salzland, von Karl Müller. 4. Geschichte und Leben der Salzflor. — Die Erdbeben, ihre Erscheinungen und ihre Entstehungsvorgänge, von D. Bütschli. Erster Artikel. — Die Eifel, von Ph. Wirtgen. Fünfter Artikel.

## Das deutsche Salzland.

Von Karl Müller

### 4. Geschichte und Leben der Salzflor.

Es ist eine höchst bemerkenswerthe Thatsache, daß im Binnenlande, wie der vorige Artikel nachwies, nur sechs Halophyten bei uns nicht dem Meeresstrande angehören. Näher betrachtet, lassen sich aber dieselben dennoch auf den Meeresstrand zurückführen. *Kochia scoparia* verbreitet sich offenbar vom österröschischen Littorale nach Deutschösterreich; *Artemisia rupestris* kann von Deland hergeleitet werden, wo es auf Kalkfeilen gerade so wie in Sibirien wächst; *A. laciniata* hat, wie ich schon berichtete, seinen Centralheerd in Sibirien und kann deshalb recht gut eine Meerstrandpflanze sein, wenn wir uns die sibirischen Salzebenen als ehemaligen Meeresboden denken; *Capsella procumbens* erscheint besonders an der Wolga, in Taurien und auf Cypern, macht also keine Schwierigkeit, als Meerstrandpflanze zu gelten; *Polamogelon marinus* steht wenigstens als Bes

wohner des Jasmunder Boddens mit der *Distis* in Verbindung und *Carex hordeistichos* deutet in ihrer Hauptverbreitung nach Osten hin, so daß sie recht wohl aus dem unteren Donaulande stammen kann. Wihin gibt es keine einzige Salzpflanze, die nicht zugleich Meerstrandpflanze wäre.

Hiernach fragt es sich nun, ob die binnenländischen Halophyten von den Meeresküsten eingewandert, oder ob sie ursprünglich sind? Das Erstere scheint in Wahrheit das Einfachere, Natürlichere; denn wir fanden ja, daß von 40 Arten, welche das Binnenland besetzt, bis auf die vorhin genannten alle übrigen an unsern Meeresküsten vorkommen, ja, daß manche längs der Ströme bis tief in das Binnenland angetroffen werden. In der baltischen Ebene namentlich gibt es einige Punkte, z. B. in Mecklenburg-Schwerin



ten Daffower-See und seine Umgebung, von denen es geradezu lächerlich zu behaupten wäre, daß ihre vielfachen Salzpflanzen ursprüngliche seien, da jener See mit der Löss in Verbindung steht. Die Verbindung unsrer Binnengewässer mit dem Meere, dem sie zufließen, die Wanderungen der Wasservögel von einem Punkte zum andern, und manche andere Ursachen erklären hinlänglich das Vorkommen vieler Salzpflanzen im Binnenlande. Troßdem lassen sich nicht alle Erscheinungen auf diese einfache Art der Colonisation zurückführen; einige Salzpunkte müssen, mit andern Worten, als selbständige Schöpfungsheerde betrachtet werden. Das gilt auch vom salzigen See von Erielen. Er empfängt zwar sein Salz durch eine schwache Salzquelle, die sich aus der Umgebung in ihn ergießt, wodurch er selbst kaum an ein brackisches Wasser erinnert; an seinen Ufern indeß concentrirt sich das Salz durch beständige Verdunstung so, daß sie im Stande sind, eine reiche Salzflor zu ernähren. Als ich ihn zum ersten Male sah, kam ich eben von den Ufern der Nordsee zurück und fand mich augenblicklich auf den Strand von Wangerooge zurückversetzt, wo ich mehrere Monate gelebt hatte. So vollständig ähnlich reichten sich die Salzpflanzen des Ufers hier aneinander; nur mit der Einschränkung, daß es an seinem Saume keine Dünen gibt. Das Kiehländ dagegen und die höher gelegenen, von Salz getränkten flachen Ufer entsprechen ganz der Gemarkung und der Ruderalflor des Salzglandes. Je nach tiefer Bodenunterlage, in welcher das Schilf (*Phragmites vulgaris*) überall bezeichnend hervortritt, erscheinen etwa 30 Pflanzen, welche mit Ausnahme von 6 salpigen Arten (*Trifolium fragiferum*, *Hippuris*, *Lactuca saligna*, *Atriplex incinolata*, *Poa dura*, *Agrostis stolonifera*) achte Salzpflanzen sind: *Spergularia salina*, *marginata*, *Melilotus dentatus*, *Apium graveolens*, *Bupleurum tenuissimum*, *Aster Tripolium*, *Artemisia maritima*, *Erythraea pulchella*, *Linariaefolia*, *Samolus Valerandi*, *Glaux*, *Plantago* und *Schoberia maritima*, *Salicornia herbacea*, *Kochia scoparia* (die aber nicht mehr gefunden wird, obgleich sie umgewandelt vorhanden war), *Atriplex hastata*, *Triglochin maritima*, *Juncus Gerardi*, *Scirpus parvulus*, *maritimus*, *Blysinus rufus*, *Carex hordeistichos*, *Glyceria distans*, *Pottia Helmii*. Dieser Verein ist so groß, daß er sich, um einige und 60 deutsche Meilen von der Nordsee entfernt, nicht durch Einwanderung erklären läßt; so wenig, als auch noch viele andere kryptogamische Pflanzen (*Chara*-Arten und Algen) im See selbst hinzutreten. Ja, wie *Carex hordeistichos*, *Kochia scoparia*, *Atriplex incinolata* und *Lactuca saligna* nach dem Osten hinduten, so beherbergt der See auch Käferformen, welche an die russischen Salzsteppen erinnern. Es ist folglich nicht zu viel gewagt, wenn man für manche Salzkorte eine Ursprünglichkeit ihrer Salzflor annimmt. Die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme erhöht sich für den Mansfelder Salzsee durch einen Hintblick auf die Salzflor von Aetern

und seiner Umgebung. Hier nämlich erscheinen wieder Halophyten, welche noch niemals an dem Salzsee beobachtet worden sind: *Capsella procumbens*, *Oblone pedunculata*, *Artemisia rupestris*, *lacinata*, während jener Lokalität andere des salzigen Sees fehlen, z. B. *Scirpus parvulus*, *Blysinus rufus*, *Carex hordeistichos*, *Juncus Gerardi* u. A. Wollte man nun die Einwanderung der Salzpflanzen des salzigen Sees von unsrem Meeresküsten ableiten, welche so entfernt liegen, so würde es doch sehr sonderbar sein, daß Aetern und der Salzsee, welche nur um 5 Meilen von einander getrennt sind, ihre eigenthümlichen Arten besitzen, obgleich eine Wanderung von beiden Orten durch mancherlei Ursachen leicht denkbar wäre. Derselbe Fall spielt aber auch in der Nachbarschaft von Aetern weiter. Denn obwohl dessen Saline von Frankenhäusen und der Domäne Numburg (nordwestlich vom Koffhäuser) nur um wenige Stunden entfernt ist, so hat doch jeder dieser drei nahe gelegenen Punkte, bei aller Verwandtschaft seiner Salzflor, seine besondern Eigenthümlichkeiten. So erscheint bei Aetern und der Numburg *Oblone pedunculata*, während sie bei Frankenhäusen fehlt; umgekehrt tritt bei Aetern die *Artemisia maritima* auf und mangelt den beiden andern Orten. Gehen wir noch weiter, so erscheinen Salinen, welche der Nordsee außerordentlich nahe liegen, z. B. die fünf Salinen der Münster'schen Mühle in Westphalen, merkwürdig arm an Salzpflanzen, während jene Salzorte der Provinz Sachsen so außerordentlich reich an ihnen sind. Jedenfalls erklärt sich das am einfachsten durch die Annahme einer Ursprünglichkeit.

Ganz Ähnliches bemerkt man auch an andern entfernten Punkten, so z. B. in Mädran an dem Rönig-See. Auch hier laugt das Wasser salzige Bestandtheile aus den umliegenden Hügeln von Leiniz und Mautniz; aber augenblicklich taucht eine Salzflor auf, welche, obgleich weit vom Meere entfernt, doch charakteristisch wird: *Salicornia herbacea*, *Schoberia* und *Plantago maritima*, *Aster Tripolium*, *Melilotus dentatus*, *Glyceria distans*, *Carex hordeistichos* u. A., die sich wieder mit salpigen Pflanzen eigenthümlicher Art verbinden, mit: *Kochia prostrata*, *Senebiera Coronopus*, *Scorzonera parviflora*, *Crypsis aculeata*, die sonst nur im ungarischen Tiefland ihren nächsten Heerd besitzt, u. A. Es ist sicher, daß z. B. das letztgenannte Gras von daher eingewandert sein kann; allein die Hauptbestandtheile der Salzflor scheinen doch ursprünglich zu sein. Nur so versteht man auch, daß an manchen Salzpunkten tief im Binnenlande vereinzelte Halophyten auftauchen, ohne einen größeren Verein von Salzpflanzen um sich zu sammeln. Dente ich mich in die Vorzeit zurück, so erscheinen mir diese vereinzelten Salzpflanzen wie die letzten Reste einer ehemaligen Strandflor. In der That löst diese Ansicht umgewungen ihr Dasein. Es hat keine Schwierigkeit, sich zu denken, daß ehemals, wo an Stelle der heutigen Soolquellen ein offenes Meer oder doch

vielefach verzweigte Meereshäfen vorhanden sein mußten, welche durch ihre Salznieferflüge die Ursache zu der Bildung dieser Soolquellen wurden, ganze Formationen von Salzpfannen an dem Strande aufstauten, daß sie aber mit der zunehmenden Landbildung viele Jahrhunderte später durch die Kultur des Menschen zu Grunde gingen. Wir sehen dieses auscheiden einzelner Arten noch heute vor sich gehen, sowie sich die Verbindungen zu ihrer Erhaltung ändern. Am salzigen See von Gileben ist *Kochia scoparia* verschwunden, *Carex hordeistichos* im Aussterben begriffen; fast nur die aemönllichsten Salzpfannen sind zurückgeblieben. Selbst das sonderbare Ueberflingen mancher Arten auf weit entfernte Standorte, wovon ich im vorigen Artikel so manches Beispiel gab, erklärt sich einfach durch diesen Wind in die Vorseit; die Verbindungsadler sind ausgefloren. Kein Wunder folglich, daß Salinenorte, wo Strahlwerke sind, welche den Boden fort und fort mit Salz tränken, verhältnismäßig noch die meisten Salzpfannen beherbergen.

Denken wir uns nun sämtliche Halophyten auf einen Punkt vereinigt, so müßte das Leben, welches sie unter sich entfalten, einem großen Wechsel unterworfen sein. Von den 131 Arten nämlich bekleiden nur 82 für immer den Boden, weil 7 von ihnen Sträucher und 75 ausdauernde Pflanzen sind. Dagegen scheiden 49 Arten aus dem jährlichen Verbanne aus, weil 9 von ihnen zweijährige und 40 einjährige Arten sind. Es ist fast dasselbe Verhältniß, welches unter den 3700 deutschen Pflanzenarten überhaupt stattfindet. Nach meiner Zählung nämlich setzen sich diese letztern zu  $\frac{1}{10}$  aus Sträuchern, zu  $\frac{1}{10}$  aus perennirenden, zu  $\frac{1}{10}$  aus zweijährigen und zu  $\frac{1}{10}$  aus einjährigen Arten zusammen; die Salzpfannen dagegen bekleiden zu  $\frac{1}{10}$  aus Sträuchern, zu  $\frac{1}{10}$  aus perennirenden, zu  $\frac{1}{10}$  aus zweijährigen und zu  $\frac{1}{10}$  aus einjährigen Arten. In Wirklichkeit freilich bleiben selbst von den mehrjährigen nur wenige in einem Zustande übrig, daß man nach Vollendung der Sommerlebens noch von einem Pflanzentode aus dem Salzlande sprechen könnte. Die wenigen Sträucher sind zerstreut, die perennirenden gieben meist ihre Sommertriebe ein, selbst die Gräser und grasartigen Formen büßen sie bis auf einige unbedeutende Reste ein; mit dem Eintritte des Winters ist das Salzland der volle Geirnsap zu dem Graulande, das sich grün und fröhlich selbst noch in dieser rauhen Jahreszeit neben ihm erhebt. Nur als garte Keimpflanzen geben die Nachkommen der 40 einjährigen Arten dem Frühling entgegen: *Malcolmia*, *Clypeola*, *Capsella*, *Lathyrus inconspicuus*, *Bupleurum*, alle *Erythraea*-Arten, *Linaria littoralis*, *Plantago Coronopus*, *Schoberia maritima*, die beiden *Salsolae*, *Salicornia*, die beiden *Corispermum*- und *Kochia*-Arten, *Obione pedunculata*, die beiden *Atriplex*, *Rumex maritimus*, *Euphorbia Peplis*, *Phleum arenarium*, *Poa lilloacea*, *Glyceria procumbens*, *Hordeum maritimum* und die 3 Lepturus-Gräser. Manche

ihrer Mutterpflanzen, z. B. die *Salsola*-Arten, treiben sich unterdeß als veredelte strobartige Pflanzenbüsche, ein Spiel der Winde, umher, bis sie dem Verrotten nahe sind. Kaum, daß die 9 zweijährigen (*Delphinium*, die 3 *Cochlearia*, *Eryngium*, *Apium*, *Scabiosa ucranica*, *Aster Tripollum*, *Tragopogon floccosus*) oder manche ausdauernde Arten durch eine Blüthenfeste an das alte Sommerleben zurückerrinnern. Die meisten der Keimpflanzen aber sind wie Blei an ihre Stelle gefest, die wenigstens, die dem schlammigen Kiebboden angehören. Hier fiel der Same wie in einen Leimtrichter, und beiderneils gruppiert sich darum die gleichen Arten, desonbers Schoberien, zusammen, wie es ihre Voreltern pflegten; der Sandboden allein gestattet eine weitere Ausbreitung, je nachdem es die zerstreuten Winde zu vollführen vermögen. Selbst eine Herbstfärbung macht sich an dem vergehenden Sommerbilde bemerklich; gerade die eben genannte *Schoberia maritima* färbt, wo sie massenhaft auftritt, die ganze Umgebung mit einem rothen Scheine, den ihre Stengel gegen den Herbst hin annehmen. Auch die *Salicornia* vollführt ein Aehnliches; nur daß sie, niedriger und mehr verzweigt, nicht die volle dunke Färbung jener hervorzubringen vermag. *Rumex maritimus* geht sogar in eine orangenfarbige, später braune Färbung über. Unterdeß fluthen die Wasser benachbarten Monocotelen nach wie vor auf und ab in ihrem Salzgewässer, als ob sie nicht von dem Winter berührt würden.

Offenbar fällt das schönste Sommerbild auf den Süden. Im Norden kann man nur wenige Halophyten zu den Zierkräutern rechnen; *Erythraea*-Arten, *Aster Tripollum*, *Althaea*, *Statice maritima* und *Limonium* sind fast Alles, was sich dahin rechnen läßt. Im Süden dagegen lehren diese Formen nicht allein wieder, sondern verbinden sich mit noch viel brillanteren Arten. Unter ihnen stehen oben an: *Delphinium Staphysagria*, *Scabiosa ucranica*, *Malcolmia maritima*, *Silene vespertina*, *Linum*-Arten, *Tamarix*-Arten, *Sonchus maritimus*, *Artemisia coerulescens*, *Stachys*, *Teucrium*, *Acanthus*, *Allium Chamaemoly* u. A. Das Alles verschwindet jedoch wieder vor jener Salzflut, die sich im Süden der Adria aufstaut, wo das südeuropäische Zuckerrohr (*Imperata cylindrica*), mehr noch der stattliche *Ampelodesmos tenax* unserer nordischen Schiffe vertreten. Wilde Kerfjagen (*Maltholia sinuata*) und Meerzwiebeln (*Pancratium maritimum*), letztere mit röthlich-weißen Blumenbuden auf hohem Schaft, wetteifern an Pracht oder an Wohlgeruch mit den Eistosen, Meerthrautsträuchern, Pflanzeln, Pforalen u. A., die sich hier dicht neben oder über ihnen am Strande erheben. Solcher Schönheit haben wir im Norden Deutschlands nichts Aehnliches entgegenzusetzen. Nur in der südlichen Bretagne, die dem warmen Golfstrom so unmittelbar ausgesetzt ist, finden sich diese südlichen Meerstrandpflanzen, zum Erstaunen des Beobachters, fast sämmtlich ein. Zu

den Nordsee-Palustriophyten gesellen sich: *Inula crithmoides*, *Sonchus maritimus*, *Statice tynchidifolia*, *Dodartii*, *Salsicornia fruticosa*, *radicans*, *Scirpus transluens*, *pungens*, *carinatus*, *Savii*, *Cypripis aculeata*, *Spartina stricta*, *Polypogon monspeliensis*, *maritimus*, *litoralis* u. A. unmittelbar am Strande; auf den Dünen: *Matthiola sinuata*, *Dianthus gallicus*, *Silene maritima*, *portensis*, *Erodium maritimum*, *malacoides*, *Tribulus terrestris*, *Helichrysum Stoechas*, *Centaurea aspera*, *Crepis Saffreniana*, *Omphalodes littoralis*, *Linaria arenaria*, *Lysimachia linum*, *stellatum*, *Atriplex rosea*, *Euphorbia Peplis*, *portlandica*, *Parasalis*, *Pancratium maritimum*

u. A.; an den Felsen des Ufers: *Frankenia levis*, *Lavatera arborea*, *Trichonema Bulbocodium* u. A. Welche Veränderung! Sie ist um so wichtiger, als manche der südlichen Pflanzen offenbar durch diese Lokalität hindurch nach den Ufern des deutschen Meeres gewandert sind, um theilweise in dem äußersten Westen des baltischen Meeres zu enden: *Convolvulus Soldanella*, die *Lepturus*-Gräser u. A. Es gehört zu den bemerkenswertheiten Eigenthümlichkeiten unser Salzflor, daß sie rings um die europäischen Küsten einen Kranz schlingt, der von dem äußersten Osten des baltischen Meeres bis zur Adria seinen Hauptbestandtheilen nach die größte Verwandtschaft in sich trägt.

## Die Erdbeben, ihre Erscheinungen und ihre Erklärungsversuche \*).

Von O. Püschell.

Erster Theil.

Nicht lange ist es her, daß wieder die Schreckensbotschaft von einem furchtbaren Erdbeben aus dem und zunächst durch Fortschritt und Kultur verwandten Continente zu uns herüber scholl, einem Erdbeben, das Tausende von Menschenleben in dem Zeitraum weniger Augenblicke vernichtet, Tausende von blühenden Stätten der Kultur und des Pantheis in Trümmerhaufen verwandelt und den Wohlstand mehrerer Länder vielleicht auf viele Jahrzehnte hin der Vernichtung nahe gebracht hat. Es war die Kunde von dem Erdbeben, welches etwa vor Jahresfrist Peru und Ecuador in Südamerika auf so entsetzliche Weise heimsuchte. Wer wäre damals nicht von Mitleid für jene unglückseligen Landstriche erfüllt worden, die nicht zum ersten Male der furchtbaren Beise der Natur auf diese Weise erlagen, sondern die schon seit Jahrhunderten der Schauplatz gewaltiger Erderschütterungen waren! Nicht ganzzahlige Jahre sind verflossen, ohne daß an der Westküste Südamerica's an einem oder dem andern Ort, häufig jedoch sogar auf weite Strecken, auf Hunderte von Meilen hin die Erdbeben ihre Wuth in größtlicher Weise offenbarten.

Ich ergreife die so nahe liegende Gelegenheit, anknüpfend an diese furchtbaren Ereignisse, welche die Aufmerksamkeit aller gebildeten und denkenden Menschen von Neuem auf sich gezogen haben, um die Errungenschaften der Wissenschaft bis zur neuesten Zeit in Bezug auf jene Naturereignisse darzulegen, und ich glaube im Hinblick auf jene südamerikanischen Ereignisse eine weitere Auslassung über die Wahl und die Zeitgemäßheit des Gegenstandes für unnöthig erachten zu dürfen. — Diese kleine Einleitung, die vielleicht bei der Betrachtung solcher, durch ihre Großartigkeit hinreichend in die Augen springender und das Interesse durch ihre stetige Wiederholung wachhaltender Phänomene

überflüssig erscheinen kann, rechtfertigt sich hauptsächlich dadurch, daß wie hier ein Gebiet betreten, wo und nicht gleich beim Eintritt große Fortschritte und Errungenschaften der Wissenschaft entzogenentzogen, sondern wo wir auf viele Zweifel, auf eine große Verschiedenheit der Ansichten und Meinungen stoßen, ja wo sich heutzuage noch zwei vorbereitende Erklärungsversuche heftig bekämpfen.

Es ist auch von höchstem Interesse, einen Blick auf die Streitigkeiten in einer wissenschaftlichen Frage zu werfen, die am klarsten die Mängelheiten und Hindernisse, die dem Fortschritt der Erkenntnis entgegenstehen, zeigen und dem Beobachter die Entwicklung einer Wissenschaft, gleichsam die Geburtwehen einer Theorie anschaulich zu machen vermögen, so ist es doch auf der andern Seite gewagt, eine noch ungelöste, von den Händen der Forscher bearbeitete Frage auf populäre Weise behandeln zu wollen. Dennoch glaube ich, daß, wenn mit einiger Gründlichkeit und wissenschaftlichem Ernst hierbei zu Werke gegangen wird, auch die Lösung dieser Aufgabe glücken kann.

Die Erscheinungen, um die es sich hier handelt, sind schon seit der ältesten Zeit bekannt und in ihrer Verbreitung auf der Erdoberfläche, so zu sagen, durch Nichts beschränkt. Die Kunde von größeren oder kleineren Erdbeben ist uns aus allen Gegenden zugekommen, in unsern Tagen, wie durch die Aufzeichnungen vergangener Geschlechter. Jedoch das Kind hat schon in der frühesten Jugend durch Erzählungen der schrecklichen Unglücksfälle, die sich an ihre Fesseln heften, Kenntniss von ihnen erlangt, so daß wir hier einem der Phänomene entgegentreten, das an allgemeiner Kenntniss mit jedem weitestern kann, das aber, wie manche so allgemein verbreitete Erscheinung, nicht entsprechend erkannt ist.

\*) Nach einem im wissenschaftlichen Verein „Fobverus“ zu Frankfurt a. M. gehaltenen Vortrage.

Schon die furchtbare Art und Weise, mit der so viele Erdbeben sich einstellen, oder ihr so plötzliches, unerwartetes Eintreten macht es, daß der Mensch von ihnen gerabegut überrastet wird oder, vor Angst und Schrecken der Besinnung beraubt, sich in späteren Tagen nur dunkel der Vorgänge zu erinnern vermag, die vielleicht sein Liebstes auf Erden dem Untergang weihen. Es gibt daher wohl nur wenige Naturerscheinungen, die durch Angst und Schrecken, durch Leichtgläubigkeit und Ueberalaben und die großartigen Eindrücke, welche sie hervorrufen, mehr entsetzt worden sind, und über die mehr Fabeln im Volke und selbst in der wissenschaftlichen Welt sich breit machen, als gerade diese. Es sind jedoch diese Irrungen im Hinblick auf das Verderben, das Erdbeben bis jetzt der Menschheit brachten, nur zu vergleichen, und ich kann nur mit Budele übereinstimmen, wenn er den großen Einfluß hervorhebt, den öftere Wiederholungen derartiger Erscheinungen auf den Volkscharakter eines Landes, wie z. B. Spaniens allmählig hervorbringen mußten. Gerade hier wäre es demnach Zeit, daß die Wissenschaft endlich einmal die wahren Gründe aufdeckte und den Vernichtungskampf gegen Aberglauben und Irrglauben schließlich vollendete. — Erst 17 neue Zeit hat auch die Erdbeben zum Gegenstand ihrer genauen Untersuchung gemacht, und hauptsächlich in den Ländern, die häufig von kleinen Erdbeben heimgegriffen sind, wie die Schweiz und Italien, haben sich wissenschaftlich gebildete Männer auch diesen Untersuchungen unterzogen.

Wie aber das Großartige die Vergrößerungssucht weckt, so erfuhren dies auch die Erdbeben, die gewöhnlich bedeutend durch dieses Bestreben entsetzt wurden. So hat Kant für das Erdbeben von Lissabon im November des Jahres 1755 eine Ausdehnung über  $\frac{1}{10}$  der gesamten Erdoberfläche berechnet, eine Zahl, die ohne Zweifel zu hoch gegriffen ist.

Wir beginnen nach diesen allgemeinen Bemerkungen die eigentliche Betrachtung der Erdbeben mit einer kurzen Schilderung der thatsächlichen bis jetzt beobachteten Verhältnisse. Ich glaube eine allgemeine Definition, die bei solchen Dingen stets hülfern genau klingt, hier übergeben zu dürfen und wende mich sogleich zu der Betrachtung der Erscheinungen, durch die ein Erdbeben sich anzeigt.

Ergitterungen der Erdoberfläche in höherem oder geringerem Grade sind alle Erdbeben, und zwar erfolgen diese Ergitterungen gewöhnlich stoßweise. Der in einer von einem Erdbeben heimgegriffenen Gegend sich befindende Beobachter verspürt einen oder mehrere in verschiedenen Zeiträumen sich folgende Stöße, die eine sehr geringe, meist wenige Sekunden lange Dauer haben, jedoch durch ihre Heftigkeit in jenem Augenblick die größte Stadt in Trümmer legen können. — In gerade die verheerendsten Erdbeben, wie das von Lissabon, das neueste zu Peru und Cuabur, haben sehr kurze Zeit ange dauert. Die ganze Zeit der Zerstörung betrug zu Lissabon nur 5 Minuten; der erste Stoß begann

und vollendete fast die gängliche Vernichtung der Stadt und hielt nur 5 bis 6 Sekunden an; hierauf folgten in dem Zeiträume von wenigen Minuten noch blüßschnel zwei Stöße — und das Werk der Vernichtung war vollbracht. Man braucht jedoch nicht besonders zu bemerken, wie mangethaft solche Zeitangaben bei schnell sich folgenden Stößen sein mögen, denn wer wird wohl während des Erdbebens von Lissabon sich die Kaltblütigkeit bewahrt haben, auf die Uhr zu schauen? — Keimliche Heftigkeit und Schnelligkeit auf einander folgender Stöße könnte man noch von einer großen Anzahl Erdbeben berichten; jedoch hat dies weiter kein Interesse. Dagegen findet sich jedoch auch das umgekehrte Verhältnis häufig genau. Es ist eine Seltenheit, daß ganze Länderstriche Monate und Jahre lang von kleineren Erdstößen denruhigt werden, so daß gleichsam auf einen oder mehrere heftige Stöße ein allmähliches Ausdehnen der inneren Gewalten folgt. So hat das Erdbeben von Cumana, wie Humboldt erzählt, 14 Monate ange dauert, so daß die bestürzten Bewohner ihre verbeerten Wohnungen nicht aufzubauen wagten. Nach dem großen Erdbeben in Galabrien, das sich bis nach Messina hin ausdehnte, sollen mehrere Jahre hindurch noch Erdstöße verspürt worden sein, und Spallanzani zählte im J. 1792 zu Messina noch 30 Erdstöße in 24 Stunden. Jedoch muß man hierbei der Beschaffenheit der Gegend Rechnung tragen; denn daß lang andauernde Erdbeben in der Nähe großer Vulkane häufig sind, ist natürlich. Jeder Ausdruck ist meist von kleinen Erdbeben begleitet, und die ihnen sich stets bewahrenden vulkanischen Kräfte, welche die Ursache jener Erschütterungen sind, können leicht Jahre hindurch an demselben Orte Erdbeben veranlassen. Weit seltener begegnet und diese Erscheinung in von Vulkanen freien Gegenden, und wir werden späterhin noch Gelegenheit haben, hierüber uns auszusprechen, wenn wir die gegenseitigen Verhältnisse von Erdbeben und Vulkanen überhaupt betrachten.

Bei jedem Erdbeben geräth die Erdoberfläche in eine Bewegung, und man hat sich von jeder bestrebt, die Art dieser Bewegung kennen zu lernen; auch ist es bis jetzt gelungen, drei sogenannte Bewegungsformen der Erdoberfläche wahrzunehmen, von welchen jedoch die eine mehr wie zweifelhafte Natur ist.

Entweder hat man direkte Stöße von unten nach oben gefühlt, und dies wird auch wohl die häufigste Bewegungsart sein, die sich bei Erdbeben bemerklich macht, vielleicht die einzige, welche die zweite nur hervorruft. Die Geologen haben diese Stoßbewegung die succussorische genannt, im Gegensatz zu der undulatorischen, nämlich einer wellenförmigen Bewegung, in die der Erdboden gerathen soll. Daß eine Erschütterung, eine stoßweise, succussorische Bewegung sich in Wellen in der die Erdschläche constituirenden Gesteinsmasse fortpflanzt, darüber ist wohl keine Frage, und daher die zweite Bewegungsweise wahrscheinlich nur als

unmittelbare Folge der ersteren zu betrachten. Daß jedoch der Erdbeben wahre Willen schlage, wie dies auch erzählt und geglaubt worden ist, kann nur ein leichtsinniges Märchen sein. Vielsach hat man die Erfahrung gemacht, daß die Erschütterung, von einer Seite kommend, sich über die Gegend hinweg; es sind dies derartige unbulatorische Bewegungen, die von dem Ort des eigentlichen Stoßes ausgehen. — Die dritte Bewegungsart, die wir oben als sehr zweifelhafte bezeichnet, ist die sogenannte rotatorische; es sollen nämlich hierbei wahre Drehungen um eine gewisse Axe stattfinden. Man hat hierfür mehrere Beispiele seit alter Zeit durch alle Lehrbücher geschleppt. Das bekannteste ist das der beiden Obeliskn vor dem Kloster des heiligen Bruno in Calabrien. Dieselben bestanden aus drei aufeinander gesetzten Steinen, von denen die beiden obersten nach dem Erdbeben um ihre Axe gedreht sein sollten, während das Fußgestell stehen blieb. Wie sich eine so wunderbare Erscheinung erklärt, ist sehr schwer begründlich, und man möchte vermuthen, daß die Steine vielleicht später wieder in dieser Position aufgesetzt wurden; denn die Rotationsaxe hätte bei diesem Erdbeben mit jeder der Axen beider Obeliskn zusammenfallen müssen. — Daß jedoch selbst bei einfachen Stößen Verdrehungen und Verschiebungen von Gegenständen auf der Erdoberfläche stattfinden müssen, davon kann sich Jeder durch kleine Versuche selbst überzeugen. Mit derselben Vorsicht sind alle andern derartigen Mittheilungen über rotatorische Bewegungen bei Erdbeben aufzufassen. Es ist natürlich, daß die Bewegung der Erdoberfläche auch häufig sehr verworrener Natur sein kann, hauptsächlich deshalb, weil ein verworrener Schichtenbau die ursprüngliche einfache Bewegung auf sehr verschiedene Weise zur Geltung an der Erdoberfläche gelangen lassen muß, so daß die sonderbarsten Umfaltungen und Verschiebungen der Dinge auf der Erdoberfläche dadurch hervorgerufen werden.

Im Allgemeinen glaube ich, daß der Art und Weise der Bewegung der Erdoberfläche keine große Bedeutung für die Erklärung dieser Erscheinungen beizulegen ist, da einmal die Modifikationen, welche die ursprüngliche Bewegung, die sie zur Geltung auf der Erdoberfläche kommt, erfährt, in den meisten Fällen sehr groß sein müssen und dann auch die Beobachtung dieser Bewegung selbst eine sehr mangelhafte sein muß. Gewöhnlich wird sich dieselbe auf einen einfachen Stoß zurückführen lassen. Man hat eigenthümliche Apparate construirt zur Beobachtung der Richtung, in der ein Erdbeben fortschreitet, und es ist diesen Beobachtungen jedenfalls eine hohe Wichtigkeit beizulegen. — Beobachtungen dieser Art sind hauptsächlich in Italien angestellt worden, und es hat sich hierbei ergeben, daß viele der dortigen Erdbeben einen unverkennbaren Zusammenhang mit den dortigen Vulkanen besitzen.

Begleitet werden die Erdbeben gewöhnlich von einem unterirdischen Geräusche, bald einem Drausen, wie das eines starken Sturmwindes, bald einem Graeseln, wie mit Ketten, oder einem Geräusch ähnlich dem, das ein schwer beladener, über das Pflaster fahrender Wagen hervorruft; auch explosionsartige Knalle u. s. v. hat man zu hören gelaubt. Jedoch sind diese dem Ohr vernehmbarsten Begleiter der Erdbeben keineswegs immer bemerkbar, und man hat heftige Erdbeben ohne jedes Geräusch erlebt, dagegen aber auch wieder unterirdisches Gekröhne und Stöße ohne jede Erschütterung. Bekannt sind diese Erscheinungen, die sogenannten Bramidos, von dem mexikanischen Hochland in der Nähe der Stadt Guanajuato. Dort hörte man vom 9. Januar 1784 an über einen Monat diesen unterirdischen Donner ohne jede Erschütterung so furchtbar, daß alle Einwohner sich flüchteten. Auch bei dem Erdbeben in Savopim im Jahr 1808 sollen Knalle wie Kanonenschläge gehört worden sein ohne gleichzeitige Erschütterung.

## Die Eifel.

Von P. H. Wirtgen.

Zweiter Artikel.

Mit den Vulkanen der Eifel stehen die Maare derselben im engsten Zusammenhange. Nur da, wo vulkanische Ausbrüche vorkommen, erscheinen auch die Kesselhäler, welche entweder einen offenen Wasserpiegel besitzen oder denselben durch Cultivirung verloren haben, oder von denen man nicht weiß, ob sie je einen solchen besaßen. Mit dem Namen „Maar“ belegt man überhaupt in der Eifel jeden kleinen Kanister, und nur einige derselben werden „Weiber“ genannt; das größte in der Nähe des Rheines bei Andernach befindliche Maar heißt allgemein in der Volkssprache „das Räch“.

Es besitzt wohl keine dieser Maare noch seinen vollständigen Wasserpiegel; überall hat die Kultur an ihnen genagt

und hat Theile ihres Bodens in Wiesen oder Ackerland umgewandelt. Die einzigen, welche noch Wasser besitzen, sind der Laacher See, 1400 Morgen groß, das Pulvermaar mit einem Durchmesser von 105 Ruthen, das Holzmaar mit einem Durchmesser von 80 Ruthen, das Uelmen Maar, 180 Ruthen lang und 136 Ruthen breit, das Meerfelder Maar, 121 Morgen groß, das Weinsfelder Maar von 142 Ruthen Durchmesser, das Schalken mehrdener von 153 und das Gemündener Maar von 109 Ruthen Durchmesser. Von sehr geringer Größe sind die schon erwähnten Maare am Rosenberge.

Die beiden Maare von Boos, zwei Maare von Uelmen, der Rosdrucker, der Dreiser und der Duppaa

cher Weiber sind zu Ende des vorigen Jahrhunderts oder in dem gegenwärtigen durch menschliche Thätigkeit ihres Wassers beraubt worden und zum Theil in gutes Wiesland, z. Th. in Sumpf mit Torfstichen umgelegt worden.

Von der Umwandlung des Strohnies und des dünnen Märchens bei Gyllenfeld, des tief in das Plateau eingesenkten Immerathes Maars, worin die Dörfer Dier- und Nieder-Immerath liegen, von dem Würmsee, welcher bei Eissfeld, dem Becken von Wehr bei Laach und mehreren anderen weiß man keine Zeit ihrer Trocknung und keine Spur von künstlichem Einflusse nachzuweisen.

Das tiefste aller dieser Maare ist das Pulvermaar bei Gyllenfeld, dessen Tiefe zu 302 p. F. angegeben wird, und dessen Spiegel 230' tiefer liegt, als das Plateau, in welches es eingesenkt ist.

Nur bei den in den Kratern des Mosensberges liegenden kleinen Maaren ist der Ursprung deutlich sichtbar. Von allen anderen ist kein vollkommen überzeugender Beweis vorhanden, daß sie in wirklichen Kratern sich befinden. Bei vielen liegen jedoch zahlreiche vulkanische Produkte, Bomben, Kapilli, Luff u. s. w., massenhaft umher. Daß dieselben aber der Vulkanität angehören und durch dieselben entstanden sind, dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen. Man hält jetzt wohl mit Grund dafür, daß die meisten dieser mehr oder weniger kreisrunden Kesseltäler, worin die Maare liegen oder gelegen haben, ihren Ursprung Explosionen, die wie Minenwirkung wirkten, zu verdanken haben, die Thäler also als Explosionskrater anzusehen sind. Die Kraft, welche aus der Tiefe der Erde wirkte und das darüber befindliche Gestein hoch in die Luft sprengte, wobei glühende Massen mit empor geschleudert wurden und mehr oder weniger abgerundet wieder zur Erde fielen, muß eine ungeheure gewesen sein, wenn wir das auf seiner Sohle allein eine Meile im Umfange haltende Kesseltal von Laach und die fast halb so großen Kessel des Meerfelder und Pulvermaares in Betracht ziehen.

Die stillen Wasserspiegel, in die Plateaus eingesenkt, in der Nähe ausgebehneter Kavaströme oder zerfallener Schladensklammern machen einen tiefen Eindruck auf das Gemüth des für die Sprache der Natur empfänglichen Beschauers, und besonders ist es das Gefühl der tiefsten Einsamkeit, das uns ergreift, wenn wir, an dem waldbewachsenen Abhange einiger dieser Maare auf einem mächtigen Felsblock sitzend, das laise Ansehen der Wellen erblicken. Hier und da springt ein Fisch über die Wasseroberfläche empor, oder ein unsicher fühlender Frosch springt plätschernd hinein, und Wasserbühner ziehen lange glänzende Furchen hindurch, Reiber oder kleinere Wasservögel ziehen schreiend ihre Kreise über unserem Haupte. Nur an zweien derselben, dem Meerfelder und dem Schalkenmehrer Maar, die aber bei weitem nicht mehr das ganze Kesseltal ausfüllen, liegen

Dörfer, und an dem dunkelblauen Laacher See erhebt die alte Abtei ihr künstthümliches Haupt.

Ganz besonders merkwürdig ist die Lage dreier Maare auf dem Mäuseberg bei Daun. Der Berg selbst, zum größten Theile aus devonischer Grauwacke bestehend, erhebt sich bis zu 1750', 600' über dem Spiegel der Eiser bei Daun. Es finden sich jedoch auch die deutlichsten vulkanischen Produkte an demselben, Luffe, Lava und Kapilli. In seinen Schooß sind vier Kesseltäler eingesenkt, von welchen drei große offene Wasserspiegel enthalten, während eines derselben, die Winkelbach, durch ein enghes Thal abgesehen ist. Das Weinfelder Maar liegt am höchsten, 527' unter dem Gipfel des Mäuseberges und 310' über der Eiser. Derselbe dieses Maars liegt und von ihm nur durch einen schmalen Bergkamm getrennt das Schalkenmehrer Maar mit einem 174' tiefer liegenden Wasserspiegel. Fünf Minuten westlich des Weinfelder liegt das Gmündener Maar, auf der Südseite von einer hohen, steilen Bergwand umgeben, dessen Spiegel 228' tiefer als der des Weinfelder liegt. Der Besuch dieses Berges und der Anblick der drei Maare macht auf den Wanderer den tiefsten Eindruck, besonders aber die ganz kahlen Umarmungen des Weinfelder Maars, auf dessen hohem Ufer sich eine kleine unsymmetrische Kapelle erhebt, die mit dem sie umgebenden Kirchhofe das Gefühl der tiefsten Einsamkeit nur noch erhöht.

Die Erwerbsquellen der Eisel fließen in den meisten Theilen derselben sehr spärlich. Viehzucht, Ackerbau und an einigen Stellen etwas Bergbau sind der Indegigkeit der menschlichen Thätigkeit; aber auch die Viehzucht liefert nur in wenigen Gegenden einen nennenswerthen Ertrag. Im Ganzen ist die Eisel Rindvieh-Race eine sehr unvollkommene, und nur im Westen, wo das Land an Belgien stößt, finden wir schöne Thiere. Leider ist in vielen Gegenden die Viehzucht Ursache großen Verlustes an Menschenkräften; denn nicht selten sieht man starke, kräftige Männer oder Frauen, welche tagelang auf der Wiese oder Weide liegen, um ihre zwei oder drei jämmerlichen Kühe, ihr bestes Besitztum, zu beschafflichen; nicht zu reden von der Verminderung der Kinder, welchen dieses Geschäft obliegt. In vielen Orten hat man freilich auch Hirten für die verschiedenen Viehgattungen. Schafzucht wird überall betrieben, und es finden sich viele Besitzer großer Herden, welche nicht allein in ihrer näheren Umgegend, sondern auch in weiterer Entfernung die besten Weiden in Pacht nehmen und mit ihren Schafen einen einträglichen Handel nach Frankreich treiben. Für dieses Geschäft möchte die Ausführung der Eiselsbahn von großer Wirkung sein! Die Landesrace ist zwar nicht die beste, denn sie erreicht nur Mittelsgröße, und die Wollens besitzt nur mittelmäßige Güte; allein die Thiere sind stark und kräftig, ihr Fleisch ist vorzüglich und der Wolltertrag bedeutend. Die guten Eigenschaften könnten aber noch sehr erhöht werden, wenn man Kreuzungen mit edleren Rassen

vernähme. Die Einführung fremder Racen würde sehr unsicher sein.

Die Schweinezucht ist ebenfalls ergiebig; doch geht auch hier die Thätigkeit nicht weit über die Aufbringung des eigenen Bedarfs. Ziegenweiden finden sich auch an vielen Orten.

Vermöge ihrer Lage würde die Eifel hauptsächlich durch die Viehzucht bedeutend gewinnen können, wenn man im Ganzen mehr Eifer darauf verwenden und die große Menge der Ländereien in gute Weidplätze verwandeln wolle. Die Schiffelwirthschaft ist in dieser Beziehung sicher kein Vortheil für das Land. In Betreff der Feld- und Waldkultur ist die Eifel jedoch seit dreißig Jahren in einem bedeutenden Fortschritt.

Der Ackerbau beschäftigt sich nur mit einer sehr geringen Anzahl von Pflanzungen. Ausgezeichnet gedeihen Hafer und Kartoffeln, und wenn bereits Eisenbahnen das Land durchziehen und diese vortrefflichen Producte leichter Abzweige erhalten, so wird die Eifel nicht allein an Anbau und höherem Ertrage gewinnen, sondern auch die Gegenden, welchen diese Producte nun leichter zufließen können, werden einen erheblichen Genuß davon haben. Roggen gedeiht ebenfalls in den meisten Gegenden sehr gut, nur ist der Körnerertrag gewöhnlich geringer, als man sonst zu erhalten gewohnt ist. Dasselbe gilt in einem noch höheren Grade von dem Weizen, den man freilich in den höher gelegenen Gegenden, welche über 1200 bis 1400' hoch liegen, gar nicht mehr cultivirt, weil er gewöhnlich im Frühling erfriert. Am besten gedeiht der Weizen auf dem Kalkgebirge, wo man auch besonders Spelz zieht, der auf der Grauwacke gar nicht gedeiht. Man unterscheidet daher auch allgemein den Kalk als Spelz- und die Grauwacke als Roggenboden. Flach- und Hafer wird gewöhnlich nur zum eigenen Hausbedarf gebaut. Beide Getreispflanzen würden für viele Landstriche eine bedeutende Einnahmequelle gewähren, da sie meistens gut geraten. Den Beweis liefert der benachbarte Huntrud, der ein nicht minder rautes Klima besitzt und doch sehr bedeutende Quantitäten von Flach auf den Markt bringt.

Eine eigenthümliche Kulturart des Bodens ist das in vielen Gegenden noch sehr stark herrschende Schiffein. Jede Gemeinde besitzt mehr oder minder große Weiden, auf welchen das Vieh gewöhnlich nur spärliche Nahrung findet. Sie liegen wüsth, künzeln bis zwanzig Jahre ungebaut, dann werden sie getheilt und jedem Ortsangehörigen sein Antheil überwiesen. Der Boden wird alsdann mit allen darauf befindlichen Pflanzungen geschält und in einzelne einen Fuß hohe Haufen locker zusammen gelegt, Stängelzweige zu unter. Ist Alles getrocknet, so werden die Haufen angezündet, was gewöhnlich in der trockenen Herbstzeit von der Mitte September bis zur Mitte October geschieht. Auf den Hochflächen und Bergabhängen scheint Vulkan in seiner alten Thätigkeit wiedergekehrt zu sein. Hoch auf lodern die Flammen, und ein überlirrender Rauch verbreitet sich

über die ganze Landschaft. Die Asche dient als Dünger, und es wird zuerst Roggen hinein gesät, im folgenden Jahre pflanzt man Kartoffeln, im dritten Hafer. Dann bleibt der Boden mehr lange Jahre unbenutzt. Mit den verschiedenen Districten wird soviel als möglich gewechselt, so daß jeder Gemeindebürger jedes Jahr sein bestimmtes Schiffein erhält. Fortwährend werden aber jetzt solche Weiden und Schiffeelder in feste Kulturländereien umgewandelt.

Derjenige Theil der Eifel, welcher bereits oben als Marfeld bezeichnet wurde, besitzt jedoch einen so guten Boden, daß die angeschätzten Verhältnisse keine Anwendung finden. Hier gedeihen alle Feldfrüchte, besonders sämtliche Getreide ganz vortrefflich, denn es herrscht hier das milde Klima des Rheinthales, und der Röß, der Niederschlag der letzten Wassersbedeckung dieser Landschaft, gemischt mit den zahlreichen Producten der erloschenen Vulkane, bildet einen ausgezeichneten Boden.

Die Bewaldung, welche früher gewiß sehr bedeutend gewesen, wenn auch ohne Kultur, ist später durch die Ungunst der Zeiten sehr gesunken; das Klima wurde dadurch weit rauer und der Wasserreichthum verfehrt. Seit der preussischen Herrschaft ist die Waldkultur jedoch bedeutend gesiegen, da ihr eine sehr große Aufmerksamkeit zugewendet wird. Tausende von schlechten Öden sind in guten Wald umgewandelt, viele tausend Morgen von Heiden und Weiden sind gut bewaldet worden.

Von den Laubbäumen finden sich vorzüglich die Rothbuche, beide Eichen, die Eichenbuche, die gemeine Erle, die Birke, Eiche, die Esche, der Ahorn, die Linde, die Ulme seltener; von Nadelbäumen ist nur der gemeine Wacholder einheimisch, doch gedeihen Kiefer und Kieferbäume sehr gut und bilden große Bestände. Berühmt ist der große, ein Jahrhundert alte Kiefernwald zu Eichenhard im Kreise Andernau.

In den Gegenden mit fruchtbaren Gebirgsabhängen werden die Stiel- und die Traubeneiche mit ihren Aesten und Zweigformen zu Eschen benutzt und bilden oft große Bestände. Die Linde wird alle zwölf bis fünfzehn Jahre geschält, und die Stämme, welche gewöhnlich zwei bis drei Zoll Durchmesser haben, niedergeschlagen. Die getrocknete Linde, Loh, wird zum Beizen der Gemeindefasse verwendet und das Holz (Knüppelholz) an die Gemeindefürger vertheilt. Nicht selten wird der so entblößte Boden als Schiffein benutzt, bis später die Stodauschläge wieder in die Höhe wachsen.

Da, wo die Eifelthäler sich der Mosel nähern und die Bergabhängen eine südliche Abdeckung haben, tritt eine ausgezeichnete Vegetation auf. Namentlich ist dieses bei dem anmutigen Badorte Pettrich der Fall, wo an dem nicht sehr breiten Abhange des Palmenberges 120 Pflanzensarten wild wachsen, unter welchen der Buchebaum, wovon der Berg seinen Namen hat, und der dreilappige Ahorn von Montpellier die interessantesten sind.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 24.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetfke'scher Verlag.

**16. Juni 1869.**

**Inhalt:** Die Ausrüstung der zweiten deutschen Nordpolexpedition, von Otto Ale. Erster Artikel. — Die Bildhase, von Pfarrer Karl Müller von Alstedt. Erster Artikel. — Die Erdbeben, ihre Erscheinungen und ihre Erklärungsversuche, von D. Bütschli. Zweiter Artikel. — Literarische Anzeile. — Literaturbericht.

## Die Ausrüstung der zweiten deutschen Nordpolexpedition.

Von **Otto Ale.**

Erster Artikel.

Die Schiffe der zweiten deutschen Nordpolexpedition werden in wenigen Tagen die Anker lichten. Mit Stolz können wir auf dieses Unternehmen blicken, das in der Ausdehnung, die es jetzt erhalten hat, sich mancher berühmten Expedition Englands oder Amerika's würdig an die Seite stellen kann. Fast möchte man sagen, daß noch nie eine Expedition zur Erwartung großer Erfolge so berechtigte, wie diese. Wohl wissen wir, daß undurchsehbare Mißgeschick auch die sichersten Hoffnungen zu Schanden machen kann; aber der Ausrüstung wenigstens hat man es an nichts fehlen lassen, was irgend die reichen Erfahrungen früherer Polarfahrten geboten erscheinen ließen, tüchtigere Leute hat noch selten ein Schiff getragen, und so viele wissenschaftliche Forscher, deutsche Forscher zumal, fanden sich noch bei keiner Expedition vereinigt.

Wie bescheiden erscheint jetzt die vorjährige deutsche Nordfahrt, die nur mit einem kleinen Segelschiff von 80 Tons ausgeführt wurde, nur für wenige Sommermonate berechnet war und keinen gelehrten Forscher in Thätigkeit setzte? Es war freilich auch nur eine Reconnoissancefahrt für ein künftiges größeres Unternehmen. Aber bescheiden begann auch dieses jetzige. Die Mittel des Volkes, auf die ja allein bei der Ausführung gerechnet werden durfte, sollten möglichst gespart werden. Allerdings war die Anwendung der Dampfkraft von vornherein durch die letzten Erfahrungen geboten, und ebenso geboten im Interesse der Wissenschaft war eine Ueberwinterung an der grönländischen Ostküste. Nach dem ersten Plane sollte, um der möglichsten Ersparung wegen, versucht werden, das kleine Schiff der vorjährigen Expedition, die Grönland, in einen Schraus-



den dampfer zu verwandeln, und dann sollte dieses auch nur die zur Ueberwinterung bestimmte Gesellschaft an der grönländischen Küste aussetzen und zu selbstständigen Forschungen weiter gehen, um dann im folgenden Jahre zurückzukehren und die Gesellschaft wieder abzuholen. Dieser Plan erwies sich bald als unausführbar. Zunächst war die Grönland an sich nicht zu einer solchen Umwandlung geeignet; sobald erschien es doch zu bedenklich, Menschen an einer Küste aussetzen, von der man nicht mit Sicherheit vorherzusehen konnte, daß sie auch im nächsten Jahre selbst für ein Dampfschiff wieder erreichbar sein werde. Man mußte sich daher entschließen, ein neues Dampfschiff besonders zu dem Zwecke dieser Expedition bauen zu lassen und zwar von hinreichender Größe, um auch einige Gelehrte mit ihren Instrumenten und Proviant und Kohlenvorräthe für mindestens 16 bis 18 Monate aufnehmen zu können. Einer der tüchtigsten deutschen Schiffbauer, Herr Tiedtberg, erhielt den Auftrag, dies Schiff zu bauen, und bereits in den letzten Tagen des April war es vollendet. Es ist ein Schiff von 143 Tons Schallt, 90 Fuß lang, 22 1/2 Fuß breit und 11 Fuß tief, und sowohl durch seine starken Zwischenbalken wie durch seine eisernen und hölzerne Anker im Innern, wie durch seine handdicke, eiserne Epitkrant nach Außen einem ersten Kampf mit dem Eise gewachsen. Die Kosten dieses Schiffes, das den Namen „Germania“ erhielt, beliefen sich mit der Maschine auf 16,115 Thlr., dazu kamen aber noch Reservestückel und Boote, Küchen- und Zimmermannsgeräthe, Felze, Zelte, Schlitten, Eisanker und Eisbaten, chirurgische Apparate, wissenschaftliche und nautische Instrumente, Proviant und Kohlen, endlich die Lohnung für Offiziere und Mannschaft, so daß die Gesamtsumme der Kosten auf c. 40,000 Thlr. anwuchs. Aber auch dabei durfte man nicht bleiben. Auch die Germania war nicht im Stande, den ganzen erforderlichen Vorrath an Kohlen aufzunehmen. Größer aber hatte das Schiff nicht gebaut werden dürfen, wenn nicht sein Tiefgang vermehrt werden sollte, der, da das Schiff seinen Hauptweg längs der grönländischen Küste zu nehmen hatte, nicht mehr als 9 bis 10 Fuß betragen durfte, oder wenn man nicht das Schiff plattbodig bauen wollte, wodurch es wieder im Eise völlig undrausbar geworden wäre. Man mußte also noch an ein Transportschiff denken, das dem Hauptschiffe Proviant und Kohlen bis zum Winterquartier nachbrachte. Als solches sollte nun das kleine Schiff der vorjährigen Expedition, die Grönland, dienen, das aber nach verrichtetem Dienst in den deutschen Hafen zurückkehren sollte. Immerhin erwachsen auch dadurch neue Kosten, die sich etwa auf 4000 Thlr. berechneten.

So hoch sich auch bereits die Anforderungen gesteigert hatten, die man an die deutsche Nation stellen mußte, so fehlte es doch auch jetzt noch an Bedenken nicht. Das Schlimmste war, daß die Expedition so genau nur auf 1 1/2 Jahr berechnet werden mußte, daß ihr auch nicht einmal

die Möglichkeit einer zweiten Ueberwinterung gegeben werden konnte. Denn auch die beiden Schiffe zusammen saßen gerade nur den allernöthigsten Bedarf, und es konnte sogar zweifelhaft erscheinen, ob der Kohlenvorrath selbst für die kurze Dauer der Expedition ausreichen werde. Sollte man es wagen, die Opferwilligkeit des deutschen Volkes noch höher anzuspannen? Ein Jahr vorher war es fraglich erschienen, ob auch nur die Kosten einer kleinen Expedition im Betrage von 15—20,000 Thlr. aufgebracht werden würden, und nur das kluge Vorgehen Pettermann's, das dem deutschen Volke keine Wahl mehr ließ, wenn es nicht die Schmach auf sich laden wollte, einen Ehrenmann bei einem Unternehmen von gleich hoher wissenschaftlicher wie nationaler Bedeutung im Stiche gelassen zu haben, brachte damals die Expedition zu Stande. Durfte man jetzt mit einiger Aussicht auf Erfolg die dreifache Summe fordern? Indes man hatte ein warnendes Beispiel vor sich, das den Beweis geliefert hatte, wie lächel angebracht die Sparsamkeit bei solchen Unternehmen sein kann. Dr. Kane hatte die Ausführung seiner berühmten Expedition in den Smithfund nur der Freigebigkeit zweier hochberzogener Privatmänner, der Kaufleute Grinnell und Peabody in Newyork zu verdanken. Um die Mittel dieser Männer nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen, hatte er seine Ausrüstung mit solcher Sparsamkeit betrieben, daß er, als er gegen die Berechnung zu einer zweiten Ueberwinterung gezwungen wurde, mit seiner Mannschaft in die größte Gefahr gerieth, dem Hunger und dem Sturbe zu unterliegen. Aber noch in anderer Beziehung kann die klügelige Ausrüstung nachtheilig werden und ist sie es wahrscheinlich auch der Kane'schen Expedition gewesen. Sehr häufig können die Arbeitskosten des ersten Jahres nur einen vorbereitenden Charakter haben und auf Erkundung des Eises, der Küsten und der zu Depôts geeigneten Punkte gerichtet sein. Wenn dann im zweiten Jahre das Vorbereitete und Erfundene ausgebeutet werden soll, wenn sich dann vielleicht gerade durch günstigen Zufall eine sichere Aussicht auf weiteres Vordringen eröffnet, nöthigt die mangelhafte Ausrüstung zur Umkehr, und im Augenblicke, wo der nahe Sieg winkt, muß Alles aufgegeben werden, wofür man so endlose Mühen ertrug, wenn nicht das Leben vieler Menschen auf das Spiel gesetzt werden soll.

Während alle diese Bedenken reiflich erwogen wurden, ereignete sich ein Umstand, der die Entscheidung beschleunigte. In der Stille hatte sich eine heftige Opposition gegen das ganze Unternehmen vorbereitet, die alles Mögliche daran aufzusetzen hatte, die das neugebaute Schiff und seine Ausrüstung bemängelte, Offiziere und Mannschaften tadelte und selbst den nationalen Charakter des Unternehmens in Zweifel zog, weil Pettermann der Unternehmer, Koldewey der ausführende Theil seien. Diese Opposition, die in dem nautischen Vereine „Germania“ in Bremerhaven ihren Sitz hatte, ging in ihrer Leidenhaftigkeit so weit, daß

sie den an derartige Strapazen nicht gewöhnten Gelehrten das schwere Schicksal prophezeigte, durch die Noth zu Kannibalen werden und an den Leibern ihrer Kameraden ihre Leiden verlängern zu müssen. Einen so unangenehmen Eindruck dieses Treiben in einem Augenblicke machen mußte, wo das ganze deutsche Vaterland bereits für das hochberzogene Unternehmen interessiert war, und wo die Vorbereitungen zur Ausführung schon viel zu weit gediehen waren, um es ohne Schaden für die deutsche Ehre noch rückgängig machen zu können, so waren doch die vorgebrachten Einwürfe viel zu unbegründet und in der Uebertreibung selbst lächerlich, um eine ernste Störung zu bewirken. Daß auch bei der umsichtigsten und vollkommensten Ausrüstung die Gesellschaft einer solchen Expedition durch ein ungewöhnliches Mißgeschick, wie durch den Bruch der Schiffe, in die Lage kommen kann, dem entgeglichen Untergange durch Hunger und Krankheit zu erliegen, hat das tragische Ende der Franklin'schen Expedition bewiesen. Das verhehlen sich auch die Gelehrten nicht, welche im Dienste der Wissenschaft dieser Expedition ihr Leben gewidmet haben; es gehört eben aufopfernder Muth zu solchem Dienste. Ob aber gerade deutsche Gelehrte besondere Anlage und vorzugsweise Neigung besitzen, in solcher Noth Kannibalen zu werden, während doch selbst auf Franklin's furchtbarer Landexpedition zum Kupferminenfluß der nagende Hunger nur einen Trosten zum Menschenfresser zu machen vermochte, das möchte doch zu bezweifeln sein.

Solchen ungerechten Einwürfen gegenüber gewannen insof die gerechten Bedenken ein erhöhtes Gewicht. Um zu einer Entscheidung zu gelangen, betraf das Bremer Comité am 8. Mai eine Versammlung sachkundiger Männer, zu welcher auch Dr. Petermann und die Gelehrten der Expedition eingeladen waren. Nach einer gründlichen Erörterung wurde beschlossen, dem Unternehmen einen größeren

Umfang zu geben, namentlich die Expedition zu einer zweiten Ueberwinterung in den Stand zu setzen. Allerdings reichte nun das seither in's Auge gefaßte Transportschiff, die Grönland, nicht aus, sondern mußte durch ein anderes, größeres ersetzt werden. Ein solches vollkommen diesem Zwecke entsprechendes und nur noch für die Eisschiffahrt einiger Einrichtungen bedürftendes Schiff fand sich auch bald in der „Hansa“, die für den Preis von 13,200 Thlr. angekauft wurde. Aber dadurch, wie durch die verlängerte Dauer der Fahrt und durch den jetzt gebotenen Beschluß, auch die „Hansa“ an der ganzen Fahrt theilnehmen zu lassen, war auch eine erhebliche Erhöhung der Kosten eingetreten. Die Kosten der „Germania“ und ihrer Ausrüstung mußten jetzt auf 42,185 Thlr., die der „Hansa“ auf 25,032 Thlr. berechnet werden, so daß ein Gesamtaufwand von 67,217 Thlr. entstand, der bis dahin, bis zur Mitte des Monats Mai, durch die Sammlungen noch kaum zur Hälfte gedeckt war. Insof die erkannte Nothwendigkeit, dem Unternehmen durch die vollkommenste und tabelloseste Ausrüstung die möglichste Gewähr des Erfolges zu geben, hob über alle Bedenken hinweg, und vertrauensvoll wandte man sich an das deutsche Volk mit der Aufforderung, auch diesem erhöhten Bedürfnis mit Opferwilligkeit zu genügen. Beenen selbst ging mit gutem Beispiel voran, indem sein Comité sich bei dem Ankauf des zweiten Schiffes mit einer Garantie von 10,000 Thlr. theillegte, und im ganzen deutschen Lande regte sich mächtiger als je die Theilnahme für das nun erst des neuen Deutschlands wahrhaft würdige Werk.

Wir werden uns im Folgenden bemühen, unsere Leser mit der Ausrüstung der Expedition, den Schiffen, der Mannschaft und den Männern, welchen die wissenschaftlichen Aufgaben des Unternehmens anvertraut sind, näher bekannt zu machen.

## Die Wildlage.

Eine naturwissenschaftliche Skizze

Von Moritz Karl Müller von Alsdorf.

Erster Artikel.

Die nahe Verwandte unserer allbekannten, auf dem Schooße der Damen oft so sehr verhätschelten Hauskatze, die überall seltene und in unserm deutschen Vaterlande in einsamen Oberrheingegenden fast nur noch ausschließlich sich zehrende Wildkatze ist durch ihren geheimnißvollen Wandel als Nachtthier, durch ihre raubmöbderischen Taten und ihre verzweiflungsvoll kühnsten Wuthheißung gegen drängende Verfolger so interessant, daß diese Schilderung willkommen sein wird. Wahrlich, es lohnt sich der Mühe, diesem furchtbaren aller Raubthiere des mittleren Deutschlands auf seinen wilden, verwegenen Pfaden nachzugehen und im

Elemente der Freiheit sein Wesen und Treiben zu belauschen. Und hier ist es wieder der echte Waldmann, der gar manchen Charakterzug des Thieres entdeckt, welcher nur dem im Forsten grübten Auge sich verrieth. Lassen wir also die langjährige Erfahrung des ersten Waldmanns reden, dem die Wahrheit als Grundbedingung einer gestreuten naturwissenschaftlichen Schilderung gilt.

Es war in den ersten Tagen des Monats November. Kalte Regentage und stürmische Nächte waren ihnen vorher ausgegangen. Drob wurde von Bäumen und Büschen das vergilbte Laub geschüttelt, so daß der anstehende Schübe

nun tiefer in die Laubholzbestände blicken konnte. Der Frost der jüngst verwichenen Nacht hatte die Pfügen der Waldwege mit dünner Eisdicke überzogen, und nur auf dem freien Plan, den die Strahlen der Morgensonne beschienen, war der Reif verschwunden. Klarer Himmel, unbewegte Luft — welche vertrauenerweckenden Vorzeichen für eine erfolgreiche Jagd! Doch Diana ist ein launenhaftes Weib, und wer mit ihr verkehren will, muß sich, gelüftet es ihn, ihre Gunst zu genießen, unverdrossen auch

ein günstiges Loos am verlorenen Posten. Da sah ich mit einem Male tief im Busch Etwas auf mich zuschleichen; mit scharfblickendem Auge und gespannter Erwartung versagte ich die Wendung des Thieres zur Rechten. Es raschelte leise im Laub, ein Zweig am Rande des Dickichtes bewegte sich zur Seite, und der blick Kopf einer Wildkatze mit funkelnden Augen tauchte auf. Das Getöse hinter ihr kümmerete die Schläure weniger, als das Mißtrauen sie lenkte, ob vor ihr die Luft rein sein möchte, zumal da die Schüsse



Die Wildkatze.

ihrer Ungunst fügen. Schweigend wartete sich die Schützen-gesellschaft einer jungen Buchenberge, von welcher derjenige Thell im Halbkreis umstellt wurde, der vor Allem den Wechsel der Fische in sichere Aussicht stellte. Mein Stand war der letzte auf dem rechten Flügel. Das Volk der Treiber hatte sich jenseits aufgestellt und trieb nun das Wild mit Hülfe der Dächsel der Schützenlinie zu. Das Felsgerstein, welches den vor uns liegenden Waldkopf umgab, bot dem Fuchs und der Wildkatze von jeher ein beliebtes Verstecksmittel; um so mehr, da in der Nähe Fichten- und Kiefernbestände sich befanden, welche der letzteren vorzugsweise willkommen sind. Jetzt erschalle die laute Stimme eines Dächfels, die Jagd ging auf die Mitte der Schützenlinie los, und bald fiel dort der erste Schuß. Ihm folgte bald das „Lautgeben“ eines andern Dächfels. Hier fiel ein Doppelschuß, da ein einfacher, dort endlich feuerten Nachbarn gemeinschaftlich ab. Schon waren mir die Treiber ganz nahe gerückt, und ich dachte längst nicht mehr an

sie offenbar schon vor weiterem Vorgehen und rascherer Flucht hinlänglich gewarnt hatten, und das Hundegerell sie obendrein zum Entschlüpfen auf Lebensfäden veranlaßt haben mochte. Doch nun hatte sie keine Zeit mehr zu verlernen, mit hohem Sage übersprang sie den Graben, fluchte einen Augenblick und setzte mit geschwungenem Schwanz über die Schneise. Am Rande des gegenüberliegenden Dickichtes gab ich ihr den Schrotschuß auf das Blatt. Gleich darauf wurde in der Nähe ein Dächsel laut, der über Fährte aufgefunden hatte und über die Schneise hin folgte. Zu meinem Erstaunen verstumte er jenseits nicht, sondern die Jagd zog weiter in's Dickicht hinein, bis ich ihn endlich „Randlaut“ hörte. Auf dem Plage angelangt, fand ich die Katze in einem dichten Dornbusch. Während warf sie ihre glühenden Augen bald auf den „lautgebenden“ Dächsel, bald auf mich. Zischend und schäumend fuhr sie auf ersteren los, hob die scharffallige Nase und schlug nach dem Zurückweichenden, aber unter der Wirkung der tödt-

lichen Schußwunde zuckte sie krampfhaft zusammen. Ein zweiter Schuß hinter das Gehör streckte sie völlig nieder. Ich erkannte in ihr eine weibliche Kage von nur zwei Fuß Länge; aber trotzdem sie einem ausgewachsenen Wildkater an Höhe und Länge bedeutend nachstand, überraf sie doch an Größe unsere Hauskage bei weitem. Mir fiel überhaupt der Unterschied zwischen der wilden und zahmen Kage unselegbar in's Auge. Die Gestalt der Wildkage ist gedrungen, der Kopf plumper, der Leib dicker, namentlich auch stärker, kürzer und am Ende nicht dünner, als an der Wurzel, der durchweg reich behaarte Schwanz. Die Behaarung ist bei ihr überhaupt weicher, der Schnurrbart stärker, das Gebiß derber und schärfer. Während bei der männlichen Wildkage der Pelz helleres oder dunkleres Grau zeigt, erscheint er bei der weiblichen gelblich. Von der Grundfarbe heben sich vier Schmelzstreifen von schwarzer Zeichnung ab, von welchen die beiden mittleren sich auf dem Rücken zu einem von da über den Schwanz laufenden breiteren Streifen vereinigen. Querstreifen von weniger entschiedenem Schwarz laufen vom Rücken herunter über die Flanken, ebenso schmücken dunklere Querstreifen die Beine, während am dem Bauche schwarze Flecken stehen. Gleichmäßig absehbare Ringe umgeben den Schwanz von der Wurzel bis zum Ende, wo sie am dunkelsten werden. Wenn auch nicht so werthvoll als der Fuchs, zieht die Wildkage ihrer Seitenheit wegen, mehr noch als dieser, die Stange der Wildträger. Höchst selten wohl mag es einem Schützen gelingen, an einem Tage oder gar in einer Stunde, wie mir es vor vielen Jahren gelang, zwei Wildkagen zu erlegen, ohne daß ich oder einer meiner Jagdenossen auch nur eine Ahnung davon hatte, wir würden solchem Witbe bezaugen.

Eine bestellte Treibjagd wurde eines Morgens des Sturmes und der zeitweise eintretenden Regenschüffe halber aufgegeben. Dafür besuchte ich mit zwei Jagdenossen und in Begleitung eines Dickschäfers die Fuchsbau. Anfangs hatten wir keinen Erfolg, daogen desto besser auf dem Bau eines freien Abhanges im Kiefernhochwalde. Wir mochten etwa noch 40 Schritte von der ersten Höhle entfernt gewesen sein, als sich der Dickschäfer von der Leine losriß und voran auf den Bau lief, wo er auch sogleich „schlüpfte“. In der nächsten Sekunde sprang jenseits aus der Höhle des Baues eine Wildkage, der ich mit der eiligst von der Schulter gerissenen Finte glücklichweise noch einige Schritte aufhängen konnte, so daß sie, im Laufen gehemmt, eine Kiesecke zu erklettern suchte. Mein ihr nacheilender Partner „Keno“ aber sagte sie in dem Augenblicke, wo sie den ersten Sprung an den Stamm ausgeführt hatte und drückte und schüttelte sie todt, ohne selbst von einem erheblichen Schlag oder Biß getroffen worden zu sein. Kaum hatten wir den Bau erreicht, so sprang vor dem Däsel die zweite Wildkage auf, welche sogleich freiwillig „baumte“ und trotz mehrerer Verwundungen in Folge schnell abgefeuerter Schüsse von Seiten meiner Gefährten bis zu einer kaum schußmäßigen Höhe emporrang. Ein zweiter Schuß aus meiner Doppelklinge holte sie demungeachtet vom Baume herab. Heftig schlug sie zu Boden, aber das zählebige Thier sprang wieder auf, rannte auf die nächste Höhle des Baues zu und verschwand unter der Erde. Ein Durchschlag wurde für nöthig erachtet, um der Beute habhaft zu werden. Längst war unterdessen die Kage verendet. Das Paar bestand aus einer männlichen und weiblichen Kage.

## Die Erdbeben, ihre Erscheinungen und hier Erklärungsversuche.

Von C. Häufli.

Zweiter Artikel.

So gewöhnlich diese Erscheinungen mit den Erdbeben verknüpft sind, und so gewiß sie von der gleichen Ursache herühren, so zufällig sind doch viele Ereignisse, die man auch in direkten Zusammenhang mit ihnen zu bringen versucht hat, wie große Nebel, heftige Winde, Gewitter und andere elektrische Erscheinungen, Ausströmen von Dämpfen und Gasen u. s. w. Viele dieser Erscheinungen sind ganz zufällig ihre Begleiter gewesen, andere jedoch, wie Ausströmen von Dämpfen und Gasen und die elektrischen Erscheinungen, stehen vielleicht in einem, wenn auch noch verbüllten Zusammenhang mit ihnen.

Dagegen ist es eine Reihe anderer Erscheinungen, die als Folge der Erdbeben, als ihrer unmittelbare Wirkung auf die Erdoberfläche oder innere Theile der Erde sich fund thun. Hierher gehört vor allem die bei Erdbeben so häufige Spalt-

tenbildung. Nicht selten wird berichtet, daß sich die Erde aufgethan und viele Häuser und Menschen verschlungen habe; und weit zahlreicher als diese großartigen Ereignisse sind die weniger bemerkbaren ähnlichen von weniger schrecklichen Folgen. Spalten von Zoll- bis Fußweite und bis meilenweiter Erstreckung sind aus vielen Ländern bekannt geworden, ja man hat selbst kleine Thäler und Schüden auf diese Weise entstehen sehen. Häufig erweitern sich die Spalten bei wiederholten Stößen allmählich, oder eben gebildet werden wieder vernichtet. An manchen Stellen wird die Erde geradezu von zahllosen Spalten zerissen; es bilden sich trichterförmige Löcher, und es ist dann eine sehr häufig eintretende Erscheinung, daß aus solchen Spalten oder Trichtern Wassermassen ausgepresst werden, auch Sand- und Schlamm Massen emporwürgen und die Verfassungen selbst

wieder ausfüllen. Welche Wichtigkeit für die Erklärung der Erdbeden die neuere, hauptsächlich durch Bischoff in Bonn und Volger vertretene Ansicht diesen Schlamm- ausbreitungen u. s. w. beilegt, werden wir später sehen, es sei nur vorerst darauf hingewiesen. Daß die Erschütterung, welche die Erdoberfläche verheert, auch im Innern derselben Vermörungen hervorbringen muß, zeigen die vielfachen Verstopfungen von Quellsüngen, das Hervordrehen neuer Quellen und Aehnliches mehr. Indem ich es für unnötig halte, einzelne hiehergehörige Beispiele aus der Geschichte der Erdbeden anzuführen, wende ich mich so gleich zu einem neuen Gegenstande, nämlich der Erörterung der Verhältnisse von Erdbeden und Meer.

Es ist klar, daß Küstengegenden treffende Erdböße sich auch dem Meere mittheilen, und dieses selbst die Bewegung auf Schiffe u. zu übertragen im Stande ist. Daher wird uns nicht selten von sogenannten Meeresbeden berichtet von Stößen, die Schiffe auf dem Meere auszuhalten hatten, und häufig hat man diese Meeresbeden mit Erdbeden in ziemlich entfernten Ländern in Zusammenhang gebracht. Es ist keine Frage, daß sich Erdbeden im Meeresboden und im Meere selbst fortpflanzen; daß dies jedoch auf so ungeheure Strecken hin stattfinden solle, wie dies manchmal behauptet wurde, ist mehr wie zweifelhaft. — Wenn in der Nähe der Küste auf dem Festlande ein Erdbeden stattfindet, also die Erdoberfläche durch irgend einen Grund heftig erschüttert wird, so wird sich diese Erschütterung sowohl in dem Meere selbst, als auch im Meeresboden fortpflanzen. Wir haben eine Fortpflanzung regelmäßiger Erschütterungen auch in der Leitung des Schalles, der sich ungemein rascher in Gestein oder überhaupt festen Körpern als in Flüssigkeiten fortpflanzt. Demnach müssen auch die Erdschütterungen im Meeresboden viel rascher vorschreiten als im Meere selbst, so daß ein in einiger Entfernung von der Küste auf der See befindliches Schiff zwei aufeinander folgende Stöße empfinden müßte. Bis jetzt ist jedoch etwas Derartiges noch nicht wahrgenommen, sondern die Berichtsteller sprechen stets nur von einem Stoß. Dies und die manchmal so bedeutende Entfernung von der Küste, in der die Meeresbeden wahrgenommen wurden, machen es wahrscheinlich, daß wir es hier in den meisten Fällen mit wirklichen Erdbeden des Meeresbodens zu thun haben; denn es steht nichts diesen Erscheinungen entgegen; ja wir werden später sehen, daß nach der Bischoff'schen Erklärungsweise der Erdbeden sogar die Erdbeden auf dem Meeresgrund unabhängig häufiger sein müssen, als auf dem Festland.

Einige Worte noch über das wirklich beobachtete Verhalten des Meeres bei Küstenerdbeden sind wir schuldig. Die hauptsächlichsten Beobachtungen darüber stammen von Lissabon und den Erdbeden Chile's. Bei erstem Erdbeden soll sich ungefähr eine Stunde nach den zerstörenden Stößen im Hafen plötzl. das Meer bis zu einer Höhe von 40 Fuß über dem Fluthstand erhoben und sich mit furchtbarer

Verheerung über die zerstörte Stadt hergestürzt haben. — Diese Fluthwoge zog sich eben so schnell wieder zurück, und noch drei bis vier Mal soll sich dasselbe Schauspiel wiederholt haben. Doch damit nicht genug, die ganze Küste Portugals zeigte ähnliche Meeresbewegungen, und bei Gable soll sich das Meer 8 Semellen weit vom Lande entfernt zu 60 Fuß hohen Wogen erhoben haben, die sich gegen das Land heranwölften und mit furchtbarer Macht gegen die Wälle anprallten. Es wird von vielen Gesäßen des atlantischen Oceans, z. B. Großbritanniens, den azorischen und canarischen Inseln, den kleinen Antillen u. s. w. behauptet, daß an ihren Küsten zu derselben Zeit ähnliche, wenn auch nicht so heftige Meereschwankungen stattfanden; ja es wurde behauptet, daß sich die große Fluthwoge des Lissaboner Hafens in nicht mehr als 9 1/2 Stunden bis zu den westindischen Inseln mit einer Geschwindigkeit fortpflanzt habe, die wahrhaft an's Fabelhafte grenzt, da sie die der heftigsten Stürme weit übertrifft.

Bischoff zieht aber diese Beobachtungen, die hauptsächlich die kolossale Ausdehnung des Lissaboner Erdbedens mit beweisen sollen, in gerechten Zweifel, und sie werden auch wohl größtentheils den Anforderungen genauer Beobachtungen, was die Beobachtung der Zeit und der Nebenumstände, durch welche die Meereschwankungen vielleicht ohne irgend welches Erdbeden wären hervorgerufen worden, bestrift, nicht genügen. Auch die Erdbeden an der Westküste Südamerikas haben häufig Gelegenheit zu derartigen Beobachtungen gegeben. Es soll hier die Regel sein, daß das Meer sich erst zurückzieht, und dann eine hohe Woge, die bei dem Erdbeden zu Lima im J. 1746 wohl übertrieben auf 80 Fuß angegeben wird, hereinbricht. Ueberhaupt scheint es Regel zu sein, daß bei Beginn des Erdbedens das Meer sich zurückzieht; denn auch von Lissabon wird Aehnliches berichtet. Eine sichere Ursache für diese Meeresbewegungen anzugeben, ist bis jetzt noch nicht gelungen; wobei die eine noch die andere Theorie der Erdbeden, die wir weiter unten besprechen werden, gibt eine vollständige Erklärung dieser Erscheinung.

Von vielen Erdbeden wird berichtet, daß dieselben große Niveauveränderungen des Festlandes mit sich geführt haben und zwar entweder Hebungen oder Senkungen. Wir kommen hier an einen ziemlich delikaten Punkt in der Geschichte der Erdbeden, da sich hauptsächlich über diese Frage die Befürworter beider Theorien in den Haaren liegen, indem die einen sowohl Senkungen wie Hebungen durch Erdbeden für gleich gewöhnlich und natürlich halten, die andern dagegen nur Senkungen, auf die sich überhaupt ihre ganze Theorie stützt, gelten lassen. Es wird nicht anders möglich sein, als daß wir einige der wichtigsten Beweise für jede der beiden Niveauveränderungen, sowohl Hebungen als Senkungen, bei einer genauern Betrachtung unterwerfen.

Im Innern eines Continents wird sich mit den bis her zu Gebot stehenden Mitteln sehr schwer eine Hebung

oder Senkung konstatiren lassen. Es wird sich zwar leicht ergeben, ob durch ein Erdbeben eine Niveauveränderung überhaupt stattgefunden hat, aber ob dies eine Hebung oder Senkung war, desto schwieriger. Dagegen geschieht dies leicht an Küsten; hier bietet sich im Meeresspiegel eine feste, unveränderliche Linie dar, auf die sich die Niveauverhältnisse leicht beziehen lassen. Es sind deshalb auch hauptsächlich diese letzteren Aufzeichnungen, die für uns von Werth sein müssen. — Die großartigsten Erdbeben durch Erdbeben sollen in Chile stattgefunden haben, obwohl nach jedem Erdbeben die Erhebung nur einige Fuß betragen haben soll. Nach dem Erdbeben vom J. 1822 hat zuerst Miller & Graham von einer Erhebung berichtet, die sich hauptsächlich an den über die Küstenlinie erbobenen Küstendünen, an erbobenen, früher vom Meere bedeckten Küsten und ähnlichen Merkmalen nachweisen lassen sollte. Späterhin, nach dem Erdbeben vom J. 1835, haben Fizeau und Darwin wieder eine Erhebung von 4 bis 5 F. konstatiren zu müssen geglaubt, die jedoch durch spätere Senkung theilweise wieder verschwand. Geologische Beweise für Hebung der Chilenischen Küste in vorgeschichtlichen Tagen sollen hauptsächlich in den dort so häufigen Stranblinien vorliegen, die den ehemaligen Stand des Meeresspiegels bezeichnen. Darwin glaubt eine Erhebung jener Küste zu einer Höhe von 1000 bis 1300 Fuß annehmen zu müssen.

Bischoff, dem diese Thatsachen, wenn sie ihre volle Wichtigkeit hätten, einen starken Strich durch seine Rechnung machen würden, sucht sie auf jede mögliche Weise zu entkräften. Jedoch will mir scheinen, daß ihm dies nur sehr unvollkommen gelingt; auch ist es nicht leicht möglich zu denken, daß ein sonst so vorsichtiger Beobachter, wie Darwin, sich hier so gräßlich getäuscht und Hebungen an Stelle stattgefundenen Senkungen gesehen haben soll. Ein weniger sicheres Beispiel einer Hebung liegt noch vor von Cutch in Hinterindien, wo im J. 1819 ein breiter Landstrich dauernd durch ein Erdbeben erboben worden sein soll. Hiergegen trat Bischoff viel gerechtere Bedenken.

Dagegen erhalten wir auch Nachrichten von ganz ungewissenhaften und sehr großartigen Senkungen. So erfolgte bei dem zuletzt genannten Erdbeben von Cutch die Senkung eines 94 geographische Quadratmeilen großen Landstriches, auf dem die Festung Sindree stand, der hierdurch vollständig in einen flachen Meerbusen verwandelt ward. Senkungen in großartigem Maßstabe fanden auch bei dem heftigsten Erdbeben im Mississippithal in den Jahren 1811 und 12 statt. Es bildeten sich hierdurch bedeutende See'n, und ein Landstrich von 70 bis 80 engl. Meilen in nordöstlicher und 30 engl. Meilen in ostwestlicher Richtung soll um c. 8 F. gesunken sein, so daß ganze Länderstrecken zu großen Moräsen wurden. — Es sind diese beiden Beispiele vielleicht die instructivsten bis jetzt nachgewiesenen, von Erdbeben bewirkten Senkungen, und es läßt sich nicht leugnen, daß die Beweise für entschiedene Senkungen ungewißhaft

sicherer sind, als die für Hebungen; denn gegen diese lassen sich immerhin Einwände genug erheben, wiewohl die Hebung der chilenischen Küste sicher statt gefunden zu haben scheint.

Wir müssen uns jedoch wieder zu allgemeineren Betrachtungen wenden, zu den Verhältnissen der Erdbeben im Großen, hauptsächlich der Flächenausdehnung einzelner, ihrer Verbreitung und einigen bis jetzt noch nicht hinreichend gewürdigten und genügend erklärten Beziehungen der Erdbeben zu den Jahreszeiten und dem Sonnen- und Mondstand. Statistische Untersuchungen haben in letzterer Hinsicht einige Eigenthümlichkeiten nachgewiesen, die sehr überraschend sind.

Was zuerst die Flächenausdehnung einzelner Erdbeben betrifft, so hat man hauptsächlich in früherer Zeit sich hiervon zu große Begriffe gemacht. Wie ich schon erwähnte, sollte das Erdbeben von Lissabon seine Wirkungen auf  $\frac{1}{3}$  der gesammten Erdoberfläche habe vernehmen lassen. Es sollten z. B. Nework, Boston und die Umgebungen des Ontario-See's in Nordamerika erschüttert worden sein, außerdem aber auch in entlegenen Orten Südafrika, Deutschlands, Italiens u. d. Veden gehbt haben. Hauptsächlich sollte ferner die Nordküste Afrika's durch dasselbe heimgesucht worden sein; in Marocco gingen viele Dörferhaufen zu Grunde. Bischoff zweifelt indes, daß dieses Erdbeben an den Küsten Nordafrika's in irgend einem Zusammenhang mit dem Lissaboner gestanden habe. Er glaubt, daß der genannte Forscher als einen sehr triftigen Grund gegen die ungeheure Ausdehnung dieses Erdbebens den gültig macht, daß so viele zwischenliegende Gegenden von dem Erdbeben nicht berührt wurden, und sich doch nicht einsehen läßt, warum dies bei der kolossalen Ausdehnung nicht geschehen sein sollte. Erdbeben von sehr großer Verbreitung in linearer Richtung waren stets die, welche die Westküsten Südamerika's heimsuchten. So führt Humboldt an, daß dieselben häufig eine Ausdehnung von über 600 Stunden gehabt haben. Das Erdbeben vom J. 1822 soll auf eine Länge von 230 geographischen Meilen hin fühlbar gewesen sein, und das im letzten Jahre dort aufgetretene Erdbeben scheint sich mehr oder weniger durch ganz Peru und Ecuador hingezogen zu haben. Dagegen gab es jedoch auch viele Erdbeben von sehr lokaler Natur, die nur auf geringe Entfernungen den eigentlichen Herd der Zerkörung überschritten.

Anknüpfend an diese Verhältnisse, will ich noch mit wenigen Worten die sogenannten Propagationsformen der Erdbeben besprechen. Am häufigsten ist wohl der Fall, daß sich das Erdbeben an einem gewissen Punkt am heftigsten äußert und von hier gleichsam nach allen Richtungen hin ausstrahlt. Ein solches centrales Erdbeben wäre dann das von Lissabon gewesen. Die Erdbeben von Chile, Peru u. f. w. hat man als lineare bezeichnet, da sich ihre Wirkung vorzüglich längs einer langen Linie hin fundirte; andere das

gegen als transversale, bei denen eine gemeinsame Linie der Erschütterungen fortstreicht, und die sich daher meist über große Ländermassen verbreiten müssen. Ein derartiges Erdbeben soll das große der Verein. Staaten vom 4. Jan. 1843 gewesen sein, das auf einem Flächenraum von 29,000 □ M. verpflüzt wurde. Es ist natürlich, daß auf die Verbreitungsformen der Erdbeben die geologische Bauweise des von ihnen des getroffenen Theils der Erdkruste den größten Einfluß hat. So wird wohl unzweifelhaft die Längenausdehnung der Südamerikanischen Erdbeben von den von Süden nach Norden sich ziehenden Cordillären bestimmt, wie ja auch sonst häufig eine Gebirgskette dem Fortstreiten der Erdbeben einen der merkwürdigen Damm entgegenstellt. Bekannt ist in dieser Hinsicht das calabrische Erdbeben; die das Land von Nord-nordost nach Südsüdwest durchziehende Gebirgskette hat demselben im Osten einen Damm entgegengesetzt, während es sich auf der Westseite mit seinen Verderben weithin erstreckte. Daß geologische Verhältnisse der Oberfläche der Erde häufig einen sehr traurigen Einfluß auf die Gewalt, mit der Erdbeben eintreten, haben, ist bekannt; dies äußert sich hauptsächlich so, daß die Erschütterung viel heftiger auf

einem aus lockerem Gestein aufgebauten, als auf einem aus festem, trophallinischen Gestein bestehenden Boden ist. — Am gewaltigsten sind die Wirkungen hauptsächlich da, wo eine verhältnismäßig dünne Lage lockeren Gesteins auf festem aufliegt.

## Literarische Anzeiger.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.  
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

## Das Mikroskop und seine Anwendung.

Von

Dr. Leopold Dippel.

Zweiter Theil: Erste Abtheilung:

Anwendung des Mikroskopes auf die Histologie der Gewebe.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen und 8 lithographirten Tafeln. gr. 8. Fein Velinpapier. geh. Preis 4 Thlr.

## Literaturbericht.

**Der Weltverkehr und seine Mittel.** Rundschau über Schifffahrt und Welthandel, sowie über die internationale Industrie-Ausstellung im Jahr 1867. Auch als Ergänzungsbuch zu dem „Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien“, Leipzig und Berlin, bei Otto Spamer. 1868. Gr. 8. 8. 778 S., 500 Text-Illustrationen, 7 Tondrucke, 1 Titelbild und kartographische Beilagen.

In derselben großartig angelegten Weise, die man an der 5. Auflage von Spamer's neuem Buche der Erfindungen, Gewerbe und Industrien zu rühmen hat, bringt uns der tapfere Verleger mit vorliegendem Prachtwerke eine Ergänzung des sechsbandigen Buches der Erfindungen, die diesem einen höchst würdigen Abschluß gibt. Das kann es auch Großartigeres geben, als den Weltverkehr, der beutragte bereits Dimensionen angenommen hat, in denen sich der ganze Mensch der Regel mit all seiner geistigen Herrlichkeit und Schöpferkraft voll und würdig widerspiegelt? Eine solche Geschichte des Menschen trägt so Großartiges in ihrem Schweben, daß sie nothwendig jedes Gebildeten Eigenthum werden muß, will er seine Zeit auch nur einigermaßen verstehen lernen. Der vorliegende Band sorgt in wahrhaft planvoller Weise dafür; denn nicht allein, daß er den heutigen Weltverkehr und seine Mittel schildert, stellt er überall alte und neue Zeit so nebeneinander, daß der Leser wie von selbst in den Geist unserer eignen Zeitallern eingeführt wird. Die beiden Vorträge schmeidet aber Besinnlichkeit unser durchdringendes Menschenkenntnis und erfüllt diese mit dem heiteren Bewußtsein eines Fortschrittes, der unsere Zeit zu einer großen Zeit hemelt. Die Beweise dafür auf eine höchst anschauliche und überflüssig Weise compendios geliefert zu haben, ist das Verdienst des vorliegenden Bandes; zu so mehr,

als überall der Grundgedanke von der Befreiung des Verkehrs der rothen Fäden ist, der sich durch das Ganze hindurchzieht.

Nach einer vortrefflichen Einleitung über alte und neue Zeit, die uns das Wohlthätige unseres Jahrhunderts mit wenigen schlagenden Worten im Allgemeinen vorführt, geht ein Rückblick auf die Entwicklung des Weltverkehrs tiefer auf die Wege ein, die nöthig waren, um unsere Zeit möglich zu machen. Flammig vermischt schreitend, schildert die folgenden Abschnitte: die großen Verkehrswege vormals und heute, Posten und Postwesen, die Kommunikationsmittel in den Hauptstädten, die Eisenbahnen als Verkehrsstraßen, die natürlichen Wasserstraßen, die Seepostwege, die Güterbewegung und ihre Mittel, Reisen und Rüste. Ein eigener Theil des Aufsatzes behandelt nun die Schifffahrt, wiederum mit einem Rückblick auf ihre Entwicklung beginnend. Bei weiterem Eingehen auf ihr inneres Leben folgt eine Schilderung über Bau und Ausrüstung der Schiffe, über das Dampfschiff, über das Schiff in See oder über die Seemannskunst, über die Einrichtungen zur Sicherung des Seesverkehrs, über Schifffahrt und Weltverkehr in unsern Tagen, über die Hebung der Seefahrt, die Entwicklung der Welttelegraphie. In ähnlicher Weise, von Alterthum bis auf und, entwickelt das Buch nun die Kenntnis von Krieg und Frieden, von Luxus und den Luxusgegenständen, und schließt daran eine Abhandlung über Volkswirtschaft und Weltverkehr mit Rücksicht auf die sozialen Arbeiterzustände, um die Macht aller Beineinseins unserer Zeit darzulegen. Folgerichtig schließt das Werk mit dem interessantesten Ausfluge des heutigen Menschenzuges, mit den Industrieausstellungen.

Bei einem solchen, geistig durchdrungenen Inhalte bedarf es wohl keiner weiteren Empfehlung des Werkes. Seine Bedeutung für Jedermann liegt auf der Hand.

R. R.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Abonnements-Preis 25 Gr. (1 R. 30 Fr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 25.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, E. Schwesigke'scher Verlag.

**23. Juni 1869.**

**Inhalt:** Die Ausrüstung der zweiten deutschen Nordpolexpedition, von Otto Ule. Zweiter Artikel. — Das Salzland, von Karl Müller. 6. Vergleichende Phykognomik der Salzpfannen. — Die Bildsäule, von Herrar Karl Müller von Kiesel. Zweiter Artikel.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Abonnement für das nächste Vierteljahr (Juli bis September 1869) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für diejenigen, welche unsrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1868, in gefälligen Umschlag gebestet, noch zu haben sind.

Halle, den 23. Juni 1869.

## Die Ausrüstung der zweiten deutschen Nordpolexpedition.

Von Otto Ule.

Zweiter Artikel.

Entdeckungsfahrten in ferne Eindröden und Wildnisse sind niemals Lustfahrten. Wer sie unternimmt, muß von vornherein auf Bequemlichkeit und Beaglichkeit verzichten; Mühen und Gefahren erwarten ihn, Kämpfe der ernstesten Art. Kein Postdampfer, mit allen erdenklichen Beaglichkeiten des Luxus ausgestattet, trägt ihn an sein Ziel, keine gastliche Hütte öffnet sich ihm. Man denke an Humboldt's fühne Drinosofahrt! Ein indianisches Kanoe, d. h. ein

durch Hülse des Feuers und der Art ausgehöhlter Baumstamm, von 3 Fuß Breite und 40 Fuß Länge war 75 Tage lang, wir Humboldt sich ausdrückt, sein und seines Gefährten Gefängniß. Kein Stuhl, kein Tisch gewäherte ihnen Bequemlichkeit. Ein hartes Geflecht von Baumzweigen war ihre Ruhestätte unter einem Blätterdach, unter dem sie nur gebückt sitzen oder liegen konnten. Unter den wütenden Angriffen blutsaugender, peinigender



Mosquito's, mit geschwollenen, blutrünstigen Händen und Gesichtern mußten sie ihre Notigen niederschreiben, ihre Sammlungen bereiten. So war das Fahrzeug beschaffen, das den Wiederentdecker America's in die tropische Wildniß trug. Kann man denn erwarten, daß das Fahrzeug, welches Entdecker in die Eismühlen der Polarwelt tragen soll, die Annehmlichkeiten eines Salons oder nur eines Stubliergimmers biete? Von diesem Gesichtspunkt muß man das Schiff betrachten, das unsere deutschen Nordpolforscher für zwei Jahre zum Aufenthalt dienen soll.

Beim ersten Blick muß Jeder erkennen, daß die „Germania“, das Hauptschiff der deutschen Nordpolarpedition, kein gewöhnliches Schiff ist, daß es eine ganz besondere Bestimmung haben muß. Man sieht sogleich, daß die Rücksicht auf Sicherheit und Widerstandsfähigkeit beim Bau dieses Schiffes die auf Comfort und sogar auf Schnelligkeit und Geräumigkeit überwiegen hat. Die handdicke Spikerkaut, über dieser die Lage starken Eisendraths und über dieser wiederum querüber am Bug schwere Eisenstäbe kennzeichnen das Schiff schon äußerlich als zum Kampfe gegen einen rücksichtslosen und gewaltigen Feind bestimmt, der an der Schiffswand nagen und es versinken wird, das Meer aus den Fugen zu reißen und einen Led zu verursachen. Dieselbe erste Bestimmung tritt ebenso unverkennbar entgegen, wenn man von dem Verdeck einen Blick in das Innere des Schiffes wirft. Solche feste Zwischendeckbalken sieht man bei Schiffen von dieser Größe nie, und doch hat man es nicht dabei bewenden lassen, doch weichen noch hölzernen und eisernen Kniee ununterbrochen ab, sorgen noch senkrechte Stützen oberhalb und unterhalb der Zwischendeckbalken, die durch staktes Band- und Winkelisen verbunden sind, dafür, daß kein seltlicher Druck auf die Schiffswände Kiel oder Deck aus ihrer Lage bringen kann. Man sieht, dieses Schiff hat es mit einem Feinde zu thun, der es von beiden Seiten zu fassen und zwischen seinen gewaltigen Klauen zu zermalmen trachtet, und welchen mächtigeren Feind hätte selbst das Meer aufzuweisen als die riesigen Schollen des Polareises? Aus dieser Vorsorgniß erklärt sich auch die ganze Form des Schiffes, seine scharfe Bauart, wie es in der Schiffssprache heißt. Sollte der Fall eintreten, der bei aller Vor sicht nicht immer vermeiden werden kann, daß das Schiff zwischen das Eis geriethe, und dieses Eis sich von beiden Seiten der zusammenschloße gleich zusammenstreichenden Felsen, so würde der Bau des Schiffes bewirken, daß es wahrscheinlich das Eis emporgehoben würde, statt zwischen den Schollen gefangen und zerquetscht zu werden. Auch die Dampfmaschine, welche das Schiff erhalten hat, ist ganz auf diese eigenthümlichen Kämpfe berechnet. Sie ist klein, um wenig Raum einzunehmen, und die zweifelhafte Schraube ist so eingerichtet, daß sie ohne Mühe ausgehoben werden kann, womit von vorn herein der nur zeitweilige Gebrauch derselben angedeutet ist. Allerdings ist die Geschwindigkeit, welche diese Maschine dem

Schiffe geben kann, keine bedeutende; sie betrug bei der Probefahrt 3 Meilen in der Stunde. Aber das Schiff soll auch kein Renitente sein, soll nicht gewaltfam gegen das Eis anrennen, um sich Wege zu bahnen. Das stärkste Panzerschiff würde in solchem Anlauf gescheitern. Das Schiff soll vielmehr zwischen den Schollen durchzuschlüpfen versuchen, sich durch die schmalsten Fahrtrinnen im Eis durchwinden, und dazu bedarf es nicht der Geschwindigkeit, sondern nur der Unabhängigkeit von Wind und Strömung, wie sie die Dampfkraft gewährt. Für gewöhnlich ist es auf die Segelkraft angewiesen. Darum hat es auch eine vollständige Segelausrüstung erhalten und eine derartige Vermaßung, daß kein Segeldeck, kein Stof es so leicht wieder entmasten können. Es wäre auch unmöglich gewesen, ein Dampfschiff für eine solche zweijährige Fahrt, auf welcher nichts Kohlendepots zu finden sind, mit dem nöthigen Kohlenvorrath zu versehen, wenn nicht die Anwendung des Dampfes von vornherein nur auf die Fahrt im Eise beschränkt wäre. So werden die 70 Tons Kotle, welche die „Germania“, und die 120 Tons, welche das Beileitschiff, die Hanfa, führt, vollkommen hinreichen, sowohl um die Maschinen zu speisen, als um das Heizmaterial für die Ueberwinterung zu gewähren. Es ist dadurch Raum für den Proviant gewonnen worden. Der Lifer kann sich denken, welcher Mengen von Lebensmitteln und welcher Vorräthe bei ihrer Auswahl es bedarf, um die Besatzungen von zwei Schiffen, zusammen 31 Menschen, für 2 Jahre zu versorgen. Denn von der Nahrung hängt die Gesundheit und von der Gesundheit der Leute wiederum das Gelingen der Expedition ab. Es ist nicht möglich, alle Gegenstände des Proviantes hier aufzuführen; nur einiges das Besondere soll mitgetheilt werden. Für Fleisch ist unter allen möglichen Formen gesorgt. Die „Germania“ führt 500 Pfd. frisches Fleisch in Eis, 2610 Pfd. vortreffliches „preserved beef“ in Büchsen, 300 Pfd. verschiedene Fleischspeisen in Büchsen, 3800 Pfd. Rauchfleisch, Speck und Schinken, dazu noch Würste, Fleischtract, gesalzenes Fleisch, Sauerfleisch u. s. w. An Brod, Mehl und Hülsenfrüchten führt die „Germania“: 3000 Pfd. Roggen- und Weizenbrod, 8970 Pfd. Mehl, 3750 Pfd. Hafergrütze, Graupen, Reis, Sago, Erbsen, Linsen, Bohnen u. s. w. 1000 Pfd. getrocknete Aepfel, 500 Pfd. in Büchsen eingelegte Schnittbohnen und Erbsen, 600 Pfd. getrocknete Kartoffeln, 100 Pfd. getrockneter Wirsingkohl, 100 Pfd. Spargel in Büchsen, 200 Stück Eier, 50 Pfd. getrocknetes Eiweiß, 700 Pfd. Sauerkohl, 150 Pfd. Rorhob in Essig, dazu entsprechende Mengen Cranberries, Zwetschen, Zwieseln, Chalaotten, saurer Gurken u. s. w. liefern das so unentbehrliche Gemüse und Obst. Dazu kommen 700 Pfd. Kaffee, 120 Pfd. Thee, 1220 Pfd. Zucker, 400 Pfd. Cacao, 200 Pfd. Chocolate, 800 Pfd. Salz und mancherlei Gemüse. Dazu kommen ferner 1200 Pfd. Butter, 1000 Pfd. Schmalz, 400 Pfd. Käse, 200 Pfd. condensirter

Milch in Büchsen; endlich an Getränken: 72 Flaschen Lagerbier, 60 Flaschen Cognac, 144 Flaschen Sherry, 24 Flaschen Portwein, 10 Anker Bordeauxwein, 10 Anker Rheinwein, 24 Flaschen Rum, 1½ Drost Citronensäure, 48 Flaschen Himbeersaft u. s. w.

Al dieser Proviant, wozu nun noch Segeltuch und Tauwerk, Pelze und Kleidungsstücke, Gegenstände der Unterhaltung, Laufschuaren, das Material zu den Schlitten, das größte Tuch zur Winterüberdachung des Schiffes, zwei doppelte Zelte u. s. w. kommen, sind in dem Hinterrheil und der Mitte des Schiffes untergebracht. Am Vordertheil befinden sich die Räume, welche den Gelehrten und der Mannschaft für eine so lange Zeit zum Aufenthalt dienen sollen. Das „Volkstlogis“, zu dem eine bequeme Treppe hinaufführt, ist so geräumig, wie es selbst auf größeren Schiffen sich nicht immer findet. Es ist 6 Fuß hoch und enthält 9 Kojen, wie gewöhnlich in zwei Reihen übereinander. An der einen Seite befindet sich die Combüse oder Küche, an der andern der geräumige Walsraum. Nur der Treppenraum trennt das Volkstlogis von der Offiziers- und Gelehrten-Kajüte, die gerade hinreichende Bequemlichkeiten bietet, da sie doch weder zum Spazierengehen, noch für umfängliche wissenschaftliche Arbeiten dienen soll. In der Mitte steht ein drei Fuß breiter und sechs Fuß langer Tisch, an dem einen Ende querschiffe ein neun Fuß langes Sopha. Ringum ist geräumiger Platz für Kissen und Stühle. Die Wände werden von acht Kojen gebildet, deren kleinste sechs Fuß lang sind; zwei davon sind zu Reservokojen bestimmt. Ihr Licht empfängt die Kajüte von oben. Zum Schutze gegen die Kälte befindet sich zwischen den äußeren Kojenwänden und der inneren Beplankung des Schiffes ein freier Raum von drei Fuß Breite, der zugleich zur Unterbringung von Segeln u. s. w. benutzt werden kann. Die Erwärmung der Kajüten im Winter wird durch vier Kesselöfen bewirkt, die zugleich eine Ventilation der Räume vermitteln.

So ist die Ausrüstung der „Germania“ beschaffen, und im Wesentlichen gleicht ihr die des Begleitschiffes „Hansa“, eines größeren, für die Eisküchsfahrt versierten Schooners. Freilich erhält diese Ausrüstung erst ihren vollen Werth durch die Tüchtigkeit der Mannschaft. Hier aber bezeichnen wir vor Allem der Mehrzahl der bewährten waderen Mitglieder der vorjährigen Expedition, an der Spitze dem trefflichen Führer, Capitän Koldewey, dem Obersteuermann der „Germania“, H. Senfacke und dem Obersteuermann der „Hansa“, Rch. Hildebrandt. Daneben finden wir nur seefahrende, meist bereits mit den Schreden des Polarmerces vertraute Männer. Die Führung der „Hansa“ hat Capitän Freemann aus Augusten im Oldenburgischen übernommen, der bereits 7 Jahre lang theils als Obersteuermann, theils als Capitän eines Walchfängers in der Behringsstraße den Kampf mit der Polarnatur bestan-

den hat. Im Ganzen besteht die Mannschaft der „Germania“ außer dem Capitän und dem Obersteuermann aus einem Untersteuermann, einem Zimmermann, einem Bootsmann, dem Maschinisten, dem Felzer, dem Koch und 5 Matrosen. Die Mannschaft der „Hansa“ zählt außer dem Capitän, Obersteuermann, Untersteuermann und Zimmermann 8 Matrosen.

Ihren Aufbruch erhält die Ausrüstung der Expedition durch die Männer der Wissenschaft, welche sich entschlossen haben, die Gefahren des Unternehmens zu theilen, um die wichtigsten Aufgaben zu lösen, welche die arktische Welt in solcher Fülle bietet, reicher, als Diejenigen ahnen, die sich gewöhnt haben in ihr nur eine Eiswüste zu erblicken. Zunächst sind es zwei Physiker und Astronomen, welche sich erboten haben, die Beobachtungen und Messungen auszuführen, welche die Temperaturverhältnisse der Luft und des Meeres, die magnetischen Erscheinungen, die Strömungen u. s. w., die Beobachtungen, im glücklichen Falle sogar eine Gradmessung erfordern. Es sind der 26 Jahre alte Carl Börgen aus Schleswig, selbster Assistent an der Königl. Sternwarte in Göttingen, und der 32jährige Ralph Cooper aus Woodpington in Lancashire in England, der nach mehrjährigen Reisen in fernem Ländern in Göttingen Astronomie studierte und seit zwei Jahren als freiwilliger Assistent an der dortigen Sternwarte arbeitete. Für die geologischen Arbeiten, insbesondere für das wichtige Studium der grönländischen Gesteinswelt, ist der 27jährige österreichische Oberlieutenant Julius Payer gewonnen, der sich namentlich durch seine vortrefflichen Arbeiten über die Gletscher der deutschen Alpen in weiten Kreisen einen ehrenvollen Ruf erworben hat. Die Zoologie, Botanik und Ethnologie wird an Bord der „Germania“ durch den 27-jährigen Professor und Privatdozenten an der Universität zu Kiel, Dr. Xoloph Pansch, vertreten sein, der zugleich als Arzt der Expedition fungieren wird. An Bord der „Hansa“ wird die Zoologie durch den Privatdozenten an der Universität Greifswald, Dr. R. Buchholz, und die Geologie durch Dr. Gustav Laube, Dozent an der Universität und polytechnischen Schule in Wien, vertreten sein.

Mit solchen Kräften ausgerüstet, ward noch keine Forderung in der arktischen Polarwelt unternommen. Wenn nicht ungewöhnliche Unfälle eintreten, unberechenbare Schwierigkeiten und Hindernisse sich entgegenstellen, muß und wird diese Expedition Erfolge erzielen, auf welche das deutsche Vaterland stolz sein können, das noch immer jeden Gewinn der Wissenschaft für einen Gewinn an eigener Macht und Ehre ansah. Möge aber auch das deutsche Volk seine Pflicht erfüllen, durch freigebige Spenden die kühnen und vertrauensvollen Männer, welche das Unternehmen in's Werk setzten und leiteten, von der schweren Last für die Deckung der Kosten des Unternehmens zu befreien!

## Das deutsche Salzland.

Von Carl Müller.

### 5. Vergleichende Phytognomik der Salzpflanzen.

Die verhältnißmäßig geringe Zahl unsrer Salzpflanzen gibt uns nur eine dürftige Vorstellung davon, was unter den verschiedenen Klimaten aus ihren Formen werden kann. Um sie daher zu verstehen, ist es notwendig, einen Blick auf diese Formenreihe zu werfen. Freilich würde das eine sehr umfangreiche Aufgabe sein, wenn wir genöthigt wären, sämtliche Familien zu betrachten, welche salzliebende Arten liefern; allein die Aufgabe beschränkt sich unendlich durch die Wahrnehmung, daß, im Grunde genommen, nur äußerst wenige Familien als größtentheils halophytische angesehen werden können. Als solche dürfen von den 34 deutschen Pflanzenfamilien nur die Chenopodiaceen, Plumbagineen und Tamaricaceen, zum Theil auch die Polygoneen gelten.

Mit Absicht habe ich die Weidenpflanzen obenan gestellt. Sie kann man durchweg als die geborenen Salzpflanzen, als die eigentlichen, ausschließlichen Bewohner des Salzlandes ansehen; denn obgleich viele von ihnen nur auf Schutz und dergleichen Orten wachsen, so hat man doch mit Recht schon lange bemerkt, daß, wie ich schon im ersten Artikel gelatte, diese Schutt- oder Ruderalflor die größte Ähnlichkeit mit der Salzflor zeigt. Aus demselben Grunde, der die Weidenarten zu den verbreitetsten Unkräutern macht, d. h. weil frisch gedüngter Boden Kuchsalz genug mit sich führt, aus demselben Grunde flüchten sie sich gern an die durchdrungenen Stätten. Ueberall oder behalten sie die gleiche Phytognomie bei. Es liegt für jeden Betrachter etwas Abstoßendes in allen ihren Formen. Ich möchte es gerabzu etwas Vorwärtliches nennen; so unsferst erscheinen diese apetalischen Phanerogamen, als ob sie eben nur ein Rest aus ferner Urzeit seien, der sich in die Gegenwart gerettet habe. Ich finde auch in der That keinen Grund, welcher gegen eine solche Annahme spräche, selbst wenn man sie als eine wissenschaftliche aufstellen wollte. Ueberall finden die Pflanzen der früheren Schöpfungen aus, weil sich die Bodenverhältnisse wesentlich ändern; sonst begreife man auch nicht, daß die fossil erhaltenen Pflanzen an bestimmte geognostische Formationen geknüpft sind. Unter denjenigen Bodenarten aber, die sich nicht verändern konnten, deren geognostische Grundlage mindestens weniger in Rechnung für die Pflanzen kam, als die sie durchdringenden Nährfußpflanzen, können wir neben den Torfmooren wohl auch das Salzland bezeichnen. Darum haben sich in jenen, wie ich schon vor Jahren an einem andern Orte nachwies, die Torfmoose, auf diesem die Salzpflanzen erhalten. Gleich den Torfmoosen (Sphaagnaceen), erscheinen sie nun so fremdbartig und von allen übrigen Formen der Gegenwart abweichend, daß man irthümlich versucht wird, diese

Fremdbartigkeit auf ihren Ursprung, auf ihr Alter zu schieben.

Es soll damit nicht gesagt sein, daß sämtliche Ekenopobiaceen dieses Alter an sich tragen. Eine ganze Reihe der Weidenpflanzen (Spinaceen und Chenopodiaceen) schließen sich in ihrer Tracht so innig an die Amaranthaceen und Polygonaceen an, daß sie nicht viel Fremdbartiges vor diesen voraus haben, obgleich auch sie, die eigentlichen Ruderalpflanzen, ein abstoßendes Gepräge an sich tragen. Dagegen weichen die übrigen Gruppen der Familie — Salicornien, Eudern, Salicorniellen und Camphorosmeen — um so mehr ab. Entweder flecken sie durch fleischige oder auch hornartige Stengeltheile, durch Blattlosigkeit oder durch gegliederte Stengel auffallend hervor. Die letzte Eigenthümlichkeit nimmt besonders unser ganzes Interesse in Anspruch. Denn alle diejenigen Arten, welche diese Eigenschaft an sich tragen, erscheinen als die fremdbartigsten. Man kann sie nur mit den Schachtelhalmern vergleichen, da sie, Stiel auf Stiel thürmend, die einfachsten Formen der Phanerogamen, nämlich die monocotylischen Gräser, für die Dicotylen wiederholen. Sonderbar genug, ist dies der Stengelaufbau auch der meisten Salzpflanzen des Mittelmeeres, der tangartigen Gewächse. Wie sie Stiel auf Stiel setzen, um endlich ein ganzes, oft außerordentlich complicirtes System eines gegliederten Zweigwerkes darzustellen; ebenso treten uns die articulirten Chenopobiaceen auf dem Salzlande entgegen.

Wir kennen diese Form bei uns nur aus der Gruppe der Salicorniellen, und zwar in der niedlichen, fast blattslosen Salicornia herbacea, einer der ächtesten Salzpflanzen. Ganz Europa, Sibirien, den Küsten Nordamerikas, Afrika's und Hindiens angehörig, ist sie als krautartige und einjährige Form gleichsam der Typus für alle gegliederten Chenopobiaceen. Die ganze Pflanze erscheint wie ein articulirtes Gerüst, das noch Blumen und Blätter erwarret, während beide schon, freilich nur wie Versuche, an dem fleischigen Zweigwerk hervorgebrochen sind. Diese vorgängliche Form entwickelt sich an den Ufern der Adria und des Mittelmeeres zum immergrünen Strauche (Salicornia frutescens, anceps u. A.), der in Spanien, Nordafrika und dem steinigsten Arabien auch selbst die unsehnbaren Blattanhebungen einbüßt (Anabasis articulata Moq. T.). In den krummigen Salzsteppen Mittelasiens sinkt diese Form, welche doch immerhin noch einen stattlich aufragenden Strauch bildet, zu Kriepstrauchern herab, von denen man auf den ersten Blick nicht mehr weiß, ob man es mit einer Blumenpflanze oder mit einer proliferirenden Schützenflechte zu thun habe. In dieser Gestalt erhebt sich Anabasis dro-

visfolia Ledeb. wie ein verkrüppelter Alpenstrauch kaum 1 bis 2 Zoll über den Boden, so daß das holzige, dicht an und in den Boden gedrückte Ast- und Wurzelwerk, aus dem die jährigen Stengelchen hervorbereichen, mehr Raum als die ganze oberirdische Pflanze einnimmt. *A. cretacea* Pall. drückt niederliegend ihr ganzes verholztes Zweigwerk, vertrocknet und incrustirt, rufenförmig an den Boden, als ob sich eine Flechte aus dem Geschiele der *Ramalina* oder der *Stereocaulon* niederlassen habe. Auch die *Halimocnemis*-Arten vollführen ein Gleiches, wenn sie oft auch truppweise den ganzen Boden bedecken und als spannenlange Sträucher mehr aufstehen. Nichtsdestoweniger gibt es in diesen Steppen öftlich des Caspisees eine Form, welche sich zu der beträchtlichen Höhe von 15 F. erhebt. Es ist der weltberufene *Saxaul*-Strauch (*Haloxylon Ammodendron* Bren.) der wichtigste Representant dessen, was man in den Steppen der Tartarei allenfalls noch einen Wald nennen könnte. Ohne ihn würden die Bewohner gänzlich von Brennholz entblößt, würde die Steppe eine Wüste sein. Wie in dieser die *Tamariske* Africa's als Pionier vordringt, so der *Saxaul* in dem mächtigen Boden des Kaspisees. Und dennoch weicht er, nach Exemplaren des berühmten Reisenden v. Ledebour, von den vorigen Formen nicht ab. An dem außerordentlich festen Astwerk, dem man seine Weiden-natur augenblicklich an der glatten, gleichigen Rinde, wie sie fast allen krautartigen Formen zukommt, anseht, beobachtet man noch immer den Charakter des Geleddertens; nur daß es sich jetzt in knorrenigen Anschwellungen äußert. An diesen brechen die rutenartig aufrecht stehenden dünnen Zweige hervor, aus denen sich schließlich kollange, noch dünnere Zweige von graugrüner Färbung, aber vollkommen fleischig, blattlos und gegliedert, entwickeln, um sich dann, ganz wie die Zweige der *Casuarinen*, rings um den Ast zu stellen, als ob derselbe von langen Nadeln umgeben sei, die Stiel auf Stiel stellend, an diesen Gliedern auch leicht gerbrechlich find. Es ist ein leichter, luftiger Bau, der stark an den der *Tamariske* erinnert, und doch wieder so dauerhaft und elastisch, daß die Streppenkürme ihm wenig anzuhauen vermögen.

Eine zweite auffallende Form ist bei uns ebenfalls nur durch eine einzige Art, durch *Salsola Kali* vertreten. Diese stellt die Disteiform der Weidenartigen dar; insofern nämlich, als Blätter und Zweige, die gern knäuelförmig um den Stengel gestellt sind, in dichte Stacheln auslaufen und somit oft die ganze Pflanze zu einem Dornengebüsch machen. Wenn die vorigen Formen vorzugsweise die Bewohner des salzigen Lettens sind, so binde sich diese am liebsten an den salzigen Sandboden, auf welchem sie von jährigen Kräutern bis zu stiellosen Sträuchern ebenfalls vorkommen. Sie sind mithin die eigentlichen Wüsten-Palophyten, deren Genuß sich höchstens die schnellwüchsigen Zunge des Kameels gestatten kann. Die Gattungen *Traganum*, *Caroxylon*, *Cornuica* u. A., welche besonders Asien und Afrika

angehören, dürfen als ihre höchste Vollendung angesehen werden. Die *Salsola Echinus* Labill. aus dem Orient mit ihren langen und starren Zweigstacheln wechselfert mit unseren Schledornen und Weisbörnen.

Eine dritte Form unterscheidet sich von dieser zweiten auffallend dadurch, daß sie besondere harte Dornen entwickelt und diese zwischen bräuharte, weichflüssige Blätter verstreut, so daß die ganze Pflanze von Weitem nur wie ein ungefähliches braunwolliges Gewächs erscheint. Diese Form erlanget in der Gattung *Echinopsilon* (s. B. E. muricatus aus Nordafrika) ihre charakteristische Entwicklung. Wir unterscheiden bei dieser Form nur eine dornenlose in unseren *Kochia*-Arten entgegenzustellen. Doch sind auch diese nur eine Abnähme dessen, was in den Wüsten aus ihrer Form hervorgehen kann. In Arabien z. B. erscheint *Kochia latifolia* Fres. auf den ersten Blick wie ein Lagerbüschchen aus der Gruppe der *Flago*; so dicht und ährenartig häuft sich der Stiel an den Spitzen ihrer Ästchen. Mit ihren lanzettlichen Blättern leiten sie auf die vierte Form, die der Saubden über, deren Blätter durch ihre Fleischigkeit abstehen. Auch für sie kennen wir nur eine einzige Art (*Schoberia* oder *Suaeda maritima*), die aber schon ganz den Charakter aller übrigen Verwandten vertritt. Das Gleiche gilt von den *Spinacien* und *Ebenopodiaceen*, die in allen Welttheilen die Tracht der unsrigen beibehalten, obschon sie sich in neue Gattungen vielfach auflösen. Selbst die eigentlichen Salzbüsche *Neuboulans* (*Rhagodia parabolica* und *hastata*), die, weil sie oft gegen 20 Proc. Salz in ihren Blättern haben, für Kinder und Schafe von ganz außerordentlicher Bedeutung geworden sind, entfernen sich nicht von dieser eigentlichen Weidenform (*Atriplex*). Hier ist es auch zugleich, wo die salztiebenden *Ebenopodiaceen* eine Mannigfaltigkeit der Formen annehmen, wie sie schwerlich noch einmal auf der Erde so beisammen gefunden wird. Mit dieser Form schweifen sie übrigens schon ganz zu den *Polygonaceen* über, die, weil auch sie oft recht charakteristisch Stiel auf Stiel thürmen, den articulierten *Ebenopodiaceen* nahe treten, wie diese mitunter casuarinenartige Formen (*Polygonum equisetiforme*) bilden.

Dies Stielsternform drückt sich übrigens höchst auffallend auch bei den *Plumbagineen* aus, soweit sie halophytisch sind, nämlich bei der Gattung *Statice*; nur daß die Stielbildung aus den Blütenstand allein übergeht. Von dieser schönen Form bildet *St. Limonium* an unsern nordischen Küsten den einzigen Vertreter. Aber obwohl die Stielbildung an ihm lange nicht so hervortritt, wie an manchen andern Arten, so trägt er doch schon das ganze Bild der übrigen Verwandten an sich, die so zahlreich namentlich im Mittelmeergebiete und in den östlichen Steppen auftreten. Fassen wir die Gattung in dem alten Sprengelschen Sinne, so variiert sie nur in den Blättern und Blumenstelen. Erstere geben aus einer nadelartigen Blattform in breite spatuliforme über, um sich schließlich in löwen-

zahnartige, ausgebuchtete (St. sinuata, lobata, Thoulini u. A.) zu verwandeln. Andererseits geht der Blumenstiel aus einer runden Form in eine röhre und gestülpte über, was dann der Pflanze eine höchst merkwürdige Tracht verleiht (St. sinuata, Thouinii, mucronata, tripteris u. A.). Aber auch ohne dies kann die Articulation des Blumengestängels sehr originell wirken. Bei der niedlichen St. auriculaelifolia vom Mittelmeer drängen sich die Blumen zu lächelartigen Kehlen zusammen; bei andern Arten (St. aristata, echinoides u. A.) baut sich das Gerüst dichotomisch im Zickzack auf und erlangt in der sarkinischen St. articulata, einem Halbstrauch, den Superlativ dieser Verästelung, die wie eine Illigamarbeit erscheint. Bei einigen Arten sinken die Blätter zu Schuppen herab, aus deren Achseln nur jene Gerüstform als Zweig hervorbricht, der die Form eines höchst verästelten Umbelliferenblattes annimmt (St. decipiens aus den mittelasiatischen Steppen, St. ferulacea und diffusa vom Mittelmeer u. A.) oder auch ein einfaches holziges Zickzackgerüst bleibt, an dessen letzten feineren Verzweigungen die Blumen hervorbrechen (St. pruinosa aus Aegypten); das Stelfamste, was der Phantasie in dieser Beziehung geboten werden kann. An diese originelle Form reicht nicht einmal diejenige heran, welche als die einfachste der Gattung vereinigte Blumen längs der gegliederten Blumenstängel zweigeteilt, wie bei manchen unserer Orchideen, anreicht (Statice (Acantholimon) acerosa) und diese Spinnei aus einem neikanten Rachen verholzter Blätter hervortreibt. Selbst die sonst so flecktopfe violette oder rötliche Blumenfarbe kann einmal in eine reizende gelbgrüne übergehen (St. aurea aus Sibirien).

Ueber die Tamariscineen ist wenig zu bemerken. Sie sind Littoral- oder Steppensträucher, deren Verbreitungskreis von den Canarischen Inseln bis nach Sibirien und der Mongolei durch den ganzen Orient reicht. Ueberall ihre bekannte Tracht beibehaltend, die ihnen ein halbkrautartiges, bei Tamarix articulata aus Nordafrika auch ein casuarinartiges Ansehen bei einem ruthenartigen Kfchwuchse verleiht, gleichen die Tamariscineen dem Sarau als die letzten Pioniere der Wüste, in der sie nichtsdestoweniger noch manchen statischen Baum zu bilden vermögen, obgleich die meisten Individuen Sträucher bleiben, unfähig, einen weiteren Anblick, noch weniger Fäb, Schatten zu verleihen.

Ganz anders die Küsten der Tropenwelt. Hier, in dem salzigen Schlamm der Ufer oder auch binnenwärts an den brackischen Ufern der Ströme erheben sich auf einem originellen Stelzwerk Bäume, die nicht das Geringste mehr mit unseren eigenen Salzpfannen zu thun haben. Es sind die unbekanten Rhizophoren oder Mangiebäume, gleichsam die Pfahlbauten des Salzlandes. Mit ihrem schattigen Laube umschlingen sie, Wälder bildend, die Küsten auf weite Strecken wie ein grüner Gürtel, aber so schattenreich, daß diese Wildnis zugleich eine Stätte der tödtlichsten Miasmen und Fieber wird. Herrschend sind überall nur wenige Geschlechter, in meist Rhizophora, Brugulera, Avicennien und Conocarpus-Arten, aber viele andere Typen gesellen sich diesen Salzpfannen vereinigt zu, in Indien selbst brasilische wachsende Palmen (Nipacae) u. dgl.; — ein Bild, das, in keiner Weise mehr an die Dürftigkeit unseres Salzlandes erinnernd, die höchste Schöpfkraft des Salzbodens ausdrukt.

## Die Wildfage.

Eine naturwissenschaftliche Skizze.

Von Pfarrer Karl Müller von Jälsfeld.

Zweiter Artikel.

Der stärkste Wildkater, der mir je zu Gesicht gekommen ist, und der am Widerrist eine Höhe von 16 Zoll maß und ein Gewicht von 18 Pfd. hatte, wurde auf einem Dachbau unweit Jälsfeld erlegt. Der Schüge hatte sich vor einbrechender Abenddämmerung, den Wind berücksichtigend, tief in den Bau angeschlichen und hinter dem Stamm einer Buche, gut gedeckt, angeliegt. Noch fiel ein glänzender Schein des goldenen Abendhimmels auf die feste Malepartus — da funkelte schon das rothgelbliche Rachenlicht aus dem Dunkel einer Röhre unter verzweigten Wurzelzweigen hervor. Das gespannte Gehör nahm nach allen Richtungen hin seine Stellung, um mißtrauisch zu lauschen, und die Nase prüfte sorgfältig den Wind. Nachdem er hinlänglich „gesehen“ hatte, stieg der riesenhafte Kater vollständig aus der Röhre herauf und wollte eben das Re-

nignungsgeschäft an seinem Peize nach Art der reinlichen Hauskater vornehmen, da knallte der Schuß, der Kater brach zusammen, wälzte sich auf dem Boden hin, schlug mit den Lagen um sich, saßte während mit den Zähnen Laub und Reisig, purzelte von Neuem und kollerte zum Karger des verblüfften Schügens in den Bau zurück. Am nächsten Morgen wurde der nahe an dem Ausgang der Röhre liegende verwundete Kater mittelfst eines Patens herausgezogen.

Von kaum geringerer Größe und Schwere war ein in der Nähe Jälsfeldbachs erlegter Wildkater. Während des Schußtreibens einer größeren Jagd brach die Dämmerung herein. Die Schügen hatten fast sämtlich ihre Stände verlassen, um den Heimweg anzutreten; nur mein Bruder und dessen Schwager, welche die Dätsel auf dem Berge

Randlaut hören, ließen sich die Mähe des Stiegens nicht verdrängen. Eben angekommen, sah der wohlbeleibte, leuchtende Schwager den Kater auf dem Aste einer alten Eiche ausgestreckt liegen. Mit vorgerücktem Kopf verfolgte die geängstigte Bestie die Bewegungen der Feinde. Ein Schuß holte den Kater vom Baum herab; aber während die Hunde über ihn herfielen, kehrte ihm noch einmal die Lebenskraft auf kurze Zeit zurück. Mit einem Schlage spaltete er dem einen Dösel den Behang, mit einem zweiten brachte er dem andern eine tiefe Wunde über dem Auge bei, daß Beide wimmernd und heulend zurückwichen. Wehe dem Schützen, wenn der Kater noch aussehende Kraft gehabt hätte, den verhängnisvollen Sprung nach ihm zu thun; denn in ähnlichen Fällen haben Kater in blindwüthender Rache Brust, Gesicht und Nacken des Mannes zerfleischt und tiefe Wunden in den Hals geissen. Der ohnmächtige Kater erhielt den zweiten Schuß und verendete.

Wie tapfer die sonst feig fliehende Wildkatze in der Nothdrang sich vertheidigt, so kühn, vermegen und mordlustig jagt sie sich auch auf ihren Raubjügen. Hier schleicht sie wie auf Socken am Rande des Waldes hin, über Aecker, Wiesen und Tristen, um die Maus oder den Vogel im Sprung zu überfallen. Und sicher muß in den meisten Fällen dieser Sprung sein, da man im Magen einer bei Tagesanbruch zu Wald gehenden Wildkatze zuweilen über 20 Mäuse gefunden hat. Dort liegt sie lauernd im Grase, um dem Hasen den Wechsel abzuschneiden und ihm nach dem Sprung auf den Nacken die Krallen tief einzuschlagen und unter tödendem Biß den trottelnden Lampe zum ewigen Schweigen zu bringen. Seht der Sprung selbst, so läßt sie von der Verfolgung ab und sucht anderwärts Entschädigung. Nach allen Richtungen hin wird ihre Kletterthat reger, und sei es auch nur der unvertilgbare Hang zum Wenden selbst bei Mangel an Hunger. Feldhuhn, Wachtel, Lerche und Ammer summt ihren Nestern am Boden, aber auch die besiedelten Bewohner der höheren Bäume sind im Schlosse und bei der Pflege ihrer Brut vor ihr nicht sicher. Selbst das bedende Eichthöndchen flieht nicht selten unter ihren Krallen und ihrem Kelschnabe. Bei uns im Gebirge bemerkt auch die Wildkatze die Geitzgämscher und fängt Fische sowohl, als auch Wasservögel. Namentlich ist es die bei uns häufig vorkommende Wasseramsel, welche vor der am Ufer lauernden Katze Abends und früh Morgens auf ihrer Hut sein muß. Um aber das Künste und doch Wahre nicht zu verschweigen, führe ich auf Grund verbüßter Thatfachen noch an, daß die erfahrene Wildkatze von Bäumen auf Rehe und Hirschkäfer springt, die mit ihr Davonrennenden fürchtetlich zerfleischend und ihnen die Schlagader durchbohrend. Solche Unternehmungen werden hauptsächlich von dem Alter und der Erfahrung der Wildkatze bedingt. Krankes oder angeschwundenes oder auch an gestorenen Schnederke wund gerathenes Wild, bezgleichen wehrlose Hirschkäfer und Rehtischen sind zunächst die ge-

sterten Opfer ihrer Angriffe. Hat sie aber einmal an solchen ihre Mordgier befriedigt, dann gelüftet es sie nach diesem erbleben Wildte mehr, und sie wartet nicht erst wieder ab, bis die strenge Witterung sie auf die „Schweifspur“ des an den „Läusen“ wundgeriebenen Rehts lenkt oder ein unerwarteter Zufall das von der „Reife“ im Augenblick unbemerkte Kriechen in ihre Gewalt gibt; sondern sie schleicht ihnen auf ihren Wechsein nach, legt sich wie der Luchs auf Baumäste in den Hinterhalt und wartet den Sprung auf Raackes und völlig gesundes Wild. Der alte Kater hat immer ein gut Theil Wildheit und Kühnheit vor der weiblichen Katze voraus, er ist sich seiner Stärke und des Erfolges mehr bewußt. Das Vertrauen auf seine von den Hunden gefürchteten Waffen läßt ihn zuweilen plötzlich den Baum, auf welchen er gestiegen ist, verlassen und unten sich zur Wehr setzen. Hoch krümmt er den Rücken, lebhaft wendet er den Schwanz hin und her oder bedt ihn im Bogen, während isst, knurrt, schäumt und droht er den Hunden. Wird er allzu hart bedrängt und überumpelt, so leat er sich auf den Rücken, sobald er diesen stehend durch einen Baum oder eine Felswand nicht mehr decken kann und vertheidigt sich mit verunbeabsichtigter Gewaltthat, Bosheit und offenkbarer Brechnung seiner Ausfälle nach den Augen und andern empfindlichen Stellen seiner Gegner. Ich habe übrigens die untrüfliche Wahrnehmung gemacht, daß die erwähnten wilden Eigenschaften, obgleich den Grundcharakter der Wildkatze bezeichnend, doch in ihrer größeren oder geringeren Ausbildung und Steigerung individuell erscheinen. In gleichen oder ähnlichen Tagen zeigt die eine Wildkatze weit mehr Muth und Entschlossenheit als die andere; während diese erst durch die äußerste Nothdrangnis zu entschiedenem Vertheidigung sich zwingen läßt, wendet sich jene bei geringer Bedrohung sogleich dem Feinde zu. Schon das Austreiben des Katers aus dem hohlen Baume durch wendende Schläge an den Stamm kann den Unbeachtsamen in Gefahr bringen, es kommt eben nur darauf an, ob er es mit einem entschlossenen oder seltsamen Individuum zu thun hat. Dieser Unterschied des Naturreis tritt auch bei dem Kampf zweier Kater unter sich zur Zeit der Werbung um die Günst der Katze, im Februar, hervor. Es ist nicht immer allein, wenn auch in den meisten Fällen, die Stärke, welche den Sieg verschafft, sondern auch bei gleich kräftigen Männchen Muth und Entschlossenheit des Angriffs. Man findet an alten Wildkatzen, wie ja auch an unserm „Ping“, echt kattiiche Narben, welche sich in den zerfetzten Gesichtern der heutigen Studenten untablehaft commentmäßig ausnehmen würden.

In das wilde Räuber-, Mörder- und Kampflieben der Wildkatzen sind doch auch anmuthige Scenen verflochten. Vorsam und treu bewacht, pflegt und nährt die Mutterkatze ihre Jungen, welche, gewöhnlich 5 bis 6 an der Zahl, nach neunwöchentlicher Trächtigkeit von ihr im Zustande der Blindheit in einer Baumhöhle, einer Felsenspalte oder

einem verlassenem Dache oder Fuchsbau geworfen werden. In den frühen Morgenstunden und Abends spielt sie mit dem „größer gemordenen Köpchen wie unsere Hauskatze, indem sie dabei gern eine mott gedrückte Beute fahen und von dem „Gehet“ wieder sangen läßt. Auch werden sie längere Zeit noch von ihr auf Raub ausgeführt, unterweisen und unterstützt. Die jungen Köpchen verrathen sich leicht durch ihr „Miauen“, wenn sie noch in der Höhle vereint sind und der ausbleibenden Mutter ungeduldig harren. Keineswegs aber geht die Mutterliebe der Kage so weit, daß sie zu aufopfernder Vertheidigung ihrer Jungen fähig wäre.

Sie flieht vielmehr und folgt nur von fern eine Strede, wenn man ihre Jungen fortträgt, die sich frühzeitig schon hochstehend gebenden und Beweise ihrer Unzähmbarkeit geben.

Kein Wunder, daß der Waldmann die Wildkage rücksichtslos verfolgt und ausgetrieben strebt, wenn man die Gefahr bedenkt, welche durch sie dem Wilde droht. Zweifelloser Nutzen bringt sie aber dadurch, daß sie ein so trefflicher Vertilger der Mäuse ist, wie man unter den Raubthieren unserer Wälder und Felder kaum einen zweiten findet.

## Literaturbericht.

1. **Excursionsflora für das südwestliche Preussland von Dr. Moritz Seubert.** Ravensburg, bei Eugen Ulmer. 1868. 16. 292 S. 1 Thlr. in engl. Einband 1½ Thlr.
2. **Taschen-Flora von Leipzig.** Von Otto Kuntze. Leipzig bei Winter. 1867. Gr. 16. 298 S. 1 Thlr.
3. **Flora von Berlin.** Bearbeitet von B. Lackowicz. Berlin 1868, bei Fr. Kortkamp. 16. 239 S. ¼ Thlr.

Vorliegende Schriften haben die gemeinsame Tendenz, die Flora gewisser kleiner Bezirke unseres Vaterlandes in der populärsten Form, welche die Wissenschaft gestattet, zusammenzufassen und somit zu ihrem Studium anzuregen. Das Mittel ist so gewählt, daß man sich nur freuen muß, wenn sich Männer finden, die, vertraut mit den pflanzlichen Eigentümlichkeiten ihrer Heimat, es nicht verschmähen, dergleichen Bücher zum Gebrauche für Schulen und Excursionen abzufassen. Dem Wissenschaftler von Profession dienen sie als eine compendieuse Uebersicht der betreffenden Gegenstände, dem Schüler als der beste Anhalt bei seinen Pflanzensbestimmungen, während selbige durch größere Floras leicht vermittelt werden. Alle drei Schriften bedienen sich deshalb mit Recht der deutschen Sprache; jede sucht in ihrer Weise diejenige Methode auf, welche dem Vf. die bequemste und leichteste zu sein scheint; jede ist zugleich in einem so bequemen Formate gegeben, daß sie wie von selbst zur Begleitung bei Excursionen aufzufordert.

Dem im Popularisiren seiner Wissenschaft so vertrauten Vf. der Excursionsflora für das südwestliche Preussland ist es gelungen, auf einem kleinen Raume gegen 1700 Pflanzensorten zu charakterisiren, ohne unübersichtlich zu werden. Er hat das Kunststück dadurch fertig gebracht, daß er nur, das Wichtigste, das Ausgezeichnete und Zwischige aufnahm, ohne zu den unangenehmen Mächtigungen der Worte seine Zuflucht nehmen zu müssen. Nur in der Angabe der Standortir hätte er, wenigstens bei den seltenen Arten, ausführlicher sein können und Garcke's Flora von Norddeutschland zum Muster nehmen sollen. An und für sich wird sein Buch aber wohl für Südwestdeutschland werden, was diese Flor für Nord- und Mitteldeutschland geworden ist. Denn das Gebiet, was sie behandelt, (Rhein, Wälder und Höhenstellen, Balen nördlich der Donau und Rheindalen, ein großer Theil von Hessen, die Frankfurter Gegend

und Nassau) ist ein so wichtiger und interessanter Bestandtheil unserer deutschen Flor, daß man es als ein Ganzes für sich betrachten darf, weil in denselben besonders die Pflanzen des Westens ihre Eigenart finden.

Die Taschenflora von Leipzig ist ein mit umwichtig, wissenschaftlichem Sinne abgefaßtes Buch, das, bei allem Gependen der Darstellung, doch ganz das gewährt, was man von einer wissenschaftlichen Taschenflora verlangen muß, nämlich die genauere Kenntniss der Formen und Standorte. Auch ist sehr zu loben, daß der Vf. selbst die angegebenen und vermittelnden Pflanzengattungen mit abnahm; ihre Eintheilung wird dem Anfänger über viele Schwierigkeiten hinwegstellen, die leicht sich einstellen, wenn er eine scheinbar wild gemachte Pflanze in der Taschenflora nicht findet und nun gewöhnt sein soll, andere Bücher um Rath zu fragen. Ob er indess wohl gethan hat, das wenig gekannte System H. Braun's statt des von Koch und Garcke angewendeten in einer so beschränkten Taschenflora zur Anwendung zu bringen, wollen wir dahingestellt sein lassen, da es den Werth des Buches nicht berührt.

Die Flora von Berlin will von Haus aus nichts Anderes sein, als die erste Anleitung zum Bestimmen. Sie hält darum mit Recht mögliche Kürze, Genauigkeit und Einfachheit als den obersten Grundsatz fest. Dies zu erreichen, hat der Vf. die bekannte Spaltmethode angewendet, wo bei 2 nach laufender Nummer geordneten Gegenständen immer einer auf die zu bestimmende Pflanze passen muß; doch in einer praktischeren Art, wie seine Vorgänger, da von den Bestimmungen nicht zwingt, bei jeder Familie von vorn anfangen zu müssen. Nebenbeiwerth an dem Büchlein ist darum seine praktische Kürze, das Vereinfachen auch der blühender kultivirten Pflanzen, die genauere Angabe der Standorte für seltene Pflanzen, das Hervorheben des Wesentlichen und sein geringer Preis; störend dagegen sind die vielen Wortabkürzungen, obgleich sie sich, gegen andere Bücher dieser Art gehalten, noch ertragen lassen, und die Abweichung von Koch's System. Letzteres sollte immer der Mittelpunkt für Localflora bleiben, die wie wieder eine eigene Flor von ganz Deutschlands bezeichnen, damit der Schüler jeden Augenblick im Stande ist, Koch's Werke, die doch nun einmal bis heute noch maßgebend sein müssen, leicht gebrauchen zu können, um weiter zu gehen.

A. R.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährliche Subscriptionspreis 35 Sgr. (1 R. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Verleger nehmen Bestellungen an.

Verleger: Schwesinger'sche Buchdruckerei in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 26.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwesche'scher Verlag.

**30. Juni 1869.**

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt **durch die Post** beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das **Abonnement für das nächste Vierteljahr** (Juli bis September 1869) **ausdrücklich bei den Postanstalten** erneuert werden muß, da sonst die Zufendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unsrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beigetreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1868, in gefälligen Umschlag gebefest, noch zu haben sind.

Halle, den 23. Juni 1869.

**Inhalt:** Die Wachsplanzen von Karl Müller. Erster Artikel. — Baron Carl Klaus von der Deden's Reisen in Ostafrika, von Otto Me. — Die Erdbeben, ihre Erscheinungen und ihre Erklärungsversuche, von D. Sätzsch. Dritter Artikel.

## Die Wachsplanzen.

Von Karl Müller

Erster Artikel.

Wachs in den Pflanzen? Wir können eine gewisse Ueberraschung nicht leugnen, da wir in unserem täglichen Leben an den Glauben gewöhnt sind, daß **ächtcs Wachs** nur von den fleißigen Bienen geliefert werde. Und dennoch ist es so. Nur muß man sich zuvor verständigen, was man unter Wachs zu verstehen habe; das Wunder verschwindet, sobald man auf die chemische Natur des Wachses zurückgeht.

Es gab eine Zeit, wo man die Biene nur als den Wachsammlet betrachtete. Dann mußte sie natürlich das Wachs zugleich mit dem Honig den Blumen entnehmen; und wäre diese Anschauung richtig, so hätte es nichts Wunderbares, daß es auch vegetabilische Wachsfabrikanten gebe, die sich von den Blumen nur durch größere Energie in der Wachsbereitung unterscheiden ließen. Gegenwärtig hat man aber die entgegengesetzte Ansicht und nennt die Biene gar



rabzu den Wachsfabrikanten selbst. Ist das richtig, so folgt einfach daraus, daß sowohl der thierische, als auch der vegetabilische Organismus im Stande sein müßte, das Wachs aus seinen Elementen darzustellen. Damit ist das Wunder entschieden größer geworden, da wir eine große Verwandtschaft beider organischen Reiche darin erblicken müssen.

Aber wie beweist sich denn das? Ganz einfach. Die Biene fabricirt ihr Wachs auch ohne Blumentracht. Züchtet man sie mit Zucker, dann schmeißen sie ihren Wachstoff aus den Hinterleiberringen ebenso gut aus, als ob sie ihre Tracht aus Blumentheilen zusammengetragen hätten. Die Bienen wissen das selbst am besten und ruhten es schon viel früher als die Menschen; denn seit die vielen Zuckerfabriken bei uns aufkamen, sind die Bienen, zum größten Schaden dieser Gabelken, wie an sie gekannt, namentlich an die Zuckerraffinerien, die auch im Sommer arbeiten, wo ja die Bienen allein auf Tracht zu gehen vermögen. Da indeß in dem Zucker kein Wachs vorhanden ist, so muß es einfach erst von den Bienen bereitet werden.

Das Uebrige ergibt sich von selbst. Denn wenn sich ein Stoff, wie das Wachs, in Folge des Ernährungsprozesses aus dem Bienenkörper ausschleibt — und dies geschieht ja bekanntlich durch ein allerliebsteßes Drüßensystem an den Hinterleiberringen — so ist das nicht anders zu verstehen, als ob sich eine Art Fett gebildet habe, das nur, statt sich in dem Leibe abzulagern und diesen unförmlich aufzutreiben, wieder aus dem Organismus entfernt wird. Es muß aber auch, wenn das geschehen soll, die Zellenhäute durchbringen können; es muß, anders ausgedrückt, hineinreichend flüssig sein, damit es eben gleich andern Flüssigkeiten zwischen den Poren der Häute zu entweichen im Stande sei, um auf deren Oberfläche zu erhärten. Das Alles setzt voraus, daß das Wachs als eine ölige Flüssigkeit erzeugt und an der Luft verdickt werde, daß es folglich ein festes Del sein müßte.

In der That auch steht dieser Ansicht nicht das Mindeste entgegen. Gleich den fetten und fetten Oelen besteht das Wachs aus zweierlei Fettarten, von denen das eine, die Cerotinsäure, in diesem Alkohol löslich, das andere, das palmelinsäure Melissolopropyl, unlöslich, das letztere versetzbar ist. Ganz ähnlich finden sich die vegetabilischen Wachsorten zusammengesetzt, nur daß sie in dieser Zusammensetzung vielfachen Abänderungen unterworfen sind, manchmal selbst unersetzbar bleiben. Es bleibt mithin über Beide kein Zweifel, daß sie zu einer einzigen Verbindungsreihe gehören, welche die Mitte zwischen den fetten Oelen und den Harzen einnimmt. Je größer aber das Schwanken der vegetabilischen Wachsorten ist, um so schwieriger ist es auch, sie von beiden scharf zu unterscheiden. Bald nähern sie sich mehr den fetten Oelen, bald den Harzen, die so zahlreich von den Pflanzen bereitet werden, und das trägt allerdings dazu bei, daß man in der Aufzählung der

Wachspflanzen zu weit gehen kann; um so mehr, als selbst einige unzweifelhafte Pflanzen dieser Art mit ihrem Wachs zugleich ein Harz gemischt enthalten.

Leßen wir das jedoch dahin gestellt sein, so liegt die Verwandtschaft sowohl des thierischen, wie auch des vegetabilischen Wachses ihrer Zusammensetzung nach auf der Hand. Ob auch hinsichtlich ihrer Erzeugung? Vieles spricht dafür, daß Wachs unter Umständen in den Pflanzenzellen erzeugt wird, als ob es aus seinen Elementen selbst her vorgehe. Wenn wir uns jedoch erinnern, daß der Zuckersstoff in den Bienen zu Wachs umgewandelt werden kann, so liegt es nahe, zu glauben, daß es auch in den Pflanzenzellen aus Kohlenwasserstoffverbindungen hervorgehen könne, welche in ihrer Zusammensetzung dem Zucker ähnlich sind. In der That gibt es dergleichen Körper mehrere; wenigstens wissen wir ganz bestimmt, daß die sogenannten Blattgrüntöfchen (Chlorophyll) in Wachs übergehen vermögen. Wie bei den Bienen, ist mithin der Ernährungsproceß der Wälder des Wachses, da eben nur in Folge dieses Prozesses alle Körper des Zellgewebes, dessen ganzer Inhalt umgewandelt werden, bis alle Stoffe an ihrem Endpunkte angelangt sind. Auf diesem Wege der Verwandlung kann ein Theil des Zellinhaltes in Wachs übergehen. Darum kommt das vegetabilische Wachs als ein Bestandteil des grünen Saugmaterials bei vielen Pflanzen, besonders häufig in den Kohlartern vor. Auch die gelben und gelbrothen Farbstoffe sind an wachssartige Körner gebunden, wie andererseits selbst der Kork eine nicht unbedeutliche Menge von Wachskörnern enthält.

Dieser Fall kommt indeß bei den meisten Wachspflanzen gar nicht in Betracht. Wo wir wirklich von solchen sprechen, da scheidet sich das Wachs auf der Oberfläche der Pflanze selbst aus. Ich spreche da freilich von einem Ausschleiden; in Wahrheit ist es eine Umbildung der äußersten Zellhaut (Cuticula) in Wachs selbst. Während dasselbe im Zellsaft in Gestalt von Bläschen gleich den Stärkemehlzellen schwimmend beobachtet wird, erscheint hier die äußerste Fläche der Oberhaut (epidermis) in Wachsauffang verwandelt. Dieser Vorgang ist häufiger, als wir gewöhnlich glauben. Denn Alles, was wir auf unsern Früchten, besonders auf den Pfäumen (Zweitschen), auf den Weinbeeren, selbst auf Pflanzensiegeln, wie auf der Ricinusblase etc., als Reis bezeichnen, ist nichts, als eine harte Wachsschicht. Auf den Blättern, auf der Rinde, überall kann eine solche erscheinen, und das dieselbe wirklich keine Abscheidung, sondern die umgewandelte Zellhaut selbst ist, geht daraus hervor, daß es Pflanzen gibt, deren ganze Stämmeoberhaut in Wachs umgebildet ist und sich in diesem Alkohol auflöst. Uloth zeigte im J. 1867, daß die weissen Streifen eines unserer acclimatistesten nordamerikanischen Korne (Acer striatum), wie sie auf dessen Rinde so charakteristisch auftraten, nichts Anderes, als Wachsstreifen sind. Auch andere Korne (A. Negundo), der Tulpenbaum, Eucalyptus

pulverulenta und *Acacia cultiformis*, die letzten beiden auf Blättern und Stengeln, fand der Genannte als biets her gebürrig.

Alle in Allem genommen, hat folglich das Erscheinen des Wachs in und auf den Pflanzen nichts Wunderbares an sich. Das Wachs ist eben ein Gemisch von Fetten, die nicht wunderbarer als alle anderen Fettarten, Harze, Oele u. s. w. in den Pflanzen sind. Das einzige Originelle, was man den Wachspflanzen somit beilegen kann, ist nur, daß sie die Wachsschicht in größeren Massen, als andere Pflanzengattungen erzeugen; allein, diese Eigentümlichkeit ist gerade so merkwürdig oder gerade so individuell, wie es Gemäse gibt, die den Zucker als Mannit oder Mannose oder ähnliche Stoffe auf ihrer Oberfläche abscheiden.

Im Ganzen zählt ich unter der ungeheuren Menge der Pflanzen nur etwa 10 Familien mit kaum 32 Arten, die als Wachspflanzen bekannt und berufen sind. Obenan stehen die Palmen, unter ihnen die Wachspalme (*Ceroxylon andicola*). Jedensfalls ist sie, wie die bekannteste, so auch die imposanteste aller Wachspflanzen. Humboldt und Bonpland, welche sie auf dem Andestrassen zwischen Bogota und Carthago in der Montaña de Quindío in Südamerika entdeckten, maßten in den dortigen Wäldern umgebundene Stämme, welche, wie Humboldt sich ausdrückt, die ungeheure Höhe von 160—180 F. erreichten. Bouffingault fand sogar einzelne Stämme, die eine Höhe von 70 Metern (215 F.) besaßen. Der prächtige Baum ist um so merkwürdiger, als er, streng genommen, nur der kalten Region von 8241—9235 F. angehört. Hier bildet er gleichsam den Centralpunkt einer Vegetation, deren Schönheit und Gruppierung nichts zu wünschen übrig läßt. Wie er selbst mit hochauftretendem, geringeltem und glattem Stamme, mit seinen unterseits silberfarbigen, gefiederten Wedeln, mit seinen vielfach verästelten, tief herabhängenden Blütenketten eine wahrhaft königliche Erscheinung ist, so auch ist es sein Holzkast. Es gibt, so versichern uns mit jenen Regionen wohlvertraute Reisende, nichts Herrlicheres, als wenn sich der Baum mit taraxacollartigen Nadelbüschen (*Podocarpus laxifolia*) und mächtigen Eichen (*Quercus granatensis*) verbündet; und dies bei einer Temperatur, welche in den oberen Lagen bei heißen Nächten dem Gefrierpunkte nahe kommt. Trotzdem erzeugt sein Stamm eine Fülle von Wachs, und dieses bildet sich durch Umwandlung der äußersten Rindenschicht. Darum schabte der Indianer nur sie ab, kochte die Schmelze mit Wasser und schöpft das an der Oberfläche schwimmende, erweichte aber nicht geschmolzene Wachs ab, das durch diesen einfachen Proceß von allen Unreinigkeiten befreit wird. Man schätzt den durchschnittlichen Ertrag eines Baumes auf nicht weniger als 25 Pfd. Das geschmolzene und wieder erkaltete Wachs ist nach Bouffingault dunkelgelb, durchscheinend und zerreiblich wie Harz; dagegen ist sein Bruch vollkommen wachstartig. Sein Schmelzpunkt liegt etwas höher als die

Temperatur des kochenden Wassers (83 bis 86°). So sehr es aber auch dem Bienenwachs gleicht, so ist es doch ein Gemisch von ädtem Wachs und einem Harze, woher wahrscheinlich auch seine Zerbrechlichkeit kommt. Um diese zu verringern, setzt man ihm in der Regel etwas Schweinsfett zu, bevor man es zu Kerzen und Wachsstöden formet. Sonst löst es sich leicht in heißem Alkohol auf, verwandelt sich aber beim Erkalten in eine gallertartige, später feste Masse. Durch Äther und Aetheren löst es sich gleichfalls und kann durch letztere versieft werden.

Auch das palmenreiche Brasilien hat seine Wachspalme, nämlich die *Carnauba* (*Corypha cerifera* Arruda, *Copernicia cerifera* Mart.). Man findet sie zahlreich im Norden des Rio Francisco in allen Provinzen, wo sie vereinzelt oder Wälder bildend auftritt. Ihr Stamm, 30—40 F. hoch und geringelt wie bei der vorigen, bewehrt sich mit den rückwärts gekrümmten Dornen der Blattstiele, deren unterster Theil nicht abfällt. Das Blatt selbst, 2—3 F. lang, und geringelt wie bei der vorigen, bewehrt sich mit den rückwärts gekrümmten Dornen der Blattstiele, deren unterster Theil nicht abfällt. Das Blatt selbst, 2—3 F. lang, stellt einen kreisförmigen Fächer dar, welcher sich in 2 1/2 F. lange, schmale Lappen theilt. Die ästigen Blumenkelben senken sich im fruchttragenden Zustande gegen 6 F. lang herab und tragen endlich fleischige, eicindliche Beeren von schwarzgrüner Färbung und bitterem Geschmack. Die Palme selbst gehört zu den weitverbreiteten des Landes, weil sie in der That zu den nützlichsten zu rechnen ist. Ihre Holz wird außerordentlich hart und darum sehr gesucht für Tischlereien, für eingelegte und Kunstschlereien. Ihre Fasern dienen zu Schnüren, Matten, Körben u. s. w. Sonst liefert sie auch Del, Essig, Stärkemehl (die vielbespöchte *Facina*), Gummi, sogar Salz, das noch wenig bekannt ist, eßbare Früchte, so lange sie jung sind, Palmkohl in den jungen Knospen und schließlich Wachs. Dieses erscheint zwischen den Blattwinkeln in kleinen Stücken, die von den Inblanern gesammelt, geschmolzen und nach der oben geschilderten Art gereinigt werden. Auch dieses Wachs ist außerordentlich preßbar, so daß es sich ohne Zusatz von Fett nicht wohl zu Kerzen eignet, was jedoch zu Lenzen im Großen geschieht; — ein Beweis, daß es ebenfalls ein Harzgemenge wie das der ächten Wachspalme ist. Es besitzt eine gelblich-weiße Farbe und entwickelt in der Wärme einen eigenthümlichen, nicht unangenehmen Geruch, obwohl es im natürlichen Zustande völlig geruchlos ist. Heißer Alkohol löst es ebenfalls auf; erst bei 83,5° schmilzt es; eine Eigenschaft, die es ermöglicht, zum Besuche der Kerzenfabrikation leicht schmelzbare Fette zu verwenden.

Eine dritte Wachspalme hat man erst neuerdings als solche durch Karsten kennen gelernt, nämlich *Ceroxylon klopstockii* Mart. (*Klopstockia cerifera* Karst.). Sie gehört ebenfalls Südamerika und zwar der Provinz Caracas in Venezuela an, wo sie Karsten bei einer Erhebung von 6000 F. unter einer mittleren Wärme von 14°,4 R. antraf. Sie entspricht mithin sowohl nach ihrer Gattung, als auch nach

ihrem Standorte genau der Wachspalme von Quindiu. Die Hute ihrer Oberhautzellen, belehrt uns der Entdecker, erleiden während des späteren Wachstums eine so gänzliche Umänderung, daß sie vollständig in einen wachsartigen Stoff umgebildet werden. Hier, sagt derselbe, ist es gar nicht möglich, das Wachs als eine Ablagerung aus dem Zellensaft auf die Zellhaut oder als eine Ausschüßung auf die Oberfläche derselben anzusehen, da die ganze Schicht der Oberhautzellen in heißem Alkohol löslich ist. Die Bildung des Wachses kann hier nur durch das Vermögen der Zellmembran erklärt werden, aus dem Nahrungssaft, mit dem sie getränkt ist, dasjenige zu assimiliren, mit demjenigen Theile desselben sich chemisch zu verbinden, der geeignet ist, mit ihrer Substanz ein ihrer Natur und ihrer Bedeutung für den Pflanzkörper entsprechendes Produkt hervorzubringen. Daß wir es hier wirklich mit einem völlig ähnlichen Stoffe, wie bei der ächten Wachspalme zu thun haben, geht aus dem Verhalten des Wachses gegen dieselben chemischen Reagentien mit Bestimmtheit hervor. Es ist ebenfalls ein Gemisch von Harz und Wachs und dürfte bereits dieselbe wichtige Rolle spielen, wie das von Ceroxylon andicola.

Nur das Zuckerrohr, und zwar seine violette Abart, ist unter den Monocotelen die letzte Pflanze, die sich den Palmen anschließt. Man kann diese Eigenschaft ihm unter den Gräsern nicht allein zuschreiben; denn der bläuliche Reis, den viele Gräser, besonders Getreidearten, und unter ihnen der Roggen vor allen, auf ihren Palmen oft so auf fallend entwideln, muß ebenfalls als Wachs betrachtet werden. Doch kennt man bisher kein zweites Gras, von dem man das Wachs auch gewinnen könnte. In der That schildert Boussingault das Wachs des Zuckerrohrs als überaus reich und fähig, Kerzen zu liefern, die an Farbe und Lichtanzug den Walrathkerzen in Nichts nachstehen sollen. Nach Azequin, welcher zuerst auf diese Substanz aufmerksam machte, soll eine Hektare, die mit violetter Zuckerrohr bepflanzt ist, gegen 100 Kilogr. Wachs liefern können. An und für sich gleich dasselbe an Ertragsfähigkeit so sehr den vorigen Wachsarten, daß es gepulvert werden kann. Es hat eine blaugrüne Färbung, schmilzt bei 82° R., und löst sich in heißem Alkohol vollkommen auf, während es in kaltem Aether unlöslich bleibt. Trotz aller dieser Eigenschaften wird es doch bis jetzt, so viel ich weiß, nirgends im Großen gewonnen.

### Baron Carl Klaus von der Decken's Reisen in Ostafrika.

Von Otto Ull.

Unter den vielen Reisenden, die in unser Zeit mit bewunderungswürdigem Muth und selbst mit Aufopferung ihres Lebens sich der Erforschung Afrika's, des geheimnißvollen aller Continente, widmeten, verdienen wenige so sehr die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, als Baron Carl Klaus von der Decken. Zu solchen Hoffnungen berechtigte noch selten ein Entdecker, wenn man Manneskraft und jugendliche Begeisterung, wenn man glänzende Ausrüstung und reiche Hilfsmittel bei dem Gelingen eines Entdeckungunternehmens in Anschlag bringen darf, als er. Ueber so reiche Privatmittel hatte jedenfalls noch kein deutscher Reisender zu verfügen. Freilich kommt in einem Lande wie Afrika, in dem Kampfe mit einer so übermächtigen Natur und einer so wilden, so heimlichen und mordlustigen Bevölkerung die Großartigkeit der Mittel nur wenig in Betracht, und Heinrich Barth, der aus eigener Erfahrung ein sicheres Urtheil über die afrikanischen Verhältnisse hatte, sprach schon bei dem ersten Unternehmen v. d. Decken's die Befürchtung aus, daß gerade diese glänzende Ausrüstung die Erfolge beeinträchtigen werde. Leider hat er nur zu Recht gehabt; wenigstens hat die reiche Ausrüstung seiner Unternehmungen viel dazu beigetragen, die Schwierigkeiten zu erhöhen, und manche verhängnisvolle Mißgriffe des Reisenden verschuldet. Aber mehr noch trägt die Schuld an dem Scheitern der großartigen Unternehmungen

gen v. d. Decken's das tragische Unglück, das sich von dem ersten Augenblicke, wo er den afrikanischen Boden betrat, an seine Fersen heftete. Dies ist es besonders, was in den Augen des Laien seinen Reisen einen so hohen, wenn auch traurigen Reiz verleihen muß. Selten ist einem Reisenden eine so enge Kette von Mißgeschick und Hindernissen entgegengetreten, aber auch selten ist mit solcher Ausdauer und Zähigkeit dagegen gekämpft worden. Noch ehe er den Fuß auf afrikanischen Boden setzte, wurde ihm eine erschütternde Kunde, die seine besten Hoffnungen vereiteln, seine sorgsam gefaßten Pläne umgestalten mußte. Albrecht Kischner, der wenige Wochen vorher zum Niassa-See aufgetroffen war, um von dort in das unbekannte Innere vorzudringen, und dem sich Decken anzuschließen, mit dessen Begabung er seine frische Thakraft, mit dessen Erfahrungen er seine reichen Hilfsmittel zu vereinigen gedachte, war an den Ufern jenes Sees von Mördeband gefallen. Mit der ihm eignen Energie überwand er den übermächtigen Eindruck dieser Kunde und faßte ohne Bedenken den Entschluß, die Unglücksfälle am Niassa-Sees aufzusuchen, um wenigstens die Papiere des Ermordeten zu retten. Aber das Mißgeschick verfolgte ihn. Wochen lang mußte er in Zanjibar, dann wieder in Kilewa weilen, hingehalten durch endlose Unterhandlungen und unerfüllte Versprechungen, und wenn schon die verworrenen politischen

Verhältnisse in Zanzibar und die traurigen socialen Zustände der Küstenvölker geeignet waren, ihm Schwierigkeiten genug zu bereiten, so kamen ihm noch neue von ganz unerwarteter Seite. Gleichzeitig mit ihm rüsteten in Kiloa Speke und Grant sich zu ihrer großen Entdeckungstreife zu den Quellen des Nil, und durch die reichen Geldmittel,

Troß der Gegentenden des besorgten Arztes, im Gefühl, daß neue Thätigkeit ihn retten werde, entschloß er sich nach Mombas zu gehen, um von dort, nach einem kurzen Ausfluge zur Station der deutschen Missionäre Krapf und Rebmann, das kühne Wagniß einer Erforschung der bisher nur von fern gesehenen Schneegebirge im Innern zu



Strandbild von der Insel Zanzibar.

die ihnen vom Staate bewilligt waren, und von denen sie bei der Anwerbung ihrer Leute rücksichtslosen Gebrauch machten, hatten sie die ohnehin schon starke Habgier der Küstenvölker zu solcher Unverschämtheit gesteigert, daß Decken kaum Begleiter zu finden vermochte. Endlich war doch der Ausbruch möglich geworden, aber schon auf halbem Wege mußte er, von Führern und Mannschaft treulos verlassen, sich zur Umkehr entschließen. In dem ungesunden Kiloa packte ihn das dort herrschende gefährliche Fieber; krank kam er nach Zanzibar zurück, und langsam siechte er dort dahin,

unternemen. Zweimal wiederholte er den Angriff auf diesen geheimnißvollen Punkt Ostafrika's. Das erste Mal gelang es ihm nur, den einen dieser Schneeberge bis zu einer Höhe von 8000 F. zu ersteigen, das andere Mal drang er wenigstens bis zur Meereshöhe von 14,000 F. vor und brachte zugleich unwiderlegliche Beweise für die Schneebedeckung des Doppelgipfels dieses Riesenberges bei, dessen geographische Lage er genau bestimmte. Der unzuverlässige, tückische, raublustige Charakter der Volksstämme, die in der Umgebung dieses Berges hausten, und von denen

nicht einmal Lebensmittel zu erlangen waren, nöthigte ihn beide Male zu eiliger Umkehr. Da entschloß er sich in großartigster Weise die Durchfahung seines Waagstücks zu versuchen. Er ging nach Europa zurück und ließ sich hier zwei kleine Dampfschiffe bauen, mit Hülfe deren er nun auf einem der Küstenflüsse, sei es dem wahrscheinlich von dem zweiten der großen Schneeberge, dem Kenia, herabkommenden Danakus oder dem wohl vom Südbahge der abessinischen Alpen entspringenden Duaba, in das Innere Ostafrika's eindringen wollte. Ausgerüstet, wie noch keine afrikanische Expedition, mit zahlreicher europäischer Begleitung und mit den trefflichsten Instrumenten, trat er die verhängnisvolle Fahrt an. Schon bei der Einfahrt in den Duaba wurde das kleinere Dampfschiff unbrauchbar, und sehr bald erwies sich das andere seiner Länge wegen als durchaus ungeeignet zur Ueberwindung der jabolosen Krümmungen des Flusses. Unterhalb der Stromschnellen des Duaba scheiterte das Schiff. Ein verächtlicher Ueberfall der fanatischen Somali kostete mehreren Mitgehabten der Expedition das Leben, und v. d. Decken selbst mit einem seiner geleiteten Begleiter fiel in der Somalihaft Verbera unter Mieberhänden. Nur wenigen Europäern gelang es sich durch eilige Flucht an die Küste zu retten. So endete im October 1865 nach fünfjährigen unsäglichen Mühen und Anstrengungen ein Forschungsunternehmen, das in Anbetracht der Mittel, die ihm zu Gebote standen, zu den glänzendsten Hoffnungen berechtigte, das mit außerordentlichem Muth und seltener Ausdauer verfolgt wurde, aber von stetem Unglück begleitet, zu keinem namhaften Erfolge führte. Wenn aber auch v. d. Decken's Reisen durch keine ruhmvolle Entdeckung ausgezeichnet sind, so haben sie doch immerhin zur Kenntniß jener wichtigen Gebiete Ostafrika's und ihrer Bewohner wesentlich beigetragen, und die Geschichte dieser Reisen erhält ebenso durch die großartige Natur des Schauplatzes, auf dem sie sich bewegten, durch die eigenthümlichen Sitten der Völker, die sie berührten, wie durch ihr tragisches Schicksal ein hohes Interesse.

Dem Baron v. d. Decken ist es nicht beschieden gewesen, selbst seine Aufzeichnungen und Ergebnisse auf diesen Reisen zu veröffentlichen. Aber er hatte das Glück gehabt, sich mit Männern zu umgeben, die, wie sie durch ihr Wissen seinen Reisen eine nachhaltige Bedeutung gaben, so auch geeignet waren nach seinem Epitaphio sein Werk vor dem Vergessen zu bewahren. Einer dieser treuen Gefährten des unglücklichen Reisenden, Dr. Otto Kerssen, hat sich das Verdienst erworben, unter Benützung der Tagebücher des Barons, wie seiner eigenen und anderer Reisegefährten Aufzeichnungen und Erfahrungen ein Reiseverf zu schaffen, das nicht bloß als das schönste Denkmal des Verewigten, sondern auch als eine Ader unserer Reiseliteratur überhaupt gelten muß\*). Es vereinigt in seiner Weise ansehnliche und unterhaltende Form mit gezieltem Inhalt. Es führt uns in den heldenmüthigen Kampf vor, den dieser deutsche Edelmann mit Einsetzung seiner eignen Person, seiner reichen Mittel und seiner zahlreichen Gefährten 5 Jahre lang gegen die Ungunst der Verhältnisse durchführte. Es bes

schreibt uns seine verschiedenen Reisen auf dem Festland und auf den Inseln, im Festland und in der Nähe des ewigen Schneeb. Es versetzt uns in der anziehendsten Weise in das ganze Leben und Treiben Ostafrika's, der Eingeborenen, wie der dort ansässigen Europäer. Es entwickelt uns an der Schilderung Zanzibar's, der Metropole Ostafrika's, ein umfassendes Gemälde der wunderbaren Natur des tropischen Afrika, seiner physischen Geographie, seiner Vegetation und seines mannigfaltigen Thierlebens. Es eröffnet uns sogar Bilde in die interessante, bis in die Zeiten von Torus und Salomo hinausreichende Geschichte Ostafrika's. Kurzum, wie erhalten in diesem Werke ein ebenso anziehendes, wie lehrreiches, höchst reichhaltiges Gemälde der fünfjährigen Decken'schen Reisen, des ostafrikanischen Festlandes und der Inselgruppen, vom Schneeberg Kilimandscharo bis Madagaskar.

Von wohl wundervollem Reiz die Natur dieser tropischen Ostafrika ist, davon möge sich der Leser durch einen Blick auf die umstehende Abbildung überzeugen, die ihm zugleich ein Begriff von den vorzeffischen, ebenso künstlerisch schönen, als naturwahren Illustrationen geben wird, die das erwähnte Werk schmücken. Es ist ein Stranbild von der Insel Zanzibar. Ueber einem dichten Gebüsch sonderbar gestalteter Pandanus oder Schraubenpalmen, deren gesäbelte, schiffartige Blätter sich schraubenförmig am Stamme emporziehen oder aus ihm entrollen, erheben sich zierlich geschnitzte Bäume, die entfernt an unsere Nadelbäume erinnern, die felsamen Kakuarinen, die überall an der ostafrikanischen Küste und auf den sie umgebenden kleineren Eilanden, wie auf der Westseite der größeren Inseln heimisch sind. Aus der Ferne winken die hohen Wipfel der Cocospalmen, das untrügliche Zeichen nader menschlicher Wohnungen. Im Vordergrund treiben Iwerantropen ihr anmuthiges Spiel, reizende Geschöpfe, die so unschuldig und mit so furchtsamer Zutraulichkeit aus den wundervollen Augen blicken. Die werden diese Thierchen gefangen und den fremden Ankömmlingen zum Geschenk dargebracht. Es gibt aber auch nichts Lieblicheres, als solch ein junges Antilopenkälbchen, das bei seiner Geburt kaum 7 Zoll Länge mißt. Leider gelingt es nur selten und bei sehr sorgfamer Pflege sie aufzuziehen; und dann entfalten sie eine wahrhaft rührende Zuneigung zu ihrem Pfleger, folgen ihm wie ein wohlgezoogenes Hündchen durch das Haus, begleiten ihn auf Spaziergängen, nehmen seine Schmeicheleien und Liebkosungen mit wahrem Behagen entgegen und erwerben sich so die wärmste Liebe auch des gegen Natur gleichgültigen Menschen. So anmuthig ist ihr Bau, so zierlich sind ihre Sprünge, daß man ihnen selbst bei der mächtigsten Störung nicht jähren kann, welche die Ruhelosigkeit dieser Störungsoffen verursacht. Leider aber wird in der Regel schon nach wenigen Tagen die Freude an den zarten Thierchen vergällt. Das kluge Auge umschleicht sich, die Munterkeit des vordem unermüdbaren Geschöpfes schwindet, es legt sich öfters und — aber kurz oder lang liegt es verendend in einer dunklen Ecke. Noch ein oder zwei Mal, sagt Kerssen, macht der Thierfreund dieselbe Erfahrung; dann gibt er es für immer auf, ein Iwerböckchen im Zimmer zu halten; er will sich den Schmerz der baldigen Trennung ersparen.

Das ist nur ein flüchtiger Blick in das herrliche Naturleben Ostafrika's; möge er den Leser reizen, durch die Lectüre des vorzeffischen Reisewerkes seine nähere Bekanntschaft zu machen.

\*) Baron Carl Klaus von der Decken's Reisen in Ostafrika in den Jahren 1859 bis 1861, bearbeitet von Otto Kerssen. Mit einem Vorworte von Dr. A. Petermann. Leipzig u. Heidelberg, G. F. Winter'sche Verlagsbuchhandlung. 1869.

# Die Erdbeben, ihre Erscheinungen und ihre Erklärungsversuche.

Von C. Häppli.

Dritter Artikel.

Was die Verbreitung der Erdbeben im Großen und Ganzen antrifft, so ist dieselbe als eine zwar allgemeine aufzufassen; jedoch wollen viele Forscher einige Verhältnisse aufzukehren haben, welche dieselbe wesentlich beschränken sollen, hauptsächlich in Bezug auf die Häufigkeit derselben in gewissen Gegenden. — Jeder Ort der Erde, muß man sagen, kann einem Erdbeben ausgesetzt sein; doch wollen Einige anerkennen, daß hauptsächlich die nicht mit Vulkanen besetzten Länder an häufigen Erdbeben litten, so daß gewissermaßen zwischen Vulkanen und Erdbeben ein umgekehrtes Verhältniß stattfände. Eine solche Beziehung zwischen der Verbreitung der Erdbeben und der der Vulkane wird jedoch nicht wohl erweislich sein, da ganze Länderstriche, wie z. B. das nördliche Europa, von Vulkanen fast ganz entleert sind und doch von Erdbeben sehr wenig zu leiden haben. Wie werden später, wenn wir die von Vischoff aufgestellte Erklärung der Erdbebenentstehung betrachten, sehen, was diese Theorie über die Verbreitung der Erdbeben zu sagen weiß, indem sie die Bedingungen ihrer Entstehung aufzählt.

Wir haben nur noch einige Augenblicke auf die Betrachtung derjenigen Beziehungen zu verwenden, die man zwischen Erdbeben und meteorologischen, wie kosmischen Verhältnissen ausfindig zu machen geglaubt hat.

Zuerst springt uns hier die verschiedene Häufigkeit der Erdbeben in den verschiedenen Jahreszeiten in die Augen. Ueber diesen Gegenstand haben mehrere Forscher sich verbreitet und Berechnungen angestellt, die fast sämmtlich ergeben haben, daß die meisten Erdbeben im Winter und Herbst stattfinden, dagegen die Anzahl der im Frühling und Sommer stattfindenden bedeutend geringer ist. Dieses Verhältniß ist fast durchgängig durch Betrachtung einer größeren Reihe von Jahren nachgewiesen. Um dem Leser einen Begriff von dem Verhältniß der Erdbebenzahl in jenen bei den Jahreszeiten zu geben, beilege ich mich der Nachforschungen, die Meier an über die Erdbeben in Basel angestellt hat. Alle daselbst bis zum Jahre 1836 beobachteten Erdbeben vertheilen sich auf die einzelnen Jahreszeiten folgendermaßen:

Winter	Frühling	Sommer	Herbst
41.	22.	18.	39.

A. Perrey hat gleichfalls sehr umfassende deatige Rechnungen angestellt und gefunden, daß die seit 1801 bis 1843 in Europa und den angrenzenden Gebieten Afrika's und Asiens stattgehabten Erdbeben sich auf die Jahreszeiten folgendermaßen vertheilen:

Winter	Frühling	Sommer	Herbst
291.	169.	224.	230.

Hieraus ergibt sich das ungefähre Verhältniß 4 : 3 als entsprechend dem Verhältniß der Erdbebenhäufigkeit von Herbst und Winter zu Sommer und Frühling. Mir scheint es sehr zweifelhaft, ob, wie Raumann vermuthet, die mittlere Stellung der Erde in der Sonnennähe die Sache erkläre oder doch damit zusammenhänge. Wir werden unten sehen, wie nach der Vischoff'schen Erdbebenentstehung dieselbe in naher Beziehung mit den atmosphärischen und irdischen Gewässern stehen soll, so daß nach dieser Theorie Wasserreichthum den Erdbeben nur förderlich sein kann; und

Herbst und Winter sind bekanntlich für Europa die an atmosphärischen Niederschlägen reichsten Jahreszeiten.

Anschließend an diese eben besprochene ungleichmäßige Vertheilung der Erdbeben auf die Sommer- und Winterhälfte des Jahres, müssen wir der ähnlichen ungleichen Vertheilung auf Tag und Nacht gedenken, die noch ungleichmäßig viel sicherer konstatiert ist, als der erstere Gegenstand. Die Anführung einiger wenigen Zahlen wird die Sache am besten klar werden lassen. Von 2396 Erdbeben, die aus den Jahren 1850 bis 1857 von der nördlichen Erdhälfte bekannt geworden sind, kommen auf die Tagesstunden (Morgens 6 bis Abends 6 Uhr) nur 988, dagegen auf die Nachtstunden 1392, was eine Differenz von 604 ergibt. Ebenso zeigt sich ein beträchtlicher Ueberschuß für die Zahl der nächtlich stattgehabten Erdbeben auf der südlichen Erdhälfte; hier wurden 546 Erdbeben in Rechnung gezogen, von welchen 229 am Tage, dagegen 317 zur Nachtzeit eintreten, so daß der Ueberschuß der nächtlichen Erdbeben hier 128 beträgt.

R. Edmond und hauptsächlich A. Perrey haben gewisse Beziehungen zwischen der Häufigkeit der Erdbeben und den Mondkonstellationen nachzuweisen gesucht, und es lauten die Resultate des letzteren Gelehrten hierüber so:

1) Die Erdbeben sind häufiger um die Zeit der Quatratoren;

2) dieselben sind häufiger im Perigäum als im Apogäum des Mondes;

3) die Stöße sollen an jeder erschütternden Stelle zahlreicher sein, wenn der Mond sich gerade im Meridian befindet. Diese Einflüsse der Mondkonstellationen auf die Erdbeben haben Ähnlichkeit mit den von jenen auf die Fluth und Ebbe des Meeres erzeugten.

Nachdem ich, wie ich glaube, so die wichtigsten Erscheinungen mitgetheilt, in Begleitung deren die Erdbeben in's Leben treten, nachdem ich ferner die Erderschütterungen in allen jenen Beziehungen, die mir als Beobachter zugänglich sind, erschöpfend habe, will ich es nun versuchen, in die heutzutage herrschenden Ansichten über ihre Entstehung einzudringen und dieselben womöglich nach ihrer größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit vom heutigen Stande der Wissenschaft zu beurtheilen versuchen. Wir dürfen die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens nicht verkennen, und ich glaube, daß eine vorurtheilsfreie Würdigung der vielen Hindernisse, die heutzutage noch der vollständigen Erkenntniß eines Phänomens, so verbreitet und so häufig sich wiederholend, wie das der Erdbeben, entgegenstehen, und die Beurtheilung der Versuche, dieses Phänomen in seinen Gründen zu begreifen, weit leichter und verständlicher machen wird. Die Erdbeben sind so allgemein verbreitete, so häufige Erscheinungen, daß sie manche Forscher in dieser Hinsicht wohl mit den Gewittern verglichen haben. Als Erdbeben muß jede Erschütterung des Erdbodens, die uns durch Gefühl oder Gehör noch bemerkbar wird, bezeichnet werden, und eine kleine Uebereilegung wird auch den mit der Betrachtung ähnlicher Gegenstände der Wissenschaft nicht Vertrauten zu der Erkenntniß führen, daß Erderschütterungen, die wir alle heutzutage zu dem gemeinsamen Phänomen der Erdbeben rechnen, und die sämmtlich in ihren

uns bemerkbaren Erscheinungsweise ungemein viel Aehnliches haben, das Resultat sehr verschiedener Ursachen sein können. — Ich glaube, dieser Schluss bedarf keiner weiteren Erläuterung, namentlich da wir in der Folge noch mit manchen speziellen Entstehungsarten und vertraut machen müssen. Es tritt uns hier eine eigenthümliche Verwirrung in der Wissenschaft, hauptsächlich der Geologie, entgegen, die darin besteht, daß man gemeint ist, von gleicher Wirkung stets auch unbedingt auf gleiche Ursache schließen zu wollen. Es ist dies ein Trugschluß; die Umkehrung des Satzes: gleiche Ursache, gleiche Wirkung — ist nicht statthaft, wie uns die Wissenschaft, in deren Gebiete wir uns forschend bewegen, vielfach nachweist.

Lange Zeit, als die Geologie überhaupt in einer eigenthümlichen Richtung sich bewegte, der sogenannten plutonischen oder vulkanischen, hat sich die Meinung, daß die Erdboden durchgängig ihren Grund in dem feurig-flüssigen Erdbinnen hätten oder doch, daß diese Phänomene in einem zwar von Verschiedenen verschieden gedeuteten Zusammenhang mit diesen unterirdischen Kräften ständen, unbedingt Geltung verschafft. — Damals kannte man nur den Drang der feurig-flüssigen Masse gegen die feste Erdkruste, Explosionen im Innern oder Aehnliches als die Ursache der Erdbeben. Doch die Zeiten kamen, wo durch die Bereicherung der Erfahrungen, durch neue eröffnete Gedankentrichtungen und die Fortschritte mancher Hilfswissenschaft die Geologie eine gewisse Umnägelung erfuhr. Es wurde von verschiedenen Seiten her der Versuch gemacht, den häufig sehr gewissenlosen Spielereien mit gemaltigen, uns bekannten Kräften ein Ende zu machen, an die Stelle kaberhafter Kraftanstregungen und Umnägelungen, die ganze Ländermassen in plötzlichem Ausbruch verschlungen haben sollten, diejenigen Vorgänge zu setzen, die uns heutzutage noch sichtbar vor Augen liegen und noch jetzt unsere Erdoberfläche, wenn auch sehr allmählig, umgestalten. Die Früchte dieser Richtung sind wohl theilweise bekannt, und es war natürlich, daß dieselbe auch auf die Betrachtungsweise der Erdbeben sich erstreckte und hier neue Ansichten, sowie einen Bruch mit dem Alten, wenigstens theilweise, bemerkbar stellte.

Die Verwerfung der plutonischen Ansichten und die Einführung der neuen Epoche hat denn auch eine Theorie der Erdbeben entstehen lassen, deren Hauptvertreter in unserer Zeit Volger und Bischoff sind. — Es läßt sich gegen diese Theorie nichts einwenden, als daß sie eben keine allgemeine sein kann, inwieweit hauptsächlich der zweite ihrer Begründer dieselbe als eine solche hinstellt. — Alles führt uns heutzutage zu der Ansicht, daß die Erdbeben nicht einer großen allgemeinen Ursache ihre Entstehung verdanken, sondern daß sie durch sehr verschiedene Ursachen hervorgerufen werden können, und eine dieser Ursachen ist es eben, welche die Theorie jener Gelehrten aufstellt.

Wir wollen nun jene beiden Theorien, die ältere plutonische und die neuere von Bischoff und Volger hauptsächlich vertretene, als diejenigen beiden Erklärungsversuche, die heutzutage sich der meisten Anhänger erfreuen, einer näheren Betrachtung unterwerfen.

Die erstere sucht also, wie schon erwähnt, die Ursache der Erdbeben in der häufig nach Humboldt's Vorgang als

„Reaction des flüssigen Erdinnern gegen die feste Erdrinde“, bezeichneten Thätigkeit des Erdkörpers.

Es ist bekannt, daß schon seit alten Zeiten verschiedene Vorgänge an unserer Erdoberfläche, hauptsächlich die Vornahme gegen das Innere, die Ansicht entwickelten, daß die Erde nur in ihren äußersten Theilen fest sei, und das Erdinnere dagegen eine heissflüssige Masse darstelle. Ueber die Frage nach der Dike dieser festen Erdrinde wollen wir hinweggehen, ihre Diskussion hat heute noch keinen befriedigenden Abschluß gefunden; nur muß ich erwähnen, daß aus verschiedenen Gründen diese Erdrinde eine verschiedene Dike besitzen muß. Einmal muß, wie Jedem auch leicht verständlich sein wird, die Dike bedeutender an den Polen sein, außerdem jedoch die Dike auch noch lokale Verschiedenheiten zeigen. Die sogenannte Reaction des flüssigen Erdinnern gegen seine Rinde soll sich hauptsächlich in zwei Thätigkeiten an der Erdoberfläche äußern, dies sind die thätigen Vulkane und die Erdbeben. Es ist hier nicht der Ort, die Art und Weise der Vulkanthätigkeit, wie sie nach dieser Theorie oder Hypothese sich gestaltet, zu erläutern; bemerken will ich jedoch, daß diese Ansicht in Bezug auf die Erklärung der Vulkanthätigkeit bis jetzt als genügender sich erwiesen hat, als in Bezug auf die Erdbeben; deshalb ist auch die Zahl ihrer Anhänger, was die Vulkane anbetrifft, eine viel größere, als in Hinsicht auf die Erdbeben. Der Schwerpunkt der ganzen Hypothese liegt darin, daß diese flüssige Erdinnere Fluctuationen zeigen soll. Es ist wohl nicht zweifelhaft, daß diese Fluctuationen stattfinden müssen, wenn die Verhältnisse so gestaltet sind, wie sie oben besprochen wurden. Einmal muß bei der Drehung der Erde der Druck, den dieses Flüssigkeitsphänoel am Aequator gegen die feste Erdrinde ausübt, ein viel bedeutender sein, als an irgend einer andern Stelle. Dies läßt sich mit einer Fluctuation von den Polen gegen den Aequator vergleichen. Damit reichen wir jedoch nicht aus; denn dann müßten sich die Vulkane sowohl als die Erdbeben hauptsächlich am Aequator zeigen, und dies ist keineswegs der Fall. Es müssen also noch andere betrieblige Fluctuationen stattfinden, und dies wird einmal so erklärt, daß bei der allmählichen Erklarung der äußersten Theile des flüssigen Erdinnern das Volumen dieser erstarrten Theile sich vergrößert, so auf die übrige flüssige Masse ein Druck ausgedrückt und diese zu Strömungen veranlaßt werde, die ihrerseits die Erde wieder zu Excitationen veranlassen sollten. Es läßt sich gegen diese Ansicht wohl nichts einwenden, als daß es überhaupt zweifelhaft ist, ob die Erde sich heutzutage noch mehr abkühlt, ob nicht die Sonnenwärme die Abgabe vollständig compensirt, und ob eine so allmählig vor sich gehende Erklarung plötzliche Fluctuationen von einiger Festigkeit erzeugen können; denn solche müssen es doch sein, die plötzliche, oft äußerst heftige Erschütterungen der Erdrinde veranlassen können. Andere Gelehrte, und hauptsächlich Huxley, der im Jahre 1861 eine Schrift über die Erdbeben von 1850 bis 1857 herausgegeben hat, wollen Strömungen des flüssigen Erdinnern von einer eigenthümlichen allgemeinen Kraft herrühren, die jedoch bis jetzt noch unbekannt sei, und die auch in den Gewässern auf der Erdoberfläche plötzliche Fluctuationen hervorruft. Ich kann mich hier nicht näher auf die Begründung dieser Ansicht einlassen, hauptsächlich, da sie eigentlich erst im Entstehen begriffen ist.





**Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.**

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 27.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, S. Schwesche'scher Verlag.

**7. Juli 1869.**

**Inhalt:** Die Wachspflanzen, von Karl Müller. Zweiter Artikel. — Die Schädeltheorie, von Frh. Nagel. Erster Artikel. — Die Erdbeden, ihre Erscheinungen und ihre Erklärungsversuche, von D. Bütschli. Vierter Artikel. — Anzeige.

**Die Wachspflanzen.**

Von Karl Müller.

Zweiter Artikel.

Unter den dickeptischen Gewächsen stehen die Bagelsträucher (Myricaceen) als Wachs liefernde obenan. Es scheint das eine allgemeine Eigenschaft derselben zu sein; denn selbst solche, von denen man kein Wachs gewinnt, zeichnen sich durch einen höchst balsamischen Geruch aus, der namentlich im Frühling bei der Blattentfaltung, die erst nach der Entwicklung der Blumenkähgen eintritt, auffallend hervortritt. In dieser Beziehung läßt wenigstens unser einheimischer Bagel (Myrica Gale) auf den torfigen norddeutschen Heiden nichts zu wünschen übrig, und ich bin oft wahrhaft überrascht gewesen von der Intensität dieses Duftes, gegen welchen der Balsamhauch der verwandten Birken und Pappeln nicht aufkommt. Noch in diesem Augenblicke duften, gerieben, die kleinen Früchte (Nüsschen) mit ihren Häußblättern überaus balsamisch, die ich schon

vor 30 Jahren sammelte. Untersucht man sie näher mit der Lupe, so entdeckt man zu seiner Ueberraschung an allen blattartigen Organen, welche die breckantigen Nüsschen wie Schuppen umhüllen, eine große Menge brauner oder goldgelbender Kugeln, die gleich winzigen Samenkörnern alle Schuppenwände bedecken. Unter dem Mikroskope stellen sich diese minutiösen Kugeln als Bellen dar, welche einen gelben compacten Inhalt umschließen, der seinerseits auch eine mehr oder minder abgerundete Kugel darstellt, die wiederum aus mikroskopisch kleinen Körnchen zusammengesetzt ist. Diese ist in heißem Alkohol löslich und gibt einen höchst balsamischen Spiritus, dessen Geruch vollständig an den Frühlingseruch des Bagels erinnert. Die Substanz selbst schmilzt bei einer verhältnismäßig niedrigen Temperatur zu einem Wachstropfen zusammen. Jedenfalls haben wir



es in ihr mit einer wachsartigen Materie zu thun, die es werth ist, im frischen Zustande genauer untersucht zu werden; um so mehr, als auch, nach andern Untersuchungen, schon in der Wurzel des Sagels ein Gemisch von Wachs und Harz enthalten ist. Auf keinen Fall aber ist das Wachs der Fruchthüllen eine Abtheilung, sondern eine umgewandelte Drüsenzelle, wie ich es auch an den Btulingellen der Birken beobachtete. Ob es sich nicht der Wäbe verleihe, in dieser Beziehung ein wachsartiges Auge auf einen Strauch zu haben, der in so außerordentlicher Ausdehnung auf den karglichen Torfhalben der Nordseemiederung, sowie der dalsischen Ebene gezogen werden könnte, will ich hier nur beiläufig erwähnt haben.

Sicher ist, daß das Wachs, das die übrigen Arten liefern, nach den vorhandenen Schilderungen genau so angetroffen wird, wie bei unserm europäischen Sagle. Eine der am längsten bekannten Arten ist der virginsche Wachsdarm oder die „Wap-Mortle“ oder auch „Candle-berry-myrtle“ (*Myrica cerifera*), der sich von jenem durch größere Blätter und erbsengroße, vollkommen kugelige Früchte unterscheidet, an deren Hüllblättern das Wachs als weißer Substanz erscheint. Der Strauch selbst wächst von Ohio und Pennsylvania durch Virginien, Carolina und Louisiana bis nach Mexiko, ganz wie unser Sagle, auf dem Torflande und erzeugt eine solche Menge von Wachs, daß die Frucht ganz wie zwischen Wachs eingebettet ist. Man sammelt sie gegen den Herbst, wirt sie in siedendem Wasser und schmilzt somit das Wachs aus dessen Zellen heraus, so daß es nun als eine schöngüne, durchsichtige Substanz im gereinigten Zustande erscheint. Man rührt es als dem Bienenwachs sehr nahestehend und bringt es als Mortelwachs in den Handel. Dieser seinerseits bemächtigt sich des Stoffes gern, weil die aus ihm geformten Kerzen in der Wärme sich nicht leicht biegen, weil sie, wie man sagt, besser und langsamer brennen als ächte Wachskerzen, und weil sie beim Auslöschen einen angenehmen Geruch hinterlassen, obwohl sie mit etwas Fett versehen werden müssen, um die Sprödigkeit des Stoffes zu mildern. Diese ist jedoch nicht so groß wie beim Palmenwachs, aber größer wie beim Bienenwachs, so daß es sich pulvern läßt. Es schmilzt bereits bei 46° C., ist in der Wärme nicht sehr kneubar und bleicht sich durch Schmelzen im Wasser. Behandelt mit beßem Alkohol, scheidet es sich in zwei Stoffe, Cerin und Myricin, welches unaufgelöst bleibt. Mit Aetlian gibt es Seife. Ein solcher Stoff ist um so bedeutungsvoller, als die Frucht, wie Bouffingault schreibt, bis zu 25 Proc., ein ganzer Stamm alljährlich an 12 bis 15 Kilogr. davon zu erzeugen vermag. Man gewann ihn in Nordamerika schon vor dem ersten Freiheitskriege, d. h. schon vor dem Jahre 1773, und brachte ihn in Kuchenform nach England. Das prächtige Gedeihen so vieler nordamerikanischer Pflanzen bei uns legt die Vermuthung nahe, daß der baumartige Strauch auch auf unserm norddeutschen

Bruch und Moorlande, besonders an der vom Golfstrom berührten Nordsee, ausbauen werde und acclimatisirt eine Pflanze von außerordentlicher Bedeutung für uns werden müßte. Man hat sich das auch schon vor Jahren gesagt sein lassen; allein die Erfolge haben bisher noch keine nennenswerthen Resultate ergeben. Doch können sie, da die Acclimatisationsversuche außerhalb Deutschlands, in Frankreich und den Niederlanden angeßelt wurden, nicht entscheidend für uns sein. Man würde freilich seine Hoffnungen nicht zu hoch steigern müssen. Denn obßon die Wachsmerte, wie man die Pflanze häufig bezeichnen sieht, massenhaft in den Sümpfen und an den Ufern der Flüße wächst, und obßon sie ein Jeder ohne Zoll sammeln darf, so kommen doch die aus ihrem Wachs gefertigten Kerzen in Charleston (Carolina) höher zu stehen, als Talglichter, und brennen überdies mit einer so schwachen Flamme, daß sich nur die Neger des Wachsfeß bedienen, indem sie es in eigenen Lampen mit Dochten brennen. Auch während der Pflanze jene trocknen Winde fehlen, die theilweise in Nordamerika derart sind, daß die Linie auch sofort trocken ist, wie sie eben der Jeter einloß. Ich werde unten auf diese trocknen Winde zurückkommen.

Außer dem eben geschilderten Sagle beßigt Nordamerika noch zwei Wachs liefernde Arten: *Myrica pensylvanica* und *carolinensis*, die aber, wie es scheint, weniger in Betracht kommen. Dagegen tritt unter den übrigen Arten des äquatorialen Südamerika die *Myrica caracasana* um so bedeutungsvoller auf. Nach Hermann Karsten sammelt man in Neugranada von ihren Früchten alljährlich mehr als 1000 Centner Wachs, das dort zur Beleuchtung dient. An diesen Früchten aber scheint sich das, was sonst an andern Früchten nur eine Art Reis ist, zu einer dicken Wachsschicht zu entwickeln. „Ähnlich wie an dem Stamme der Palmen, schreibt der Genannte, ändert sich an den Früchten der *Myrica* die Hüllhaut und die Membran der Oberhautzellen im Verlaufe ihrer Entwicklung in Wachs um.“ Darum sammelt man auch hier die Früchte zur Zeit der Reife ein, läßt sie zerquetscht mit Wasser sieden, schöpft das Wachs von der Oberfläche und reinigt es durch Seiden und nochmaliges Umkochen. Es ist bis jetzt nicht bekannt, ob auch bei der vorigen Art auf den Früchten selbst noch eine solche Umwandlung stattfindet; wahrscheinlich dürfte sie für manche andere Arten sein, deren Früchte man darum ebenfalls zerquetscht und auskocht. Sie finden sich sämmtlich in Afrika; nämlich *Myrica aethiopica* in Abyssinien, *M. brevifolia*, *Kraussiana*, *Burmanni*, *quercifolia*, *lacinata*, *cordifolia* und *serrata* Lam. (*M. banksiaefolia* Willd.) am Kap der guten Hoffnung. Die letzten beiden Arten sind von besonders hoher Bedeutung, da sie zwischen der Kapstadt und Stellenbosch zur Befestigung der Sanddünen und des Flugsandes überhaupt wesentlich beitragen, indem sie gegen 60 F. lang ihre Wurzelstöcke im Sande hintreiben und 2 bis 3 F. hohe Sträucher über den

Woden massenhaft ausfinden, so daß es eine Fülle von Wachsbereen gibt. Man sammelt dieselben vom Mai bis November und behandelt sie, wie es oben geschildert wurde; nur daß man das grünlche Wachs an der Sonne auch bleicht. Anfangs soll das Wachs als weiche Substanz auf den Früchten erscheinen, dann aber bis zu einem Pulver erhärten, was nach den obigen Beobachtungen Karsten's höchst unwahrscheinlich ist, sobald man davon ausgeht hat, daß die äußerste Zellschicht selbst in Wachs übergeht.

Wie weit sich diese Anschauung auf die wachsbartigen Stoffe, die man aus der Familie der Myricaceen gewinnt, ausdehnen läßt, steht dahin. Jedenfalls sind sie mehr talgartige Fette, die zwar zur Kerzenfabrikation häufig benutzt werden, aber einen sehr niedrigen Schmelzpunkt besitzen. Hierher gehört das sogenannte *Deuba-Wachs*, eine olivengrüne Substanz, die schon bei 36 bis 48° schmilzt und, von einem *Muskatnussbaum* (*Myrsine*) stammend, am Amazonasflusse in der brasilianischen Provinz Pará gewonnen wird. In Guiana erhält man schon seit länger Zeit durch Ausleichen der Früchte einen ähnlichen Kerzentalg von der *Talg-Muskatnuss* (*M. sebifera*), wie viele andere Arten wohlriechende Balsame geben, die sich fettartig verhalten.

Dagegen bildet die merkwürdige, in ihren Formen durchaus pilzartig erscheinende Familie der *Balanophoren* ein höchst charakteristisches Pflanzenwach. Dasselbe erzeugt sich aber nicht auf der Oberfläche der Gewebe, sondern in deren Zellen selbst, ganz nach Art des Stiefmehls im Zellsafte schwimmend. Nach dem Vorhergehenden kann man nur schließen, daß sich hier gewisse in Zellenform erscheinende Stoffe zu Wachs umgebildet haben, wie es Karsten ähnlich auch in dem Gewebe der unreifen Früchte des *Pisang* (*Musa*) beobachtete. Daher kommt es auch, daß man in Neugranada schon die Stengel einer ganzen Pflanze (*Langsdorffia hypogaea*), wenn sie nur getrocknet sind, als Kerzen zu brennen vermag. Man nennt sie dort *Eleias*, während die Pflanze *Pipó* heißt, und bedient sich ihrer zu *Boquetó* gleich Wachsstöcken an Fest- und Feiertagen. Im *Tollmagedberge*, wo auch die *Wachspalme* (*Ceroxylon andicola*) wächst, ist die Pflanze als *Belada* bekannt. Sonstiger genau, scheint der Blumenboden nur wenig oder gar kein Wachs abzuscheiden, sondern kann als Speise dienen, wie man ihn in der That unter dem Namen *Melantia* genießt. Die Pflanze enthält eine so große Menge Wachs, daß man schließlich Kerzen aus ihm fabricirt. Auch *Okinbin*, besonders *Java*, hat eine ähnliche Pflanze hervorgebracht, die *Balanophora eiongala*. Wie die vorige, gebt auch sie der höheren Bergregion, und zwar einer Region von 7500 bis 10,000 F. Meereshöhe an, wo sie bei den Javanesen als *Prut* oder *Bundjig* bekannt ist. Tief zwischen Wachsblättern versteckt und sich oft nur mit der Spitze ihres gelb- und rothgefärbten Blütenkolbens darüber

erhebend, — schreibt Junghuhn in seinem großen Werke über *Java*, — trifft man diese *Balanophore* an, die auf den Wurzeln der Bäume, besonders von *Agapetes vulgaris* (einer Art *Baumheide*) wächst und deshalb mit ihrem ungetreten fleischigen, knolligen Körper zum Theil unter der Erde verborgen ist, woraus nur ihre langen Blütenkolben hervorragen. Sie entwickelt sich als eine ächte *Schmaragrpflanze* nur auf den Wurzeln verschiedener Arten von *Ericaceen* - Bäumen und Sträuchern und gebt daher, so wie diese ihre Mutterpflanzen, recht eigentlich der obersten *Wegeregion*, den *Berggipfeln* an, auf denen sie, wegen der all gemeinen Verbreitung der *Agapetes vulgaris* und verwandter Arten, durch die ganze Insel häufig gefunden wird." Mitunter wächst auch *Balanophora maxima*, eine nahe Verwandte von gelblich *carminrother* Färbung, in dieser Region auf den Wurzeln der *Albizia montana*; doch lebt nur jene die abgerundeten und bequemen Javanesen hier heraus, um *Prut* zu sammeln. Sie zerstampfen das Gewächse, dessen äußerer fleischiger Theil von einem zähen, klebrigen Wachs erfüllt ist, und bestreichen mit der leimigen Masse dünne *Bambusstäbchen*, die dann getrocknet als kleine Kerzen, *Wachskerzen*, gebrannt und auf den Märkten 10 Stück für  $\frac{1}{2}$  Pfennig verkauft werden.

Höchst wahrscheinlich verhält es sich ganz ähnlich mit dem Wachs des *Ruhbaumes* (*Galactodendron utile*). Auch hier glaubt Karsten die Zellennatur mit Sicherheit beobachtet zu haben. Bekanntlich ist bei diesem merkwürdigen und wohlthätigen Baume, welcher der *Küstenorbikler* von *Caracas* eigenthümlich ist, und welcher der Familie der *Artocarpaceen* angehört, das Wachs schwimmend in dessen geringbarem *Milchsafte* enthalten. Dieser selbst ist ein Gemisch zweier Stoffe, von denen der eine *vegetabilische Eiweiß*, der andere eben dieses Wachs ist. Jenes verhält sich wie der *Käsestoff* der *Milch* und wurde von *Boussingault* als *Fibrin* bezeichnet, dessen chemische Natur auch *Stichstoff* enthält; dieses, *Galactin* genannt, hat eine fettartige Beschaffenheit und läßt sich mit dem *Bienenwachs* vergleichen. Beide werden durch Erwärmen leicht von einander getrennt. Alsdann liefert die ganze Masse, im *Sandbade* eingebüht, eine Art *Extract*, welches dem *Frangipane* (einer Art *Nandelbadwerk*) ähnelt; noch mehr erhärtet, scheidet sich dieselbe in eine starre Flüssigkeit, welche das geschmolzene *Pflanzenwachs* ist, und in den *Faserstoff*, dessen Geruch an *Fleisch* erinnert, welches in Fett gebraten wird. Auf diese Weise abgeschieden, kann schließlich das *Galactin* als eine gelblich-weiße Masse dargestellt und zu hellbrennenden Kerzen verarbeitet werden. Es schmilzt bei 60° C., ist schon bei 40° knetbar und löst sich in *Lochen* dem *Alkohol* vollkommen auf, während es sich beim *Erfalten* wieder niederschlägt. Mit *Alkalien* versetzt es sich. So merkwürdig dieses Wachs auch ist, so fehlt es doch im *Pflanzenreiche* nicht vereinzelt da. Höchst wahrscheinlich gibt es eine Menge von *Milchsaften*, welche eine wachsame

tige Materie enthalten; nur würde es darauf ankommen, sie noch auf diese Endung zu prüfen. In derselben Küstencordillere liefert um Maracapo die „Kaka“ (*Clusia Galatiodendron*), eine Pflanze aus der Familie der Euphorbiaceen, einen ähnlichen genießbaren Milchsaft, so daß auch sie wohl mitunter als Kaka oder Milchbaum (Arbol oder Palo de Kaka oder Palo de Leche) genannt und mit dem vorigen Baume verwechselt wird. Doch nähert sich ihr Wachs nach Bouffingault mehr den Harzen, da es viel weniger leicht schmilzt. Auch die Milch des allbekannten Nelkenbaumes (*Carica Papaya*) aus der kleinen Familie der Papayaceen enthält nach dem Genannten, neben einer stickstoffhaltigen Materie, Zucker, Wachs und Harz in geringen Mengen; und ebenso dürfte das mit der genießbaren Milch der „Hya-hya“ (*Tabernaemontana villosa*) im britischen Guiana, einer Apocynaceen, der Fall sein. Doch wird von keiner dieser Pflanzenarten das Wachs für sich dargestellt. In der Reihe der Wachspflanzen nehmen aber diese Milchsaftpflanzen einen um so höheren Rang ein, als sie uns die nahe Verwandtschaft des Wachses mit andern gleichzeitig vorkommenden Stoffen kund thun. Der Kakabaum selbst aber stellt sich als vierte der nördlichen Gebirgsregion Südamerica's angehörende Wachspflanze so bemerkenswerth hin, daß man, besonders im Hinblick auf andere Wach-

pflanzen, die, wie die javanischen Balanophoren, der kalteren Gebirgsregion angehören, dem Klima dieser Gegenden einen höchst wichtigen Antheil an der massenhaften Bildung des Wachses zuschreiben möchte, obwohl man nicht vergeffen darf, daß die Wachsbildung unter allen Klimaten als eine ziemlich allgemein verbreitete Eigenschaft der Pflanzen vor sich geht. In dem stürmischen Klima der Falklands-Inseln überziehen sich die meisten Pflanzen mit einem harzigen Ueberzuge, der sie wie mit Harnis überzogen erscheinen läßt. Noch überzeugender wird das Hochland von Patagonien zwischen 38° 50' und 43° 15' s. Br. Hier, wo nach Heuffer und Claraz Alles den Typus eines trocknen Klimas zeigt, entwickeln verschiedene Sträucher von unbekannter Abkunft wachse- und harzartige Stoffe. Die *Malta negra* zeichnet sich durch ein Harz aus, das beim Verbrennen des Strauches einen höchst unangenehmen Geruch entwickelt, der sich selbst den Speisen mittheilt, welche bei diesem Feuer gekocht und gebraten werden. Die *Malta encensis* dagegen verbreitet beim Verbrennen einen dem Weihrauch ähnlichen Geruch. Das Citrus der Indianer aber hat eine so wachseriche Rinde, daß sie sich als Hülle abstreifen läßt. Die Indianer zünden darum die Zweige einfach an, lassen das Wachs in eine Schüssel mit Wasser tropfen und kauen es schließlich aus.

## Die Schädeltheorie.

Von Fritz Nagel.

Erster Artikel.

Wissenschaft und Kunst dürfen nicht, wie es so oft geschieht, als die polaren Gegenstände im Gebiet der Geistes-thätigkeiten betrachtet werden. Liegen auch ihre letzten Ziele, hier die Darstellung des Schönen, dort die Erkenntniß des Wahren, weit auseinander, so sind doch die Mittel und Wege zur Erreichung derselben im Grunde identisch und lassen keine scharfe Scheidung beider Gebiete zu. Allerdings ist die Erkenntniß des Einzelnen die erste und größte Aufgabe der Wissenschaft; sie sucht jede Erscheinung so rein als möglich darzustellen, indem sie sie befreit von den außer derselben liegenden störenden Einflüssen, und es ist eben dieser Zweck, dem ihr charakteristisches Hülfsmittel, das Experiment, dient. Aber diese Sonderung ist nur der erste Schritt, dem ein zweiter folgen muß, welcher die erdrückende Menge der einzelnen Fälle beherrscht, indem er sie auf das ansieht, was ihnen; gemeinsam ist, und sie so erst der Denkfähigkeit gleichsam handgerecht macht. Es folgt mit andern Worten auf das analytische Verfahren stets ein combinirendes, verbindendes. Das Hauptgewicht ruht allerdings auf dem ersten, wie auch die der wissenschaftlichen Bethätigung unserer Geistes vorzüglich seinen Stempel aufdrückt. — In der Kunst ist der Weg ein ähnlicher. Aus

der Menge der Erscheinungen, die sich den Sinnen des Künstlers bieten, sucht er ein Gesamtbild zu schöpfen, das der individuellen Zufälligkeiten entkleidet das allen Einzelwesen Gemeinsame darstellt. Gerade darin beruht das, was wir in einer Venus von Meios, einem Hamlet, einem Faust als das Große, für eine lange Reihe von Generationen Giltige ansprechen, daß sie, herausgehoben aus der Beschränktheit des Individuellen, gleichsam Typen der Menschheit in verschiedenen Richtungen ihrer Erscheinung darstellen. Wenn ein Naturgesetz uns zeigt, was ewig wahr ist, so zeigt uns ein ächter Kunstwerk das, was ewig schön ist. Das Studium des Einzelnen ist in der Kunst jedenfalls unentbehrlich, aber es nimmt in ihr — im Gegensatz zur wissenschaftlichen Thätigkeit — eine verhältnismäßig weniger hervorragende Stellung ein, während die combinirende, auf das Gemeinsame in verschiedenen abtönende Griffsrichtung überwiegt und überseht die Kunst vorzugsweise charakterisirt.

Nun liegt es in der Natur des menschlichen Geistes tief begründet, daß er diejenigen Wege, welche er in Folge der Hauptrichtung seiner Beschäftigung am häufigsten zu betreten hat, für möglichst viele Fälle zu benutzen sucht;

denn es ist leicht zu denken, wie er aus natürlicher Trägheit nicht gern die glatten Bahnen der Gewohnheit verläßt, um durch schwieriges Terrain neue Wege sich zu bahnen. So neigt sich denn J. B. der Künstler häufig zu einer übermäßig allgemeinen, schematischen Auffassung der Natur, der Naturforscher dagegen ebenso sehr zu einem bis ins Unnütze gehenden Sondern und Spalten, Jeder, indem er diejenige Richtung des Geistes ausschließlich verfolgt, welche in seinem Gebiete die vorwiegende ist. Was nun die Wissenschaft im Besondern betrifft, so werden in ihr derartige Einseitigkeiten leicht durch ihren Stoff zu Nothwendigkeiten gemacht; denn in manchen Gebieten ist die Menge des Einseinen eine solche, daß Generationen von Forschern damit vollauf beschäftigt sind, diesen Stoff einigermaßen zu gliedern und ihn so weit zugänglich zu machen, daß eine vergleichende (sog. philosophische) Betrachtung und Verwerthung eintreten kann. In dieser Hinsicht ist J. B. in der Botanik und der Zoologie eine einseitige auf die systematische Kenntniss der verschiedenen Formen hinabzielende Richtung leicht begreiflich und für eine gewisse Stufe der Entwicklung durchaus berechtigt. Aber es ist aus dem eben Gesagten auch begreiflich, welche Gefahr für die harmonische Entwicklung der Wissenschaft diese Richtung in sich birgt. Wer sich einmal Jahre lang damit beschäftigt, „Species zu machen“, d. h. die Arten zu untercheiden, muß schon ein sehr bedeutender Kopf sein, wenn er aus dieser Verengung in das Besondere den Blick herauszuschleusen lassen kann über das Allgemeine. Man sieht, wie große Männer in früherer Zeit sich mit dieser Arbeit ihre Belegung abmühten, und tröstet sich leicht über das im Grunde Geisteslose derselben. So hat das Beispiel Linné's manchen Perdurantibus-Botaniker und Museums-Zoologen in dieser Bahn erhalten und bestärkt, aber nur weil ihm das Verständniß abging für den Satz, daß in einer Zeit groß und nützlich sein kann, was in einer andern gänzlich unfruchtbar und geringfügig ist.

So kann es geschehen, daß der Punkt, auf dem es für eine Wissenschaft möglich und wünschenswerth wird, von der sondernden, zerlegenden zur vergleichenden Behandlung ihres Stoffes überzugehen, nicht erreicht wird. Indem man im gewohnten Geleise fortgeht, wird aber der Fortschritt der Wissenschaft ernstlich gefährdet, und es erhebt sich stets theils durch den Einfluß benachbarter Wissenschaften, theils durch den selbständig denkenden Forscher eine Reaktion im entgegengesetzten Sinne. Auch diese Gegenströmung wird nun meist, wie das in der Natur der Sache liegt, über ihr Ziel hinaustreiben; aber sie wird, wenn sie auch keine bedeutenden bleibenden Früchte tragen sollte, doch schon darum vom höchsten Werthe für den Fortschritt sein, weil sie wenigstens die Möglichkeit einer andern Behandlung des Stoffes eröffnet, als sie bis jetzt gebräuchlich war, und damit den beschränkenden Mann, der die Geister alle auf einen Weg zwingt, bricht. — Wir wollen im Fol-

genden versuchen, eine Episode aus einer derartigen wissenschaftlichen Revolution herauszuheben, und werden darin Gelegenheit finden, das Gesagte mit Thatfachen näher zu erläutern.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts waren diejenigen Zweige der Naturwissenschaft, die man die beschreibenden nennt, in sehr kurzer Zeit zu einer hohen Blüthe gelangt. Linné hatte durch seine leicht zu handhabende, klare Systematik ermöglicht, den früher überwältigenden Stoff in übersichtlicher Weise zu gliedern und den neu hinzukommenden ohne Schwierigkeit einzureihen. Das Hauptbedenken, das seither einer gedeihlichen Entwicklung dieser Wissenschaften sich entgegengestellt hatte, die Unmöglichkeit, die unzähligen, verschiedenen Formen gehörig auseinander zu halten und eine Einsicht in dieselben zu erlangen, war damit gehoben, und so vermehrte sich denn das Material nicht allein quantitativ durch eine große Zahl eifriger Sammler in allen Gegenden der Erde, sondern es lag in demselben Verhältniß auch in Bezug auf die wissenschaftliche Verwerthbarkeit. Denn es zeigte sich bald, als die Formenmenge immer mehr anwuchs, daß die von Linné gegebenen Grundzüge der Systematik nicht ausreichten. Sie hatten wohl dem ersten Bedürfniß genügt, aber sie vermochten das nicht mehr, als man begann tiefer in das Wesen der einzelnen Geschöpfe einzudringen. Man sah ein, daß man den Systemen Merkmale zu Grunde legen müsse, welche einen größeren Bezug auf das ganze Leben und Sein der betreffenden Pflanzen oder Thiere besäßen, als die von Linné gewählten. So entstand zuerst auf botanischem, später auch auf zoologischem Gebiete das natürliche System. — Eine natürliche Consequenz dieser neuen Richtung war, daß man sich mehr bemühte, in den innern Bau der organischen Wesen einzudringen; um eben jene Merkmale zu finden, welche man mit Recht als die allein für die Systematik verwertbaren betrachtete. So wurde die vergleichende Anatomie, die bis jetzt mehr nur theoretisch genüßigt worden war, zu einer Wissenschaft erhoben, deren Resultate bald die Augen der Naturforscher auf sich lenkten, besonders als Cuvier seine fruchtbare, nach verschiedenen Richtungen hin dahinreichende Thätigkeit begann.

Man war gewohnt gewesen, Botanik und Zoologie als Domänen des gestillten, trocknen Sammelmeißeis zu betrachten; das wurde schnell anders. Die denkenden Köpfe, welche bis jetzt nur in den physikalischen Naturwissenschaften einen Gegenstand, würdig der allgemeinen Beachtung, gesehen hatten, blickten mit Staunen auf den ungeahnten Reichtum von merkwürdigen Verhältnissen, welche das Stalpell des Anatomen herausstellte, und gingen mit Begeisterung auf die großen und glänzenden Gesichtspunkte ein, welche diese Schätze zu bieten schienen oder versprochen. In Frankreich war Cuvier's Autorität groß genug, um Zuschreibungen des spekulativen Geistes zu verhindern; anders in Deutschland. Hier hatte nicht allein in der Philosophie

eine mehr künstlerische, der Phantasie hingegebene Richtung statt der wissenschaftlichen große Ausdehnung gewonnen, sondern es war dem ganzen Geistesleben eine Hinneigung zu phantastischer Betrachtung eigenthümlich geworden, welche vorzüglich auf dem Uebergewicht beruhte, das zu dieser Zeit die poetische Richtung der Nationalliteratur übte. Schon hatte man alle Verhältnisse des äußern und innern Lebens in die Rahmen der speculativen Philosophie eingeschlossen und eingewöhnt, und wandte sich nun auch an die der äußeren Natur und zwar bedeutsamer Weise vorzüglich an die beschreibenden Naturwissenschaften. Freilich, die Thatfachen der Astronomie und Pöphy! standen zu fest, als daß man an ihrer Stelle die Schemen einer willkürlichen Phantastiebtätigkeit zu setzen wagen durfte; ein um so schöneres Feld solcher Thätigkeit bot aber das Reich der Pflanzen und Thiere. Da hatte man gerade so viel Thatfachen, als man brauchte, um tiefe Zusammenhänge zu ahnen, da waren die wenigen Thatfachen noch vereinzelt genügt, um willkürlich gedeutet und zur Grundlage schwindelnder Gedankenschlösser gemacht zu werden. So kam es, daß die sogenannte naturphilosophische Richtung auf diesem Gebiet ihre stärksten Positionen gewann, welche genau so lange blieben,

bis das Material ihrer großen Bauten sich in den Stoff auflöste, aus dem es zusammengeballt worden war — in luftigen Nebel; und dieses hat nicht lange gedauert. Aus dem ganzen, glänzenden Treiben dieser Schule sind nur einige stille Denkmäler übrig geblieben, welche als bleibende Bereicherung der Wissenschaft zu betrachten sind, abgesehen von dem nicht zu ermessenden geistigen Einfluß auf eine Zeit, welche richtigere Wege zu gehen gelernt hatte. Aber selbst jene Denkmäler tragen den Stempel ihrer Entstehung deutlich an sich. Sie sind mehr dem Andenten großer Gedanken gewidmet, sie wandeln und wirken nicht mehr unter den Lebenden; aber sie sind ebensoviele Grabsteine, wie das die Denkbilder unsrer großen Männer sind; sie sollen an das Fortleben der Idee, nicht an das Absterben ihres zeitlichen Gewandes erinnern.

Unter diesen Denkmalern naturphilosophischer Richtung ist die Schädeltheorie das, was wohl am meisten betrachtet und bewundert wurde und am längsten selbst in einer Zeit fortgewirkt hat, als die ihr zu Grunde liegenden Thatfachen sich aufzulösen schienen; wir finden darin die Berechtigung, dieselbe in kurzem Ueberblick unsern Lesern vorzuführen.

## Die Erdbeben, ihre Erscheinungen und ihre Erklärungsversuche.

Von O. Pöschel.

Vierter Artikel.

Vulkane und Erdbeben sind nach der besprochenen Theorie die Wirkungen einer in ihrer Grundlage gemeinsamen Ursache. Es liegt daher die Frage nahe: Stehen diese beiden Phänomene auch auf der Erdoberfläche in gewissem Zusammenhang? Es dat diese Frage auch viele Forscher seit langer Zeit her in Thätigkeit gesetzt, ohne jedoch genügende Beantwortung gefunden zu haben. Der eine meint einen bestimmten Zusammenhang entdeckt zu haben, der andere leugnet jede gegenseitige Beziehung dieser Phänomene. — Jedenfalls sind dieselben räumlich nicht verknüpft; sowohl vulkanreiche als vulkanlose Gegenden zeigen Erdbeben, und gerade aus letzterem Grunde haben einige Gelehrte den Zusammenhang beider Erscheinungen nachzuweisen gedacht. Schon lange ist die Ansicht unter den Anhängern der plutonistischen Theorie verbreitet, daß die Vulkane gleichsam Sicherheitsventile gegen Erdbeben sein, daß Gegenden mit zahlreichen thätigen Vulkanen von Erdbeben, so lange diese Vulkane in Thätigkeit sind, verschont bleiben, und es kann nicht geleugnet werden, daß Beispiele für einen derartigen Zusammenhang dieser Naturerscheinungen auffindbar gemacht werden können; auch ist es eine Thatfache, daß viele Vulkanausbrüche mit kleineren Erdschütterungen verknüpft sind. Allgemein ist jedoch auch dieser Zusammenhang nicht constatirt. — Eine weitere Frage tritt uns jedoch hier entgegen: Welches ist der Grund, daß viele Erdbeben gewisse

Beziehungen zu irdischen Gewässern zeigen? Es zeigt sich dies einmal darin, daß sich hauptsächlich in der Nähe des Meeres viel Erdbeben einstellen, zweitens, daß ihnen sehr heftige und anhaltende Regengüsse und ganze Regenseiten vorausgehen. In Zusammenhang mit dieser Betrachtung ließe sich die eigenthümliche Vertheilung der Erdbeben auf die Jahreszeiten bringen, wonach der Herbst und Winter in unsern Klimaten hauptsächlich reich an Erdbeben sind. Da nun bei uns jene Jahreshälfte die an Regen reichste ist, so läßt sich leicht und wohl nicht ohne Grund vermuten, daß gerade diese meteorologische Eigenthümlichkeit dieser Jahreszeiten das Vorkommen der Erdbeben während derselben bedinge, namentlich auch deshalb, weil wir bei der Betrachtung der zweiten Erdbebenstheorie sehen werden, daß auch bei ihr die Verhältnisse der irdischen Gewässer schwer in die Waagschale fallen. Bekanntlich zeigt sich bei den vulkanischen Erscheinungen etwas Aehnliches; auch die Vulkane sind hauptsächlich in der Nähe des Meeres verbreitet, und bei manchen ist beobachtet, daß ihre Thätigkeit durch reiche atmosphärische Niederschläge angereizt wird. — Bei den vulkanischen Phänomenen schreibt man, wie bekannt, dem Wasser eine sehr wichtige Rolle zu; das Eindringen der Gewässer in den Vulkanbauden, zu glühenden, emporsteigenden Lavamassen soll hier die Veranlassung zu den gewaltigen Eruptionen werden. Aehnlich hat man auch versucht die Mits

wirkung des Wassers bei Erdbeben zu deuten, jedoch vielleicht nicht so glücklich als bei dem Spiel der vulkanischen Thätigkeit. Mit Zugrundlegung der Erdbildung aus feurig flüssigem Kern und fester Rinde; wie dies oben geschah, träte uns hier eine neue Erklärungsweise der Erdbeben entgegen. Das Wasser bringt von der Erdoberfläche aus durch Spalten und Rissen, ja durch die immerhin poröse Masse der Gesteine selbst in die Tiefe, und je tiefer, desto höher steigt die Temperatur; daher die mannigfachen warmen Quellen, denen wir begegnen. Schließlich muß auch eine Tiefe erreicht werden, in der sich kein Wasser, sondern nur Dampf erhält. Plötzliche Erhörungen durch Fluctuationen des flüssigen Erdinnern, plötzliche Abnahme des Druckes, der auf der überhitzten Wassermasse lastet, können momentane, großartige Dampfenentwicklungen hervorgerufen, welche die Veranlassung zu Ersitterungen des Erdbodens werden können, ja es können sich möglicherweise vulkanische Erscheinungen, wie wir sie auf unserer Erdoberfläche stattfinden sehen, in gewissen Tiefen zutragen und so die Veranlassung zu Erdbeben abgeben.

Es ist leicht denkbar, daß im Erdinnern Explosionen verschiedener Art zeitweise stattfinden können, ich meine hier, durch Ansammlung und Entzündung explosibler Stoffe, hauptsächlich Gaskarten; jedoch werden die Bedingungen hierzu nur in den seltensten Fällen eintreffen, und diese Art der Erklärung, die für Vulkane und Erdbeben sich zu Anfang unseres Jahrhunderts eine Zeitlang behauptete, will ich deshalb hier nur deiläufig erwähnt haben.

Es liegt uns jetzt die Aufgabe ob, die zweite Theorie, eine rein mechanische oder chemisch-mechanische, unserer Betrachtung zu unterziehen. Es war schon vielen Forschern auf diesem Gebiete aufgefallen, daß die große Tiefe, in welche die erstere Theorie den Ursprung der Erdbeben versetzt — denn die feste Erdrinde muß doch immer die Dicke einiger Meilen haben — daß diese große Tiefe des Ursprungs nicht vereinbar mit der kleinen Ausdehnung so vieler Erdbeben ist. Eine Ersitterung, die ihren Ursprung in zwei Meilen Tiefe unter unserer Erdoberfläche besitzt, muß, wenn sie auch nur in sehr geringer Intensität sich auf der Erdoberfläche fühlbar macht, eine bedeutende Fläche derselben erschüttern. Es machte sich daher theilweise für derartige beschränkte Erdbeben die Forderung nach einer anderen Erklärungsweise geltend, und es kann nicht gelugnet werden, daß die von Volger und Bischoff aufgestellte Erklärung weitauß der natürlichste aller ist, die bis jetzt versucht worden sind. Diese Auffassungsweise der Erdbeben bringt dieselben in innigen Zusammenhang mit den unter dem Namen Bergstürze, Bergschliffe und Erdfälle bekannten Erscheinungen. Alle diese Erscheinungen haben als Gemeinsames das, daß sie Veränderungen in der Stellung und Lagerung gewisser Theile der Erdoberfläche sind, hervorgerufen durch gänzliche Entfernung oder Unsicher- und Schließwerden ihrer Unterlage. So gleitet bei einem Bergsturz

der Abhang eines Berges in das Thal hinab, weil eine Thonschicht, die der Schichtenmasse des Abhanges als Unterlage diente, durch anhaltenden Regen so aufgeweicht war, daß die gemaltigen Gesteine auch ihren Halt verloren; so stürzt ein Theil der Erdoberfläche bei einem Erdfall ein, weil ein unter ihm gemeinsames Stützgerüst durch die Gewässer allmählig aufgelöst und fortgeführt wurde. Die Erdbeben unterscheiden sich hiervon nur dadurch, daß der Erdfall oder Bergsturz nicht sichtbar zu Tage liegt, sondern statt dessen auf der Erdoberfläche nur der Stoß vernommen und verspürt wird, den die sich niederfallenden oder niedergleitenden Gebirgsmassen bei ihrem Aufsprallen auf tiefere Gebirgsschichten erfahen. — Volger hat diese Erklärungsweise speciell auf ein verhältnißmäßig sehr mächtiges Erdbeben angewendet, das zu Bisp im Canton Wallis am 25. Juli 1856 stattgefunden, ein Erdbeben, das die Wägler und Guburg, ja vielleicht bis Paris nach Norden hin gespürt wurde, nach Süden jedoch noch bis Lucin merklich war, und dessen Verheerungen wahrseheinlich ebenso groß, wie die des Lissaboner, gewesen wären, wenn es eine Stadt dieser Größe betroffen hätte, das so jedoch, ohne wenigstens große Verluste an Menschenleben verursacht zu haben, vorüberging. — Die Ursache dieses Erdbebens ist nach Volger einfach die, daß die in der Formation jener Gebirgsgegend sich häufig findenden Stützschichten allmählig, jedoch sehr beträchtlich, wie die massenhafte Stütz führenden Quellen derselben, aufgelöst wurden, und nach theilweiser Wegführung einer solchen Schicht sich die ganze Gebirgsmasse plötzlich um mehrere Fuß senkte und durch den gemaltigen Rückstoß das Erdbeben erzeugt wurde. Den Grundgedanken der Entstehungsweise der Erdbeben nach dieser Ansicht haben wir hiermit schon erkannt; mit seiner Erweiterung auf alle möglichen Fälle hat sich hauptsächlich Bischoff beschäftigt, der alle die Bedingungen ermittelt hat, unter welchen Erdbeben in dieser Weise entstehen können, hauptsächlich auch, wie sie nach dieser Theorie an Meeresküsten sich als sehr häufige Erscheinungen zeigen müssen, wie die Bedingungen ihrer Entstehung jedoch auf dem Boden des Meeres, d. h. in der Gebirgsmasse, welche den Meeresboden bildet, am reichsten vorhanden sind.

Natürlicher Weise sind bei Erdbeben, die ihrer Entstehung nach dieser Theorie angehören, Erhebungen unmöglich, dagegen Senkungen stets vorhanden. Das ganze Stützgebiet eines solchen Erdbebens, d. h. derjenige Theil der Erdoberfläche, der niederfällt und durch seinen Aufstoß das Erdbeben erzeugt, muß sich senken. Daber haben wir früherhin schon darauf aufmerksam gemacht, daß von den Verfechtern dieser Theorie durch Erdbeben bewirkte Erhebungen geignat werden, wogegen die plutonische Erklärungsweise die Beweise von Erhebungen mit Freude aufgreift, da sie doch unabweisbare Beispiele einer von unten nach oben wirkenden Kraft find. — Die Wirkung der Gewässer ist das Lebensprincip dieser Theorie. Wir sehen daher, daß auch sie in Uebereinstimmung ist mit der Thatfache, daß

die Erdbeben reichlicher in unseren regenreicheren Jahreszeiten auftreten, als in den regenarmen. Dagegen ist jedoch das Eintreten gewaltiger Erdbeben auch nicht an vorübergehenden Regen n. s. w. gebunden. Wenn die unterirdischen Zerstörungen im Schichtenbau so weit gehenden sind, kann der Einsturz und das Erdbeben auch ohne bedeutenden Reichtum an meteorologischen Niederschlägen, ja wie das bekannte Erdbeben zu Caracas, nach anhaltender Dürre stattfinden. — Es ist vollständig klar, daß obgleich die Regel genau nach dieser Theorie die sein wird, daß Erdbeben zur Zeit heftiger atmosphärischer Niederschläge zahlreicher sind, doch die Verhältnisse derartig sich zu gestalten vermögen, daß auch in Zeiten anhaltender Trockenheit sich Erschütterungen einstellen.

Während sowohl durch diese Theorie, als auch, obgleich nicht so ganz deutlich, durch die platonische Theorie die Vertheilung der Erdbeben in die verschiedenen Jahreszeiten eine wenn auch nur wahrscheinliche Erklärung findet, so fehlt und bis jetzt jedoch irgend welche Erklärung der noch viel sicherer nachgewiesenen Vertheilung der Erdbeben auf Tag und Nacht, einer Thatsache, die sich bis jetzt für die Erdbeben aller bekannten Gegenden bestätigt hat, und für die, wie mir scheint, bisher noch von Niemandem eine Erklärung versucht wurde. Die Verhältnisse gestalten sich hier ziemlich analog in gewissem Sinne, wie bei den Jahreszeiten, und es läßt sich meteorologisch die Nacht gewissermaßen mit dem Winter vergleichen; jedoch ist es bis jetzt noch gänzlich unentschieden, ob diesen ähnlichen Verhältnissen eine ähnliche oder eine gemeinsame Ursache zu Grunde liegt.

Wir haben auf diesem Wege die beiden hauptsächlichsten Erdbeben-theorien einer Besprechung unterzogen, ohne uns für eine unbedingt entscheiden zu können. Nichts hindert uns, beide nebeneinander bestehen zu lassen. Ist der Bau der Erde ein solcher, wie ihn die große Mehrzahl der Geologen bis auf unsere Zeit annimmt, und wie ihn die neuesten Beobachtungen anderer Weltkörper, hauptsächlich der Sonne, nur wahrscheinlicher machen, so ist nicht abzusehen, warum nicht manche Erdbeben den Ursprung haben können, wie ihn die platonische Theorie früherhin allen zuschrieb. — Außerdem ist jedoch nicht zu leugnen, daß eine wahrscheinlich große Zahl von Erdbeben ihren Ursprung in Einstürzen und ähnlichen Störungen innerhalb des Gesteinsbaues hat, in Folge der zweiten Theorie. Man darf jedoch wohl nicht glauben, daß man mit diesen beiden Ursachen für alle Erdbeben ausreichen werde. Es ist bis jetzt bei vielen Erdbeben eine Reihe eigentümlicher Erscheinungen beobachtet worden, die es sehr wahrscheinlich machen, daß auch noch auf andern Wegen Erschütterungen im Erdinnern erzeugt werden können. Hierher rechnen wir haupt-

sächlich gewisse meteorologische Erscheinungen, wie Oefane und Cyclone, die manchmal von Erdbeben begleitet werden, und bei der Verringerung des Luftdrucks, die im Innern einer Cyclone stattfindet, ist das Entstehen eines Erdbebens vielleicht nicht so schwer erklärlich. Fernerhin jedoch überlassen uns die hauptsächlich in neuerer Zeit beobachteten elektrischen und magnetischen Erscheinungen vor und während der Erdbeben, ebenso der Zusammenhang mit Nordlichtern, der uns von einig<sup>em</sup> berichtet wird. Es sind Magnetenadeln vor und während mancher Erdbeben in beständige Bewegung gerathen, ja sie haben ihre Stellung auf längere Zeit ganz geändert, und zwar sowohl in Bezug auf Inclination wie auf Declination; oder es sollen sich Lichterscheinungen ähnlich elektrischen und auch geradezu Nordlichtern während der Erdbeben gezeigt haben.

Obgleich uns heute noch jeder Anhaltspunkt fehlt, diese Beobachtungen zur Erklärung, wenn auch nur gewisser Erdbeben zu verwerthen, so zeigen sie uns doch, daß wir noch lange nicht so weit sind, den Ursprung aller Erdbeben mit unseren bis jetzt aufgestellten Hypothesen genügend erklärt zu haben, sondern daß uns vielleicht noch eine ganze Anzahl derartiger Ursachen verborgen ist. — Es kennzeichnet sich daher die Aufgabe, die der Folgezeit in der Erforschung der Erdbeben gestellt ist, dahin, daß vor Allem die Aufmerksamkeit einzelnen Erdbeben und der allgeründlichsten Erkenntnis ihrer Verhältnisse zuzuwenden ist, so daß wir entscheiden können, welche Ursache ihnen im speciellen Fall zu Grunde lag. Eben weil wir gesehen, daß die Erdschütterungen die Folge sehr verschiedener Ursachen sein können, bilden wir auch nur mit<sup>tem</sup> Zweifel auf die Richtigkeit, die bis jetzt über die Vertheilung der Erdbeben auf die Jahreszeiten zu Tage gefördert worden sind, und müssen deren weitere Vervollständigung abwarten, hauptsächlich auch in Bezug auf außerentropäische Länder, um zu erfahren, ob wirklich eine solche allgemeine Gleichmäßigkeit herrscht. Ist das in der That der Fall, so deutet dies auch auf eine gemeinsame Eigentümlichkeit der Ursache hin, oder es muß eine Entstehungsursache bei weitem vorherrschen. Bis wir jedoch hierhin gelangt sein werden, ist die möglichst vollständige Erforschung einzelner Erdbeben ein Weg, auf dem wir in der Erkenntnis der Entstehungsweise wohl am weitesten und sichersten vorschreiten werden.

## Wimmer's Herbarium.

Das sehr umfangreiche und werthvolle Herbarium des verstorbenen Herrn Prof. Dr. Fr. Wimmer, mit „*Salicis*“ enthaltend, ist zu verkaufen.

Erfreuen nimme die Schletter'sche Buchhandlung (H. Sturzsch) in Breslau entgegen, durch welche auch der betreffende Katalog auf Verlangen zur Einsicht mitgetheilt wird.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährliche Subscriptionspreis 25 Sgr. (1 R. 25 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verhandelt: Schletter'sche Buchdruckerei in Halle.



Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 28.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwesigke'scher Verlag.

**14. Juli 1869.**

**Inhalt:** Die oldenburgischen Deichbauten, von A. Ewald. Erster Artikel. — Die Bachschlangen, von Karl Müller. Dritter Artikel. — Literaturbericht.

**Die oldenburgischen Deichbauten.**

Von **A. Ewald.**

Erster Artikel.

„Das Herzogthum Oldenburg“ \*), so heißt es in einem jener geographischen Handbücher, welche, obwohl noch ziemlich neuen Datums, doch durch die Ereignisse des Jahres 1866 bereits so vielfach veraltet sind, „ist sowohl an der Nordsee, als auch gegen die Weser durch Deiche, deren Gesammtlänge 33 — 34 Meilen beträgt, wider Ueberschwemmungen gesichert.“ — Der binnenländische Leser überfliegt diese klotzig flüchtigen Blätter. Das Territorien, welche zu niedrig gelegen sind, durch Dämme gegen den Einbruch der Fluthen geschützt werden müssen, erscheint ihm als eine einfache und selbstverständliche Sache. Aber welch' ein ungeheures

Unternehmen es ist, diesen Boden den gewaltigen Wogen derselben zu schützen, welch' ein, man möchte sagen, erschreckendes Capital an Geld und Arbeitskraft dies Unternehmen von Alters her verschlungen hat, davon macht wohl Keiner, der nicht an Ort und Stelle Zeuge war von diesem unausgesetzten Kampfe des Menschen mit den Elementen, sich einen richtigen Begriff. Je unscheinbarer die Arbeit war, welche als unabwendbares Erbtheil eine Generation von der andern übernahm, je weniger diese Werke von sich reden machen, desto mehr verdienen sie gleichwohl Gegenstand eines allgemeineren Interesses zu werden. Vielleicht, daß es den nachfolgenden Zeilen gelingt, für den Volksstamm an der deutschen Nordseeküste, der so wacker seinen Heimatboden verteidigte, dem Leser ein solches In-

\*) Unter dieser Bezeichnung versteht man das oldenburgische Stammland, mit Ausschluß der Fürstenthümer Lübeck und Birkenfeld, mit denen vereint jenes den Namen „Großherzogthum“ führt.



teresse, vielleicht auch ein Gefühl der Achtung abzumöthigen.

Bekannt ist die Beschreibung des Plinius, welche in scharfen Zügen den Zustand schildert, in welchem die Römer zuerst diese unwirthbaren Gegenden fanden. „Das Meer“, sagt er, „schmilzt bei den Chauten alle Tage zwei mal so hoch an, daß man weißhaft wird, ob man die Gegend Land oder Meer nennen soll. Hier hat sich das ärmliche Volk Hügel aufgeworfen, so hoch, wie das Wasser zu steigen pflegt, um seine Hütten darauf zu bauen. Wenn die Fluth steigt, gleichen sie Schwimmenden, Schiffbrüchigen aber, wenn das Wasser fällt. Zur Nahrung haben sie weder Vieh noch Milch und nicht einmal Wildpret, da gar kein Gesträuch vorhanden ist. Die mit dem Wasser zurückstehenden Fische fangen sie bei ihren Hütten in Netzen, welche sie aus Winken flechten. Aus der Tiefe holen sie mit ihren Händen Erde heraus, trocknen sie mehr am Winde als in der Sonne und brennen sie, um ihre Speisen zu bereiten und ihre von Kälte starrenden Glieder daran zu wärmen. Zum Getränk haben sie nichts als Regenwasser, das sie vor ihren Häusern in Gruben auffangen.“

Noch heute würde diese offenbar von einem Gefühl verächtlichen Mitleids dictirte Schilderung des alten Römers auf die sammtlichen Marschen der Nordsee passen, wenn nicht eben die Deiche das Mittel gewesen wären, die armelige Existenz der Uebewohner dieser Gegenden in eine menschenwürdigeren zu verwandeln. Jahrhunderte haben an ihnen gebaut und geherrscht; eine einzige Sturmfluth aber, in welcher der Nordwestwind die Wogen mit verheerender Gewalt gegen die armen Küsten peitschte, hat — wie oft! — die Arbeit ganzer Generationen mit einem Schläge vernichtet, bis endlich die Deiche, denen schließlich doch jede dieser schrecklichen Erfahrungen zu Gute kam, zu den festen Bollwerken wurden, die sie heutiges Tages sind.

Ueber ihre erste Anlage lassen sich begreiflicher Weise beglaubigte Nachrichten nicht auffinden. Ohne Zweifel wird man zuerst an den Flußfüßen — also vornehmlich an der Weser — wo die Fluthen weniger hoch steigen und auch nicht mit so verderblicher Macht anprallen, als an den offenen See- und Meeresküsten, den Anfang mit Eindeämmung („Beedeichung“) einer Strecke Landes gemacht haben. Sah man nun, daß dieser Damm wenigstens gegen „ordinäre“ Fluthen schützte, so war damit der Impuls gegeben, die Beedeichung auf eine längere Strecke fortzuführen und zugleich die Schutzwehr selbst zu erhöhen und zu verstärken, so daß sie auch heftigeren Angriffen, wie jede Sturm- und Springfluth sie mit sich bringt, Widerstand zu leisten vermochte. Zuerst hat ohne Zweifel jeder Landbesitzer auf seine eigene Faust und zu seinem eigenen Nutzen — pro domo — gebedeicht. Schnell aber machte die Nothwendigkeit, größere Genossenschaften zu diesem Zwecke zu bilden, sich geltend. Denn was half es dem Anbauer, wenn er sein eigenes Land vor den Fluthen schützte, seine Nachbarn zur Noth

und zur Finken dagegen ihnen Thor und Thür offen ließen? Aus der Privat- ward eine Communalbedeichung, welche den Interessenten einen brisanten Zwang auferlegte. Nicht lange, so demüthigte sich die Beedeichung, in voller Erkenntnis der Wichtigkeit der Sache, der Regelung des gesammten Deichwesens. Die älteste geschriebene oldenburgische „Deichordnung“ datirt vom J. 1424. Mit einer planmäßigen Bedeichung, wenigstens einer von größerem Umfange — denn einzelne Theile der damaligen Grafschaft Oldenburg müssen früher schon mit Deichen versehen gewesen sein — machte erwiesenermaßen Graf Gerhard der Streithare von Oldenburg um die Mitte des 15. Jahrhunderts den Anfang.

Da es von der höchsten Wichtigkeit sein mußte, daß da, wo sich eine Genossenschaft zu einem sogenannten Deichbunde zusammengethan hatte, jeder Einzelne auf Gewissenhaftigkeit die ihm zuerkannten Obliegenheiten erfüllte, so bedroht diese alte Deichordnung die Säumigen mit den schwersten Strafen, wenn sie ungeachtet „Gobte oder Pfandung“ (Gebet oder Pfändung) ihre Deiche würden „liegen laten und de Dolt tro des Landes Verderb würde wegghabn“, (liegen lassen und der Dolt zu des Landes Verderben weggehen würde). Ein solcher Mißthäter ward bedroht: „Man schall sen Hus, neven öhne südest, so man öhn övertummt, darinne öfen“, (man soll sein Haus, sammt ihm selbst, so man seiner habhaft wird, darin bedecken, d. i. vergraben). Noch jetzt geht man im Volke an einem der oldenburgischen Deiche die junkimliche Stelle, wo diese barbarische Strafe wirklich vollzogen sein soll.

Zwar machte eben diese excessive Strenge des alten Deichrechts eine Veränderung und mildere Fassung desselben nöthig. Begreiflich aber ist es, daß eine Zeit, die in so hohem Grade der Abschreckungstheorie huldigte, harte Pönalstrafen, wo ein einziges vernachlässigtes Deichstück das Leben Tausender gefährden konnte. Allein auch ohne solches Verschulden Einzelner mußten Jahrhunderte hindurch Menschenwerk und Menschenleib unterliegen, so oft Wind und Wellen zu voller, unbegrenzter Wuth entsefst waren. Unzählige Driechbrüche, unzählige Fluthen, die vernichtend über das Land hereinbrachen, saßen von diesem Ringen und Unterliegen Zeugnis ab. Die bedeutendsten dieser Fluthen haben ihre Namen von den Kalendertelligen erhalten; auf deren Tage sie fielen, und kein Jahrhundert ist, das ihrer nicht eine Reihe aufzuweisen hätte. So, um nur einige zu nennen, gibt es die Marcellusfluth vom J. 1210, die Weihnachtsfluth von 1277, die Dionysiusfluth von 1373, die Gacilienfluth von 1412, die Antonisfluth von 1511, die Akerbellenfluth von 1570, dazu die vielen Sturmfluthen des 16. Jahrh., endlich die entsefstige Weihnachtsfluth von 1717. Es gehört wenig Phantasie dazu, um den bürten Zablengangaben über verwüstete Dörfer, ertrunkene und weggetriebene Menschen, erkaufte Vieh, welche wir in den Chroniken finden, sich Bilder von Elend zu konstruiren,

wie sie an Furchtbareit und Großartigkeit wohl kaum von einem der durch die Geschichte aufbewahrten Uebers troffen werden. So, wenn wir lesen, daß eine einzige dieser Sturmfluten an den friesischen Küsten 6000, 10,000 15,000 Menschen das Leben kostete; wenn von der Allerheiligensfluth vom J. 1570 berichtet wird, daß sie ihrer 100,000 verschlungen habe! Von dieser letzten Ziffer kommen allein 4000 auf den zwischen Weser und Jadebusen sich erstreckenden oldenburgischen Landestheil „Butjadingerland“, während alle übrigen Küstengegenden nach Verhältniß zu leiden hatten. — Naiver Weise wurden in den früher gebräuchlichen oldenburgischen Rechenbüchern diese schauerlichen Zahlen zu Plus und Minus der Jugend als Additionsexempel benutzet.

Angesichts so furchtbarer Verheerungen trat immer dringender die Nothwendigkeit eines rationellen Verfahrens beim Deichbau hervor. Als Begründer desselben müssen eben der Oberlieutenant und „Deichgräfe“ Anton Günther von Münnich<sup>\*)</sup>, so wie der dänische Oberlanddrost, Admiral Thomsen von Sehestedt<sup>\*\*)</sup> genannt werden. Zu einer völligen Umgestaltung des gesamten Deichwesens, und zwar unter Leitung der genannten beiden Männer, kam es jedoch erst, als die furchtbare Weimaderfluth vom J. 1717 hereingebrochen war und nach ihr von sämmtlichen bis dahin vorhandenen Deichen tatsächlich nur eine kleine Strecke in brauchbarem Zustande sich fand. Zur Beleuchtung des durch jene Fluth hervorgerufenen entsetzlichen Elends möge nachfolgende Stelle aus einem Briefe dienen, den ein Brammer, der Amtsbvogt Fabricius, von einem kleinen Orte des wiederum hart heimgesuchten Butjadingerlandes aus damals schrieb<sup>\*\*\*)</sup>.

„Das Unglück, so dieses Land leider betroffen, ist mit keiner Feder solchergestalt auszudrücken, daß einer, so das große Elend nicht selber gesehen, sich eine Idee davon sollte machen können. Die gerechte Heimsuchung des Höchsten kam in der Nacht, um vier Uhr, da noch ein jeder auf seinem Bett in Ruhe, also desto gefährlicher war. An-

sangs lief die Weser über, wovon wir jedoch, weil unser Haus ziemlich hoch liegt, nicht einmal was gewahr wurden. Etwa zwei Stunden danach, ungefähr um 6 Uhr, da das Wasser in der Weser bereits ein gut Theil gefallen war, stürzte von der andern Seite, nämlich von der Jade und von der See-Seite her, das Wasser mit einer entsetzlichen Gewalt und Geschwindigkeit über's ganze Land, daß es ganz mit. r gewöhnliche Art aus dem Lande über die Deiche in die Weser fiel. Wir hatten es bereits im Hause, da wir es ersehen, Risten und Kassen und Alles, was auf der Erden stand, fing an zu treiben; die Schränke schlugen mit großem Rassen nieder und schwammen herum, da es denn nicht zu säumen, sich nach dem Boden zu retiriren, und trug ich meine Frau halbschwimmend darauf; die zwei Kinder folgten mit dem Gesinde, nebst etwas von der Kinder Bettzeuge, alles Uebrige blieb unten schwimmen. Weil ich ganz naß worden, so legte ich die Kleider ab und trock in's Heu, nebst Frau, Kindern und Gesinde, uns dem lieben Gott empfehlend. Bald darauf erscholl recht erbärmliches und entsetzliches Schreien, Rufen und Winseln über Hüfte und Rettung von Mannes- und Frauen's-Personen, Alten und Jungen, welche von andern Leuten her auf einem Stück vom getrossenen Hause, etwas Heu, Stroh u. s. w. in dem weiten Wasser, starkem Stroh und Wind, wie ein schnell segelndes Schiff vorbei trieben. Etliche blieben hier und da, an denen Hügeln und hohen Werken, auch neben meinem Hause sitzen, etliche gingen durch die Braken oder Pöcher, so in den Deich gerissen, weiter fort. Einige aber ertrunken und erfroren. Von dem Elend anderer Leute ward man dergestalt gerührt, daß man die Gefahr, worin man selbst war, fast vergaß, und klagt meine Frau, daß ihr das jämmerliche Schreien und Rufen noch diese Stunde in den Ohren schalle. — — Es sind aus meinem mit anvertrauten Distrikt von Häusern gänzlich weggetrieben, auf deren Stelle weder Stroh noch Stiel zu sehen, 172 und sind ertrunken 745 Seelen. An den übrigen Orten dieses kleinen Landes sind in die 1700 Menschen ums Leben gekommen, 400 Häuser gänzlich weggeschwemmt. Das Vieh aber ist fast alles eingebüßt. Um denen kümmerlich, auch fast nadend, wie sie in Betten gelegen waren, geborgenen Leuten den Hunger zu stillen, mußte ich die Böden und Mühlen visitiren und fand zum Glück noch einige Säcke Wehl, welche ich mit und gegen der Leute Willen (jedoch daß solche bezahlt werden sollten,) nehmen und in denen wegen hieselbst übrig gebliebenen Defenbrod kochen ließ und jedem Jeden seine portion gleichsam von Mahlzeit zu Mahlzeit gab. Zur Erlangung etwas frischen Wassers wurden hin und wider Gruben gegraben, wiewohl es noch diese Stunde nicht frisch ist, außer, was man von dem genwärtigen Schnee bekommt“ u. s. w.

\*) Vater des berühmten russischen Feldmarschalls, welcher letztere seine Kenntnisse und Einsichten, welche ihn später zum Bau des Arenhöfischen und Katoga's Kanals befähigten, größtentheils unter seines Vaters Leitung und bei den oldenburgischen Deichbauten erworben hat.

\*\*) Oldenburg fiel bekanntlich nach dem Ausbrechen des regierenden Minnekammer mit dem Tode des Grafen Anton Günther (+ 1667) an Dänemark, welches die Grafschaft durch Oberlanddrosten verwalten ließ, bis sie im J. 1773 durch Lausn an das Haus Holstein-Gottorp kam.

\*\*\*\*) Mittheilung in den „Blättern vermischten Inhalts, Oldenburg 1791“.

## Die Wachspflanzen.

Von Carl Müller.

Dritter Artikel.

Nachdem wir bei dem Kubbäume und andern Milchsaft führenden Gewächsen Pflanzenwachs als einen integrierenden Bestandteil des Milchsaftes gefunden haben, kann es uns nicht mehr überraschen, Pflanzenwachs auch in der großen, an Milchsaften aller Art so reichen Familie der Euphorbiaceen zu beobachten. Es sind aus derselben mehrere Arten bekannt geworden, die, zum Theil schon seit den ältesten Zeiten als Wachs liefernde bekannt, doch erst in neuerer Zeit bei uns Aufsehen gemacht haben.

Einer dieser Bäume ist der Palmyr der Labitier oder der Comiri der Malaien (*Aleurites triloba*) aus der Gruppe der Crotonen. Die beiden Förster, welche den Baum zuerst auf den Gesellschaftsinseln fanden, gaben ihm den latinisirten griechischen Namen wegen der eigenthümlichen mehrlartigen Bestäubung, die sich auf verschiedenen Theilen höchst bemerkbar macht. Man hat folglich den Baum geradezu den Melibäum zu nennen. Aber der mehrlartige Ueberzug ist nichts als Wachs, und dieses bildet sich vorzüglich in den großen zweifächerigen Beeren so massenhaft, daß schon die Früchte brennen. Aus diesem Grunde ziehen sie die Insulaner auf Schmitten und gebrauchen sie als Naturkerzen, die freilich keinen besondern Geruch entwickeln, weshalb sie auch nur von den Ärmern benutzt werden. Sonst verstampft man sie und gewinnt das Wachs durch Auskochen. Auch *Aleurites Ambinix* (*Croton moluccanum* L.) bringt eine ähnliche Substanz auf den Molukken hervor, während bei beiden Arten entweder die Samen oder die Früchte genossen werden. Die Gattung ist um so merkwürdiger, als eine dritte Art (*A. laciniata* Willd., *Croton laciniatus* L.) den hochgeschätzten erplonischen Lackfirnis (*Cappatva*) gibt, der, zwar ein Erzeugniß der Gummischilblaus, doch seine Grundbestandtheile zunächst in dem Saft des Baumes hat und somit zu den Verwandten des Pflanzenwachses gehört. Ueber seine Entstehung wären noch genauere Untersuchungen zu wünschen, um zu entscheiden, ob der Saft im Organismus der Schilblaus wirklich umgewandelt werde, oder ob er durch Abkochen der Pflanzentheile mittelst des thierischen Saugrüssels ursprünglich ausfließt. Jerns behauptet Louritz, nur daß er die Schuld auf die rothen Ameisen schiebt; nach Burmann möchte man auf einen ähnlichen Ursprung schließen, wie beim Pflanzenwachs, das sich auf der Oberfläche der *Palaus zeylanicus* (p. 201), habe ich einen sehr schönen Lack in den Zweigwinkeln an der Blattbasis gesammelt, ohne einer thierischen Einwirkung zu gedenken.

Ein naher Verwandter dieser Bäume ist der so berühmte gewordene chinesische Talqbaum (*Silingia sebifera* Mch.,


*Croton sebiferum* L.), der, ursprünglich in den südlichen Provinzen China's, besonders aber auf der Insel Schusan und dem gegenüberliegenden Festlande häufig wachsend, in den südlichen Vereinigten Staaten (Carolina) und auf Cuba einheimisch gemacht wurde. Er übertrifft an Bedeutung Alles, was wir bisher von Wachspflanzen fanden, und hat darum seinen Verbreitungskreis neuerdings über das ganze nordwestliche Indien, das Persien und die Insel Mauritius ausgedehnt. Carlisch bemerkte Berthold Seemann schon im Jahre 1852, daß einzelne Kerzenfabriken Londons jährlich ebensoviel für den Kerzenstoff dieser Pflanze ausgeben, als manche der deutschen Königreiche Einkommen haben. — Man schildert die Pflanze als einen kleinen Baum mit lanzezförmigen schief-eisernen Blättern, gelben Blumentrauben und dreifächerigen Früchten, in denen drei erbsengroße schwarze Samen liegen, die ihrerseits von einem wallchartartigen Fette eingehüllt sind. Man gewinnt dasselbe durch Zerstoßen und Auskochen der Früchte, setzt der Masse Del oder Wachs zu und verarbeitet sie zu Kerzen. In China nennt man den Talg schu-lah oder schu-kou (Baumfett) und verkauft ihn in Kuchenform von 70 bis 100 Kattis zu 7—12 Dollars per Piko. Leider existiren, so viel ich weiß, keine Untersuchungen darüber, ob die Substanz, gleich dem Pflanzenwachs, eine Umhüllung der Zellhäute oder eine Abscheidung sei. Jedenfalls steht sie auf der Grenze zwischen Wachs und Fett und scheint sich mehr jenem zuzuneigen, da die Samen außer ihr noch ein fettes Del enthalten, das man durch Auspressen der Samen gewinnt, um es entweder zu verbrennen oder zu andern technischen Zwecken, selbst zu medicinischen zu verwenden.

Uebershaupt grenzen Del, Harze, Firnisse, Fette und Wachs so nahe an einander, daß wir uns nicht wundern dürfen, wenn manche dieser Stoffe zugleich in einer und derselben Pflanze angetroffen werden. Ein solcher Fall kommt in der Familie der Anacardiaceen vor, und zwar bei dem Firnis-Sumach (*Rhus verniciifera*, Dec. oder *Rhus vernix* Thbg.). Er ist der so berühmte gewordene japanische Firnisbaum, aus dessen Milchsaft, welcher sich an der Luft schwärzt, obwohl er als ein wasserheller Saft ausfließt, die Japanesen ihren vortheilhaftesten, nie springenden Firnis bereiten, indem sie ihn mit Del, Binnob, Zinte und ähnlichen Stoffen vermischen, je nachdem die Färbung sein soll. Schon Linnberg stellte diesen Firnis weit über den chinesischen und flammeschen; eine Bemerkung, die sich so sehr bewährt hat, daß man bei uns ernstlich daran denken sollte, den Ueas oder Drusich, wie er in Japan heißt, bei uns zu acclimatistren. Der Baum, in Népat, Nordchina und in Japan (Oebirge von Fokino und auf Nippon) einheimisch,

erreicht kaum die Höhe von 25 Fuß, hat ganz die Tracht unsrer allbekannten Sumacharten mit gefiederten Blättern oder eines Wallnußbaumes, und wächst auf jedem Boden, besonders auf feinigem, ohne von einer mäßigen Kälte zu leiden. Man pflanzt ihn in besonderen Anlagen, und zwar in Abständen von wenigstens 6 Fuß. Dann gibt er schon als 6—7jährige Pflanze, vom Juni bis September, dreizehn Jahre hindurch ein reichliches Pfund Firniß, welcher so kostbar ist, daß man ihn in Japan selbst mit 2—2½ toll. Gulden bezahlt. Um ihn zu ernten, macht man an der Westseite der Bäume halbkreisförmige Einschnitte in verschiedner Höhe und läßt den giftigen, die Haut stark ätzenden Saft durch Röhrenchen austräufeln, die ihn von der Berührung mit der Luft abhalten, worauf er, wie Thunberg angibt, durch ein äußerst feines, dem Gewebe der Spinnen ähnliches Papier filtrirt, von seinen Unreinigkeiten befreit und mit dem hundertsten Theile eines Oeles, „Tol“, versetzt wird, das man aus den Früchten der auch bei uns acclimatisirten *Paulownia imperialis*, der *Bignonia tomentosa* Thunberg's, auspreßt. Das nebenbei; denn der eigentliche Stoff, welcher uns hier interessiert, ist ein festes Oel, und dieses gewinnt man durch Auspressen aus den beerenartigen, erbsenartigen Früchten, um es zu Kerzen zu verarbeiten. Auch über diesen Stoff fehlen uns nähere Untersuchungen, um seine Verwandtschaft mit den Wachsen zu bekunden. Durch v. Siebold ist der Baum im Jahre 1845 in Deutschland eingeführt worden, wo er bei Boppard am Rhein auf St. Martin zwar bei einer Winterkälte von 15° R. abstarb, aber wieder aufschlug.

Dagegen liefert eine verwandte Art in Japan, der Wachsbäum oder *Habil* (*Rhus succedaneum*), eine als Wachs, und zwar als das berühmte japanische Wachs anerkannte Substanz. Auch dieses wird aus den Früchten gewonnen, während der Stamm, obgleich nur in geringem Maße, auch nur einen Firniß erzeugt, dessen Gewinnung aber nicht die Kosten lohnt. Dieses Wachs läßt sich schon bei 30° C. kneten, bei 40° schmelzen, wodurch es allerdings um die Hälfte weicher als weißes Bienenwachs ist. An und für sich raucht zwar seine Flamme stark, allein die Japanesen haben diese Eigenschaft wesentlich dadurch gemildert, daß sie die Sumachkerzen mit doppeltem Luftzuge

brennen. Zu diesem Behufe rollen sie einen Papierstreifen cylindrisch zusammen, den sie dann in flüssiges Wachs tauchen. Auf diese einfache Weise erhalten sie einen hohen Docht, um welchen das Wachs in concentrischen Schichten



Die Wachspalme (*Cereyloo andelea*); zum ersten Mal bei diesem Aufsatze gebrüg.

ten liegt, so daß es selbst bei dieser ziemlich roten Einrichtung auch ziemlich vollständig, nur mit sehr gelber Flamme verbrennt. So hält es, mehr fettig als spröde, die Mitte zwischen Talg und Bienenwachs, ohne doch mit Letzterem an Schönheit concurren zu können. Auch zwischen den Fingern behält es, da es sich mehr fettig als klebrig anfühlt, diese Eigenschaft bei. Um es zu gewinnen, zerquetscht

man die Samen, kocht sie aus, und erhält dann durch warmes Pressen ein Öl, das, größtentheils aus Palmitin bestehend, beim Erkalten eine feste Beschaffenheit annimmt, und, wie ich finde, gänzlich geruchlos ist, wenn man von einem etwas talgartigen Geruche absteht. Selbst bei der starken Flamme der japanischen Kerzen entwickelt sich nichts Unangenehmes. — Kein Wunder, daß man das japanische Wachs heutzutage vielfach zur Verfälschung des ächten Bienenwachses verwendet und dabei, weil jenes bedeutend niedriger im Preise steht, einen hohen Profit erlangt. Derselbe steigert sich aber noch höher, nachdem die Speculation herausgefunden, daß das japanische Wachs einen Aufas von 15 — 20 Proc. Wasser vertragen kann und dadurch nur spröde und undurchsichtig wird. Beide Fälle müssen als betrügerisch angesehen werden, weil, abgesehen von dem schlaun Wasserzuzas, das japanische Wachs wegen seiner leichteren Verbrennlichkeit die Mitte zwischen Talg und Bienenwachs hält. In Japan ist seine Vermischung mit Bienenwachs allgemein, da es an und für sich zu weich sein würde und in jenem Lande kein thierischer Talg erzeugt wird; ein Umstand, welcher dort dem Pflanzenwachs eine um so größere Bedeutung verschafft hat. Aus diesem Grunde werden dem Mikado alljährlich bei der üblichen Besenkung auch 100 Stück Kerzen aus diesem Stoffe, jede 1 F. lang und von der Dicke eines Mannesarmes, überreicht. Sie vertreten gewissermaßen ein Symbol der Landesfruchtbarkeit und werden deshalb nur zweimal im Jahre der besondern Feierlichkeiten angezündet. Die Mutterpflanze, welche die Frucht eines Apfelbaumes haben soll, wird in regelmäßigen Pflanzungen am sanften Bergelehnen, am besten in südlichen Richtungen, gebaut. Nach Berg, welcher Blatt und Fruchtstiel sah, ist jenes ebenfalls gefiedert, die Früchte sind rundlich, zusammengebrückt und erzeugen auf ihrer durchscheinenden Streinschale, welche von der Fruchthaut umgeben ist, eine mehlig-wachstartige Masse, die man, zwischen Mühlsteinen germalmt, durch Auskochen gewinnt.

Jedenfalls sind die Sumachspflanzen als Wachspflanzen ganz besonders zu beachten. Wie es scheint, produciren noch viele andere Arten Wachs, das bei ihnen mit Gerbstoff verbunden zu sein pflegt und hier also eine neue Verwandtschaftsreihe fundirt. Rhus typhinum, Toxicodendron, Coriaria u. A. sind entweder schon als wachsbaltig gefunden oder dürfen sich noch als wachsbaltig erweisen. So gibt auch Rhus javanicum einen Stoff, den man zwar einen Firnis nennt, der aber mehr zu den festen Oelen, als zu einer andern Stoffreihe zu gehören scheint. Dela Lourerio, der über den Baum zuerst ausführlicher in seiner Cochinchinischen Flor schrieb, behandelt die Chinensen die Früchte ähnlich, wie die Samen ihres Talgbaumes; sie zerstoßen sie und kochen ein Öl aus ihnen, welches bald Consistenz gewinnt. Die Mutterpflanze ist dieselbe, von der auch die chinesischen Salpaster bezogen wer-

den. Auch Rhus chinensis scheint gleichen Zwecken zu dienen.

In der Familie der meist so balsamischen Dipterocaraceen zeichnet sich der Pinorbaum (*Valeria indica*) als Wachspflanze aus. Er ist doppelt interessant, weil der Stamm eine Art Kopf-Harz, das Gumiini Aume der Engländer, auschwitzt, und die Samen durch Auskochen einen vegetabilischen Talg liefern, den man als Piney-Baumharz im Handel kennt. Da es aber in derselben Familie auch einen äußerst reichen Kampherbaum (*Oryobalanops Camphora*) gibt, so wird dieser Talg noch interessanter, da man versucht wird, die festen Oele auch mit dem Kampher als Produkte ähnlicher Vorgänge im Pflanzenleben in Verbindung zu bringen. Der Talg selbst hat einen balsamischen Geruch und liefert darum sehr wohlriechende, hellbrennende Kerzen. Im Uebrigen steht er dem Wachs sehr nahe, hat eine gelblich-weiße Farbe, ist sehr zähe und fñhrt sich wie Wachs an. Sein Schmelzpunkt liegt jedoch schon bei 35 bis 57° C. Die Mutterpflanze bildet, nach Art der meisten Verwandten, einen sehr stattlichen Baum mit länglichen, lederartigen Blättern, weißen Blumentrispen und dreiflügeligen, einsamigen Fruchtkapseln. Seinem Vaterlande nach gehört er Ostindien, besonders der Küste von Malabar an.

Die letzte der Wachs liefernden Pflanzenfamilien ist die der Delbbaumartigen. Man nennt drei Arten, von denen eine Substanz kommt, die man im Handel unter dem Namen „Pela“ kennt: *Ligustrum lucidum*, *L. lbota* und *Fraxinus chinensis*, also zwei Arten vom Liguster oder Hartriegel und eine Esche. Doch soll das wachstartige Produkt, welches sie liefern, thierischen Ursprungs, und zwar durch Stiche von Insekten hervorgerufen sein. Nach Dr. Macgowan zu Ningpo ist es eine Cicade (*Flata limbata*), welche auf der ersten genannten Art des Ligusters wohnt. Nach Handurz bringen mehrere Insektenarten das Wachs hervor: *Flata limbata*, *F. nigricornis* und verwandte Arten, endlich *Coccus ceriferus*, so daß jede eine eigenthümliche Pela erzeugt. Westwood nannte das Insekt zuerst *Coccus sinensis*, noch ehe er es gesehen hatte, jetzt C. Pela. Auch hinsichtlich des chinesischen Wachses ausschließend sei. Da jedoch besagte Pflanzenarten in nächster Verwandtschaft zu einander stehen, so ist es wahrscheinlich, daß sie alle drei Wachs liefern. Von *Ligustrum lucidum* erzählt Macgowan ausführlich Folgendes. Er wächst im der Provinz Schantung in Mittelchina und erscheint im Juni als ein Strauch, dessen Gipfel über und über mit einem schneeweißen, flockigen Reife bedeckt ist. Er ist die Pela, und um ibertrollen pflanzt und pflegt der Chinese den Strauch in eigenen Anlagen mit großer Sorgfalt. Im August schabt er den Reif von den Sträuchern, bringt die mit den Hüllen der Insekten verunreinigte Masse in ein

cylindrisches Gefäß, schmilzt es in demselben mittelst kochenden Wassers, das den Cylinder umgibt und bringt es dann in großer Reinheit als eine durchscheinende, glänzende, geruch- und geschmacklose, krystallinische, spröde Masse von faseriger Beschaffenheit zu Markte. Zu Ningpo kostet dann das Pfund 22 bis 23 Cents. Seine Ausbeute soll jährlich mehr als 100,000 Pfund betragen. Sein Schmelzpunkt liegt bei der Temperatur des siedenden Wassers; bei der trocknen Destillation zerfällt es in einen paraffinartigen Stoff, das Cerotin, und in Cerotinsäure; sonst besteht es nach Brodie aus cerotinsäurem Cetylcerod. Sein ganzes Wesen stellt es äußerlich dem Wallrath nahe. Die Pels kommt in runden Kuchen von verschiedenem Inhalt, oft von 3 1/2 Zoll Dike und 13 Zoll Durchmesser in den Handel. — Ebenso bestimmt sprechen sich Andere über Ligustrum lbota in Japan aus. Man soll hier das Wachs nur in kleinen Mengen erhalten, und dieses soll erst erscheinen, nachdem die Zweige von einem Wachsinsekt (*Asinuca cerifera*) angezogen werden. Jedensfalls wären bestimmtere Untersuchungen darüber zu wünschen, ob das Wachs bereits in dem Zellsaft vorgebildet sei, wie in den Balanophoren, und durch den Insektenstich nur ausfließe, oder ob es durch die Insekten, nach Art der Bienen, selbst bereitet werde. — Auch Südamerika liefert ein Wachs, dem man einen ätherischen Ursprung zuschreibt, das Anbaquies-Wachs. Es kommt aus dem Bereiche des

Trinoko und Amazonasstromes, schmilzt bei 77° und soll dem Bienenwachs sehr ähnlich zusammengesetzt sein. Doch ist weder das Insekt, noch die Mutterpflanze bis heute näher bekannt.

Ein Rückblick zeigt die wunderbaren Perspectiven in das Pflanzenleben. Nicht allein, daß es schon von hohem Interesse ist, so merkwürdige, dem Leben nützliche Substanzen im Pflanzenreiche zu finden, welche Cultur und Wohlstand zeugen, erhebt noch vielmehr die Wahrnehmung, daß durch eine leichte Modifikation in der Umsehung des Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Sauerstoffs aus mikroskopisch winzigen Zellen Stoffe hervorgehen können, die zwar in erskaunlichster Mannigfaltigkeit als Zellinhalt (Cellulose), Stärkmehl, Chlorophyll, Zucker, Harz, Galle und ätherische Öle, Kampfer, Glycerin, Wachs u. s. w. auftreten können und doch ihrem Ursprunge nach einer und derselben Quelle entstammen, aus der sie der thätige Organismus der Pflanze ebenso bildet, wie theilweis auch der thierische, welcher in der Bildung des Wachses eine so merkwürdige Parallele zwischen beiden organischen Reichen zieht. Jedensfalls gehört das Dasein des Wachses im Pflanzenreiche zu dessen interessantesten Erscheinungen; um so mehr, als sich an die Wachspflanzen unmittelbar jene ebenso merkwürdigen, als wohlthätigen Bäume anschließen, welche, indem sie einen aus Olein und Palmelin bestehenden fettartigen Stoff bereiten, die Butterbäume genannt worden sind.

## Literaturbericht.

Anleitung zum rationellen Anbau der Handelsgewächse, von Dr. William Löbe. Stuttgart 1868, Cohen & Misch. In 6 Abtheilungen. 3 Thlr. 15 Sgr.

Der als landwirthschaftlicher Schriftsteller wohlbekannte Vf. verzögert dieses Verfaßte damit den Jueden, unsern Landwirthern eine möglichst gründliche Anleitung zum Anbau der wichtigsten Handelsgewächse zu geben, weil er überzeugt ist, daß selbige über kurz oder lang theilweis doch zu diesem Zwecke der Landwirthschaft übergeben müßten, wenn sie dem Boden eine dem aufzuwendenden Kapitale entsprechende Rente abgewinnen wollen. Denn weil durch einfältige Steigerung des Getreidebaues mittelst rationeller Wirthschaftssysteme eine Ueberschreitung des Getreides schon seit Jahren eingetreten sei, habe man zu befürchten, daß die hierdurch gesunkenen Getreidepreise von größerer Dauer sein werden; um so mehr, als durch Ausbildung der Verfeinertesten Umrassen von Getreide aus dünnbesetzten Ländern auf den Markt kommen. Seiner Ueberszeugung nach werde man die Bodenrente durch Anbau von Handelsgewächsen zwei bis dreifach und darüber steigern, einen zweckmäßigen Fruchtwechsel, eine gleichmäßigere und vortheilhaftere Arbeitseileilung, überhaupt eine Verbesserung des Bodens erzielen. Er verheißt es nicht, daß sich der Anbau von Handelsgewächsen, weil er viel Arbeitskraft erfordert, weniger für den großen als für den kleinen Landwirth eignen werde, der selbstständig mit seiner ganzen Familie eintreten könne, obgleich, wo die Arbeitskräfte niedrig, auch der größere Landwirth recht gut zu concurriren im Stande sein werde.

Da es nun selbstverständlich ist, daß man in einer bestimmten Gegend nicht sämtliche Handelsgewächse kultiviren kann, weil jedes einen besondern Boden und andere eigene Bedingungen zu seiner Rentabilität verlangt, so hat Vf. sein Werk in 6 besondere Abtheilungen zu beliebigem Kaufe zerlegt. Nr. 1 behandelt die Gewürzgewächse, Nr. 2 eine Gruppe von Gewächsen, die der Vf. Faserpflanzen nennt (Felsenbaum, Gancienbaum, Giderie, Gernantel, Kaffeewald, verische Kamille, Nierenröhre, Labat, Heberlatze, Gräser zu Ruchmaterial, Juckerde u. s. w.), Nr. 3 die Weinbaupflanzen, Nr. 4 die Felspflanzen, Nr. 5 die Faserpflanzen, Nr. 6 die Arznei- und Seereichpflanzen.

Jedensfalls ist der Gedanke des Verfaßten ein guter; denn es ist uns kein Ähnliches bekannt, welches sämtliche Handelsgewächse nach ihrem botanischen Charakter, nach Boden und Klima, Düngung und Fruchtfolge, nach Bodenbearbeitung, Auezeit, Pflege und Ernte, nach Rentabilität und Verwerthung, überhaupt nach ihrem naturgeschichtlichen und agrarisch-wirthschaftlichen Charakter vereint behandeln sollte. Auch ist das, was der Vf. fordert, bereits in der Entwidelung begriffen; in den meisten Theilen unseres Vaterlandes, namentlich in dem fast parzellirten und dichtbesetzten Süden, beginnt man heutzutage überall mit der Cultur dieser oder jener Handelsgewächse zu verfahren, von der man früher nichts wußte. Es bedarf also nur des Hinwieses auf das Dasein vorliegenden Werkes, das jedem, welcher es bedarf, Anregung und Belehrung in reichem Maße ertheilt und dieses, wo es nöthig, auch durch Holzschnitte zur Anschauung bringt. Wenn hätten wir aus wissenschaftlichen und prof-

tischen Gründen glauben, daß der St. auch bei jeder Pflanze die gegenwärtig schon existirenden Culturorte so genau wie möglich anzuordnen hülte. Für den Wissenschaftler würde das ein interessanter Beitrag zur Pflanzengeographie Deutschlands, für den Praktiker ein Anhalt mehr zum Weitergehen gewesen sein. Manches auch hätte eindringlicher gesagt werden können, wie z. B. die Einkornanlage der jungen Hopfenpflanze, die bei der Reifeanlage nur schiefer oder gar nicht gedeiht. Jedemfalls aber hat der St. mit Umficht Alles insam- mengestellt, was die bisherigen Erfahrungen lehren, und diesen Werth räumen ihm auch kleinere Ausstellungen nicht. A. M.

**Der rationelle Betrieb der Milchwirthschaft mit Einschluss der Butter- und Käse-Fabrikation. Von Max Wöttger. Mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen. Stuttgart Götz & Wifsch. 1868. 8. 268 S. 1 Thlr. 7½ Sgr.**

Wenn man bedenkt, daß allein für das kleine Sachsen der Milch- ertrag (schäferlich Viehzucht auf 14½ Mll. Thlr. berechnet mit, so hat man eine kleine Vorstellung von der Bedeutung eines rationellen Betriebes der Milchwirthschaft. Das letztere aber auch wirklich überall rationell betreiben werde, wäre eine Annahme, die schwerlich zu be- weisen sein würde. Denn obgleich es in Jedermanns eigenem In- teresse liegt, so viel Milch als nur möglich, und von der Milch so viel Nutzen zu gewinnen, als sich nur gewinnen läßt, so sind doch noch die wenigsten Wirthschaften nach den neueren Erfahrungen eingerich- tet. Es muß geradezu in die Willkür fallen, wenn man die nicht gewonnenen Schätze unserer gegenwärtigen Milchwirthschaften berech- nen sollte. Wir haben darum alle Ursache, dem St. vorliegenden Schrift, der selbst Untersucher ist, dankbar für sein Buch zu sein, das in klarer Darstellung Alles vereinigt, was man sich heute über die Natur der Milchkuhe, über Milchbildung, Kalmerngung, But- ter- und Käsebereitung erlangungsmäßig weiß. Seine Darstellung ist so, daß das Buch nicht allein den Landwirth, sondern Jeden in- teressiren muß, welcher sich über den fraglichen Gegenstand näher unterrichten will. Doch hätten wir den Einsluß der Fütterung auf Menge und Beschaffenheit der Milch gern weiter ausgeführt gesehen, und zwar dahin, daß der St. die Milchkräuter näher aufeinanderge- setzt hätte, die man als solche kennt, daß er, mit andern Worten, auch näher auf die Miesen und ihre Kräuter eingegangen wäre. Als besonders räthenswerth ist das Bestreben hervorgehoben, in den Er- fahrungen auch das Geschiehe nachzuweisen, wodurch sein Buch auch ein naturwissenschaftliches Interesse erhält. Als solches es unserm Leserkreise anzulegen und zu empfehlen, glauben wir keinen Anlaß zu empfinden zu haben. A. M.

**Naturgeschichte der einheimischen Küfer nebst analytischen Ta- beln zum Selbstbestimmen für Lehrer und Studierende und alle Freunde wissenschaftlicher Entomologie von Wilhelm von Friden, Doctor der Philosophie. Mit 63 in den Text gedruckten Holzschnitten. Krasberg. Verlag von F. F. Grote. Preis 20 Gr.**

Die vorliegende kleine Fauna, welche sich zur Aufgabe macht, das Studium der einheimischen Küfer durch kurze, verständliche Beschreibungen und eine Reihe analytischer Tabellen allen Interessirten zu erleichtern und ein gefühelter Bedürfnis überhaupt zu befriedigen, darf wohl auch einmal den Gegenstand der Vertheilung von Seiten einer, wenn auch nicht fachkundigen, doch sich selbst interessirenden Feder abgeben.

Der bei weitem größte Theil der küfernden Terebranten ist wohl nicht bei den Zoologen von Fach zu finden, sondern bei denen, welche

nach Abolierung ihrer Verfassungsschäfte, nach dem Nützlichkeit des Auenlandes u. s. w., ein großes Bedürfnis fühlen, sich in der ihnen freien Zeit zu erheben und durch die Betrachtung der Natur in ihren verschiedenartigen Richtungen zu erwidern. Wenn nun solche, wie leicht durch die Macht der Verhältnisse veranlaßt, sich mehr wie ge- wöhnlich in der freien Natur aufhalten und ihren sog. Liebsbäckerien nachhängen können, so dürfte der Veranlassung des Interesses an der Entomologie ihnen ein Werkchen über die Naturgeschichte der Küfer gewiß recht willkommen sein. Der Dr. Verf. bemerkt und dies wohl mit Recht: „daß die Behandlung der Küfer in allgemeinen Naturgeschichten, so vortheilhaft dies auch zum Theil — i. St. die Synonymie von Leutnig — sind, fast ausschließlich nur knapp und für ein eingehenderes Studium nicht ausreichend sein kann.“ Er er- mittelt daher auf 214 Seiten in 11. 8. die Beschreibung der Küfer in vielfach ausführlicherer Weise, als dies Leutnig in seiner Synonymie gethan, ohne jedoch immer den alten, erprobten, vorzüglichen Cuvier u. s. w. zu überfließen. Die Gintbeilung der Küfer erfolgt in 37 Familien, wovon die Beschreibung der Familie Carabidae und ihre Glieder 24 Seiten ausmacht und durch 5 Holzschnitte unterstützt wird.

Was bei dem vorliegenden Werkchen hervorgehoben sein dürfte, ist die bündige Schilderung der Unterteilungsgeschichte einzelner Küfer, wodurch das wissenschaftliche Interesse an der Entomologie jederzeit ge- steigert und die wahre Naturgeschichte der Küfer möglichst dargestellt wird. In der Darstellung, welche der Verf. zum Ausdruck bringt, so- wie von der systematischen Uebersicht der Insectenordnungen handelt, hätte zur Vollständigkeit der Charaktere u. s. w., eine größere Anzahl von Holzschnitten (entsprechend sein dürfte, da ja bei der Bestim- mung der einzelnen Species und Arten sowie auf die genaue Kennt- niss der Färbung und Krallen, der Larven u. s. w. ankommt. Das zweite Capitel, welches vom inneren Bau handelt, ist durch zwei in- struente Abbildungen nebst erläuterndem Texte auf 7 Seiten recht klar und faßlich abgehandelt.

Den Abbildungen, welchen wir noch eine kurze Beschreibung widmen wollen und die sich, wie erwähnt, zu der Zahl 63 erstrecken, sind größtentheils aus der Offen von J. Decker in Leipzig her- vorgegangen, während die übrigen der geistigen Hande des Verlegers von E. Schum u. Thierbach zu verdanken sind. Wir finden die Ab- bildungen recht befriedigend, doch erscheinen einige in nicht ganz rich- tiger Schattirung und sind wie in vorliegenden Exemplare meistens auch noch zu schwarz gedruckt, so daß man nicht häufig in der Lage ist, die neben im Texte angegebenen Kennzeichen in der Abbildung wieder zu finden. Als Hinterabdruck möchte Fig. 61 genannt werden, die in jeder Beziehung nichts zu wünschen übrig läßt; was nicht auf sich die beiden Küfer von Fig. 20 gerathen u. a. mehr. Da gerade für entomologische Zwecke gute Abbildungen von großem Werth sind, so erlauben wir uns hier speziell auf das Manuskript hinzuweisen. Da das Werkchen bei seiner angenehmen bündlichen Form, seiner Brauchbarkeit und seinem billigen Preise voraussichtlich eine weite Verbreitung finden wird, so dürften dem vvn. Verf. bei einer neuen Auflage noch folgende Punkte zur Berücksichtigung em- pfohlen werden:

Die Angabe des Maßes, welche in dem vorliegenden Werkchen fehlt, konnte nicht einem kleinen Nachtrage bei einer neuen Auflage auch in dem üblichen Pariser-Poll-Maß oder im Centimeter mit sei- nen Unterabtheilungen gefehlen. Eine Zusammenstellung der Küfer je nach ihrer Vertheilung, geordnet nach Geshäusen, Blumen zc., dürfte nicht fehlend eine größere Anzahl von Abbildungen und angenehmen Tafeln, insbesondere um die für Fort- und Sammler- schaft schädlichen Küfer alle genau kennen zu lernen, gewiß Vielen willkommen sein. Sollte sich der Preis des Buches auch um ein Drittel erhöhen, so würde es dennoch im Verlage zu anderen sich immer noch durch Billigkeit auszeichnen. Schließlich machen wir noch darauf aufmerksam, daß die praktische Seite des Buches weitest- gehend gewonnen würde, wenn die Paginierung nach arabischen Ziffern hätte, die Zahlen oben in die Hand gesetzt würden und gleich neben die Angabe der Familie nebst der betr. Nummer auf jeder Seite enthalten wäre.

Wäge das Werkchen, das in seiner Ausstattung dem modernen Bedürfnis Rechnung trägt, einen großen Leserkreis finden und die Freunde der Selbstbetrachtung der Küferwelt außer dem Rezenten auch anderen Freunden der Fauna zu verschaffen suchen.

G. D. S.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Falt.

**N 29.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Falt, O. Schwetschke'scher Verlag.

**21. Juli 1869.**

**Inhalt:** Wälder am Nordpol, von Otto Me. Erster Artikel. — Die Schädeltheorie, von Frip Kadel. Zweiter Artikel. — Die oldenburgischen Reichbauten, von F. Oswald. Zweiter Artikel. — Kleinere Mittheilungen.

## Wälder am Nordpol.

Von Otto Me.

Erster Artikel.

Wälder am Nordpol! Klingt das nicht, als ob ich dem Leser Münchhausen'sche Luftschlösser aufbauen, phantastische Lügenmärchen aus alter Zeit erzählen wollte? Wälder am Nordpol, wo fast Jahr aus Jahr ein Eis und Schnee den Boden bedeckt, wo kaum ein paar Sommerweiden einige dürftige Kräuter, Moose und Flechten einige grüne Flecke in die Einöde zaubern, wo die einzigen baumartigen Gewächse, die Zwergweiden, sich kaum einige Zoll hoch über den Boden zu erheben wagen! Und doch sind diese Wälder Wahrheit! Allerdings muß ich nach Art der Märchen von alter, alter Zeit sprechen, einer Zeit, die Niemand gesehen, aus der Niemand berichtet hat, aus der uns aber doch noch Zeugen und zwar sehr deutlich und unwiderleglich sprechende Zeugen geblieben sind — die im Boden aufbewahrten versteinerten Ueberreste jener Wälder und

ihrer Bewohner! Oswald Heer in Zürich hat seit Jahren diese Schätze aus den verschiedensten Polarländern, in die der Mensch in neuester Zeit gekommen, aus dem Norden Amerika's, vom Bankslande, aus Grönland, Island und Spitzbergen zusammengetragen und wissenschaftlich bearbeitet. Er hat noch vor Kurzem die ihm von zwei neueren Expeditionen im hohen Norden Grönlands und auf Spitzbergen zugeführten fossilen Ueberreste der Vorzeit untersucht und in einem in Zürich gehaltenen und später der Öffentlichkeit übergebenen Vortrage\*) daraus ein lebendiges Bild jener Länder geschaffen, wie sie sich darstellten, als noch

\*) Ueber die neuesten Entdeckungen im hohen Norden, von Dr. Oswald Heer. Vortrag, gehalten den 28. Januar 1869 auf dem Rathhause in Zürich. Verlag von Fr. Schulthess in Zürich.



Wälder ihre jetzt vereisten Fluren bedeckten und Käfer und Schmetterlinge sich auf Blüten wiegten, wo jetzt alles Leben erstarrt ist. Diese beiden Expeditionen sind die des Engländers Edward Whymper nach Nordgrönland im Sommer 1867 und die bekannte schwedische Nordpolsexpedition des vorigen Sommers.

Whymper, bereits bekannt als der erste Besteiger des Matterhorns in der Schweiz, erhielt von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in London und der britischen naturforschenden Gesellschaft den Auftrag, fossile Pflanzen in Nordgrönland zu sammeln. Er gelangte mit dem regelmäßig jedes Frühjahr von Kopenhagen nach Nordgrönland segelnden Schiffe am 6. Juni nach Egedesminde zu einer Zeit, wo das erste Grün der Zwergweiden das Erwachen des Frühlings verkündete. Er machte sofort von Jacobshaven aus den Versuch, in das Innere des Festlands vorzudringen, das bekanntlich ein von einem unermeßlichen Eismeer bedecktes Hochland von 2—3000 Fuß Meereshöhe bildet. Ueber dieses Eismeer kostete er mit Hundeschlitten zu gelangen. Das Gletscherplateau wurde auch bestiegen, und vor ihm lag nun die Eisschläge, so weit das Auge reichte. Keine Berggipfel ragten daraus hervor, keine Schluchten und Thäler durchfurchten sie; es war wie ein zusammenhängender Eismantel, der alle Hügel und Thäler gleichmäßig ausgefüllt hat. In's Innere vertieft sich diese Eisschläge in unbegrenzte Ferne, nur gegen die Küste sendet sie zahlreiche Arme hinab, die den ursprünglichen Thälern folgen und dem Meere immer neue Eiseberge zuführen. Unzählige Risse und Schründe durchfurchten die Oberfläche des Eises, und stellenweise breiteten sich große See'n darüber aus. Die Hundeschlitten erwießen sich bald als unbrauchbar auf diesem holprigen, schründigen Eise; sie wurden beständig umgeworfen und zerbrachen zum Theil, und die Hunde waren nicht mehr zu leiten. Das Unternehmen mußte daher aufgegeben werden, und Whymper beschränkte sich nun auf seinen Hauptzweck, die Untersuchung der großen Halbinsel Noursoak und der Insel Disco, der Hauptfundstätten vorweltlicher Pflanzen in Grönland. Die hier gesammelten Pflanzen gelangten nach London und wurden Herrn Oswald Heer zur Untersuchung übergeben. Dieser Gelehrte aber, das sie benutzt, um ein Bild der alten Zeit Grönlands vor das geistige Auge zu führen. Ich will es versuchen, dieses Bild, mich eng an die eignen Worte des Künstlers anschließend, dem Leser treu wieder zu geben.

Zur Zeit, als die mächtigen Kalk- und Thonmergelschichten entstanden, welche jetzt das herrliche Hügelland in der Umgebung von Wien und der Rebendügel des Mainzer Beckens bilden, als die Sandsteine abgelagert wurden, welche größtentheils den Boden der niederen Schwitz zusammenlegen, muß im hohen Norden ein ausgebreitetes Festland bestanden haben. Es ist die Zeit, welche man die miocene oder noch allgemeiner die tertiäre genannt hat. Damals

herrschte in ganz Mitteleuropa ein subtropisches Klima, und in den immergrünen Lorbeerwäldern und Palmenbainen lebte eine reiche Thierwelt, nach Zopen gestaltet, wie wir sie jetzt nur in der warmen und heißen Zone treffen. Nach Norden zu veränderte sich zwar das Kleid der Erde, doch tritt uns in Grönland noch selbst unter 70° n. Br. eine Flora entgegen, die nach ihrem klimatischen Charakter mit derjenigen von Norditalien verglichen werden kann. Wir erfahren aus ihr, daß in der Gegend der Disco Insel ein Süßwassersee war, an dessen morastigem Ufer sich mächtige Torflager bildeten, aus denen dann später die Braunkohlenlager entstanden, welche man jetzt dort längs des Meeresufers findet. Wir müssen dabei an unsere jetzigen Sümpfe und Moore denken und namentlich an die Wirkungen des eisenhaltigen Wassers, welches nicht selten den Boden derselben mit einer braunrothen Rinde überzieht. Auch diesen alten Morästen Grönlands floß offenbar solches eisenhaltiges Wasser zu, und das Eisen schlug sich daraus nieder und umhüllte die Pflanzen, welche in's Wasser gefallen waren, und die dann auch ihrerseits wieder zur Fällung des Eisens beitrugen. In dieser Weise sink allmählig die braunrothen Eisensteine entstanden, die man auf der Halbinsel Noursoak findet, und die von Pflanzenersten, Zweigen und Blättern, Früchten und Samen, förmlich angefüllt sind. Aus diesen Pflanzeneinschlüssen ergibt sich nun, daß Riedgräser und Schilfrohre den Sumpf bekleideten, daß aber auch Sumpfcypressen und Wasserfichthen (Sipoptroten), daß auch Birken, Erlen und Pappeln über denselben sich ausbreiteten; denn ihre Reste sind in Menge vom Eisen umschlossen. Der Fieberklee (*Menyanthes arctica*) stand ohne Zweifel gerade so im Moore, wie sein jetzt lebender Vetter unsere Moorgründe mit seinen zierlichen Blüten schmückt, und die Igelkolben (*Sparganium*), deren Früchte in diesen Eisensteinen gefunden wurden, streckten einst ebenso wie heute ihre schlängeligen Köpfe aus dem Wasser hervor. Die Bäche brachten aber auch die Blätter anderer Lokalitäten dorthin; sie schwemmten sie aus dem Urwalde in die Moore, und so spiegelt sich auch dieser in den Abdrücken der Eisensteine.

Treten wir in diesen Urwald ein, so begegnet uns ein wunderbarer Reichtum an Baum- und Straucharten, von denen Heer 95 verschiedene Formen unterscheidet. Wir sehen da zunächst einen mächtigen Nadelholzbaum (*Sequoia Langsdorffii*), der in der Tracht mit unsrer Eibe verglichen werden kann, der aber zu den sogenannten Mammutbäumen gehört. Die belästigten Zweige dieses Baumes sind so häufig, daß fast jedes Steinstück einzelne Reste desselben enthält, und aus den Blüten, Früchten und Samen, welche Heer aus den Steinen herausklopfte, gelang es ihm den ganzen Baum wiederherzustellen. Er ist von zwei verwandten Arten begleitet, deren eine (*Sequoia Coultsiae*) in ihrer Zweig- und Blattbildung lebhaft an den riesigen Mammutbaum Californiens erinnert. Eine andere Tracht

hatten ein Lebensbaum und ein Sinko (*Salisburia adian-  
toides*), der durch seine farnähnlichen Blätter so auffal-  
lend von den übrigen Nadelbäumen abweicht. Ueberaus  
zahlreich sind die Laubbäume vertreten. Während wir jetzt  
in unsern deutschen Wäldern nur 2 Eichenarten finden, ent-  
hielten die Wälder Nordgrönlands deren 9, und von diesen  
müssen 4 immergrüne Blätter gehabt haben, wie die ita-  
lienische Eiche. Zwei Buchenarten, 1 Kastanienbaum, 2  
Platanen\* und 3 Ausbaumarten dieses Urmaltes erinnern  
an allbekannte Baumtypen; aber auch die amerikanischen  
Magnolien, Cassiast\* und Amberbäume hatten hier ihre  
Repräsentanten, und die Ebenholzbäume (*Diospyros*) sind  
in 2 Arten ausgeprägt.

Die Haselnus und der Sumach, der Kreuzbarn und  
die Stachelme, der Schneeball und der Weißbarn haben  
wahrscheinlich das Strauchwerk am Rande des Waldes ge-  
bildet, während Weinreben, Efeu und Sarsaparille ohne  
Zweifel an den Bäumen des Urmaltes emporranken und sie  
mit grünen Guirlanden umzogen. Im Schatten des Wal-  
des oder wucherten zahlreiche Farn, die mit ihrem tierlichen  
Blattwerk den Boden überkleideten. Aber auch die Insek-  
ten, welche diesen Wald belebten, sind keineswegs völlig  
verloren gegangen. Auch von ihnen sind einzelne Abbilder  
uns gekommen, und sie erzählen uns, daß kleine Blatts-  
läufer und Eiskäfer auf den Zweigen sich sonnten und große  
Trogositen die Rinden der Bäume durchbohrten, während  
zierliche kleine Cicaden durch das Gras hüpfen.

Dies ist kein Phantasiegebilde, sagt Heer, denn alle  
diese Pflanzen und Thiere liegen uns vor; sie waren zum  
Theil während seiner Vorlesung auf einem Tische vor den

Hörsaal ausgebreitet. Früher, wo von mehreren Baumar-  
ten der alten grönländischen Wälder nur Blätter bekannt  
waren, hatte man versuchen müssen, aus diesen auf die  
Bäume selbst zu schließen, und die Richtigkeit dieser Deu-  
tungen konnte noch bezweifelt werden. Jetzt, wo auch die  
Früchte aufgefunden sind und die früheren Bestimmungen  
bestätigt haben, ist kein Zweifel mehr erlaubt. So sind  
zwei Fruchtgasken der Magnolia und die Früchte und Blü-  
then des Kastanienbaumes von Heer entdeckt worden. Die  
Kastanien sind, wie bei der lebenden Art, von einer nach-  
lässigen Fruchthülle umschlossen, innerhalb welcher 3 Kerne  
liegen.

Im Ganzen hat Heer aus diesem Theile Nordgrön-  
lands bereits 137 Pflanzenarten erhalten, von denen 32  
der Wilmper'schen Expedition verdankt werden. „Wohl  
liegen diese Pflanzen“, so schließt Heer seine Schilderung,  
„in eisernen Banden. Es ist diese Flora, gleichsam eine  
zweite Andromeda, an die Meeresselsen eines fernern Lan-  
des gefesselt; doch der Zauberkab der Wissenschaft kann  
diese Bande lösen, und sie tritt nun verjüngt aus diesen  
Felsen hervor!“

Was es hier nur eine einzige Epoche aus der Urzeit  
der Polarländer, deren Bild uns hier durch die fossilen  
Pflanzen Nordgrönlands enthüllt wurde, so werden wir  
durch die Sammlungen der schwedischen Expedition eine  
ganze Reihe von Zeitaltern, eine ganze Reihe von Wäl-  
dern, die nach einander auf dem jetzt vereisten Boden der  
Bäreninsel und Spitzbergs wucherten, vor unser geistiges  
Auge geführt sehen.

## Die Schädeltheorie.

Von Fritz Nagel.

Zweiter Artikel.

Betrachten wir den Schädel eines Menschen oder eines  
Säugethieres, so sehen wir ihn aus einer bedeutenden An-  
zahl von Knochen zusammengesetzt, welche vorzüglich zu  
zwei Hauptabtheilungen zusammenfassen, dem Gehirnschädel  
und dem Gesichtsknochen. Beide Abtheilungen sind an dem  
vertikalen Durchschnitt eines menschlichen Schädels durch  
die Linie o n von einander getrennt, und erklären ihre  
Bedeutung eigentlich schon in der für sie gewählten Benen-  
nung. Der Gehirnschädel umschließt das Gehirn als Kno-  
chenkapsel von elliptischer Form; das Gehirn steht durch das  
Hinterhauptloch mit dem Rückenmark in Verbindung;  
außerdem hat diese Kapsel nur kleinere Oeffnungen für den  
Durchtritt von Nerven und Gefäßen. An sie legt sich vorn  
der Gesichtsknochen an, welcher vorzüglich aus den Knochen  
besteht, die zum Schutze der Organe des Geruchs, Gesicht  
und Geschmack angebracht sind, und aus denen, welche dem  
Kausgeschäfte dienen. Betrachten wir nun die Zusammen-

setzung der das Gehirn umschließenden Knochenkapsel näher,  
so finden wir sie aus drei einzelnen und aus sechs paarigen  
Knochen zusammengesetzt, so zwar, daß jedem der drei ein-  
fachen Knochen je zwei Paar der letzteren zugeordnet sind.  
An dem Gehirnschädel des Bibern sehen wir dieses Verhält-  
niß recht deutlich. Die drei einzelnen Knochen sind das  
Hinterhauptbein, das hintere und das vordere Keilbein; sie  
liegen in einer Reihe hintereinander und bilden den Boden  
der Gehirnkapsel. Dem Hinterhauptbein gehören ein Paar  
seitliche und ein Paar obere Hinterhauptbeine zu, und sie  
umschließen so wie ein Gürtel eine Oeffnung, das Hinter-  
hauptloch, durch welches das Rückenmark mit dem Gehirn  
in Verbindung tritt. Dieser Gürtel verwächst jedoch oft, wie  
beim Menschen, in seinen einzelnen Theilen zu einem wirk-  
lichen Knochenring. Da es jedoch nicht allein viele Thiere  
gibt, in welchen das ganze Leben hindurch diese Verwachsung  
nicht stattfindet, sondern auch bei allen Wirbelthieren

während der Jugend die einzelnen Knochen noch getrennt sind, so ist die Zusammenfügung dieses Ringes aus 5 Knochen liberall zu erweisen. Ihm folgte nach vorn ein zweiter Gürtel, ebenfalls ursprünglich aus 5 Knochen gebildet. In ihm ist der einzelne Knochen das hintere Keilbein, die zwei paarigen sind die großen Keilbeinflügel und die Scheitelsbeine, von denen die letzteren schon in ihrem Namen ihre Lage bezeichnen; sie stoßen nämlich in der Gegend des Scheitels zusammen und bilden so den größeren Theil des Daches des Gehirnschädels. Der vordere Gürtel endlich besteht aus dem vordern Keilbein, den kleinen Flügeln des Keilbeins und den Stirnbeinen; letztere sind beim Menschen in der Mittellinie miteinander verschmolzen, sind aber ursprünglich paarig und bedecken, indem sie die Stirn und einen Theil des Vorderkopfs bilden, den vordern Theil des Gehirns. Zwischen diesen einzelnen 15 Knochen kommen nun durch Vermischung mannigfache Combinationen zu Stande, aber der Typus, wie wir ihn beschrieben haben, nämlich die Zusammenfügung aus 3 Gürteln, deren jeder 5 Knochen enthält, geht durch alle diese Verhältnisse, liegt jedem Wechsel zu Grunde.

Sichtbar ist der beschriebene Bau unseres Schädels dem bloßen Auge, das bloß an die Auffassung des Oberflächlichen gewöhnt ist, freilich nicht, und die Anatomie, welche sich Jahrhunderte lang mit dem Knochenstellet des Menschen ganz besonders eingehend beschäftigt hatte, die nicht müde wurde, jedes Schädelchen und jedes Hügelchen zu finden und zu benennen, sie hatte allerdings für derartige Dinge sehr blinde Augen. Inwiefern das lag vorzüglich darin, daß sie Dienerin der praktischen Heilkunde war. Diese Stellung schrieb ihr gleichsam ihre Pflicht gebieterisch vor, und wie wir es für überflüssig halten, daß eine Dienerin ihren Geist tiefer in die Dinge ihres Dienstes versenke, als dieser es verlangt, so hüteten sich auch die Anatomen über das hinauszuweisen, was nun einmal ihre Pflicht war: die Kenntniß der Theile des menschlichen Organismus, die unseren Sinnen zugänglich sind, fortzupflanzen und, wenn möglich, zu vermehren. Denn der Gedankengang in diesem Falle war ganz natürlich der: Um eine Krankheit zu heilen, nützt die Kenntniß der Dinge, wie sie sind, Alles, die Kenntniß, warum sie so sind und wie sie so geworden sind, Nichts. Sollte daher jenes oben erwähnte, eigenthümliche Verhältniß der Knochen des Gehirnschädels und so mancher andere Zusammenhang im Bau des menschlichen und thierischen Körpers erkannt werden, so konnte der Anstoß hierzu nicht leicht von der Seite kommen, welche vermöge ihrer Beschäftigung mit diesen Dingen dazu berufen gewesen wäre, sondern die Wahrscheinlichkeit, daß er von außen komme, war, so paradox das klingen mag, unstreitig größer. Denn außerhalb der Grenzen der Anatomie war es, daß alle Richtungen, die auch für sie befruchtend werden konnten, ihre Ausgangspunkte hatten, und das waren in erster Reihe die vergleichende Anatomie und die Naturphi-

losophie. Ihnen gegenüber erscheint die Anatomie bis zum Anfang unseres Jahrhunderts im Verhältniß eines Handwerkes zu den Wissenschaften, die es erklären, etwa des Maschinenbaues zur Physik und Mechanik. Aber gerade die Entdeckungen auf dem Gebiete der vergleichenden Knochenlehre halfen zuerst und am wirksamsten dazu, sie aus der untergeordneten Stellung herauszuheben.

Den ersten Impuls gab in dieser Hinsicht wohl Goethe durch seine Entdeckung des Zwischenkiefers im Menschen; nicht als ob diese Entdeckung an und für sich eine so gar bebrutende und großartige gewesen wäre, sondern mehr deshalb, weil sie zeigte, auf welchem niedrigen Standpunkte die Kenntniß des Knochenstelletes stand, und wie deshalb durch Anwendung neuer Methoden es selbst Dinge aufzuklären und in ein besseres Licht zu stellen gelang, welche man unbedeutlich als unabhängig festgestellt zu betrachten sich gewöhnt hatte. Uns scheint es wenigstens, als ob auch ohne direkte Beobachtung das Vorhandensein jenes Knochens im Menschen hätte erwiesen werden müssen. Alle Wirbelthiere haben einen deutlichen Zwischenkieferknochen, welcher stets, wo solche vorhanden, die Schneidezähne in der oberen Kinnlade trägt. Im Menschen nun sind diese Schneidezähne stets gerade wie in den Thieren vorhanden; es sind die vier mittleren, vorderen, meißelförmigen Zähne unserer Oberkinnlade. Erlaubte das nicht schon den Schluß, daß auch sie von einem Zwischenkiefer getragen werden müssen? Oder hätte das nicht wenigstens Anlaß geben müssen, nach dem Zwischenkiefer zu forschen? Gerade der Umstand, welcher auf den richtigen Weg hätte führen müssen, führte auf dem falschen nach weiter fort. Man sah die große Uebereinstimmung im Knochenbau des Menschen und der Säugethiere und besonders die große Ähnlichkeit im Schädel des Affen und des Menschen. Anstatt aber daraus zu schließen, daß, wo eine solche durchgehende Ähnlichkeit vorhanden ist, das Fehlen eines ganzen Knochens für den Menschen unentbehrlich sei, und daher zu suchen, ob die Ähnlichkeit in diesem Falle nicht durch irgend welche nebensächliche Umstände unschindbar gemacht werde, stützte man sich gerade auf diesen Unterschied und proklamirte laut: der ganze Unterschied des Menschen vom Affen besteht darin, daß dieser einen Zwischenkiefer hat und jener nicht. — Lassen wir aber Goethe selbst sprechen: „Als ich mich zu Anfang der achtziger Jahre unter Hofrath Foders Anleitung viel mit Anatomie beschäftigte, war mir die Idee der Pflanzennietamorphose noch nicht aufgegangen; allein ich arbeitete eifrig auf einen allgemeinen Knochentypus los und mußte deshalb annehmen, daß alle Abtheilungen des Geschöpfes, im Eingelenken wie im Ganzen, bei allen Thieren aufzuweisen sein möchten, weil ja auf dieser Voraussetzung die schon längst eingeleitete vergleichende Anatomie beruht. Hier trat nun der seltsame Fall ein, daß man den Unterschied zwischen Affen und Menschen darin finden wollte, daß man jenem ein os intermaxillare, diesem aber keines zuschrieb;

da nun aber genannter Theil darum besonders merkwürdig ist, weil die oberen Schneidezähne darin gefast sind, so war nicht begreiflich, wie der Mensch Schneidezähne haben und doch des Knochens ermangeln sollte, worin sie eingefügt seiden. Ich suchte daher nach Spuren desselben und fand sie gar leicht u. s. w.“).

Goethe wies nun nach, daß dem Menschen ohne Zweifel ein Zwischenkiefer zukomme, welcher bei den ganz jungen Kindern auch sehr deutlich sei, später aber mit den nachfolgenden Knochen des Oberkiefers verschmelze. Als er aber mit der Freude des Entdeckers seinen Fund an den berühmten Camper mittheilte, so lobte dieser Arbeit und Bemühung, erwies sich freundlich, versicherte aber nach wie vor, „der Mensch habe kein Os intermaxillare.“ Unser großer Entdecker aber zog daraus den Schluß, „daß immers




Fig. 1. Senkrechter Durchschnitt eines menschlichen Schädels nach Welcker.

1 Hinterhauptknöchel; 2 Hinterer Keilbeinknöchel; 3 Vorderer Keilbeinknöchel.

fort wiederholte Phrasen sich zuletzt zur Uebergangung von Knochen und die Organe des Anschauens völlig verstumpfen“). Nicht überall indessen begnugte er so unersetzlicher Ablehnung. Schied doch schon im J. 1791 der geniale Stimmering in seiner Knochenlehre: „Goethe's sinnreicher Versuch aus der vergleichenden Knochenlehre, daß der Zwischenknochen der Dorkinnade dem Menschen mit den übrigen Thieren gemein sein, von 1785, mit sehr richtigen Abbildungen, verblende, öffentlich bekannt zu sein.“ Wirklich konnten denn auch die hartnäckigen Anhänger des Vergebrachten sich nicht immerfort der neuen Wahrheit verschließen, welche bald allgemein aufgenommen ward; aber die Konsequenzen dieser Wahrheit, die wohl bedeutender waren, als sie selbst, waren wohl leicht zu ziehen, aber schwer für jeden einzelnen Fall zu verwerthen. Nicht überall lag das Richtige so auf der Hand, wie in Goethe's schöner Entdeckung; es bedurfte in andern Fällen einer hingebenden, eindringenden Einzelforschung, und dazu war man nicht immer bereit, und wenn man es war, ließ man Gesfahr, im Einzelnen wiederum zu versinken. Jeder mußte

sich sagen, wie fruchtbar es sein müsse, wenn man das Gebiet der Analogien nicht allein auf die höheren, sondern auch auf die niederen Thiere ausdehnen könnte; leicht war es zu ahnen, daß, da so Manches, was in dem complicirten Organismus des Menschen unerforschlich bleibt, uns schwer zu erklären sein dürfte, wo die Verhältnisse einfacher und leichter zugänglich und vorliegen. Aber wer übernimmt die Arbeit? Hier lag die Kippe, über welche diese Zeit nicht hinauskam. Die niederen Thiere kannte man noch sehr wenig, und es tat einer Generation




Fig. 2. Senkrechter Durchschnitt eines Biberkopfes nach Huxley.

1a Hinterhauptknochen; 1b Schläflicher Hinterhauptknochen; 1c Oberer Hinterhauptknochen. 2a Hinterer Keilbein; 2b großer Keilbeinfortsatz; 2c Scheitelbein. 3a Vorderer Keilbein; 3b kleiner Keilbeinfortsatz; 3c Stirnbein.

Die schraffirten Partien in Fig. 2 gehören nicht dem eigentlichen Oberkiefer an, sondern sind vielmehr fremde Knochenstücke, theils dem Gehörorgan, theils der Unterkieferknochen zugehörig.

geistvoller und fleißiger Forscher bedurft, ehe man einen Ueberblick im allgemeinsten Sinne über ihren Bau gewonnen. Da lag nun allerdings nichts näher, als entweder hier, auf dem Gebiete der Thierkunde, rüstig und ohne Anspruch auf höhere Resultate sich in's Einzelne zu versenken oder sich mit dem zu begnügen, was nun einmal an Thatfachen vorlag, und zu versuchen, ob nicht schon aus diesen die Gesetze des Baues und des Lebens der Thiere erkannt werden möchten. Jener Weg war sicher, aber das Ziel fern, dieser hatte das Ziel näher, aber er führte über tausend Klippen und Abgründe; jener war der Weg der Naturforscher, dieser der der Naturphilosophen.

Eine solche Scheidung der Forschungsmethoden trat mit dem Erstarken der naturphilosophischen Richtung auf allen Gebieten der Naturwissenschaft immer deutlicher hervor und wurde durch den Streit heftiger Partien immer schärfer, so daß endlich zwischen den zwei Richtungen, in deren ganzem Wesen es liegt, daß sie einander ergänzend und befruchtend durchdringen, jener polare Gegenatz eintrat, den wir in unsern einleitenden Worten flüchtig geschildert haben. Gab es aber keinen Mittelweg, keine goldene Straße der versöhnten Widersprüche? Schwierig war eine solche möglich für Völk; wo sie zu finden war, war es wohl nur auf dem Grunde mächtiger Persönlichkeiten, großer Ver-

\*) Goethe's ges. Werke in 40 Bdn. 1859. Bd. 36. S. 240.

\*\*) Ebenfalls.

gabungen. Aber gerade diese stehen dem Parteitreiben fern, das das beliebte Gebiet der Mittelmäßigkeiten darstellt. Für kleine Geister ist gerade der heftige Streit der Gegensätze die erwünschteste Gelegenheit, mit ihrem leichten Pfund zu wuchern, und eher erstickten sie die Stimme dessen, der auf Grund eines weitersehenden Geistes, einer umfassenderen Kenntniß zur Ausgleichung mahnt, als daß sie sich die köstliche Gelegenheit entgehen lassen, mit ihrem leeren Getöse die Sinne der Menge zu beschleichen. So kam es denn, daß, als Goethe und Platen, das unsichtbare und sichtbare Haupt der naturphilosophischen Schule, unabhängig von ein-

ander die Schädeltheorie aufstellten, die bestimmt schien, der Forschung auf diesem Gebiete eine ganz neue Richtung zu geben, dieselbe nur in ihren äußerlichkeiten erfaßt und zu einer Frage ausgezogen und breitgeschlagen wurde, die mit Recht den Spott der Gegner herausforcete, während ihr Kern, ihr geistiger Inhalt unbeachtet blieb und sich unter den rohen Händen der Parteimänner verflüchtigte. Das Goethe'sche Wort von den Nachbetern und Nachsetzern:

Sie halten die Ideale in ihrer Hand,

Heißt leider nur das geführte Band!

ist wohl nirgendwo wahrer gewesen, als hier.

## Die oldenburgischen Deichbauten.

Von J. Ewald.

Zweiter Artikel.

Die wenigsten Familien übrigens waren so glücklich wie die des wackeren Amtsobersten, die doch keines ihrer Glieder einbüßte, und die auch bereits um den Mittag desselben Tages das Wasser in ihrem Hause wieder fallen sah. Der Prediger eines andern butzjägeri Dorfes, der mit den Seinigen gleichfalls auf den Hausboden geflüchtet war, sah dieselben in der bitteren Winterkälte bald nach dem nachgehenden Hunger ausgehungert. Zum Glück trieben ihnen die Wellen zwei Brode zu, mit denen sie ihr Leben fristeten, bis endlich am vierten Tage ein Boot zu ihrer Rettung herbei kam. Ein junger Bauer mußte vor seinen Augen Eitzen und Geschwister ertrinken sehen; er selbst rettete sich mit nackten Beinen auf ein Stück von dem Stroddache seines zusammenstürzenden Hauses und schwamm nun mit demselben fort. „Als es Tag wird“, heißt es in einer Beschreibung dieser fürchterlichen Fluth (Blätter vom Inhalts B. IV.) „merkt er aus den Kirchthürmen, die er hinter und vor sich erblickt, daß er mitten auf der Weser fährt. Der Wind treibt ihn bald nach dem Lande Wäbden (am rechten Weserufer), bald mit der Ebbe wieder nach der See hinab. Die Kälte wird indes unerblicklich; er wäre erfroren, hätte ihm die Welle nicht ein Stück Kleides zugeworfen, das er für seiner Schwester Rock erkennt und um die erstarreten Beine schlägt. Jetzt stößt sein Schiff an ein Stück des zertrissenen Wäbder Deiches. Er sammelt seine Kraft, springt herab und erreicht auch glücklich den Deichs högel. Aber auch hier sieht er ringsum nur Wasser und nicht fern von da einige Menschen auf Bäumen sitzend.“ — Erst am Abend wird der arme Mensch von einem Rettungsbote aufgenommen, und als man nun den Deich entlang fährt, gewahrt man plötzlich eine Person, wie die Erzählung es ausdrückt: „im äußersten Eend“, und erkennt in ihr die Schwester des Gerechteten, die auf eben die Art, wie ihr Bruder, mit einem Stück Stroddaches über die Weser geführt worden ist, und die nun gleichfalls dem Tode entfliehen wird. —

Grauvoll ist auch die Beschreibung, wie die Trümmer eines brennenden Hauses von Wind und Fluth getrieben, durch mehrere Dörfer fuhr, ohne daß es möglich gewesen wäre, den drei auf ihnen befindlichen, an Händen und Füßen jämmerlich verbrannten Menschen die erlöste Rettung zu bringen.

Solche Nothstände zwangen denn freilich, alle Einsicht und Thatkraft aufzubieten, um das unglückliche Land vor diesen immer wiederkehrenden Angriffen des Meeres zu schützen. Mühsam und Sehesteht arbeiteten daran mit vereinten Kräften und mit dem schönsten Erfolge, ungeachtet drei Jahre nach jener furchtbaren Calamität die damals neuangelegten Deiche durch die Neujahrsfluth vom J. 1721 zum größten Theile wieder vernichtet wurden, so daß man nothgedrungen zu einer Zurücklegung derselben sich entschließen mußte. — Sehesteht hat überdies noch das Verdienst, eine der schwierigsten Unternehmungen in der ganzen Geschichte des Deichbaues zu einem glücklichen Ende gebracht zu haben. An der östlichen Küste des Jähder Meerbusens nämlich stößt — eine Erscheinung, die sich sonst nirgendwo wiederholt — eine große Strecke Moorlandes unmittelbar an die See. Wahrscheinlich ist dasselbe durch die Fluthen von seinem eigentlichen Entstehungsorte abgehoben und danach fortgetrieben worden; ein Ereigniß, das wegen der überaus lockeren Beschaffenheit des Moores keineswegs zu den Seltenheiten gehört. Das in Rede stehende umfangreiche Stück nun ward an der Seeufer abgesetzt und lagerte sich dort dergestalt, daß es immer noch mit der Fluth flog und fiel, überall oder doch größtentheils des festen Untergrundes entbehrend<sup>\*)</sup>. Alle Versuche zur Verdrückung dieses Moordistriktes waren bis dahin vergeblich gewesen, bis Sehesteht's Energie und Standhaftigkeit jedes Hinderniß

<sup>\*)</sup> Man vergleiche damit Robt's Schilderung von dem schwimmenden Lande bei Walsburen in seinen „Nordwestdeutschen Sagen.“

endlich besetzte. Er ließ aus den lockeren Moorboden so viel f. g. Kleerde aufschütten, daß dieselbe vermöge ihrer eigenen Schwere sich senkte, jenen durchbrach und nun auf dem festen, sandigen Untergrunde ruhte, dem nach oben sich erhebenden Deiche eine breite und sichere Basis bildend. Wie mühevoll und kostspielig diese Arbeit war, davon kann man sich einen Begriff machen, wenn man erfährt, daß zur Herbeischaffung der Erde eigene Wege durch das Moor gebahnt werden mußten, aus Hohlen bestehend, auf welchen die Käder der Wagen und Erbkarren liefen, und einer Gaschnenunterlage für die Pferde. Man begann das Unternehmen im Jahre 1721, indem man von den Endpunkten der bereits vorhandenen, an das Moorland stoßenden Deiche zu bauen anfang und endlich nach vierjähriger, unausgesetzter Arbeit zusammenschloß, während doch die ganze Deichstrecke noch nicht völlig 20,000 Fuß Länge hat.

Werkwürdig ist, daß bei der Herstellung dieses Moordes schon eine jener massenhaften Arbeitseinstellungen vorkommt, wie sie in neuerer Zeit unter dem Namen „strike“ bekannt genug sind, die aber damals, d. i. wenn sie eben einen Ausbruch von Deicharbeitern bedeuteten, die Benennung „Lamey“ führten. Ueber die Etymologie dieses wunderlichen Wortes ist man noch im Unklaren. „Man hat vermuthet, daß dasselbe eigentlich heiße: „lat weien“ (d. i. laß wehen, die Aufrufnahme nämlich). Allein diese Erklärung schließt doch ihre Bedenken zu haben.“ (Olb. Gesellschafter 1857). — Der Zweck des Lameymachens war natürlich eine Lohnerhöhung, welcher Forderung die Arbeiter mit ihrem Hauptwerkzeuge, dem eisernen „Koperbaken“, den größtmöglichen Nachdruck zu geben suchten. Sehr scharf verordnete dagegen: Wer immer bei der Arbeit in Eile oder Ernst das Wort Lamey austrufe, solle sogleich gefangen nach Oldenburg gebracht und in die Kette geschlossen werden. Als einmal eine Kette aufreißerischer Deicharbeiter mit ihren Koperbaken den tapferen Admiral umringte, rief dieser ihnen zu, wer von ihnen etwas zu sagen habe, möge vortreten. Einer der Hauptadelsführer folgte dieser Aufforderung, ward aber von Sehrstedt mit einigen kräftigen Hieben seines Gehfokes begrüßt, und Keiser von Allen wagte darnach, dem einzelnen, unterwaffneten Manne gegenüber auch nur ein Wort wieder laut werden zu lassen.

Daß bei den ungeheuren Kosten, welche aus den Deichanlagen erwuchsen — der Moordelch allein verschlang 3. B. eine Summe von mindestens 850,000 Thalern, eine Ziffer, die bei dem damaligen höheren Stande des Geldes ebenfalls das Doppelte des heutigen Wertes beträgt — schon frühzeitig die Frage aufgeworfen ward: wer ist deichpflichtig? ist natürlich; ebenso natürlich aber auch, daß ihre Beantwortung an allen Enden Streit und Hader hervorrief. Zwar leistete die Landeskasse erhebliche Zuschüsse; allein, sie wurde so oft und so stark in Anspruch genommen, daß der

vorermähnte Graf Anton vom Kaiser Ferdinand II. im J. 1623 mit der Berechtigung zur Erhebung eines Schiffszehntes auf der Weser bei dem Hafenorte Eßfeldt besetzt wurde, nachdem er vorgestellt: daß er wegen der seltenen Untertanen durch schweren und täglichen Wasserbau, auch vielfältig erlittenen Wasserschaden verursachten Unvermögenheit (so er in seiner Rentekammer von Tag zu Tag mehr fühle und empfinde,) besagte Deiche im Stande zu halten nicht vermöge.“

Dieser Wehrgeld, der in der Folge zu unauslöschlichen Streitigkeiten mit den Bremischen Kaufleuten Anlaß gab, ist wirklich durch zwei Jahrhunderte erhoben worden. Als Äquivalent ward den oldenburgischen Grafen zur Pflicht gemacht, „die Dämme und Deiche sammt andern nothwendigen Wasserbauten zur Versicherung der Reichsgrenzen in gutem Wohlstande zu erhalten.“

Es erschien jedoch nicht mehr als billig, daß alle diejenigen Ländereien, welche den Schutz der Deiche genossen, zu den Kosten ihrer Erbauung und Erhaltung beitrugen. Nun aber erforderte ein Deich größere Summen, als ein anderer, der etwa der Richtung des herrschenden Windes parallel lief, mithin weniger der Gewalt von Wind und Wellen ausgesetzt war. Demnach hatten Grundstücke, welche dieses Vortheils sich nicht erfreuten, ungleich bedeutendere, ja oft unerschwingliche Deichlasten zu tragen. Sie und da ward auch ein Grundstück von seinem Eigenthümer willkürlich und zu Gunsten eines andern, das dadurch natürlich im Werthe stieg, mit Deichlasten überhäuft. Dann wieder gab es abtlge Ländereien, welche Deichfreiheit beanspruchten. — Kurz, Streitigkeiten und Prozesse nahmen kein Ende, und es macht förmlich einen komischen Eindruck, wenn auch für diese Deichangelegenheiten das hochweise Reichskammergericht zu Weslar als oberste Instanz fungirt. — Landesherliche Verordnungen bestimmten daher aufs Genaueste die Vertheilung dieser Lasten, indem sie den Grundsatz aufstellten: „Kein Land ohne Deich, kein Deich ohne Land“, und in Fällen dringender Noth, alle bis dahin Deichfreien, also auch die Abtlgen zu den Kosten heranzog. „Als nach der dänischen Besitznahme“, so wird uns berichtet, „eine im J. 1680 angeordnete Commission die Freiheiten der Abtlgen untersuchte, und diese ihre Briefe vorzeigte, wonach sie von Deichlasten befreit waren, so antwortete man ihnen ungefähr, was nach der Allerhöchstenfluch 1570 der Herzog von Altd als Gouverneur der Niederlande den friesischen Edelenten anzwortete, die auch ihre Freiheite vorzeigten: „„Hmme mit diesem euren Pergamente die Buch der Wellen, und ihr sollt frei sein!““ Nach den Bestimmungen des gegenwärtigen oldenburgischen Gesetzbuchs ist deichpflichtig zunächst alles Marschland, soann alles an die Marsch grenzende kultivierte Moor- und Gesland, welches 3 Fuß oder weniger unter der mittleren ordinären Fluthhöhe liegt, d. h. also alle diejenigen Ländereien, welche durch das etwa eins

brechende Wasser Schaden leiden könnten; — eine Bestimmung, die jedenfalls eine durchaus gerechte und angemessene genannt werden muß. „Die Deichlast“, so wird ferner verordnet, „ruht unablässig auf dem deichpflichtigen Lande und ist von demselben ungetrennlich.“

Wachsen, ehe die Befestigung diese wichtigen Punkte geregelt hatte, einem Grundbesitzer die Deichlasten zu unerschwinglicher Höhe an, so konnte er Gebrauch machen von dem f. g. Spadenrecht. Indem er nämlich seinen Spaten in das Grundstück stieß, ohne ihn wieder herauszugeben, gab er alle seine Rechte an jenes auf. Wer den

Spaten herauszog, trat dadurch in alle diese Rechte, übernahm aber dadurch zugleich alle mit ihnen verbundenen Pflichten und Lasten. So gaben um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Wälfser eine schöne Befestigung (Kodden) im Buriabingerlande auf, weil ihr Ertrag zu den Deichlasten in zu ungünstigem Verhältnis stand. Ein ausgedehnter Gebrauch soll auch nach der Weichmachtsfluth 1717 vom Spadenrecht gemacht worden sein. Kurz und schlagend teilt dieselbe Rechtsanschauung in dem Worte: „de nich wil dyken, mot wesen“ — der nicht will deichen, muß weichen — hervor.

## Kleinere Mittheilungen.

### Schwarze Ameisen in Afrika.

Zu den schlimmsten Feinden der Reisenden in tropischen Ländern gehören unfehlbar die Ameisen. Nicht genug wissen sie von der Zudringlichkeit dieser Thiere zu klagen, vor deren scharfen Zähnen weder Lebensmittel, noch Decken und Kleidungsstücke, noch Sammlungen sicher sind, und wenn sie noch so gut in Kisten und Koffern verwahrt wären. Dem berüchtigten *Seinr. Hart* trafen sie einmal die Decke, auf der er saß, unter dem Leibe weg. Noch empfindlicher sind ihre Bisse, wenn sie dem Körper des Reisenden selbst gelten. In Afrika räumen sogar die Eingeborenen vor einer besonders blässigen Wanderameise unzugänglich die Hütte, in welche sie auf ihren Jügen einküßt. Auch *Baron v. D. Dedek*, von dessen fähigen Wanderungen in Ostafrika neulich „die Natur“ eine gedrängte Skizze brachte, hat viel von diesem Feinde zu leiden gehabt und ihm manche schlaflose Nacht verdankt. Die Art und Weise aber, wie die Plage eines solchen Ameisen-Ueberfalls schildert, ist so drastisch, daß wir auch unsern Leser den Genuß dieser Schilderung nicht vorenthalten wollen.

„Löwen und Panther“, sagt er, „fürchten sich vor dem Menschen oder greifen ihn wenigstens nicht an, da sie ihren Hunger an den zahllosen Wildbeerden sättigen können; Elephanten, Rhinoceros und Flußpferde haben nichts Ungefährliches für den, welcher sie kennen gelernt; andre zudringliche Thiere lassen sich auf diese oder jene Weise verschrecken — wer aber vermag sich gegen wüthende Ameisen, Bienen oder Widen zu schützen? Nimmt eine Ameisenhaare ihren Weg über einen Lagerplatz, so muß der Herr der Schöpfung weichen und sich weit ab eine andere Stätte suchen, wenn er nicht noch rechtzeitig die Gefahr bemerkt und den Boden ringum mit glühenden Kohlen und heißer Asche fängt, um die vorhandenen Thiere zu vertilgen und neuankommende fern zu halten. Wehe dem, welcher Nichts ahnend, in die Richtung eines nächtlichen Ameisenzugs sein Bett aufgeschlagen: die schwarzen, hart gepanzerten Feinde von einem Viertel — bis zu einem halben Zoll Länge überlegen ihn am ganzen Leibe, kriechen in Kleider und Haare, in Nase und Ohren, ohne daß er etwas merkt. Wendet er sich aber ein wenig zur Seite und drückt dabei einige der bisher noch harmlosen Thiere, so fallen sie mit Ruch über ihn her und beißen, wie auf Commando, an tausend Stellen zugleich. Gesteht läßt der Schlaftrummer, betrachtet sich hier und dort, und wohn seine Hand gleitet, fühlt er harte, glatte Punkte auf der Haut. Unmittelbar nach der Verwundung aber senken sich in das Fleisch ein paar Jangen, welche sich weiter öffnen, als der Körper des Thierchens breit ist, und mit ungläublicher Kraft sich schließen und das einmal Gewadte festhalten. Da hilft nur Geduld, man darf die Wunde nicht vertieren und muß die verhassten Wesen eine nach der andern, so gut es eben geht, mit Finger oder Lothlösen,

ohne durch unglückliche Bewegungen die andern noch friedlich dahin wandernden gleichfalls zu grimmigem Angriff zu reizen.“

C. H.

### Condensirte Milch.

Seit einigen Jahren besteht in Gdam bei Zug in der Schweiz eine Fabrik, in welcher Milch zu einer Art von Extract verdichtet wird, aus welchem man durch Verdünnung mit der gebührenden Menge Wasser eine Flüssigkeit herstellen kann, die in Geschmack und Bestandtheilen der ursprünglichen Milch sehr nahe kommt. In Blechbüchsen aufbewahrt, erhält sich dieser Extract Jahre lang. Die vorjährige deutsche Nordpolarexpedition hatte sich mit solcher condensirten Milch versehen, und sie bewährte sich außerordentlich gut. Eine dieser Büchsen ist nach ihrer Wanderung durch das Polarmeer in meine Hände gelangt und hat mir bestätigt, daß die lange Zeit ihrem Inhalt nichts anzuhaben vermochte. In Nordamerika soll condensirte Milch schon seit längerer Zeit ziemlich allgemein in Gebrauch sein, und eine amerikanische Gesellschaft ist es auch, welche die Fabrik in der Schweiz errichtete. Da in dieser Milch alle für die menschliche Ernährung wesentlichen Bestandtheile erhalten sind, auch die, welche sonst bei der Aufbereitung verloren gehen, und da der einzige Zusatz im Zucker besteht, so ist wohl zu erwarten, daß sie auch in Deutschland, namentlich in den argeßen Städten, wo trotz aller Polizeiverbote fast nur noch gewöhnliche oder gar verfaulende Milch auf den Markt kommt, noch eine Rolle zu spielen vermag ist.

Die Fabrikation dieser condensirten Milch ist eine sehr einfache. Die an einem bestimmten Wochentage in die Fabrik gebrachte Milch wird sofort im kühleren Räume, in einem sogenannten *Baumum* Apparate, abgedampft, nachdem derselben die erforderliche Menge Zucker zugesetzt worden ist. Sobald die Milch die Consistenz eines dicken Honigs erreicht hat, wird sie in Blechbüchsen eingefüllt, welche luftdicht verschlossen werden. Solche Blechbüchsen fassen durchschnittlich 350 Cubikcentimeter oder dem Gewichte nach 400 bis 470 Gramm (24 bis 28 Loth) condensirter Milch. Liebig hat solche condensirte Milch untersucht und mit frischer verglichen. 10 Cubiccentimeter frischer Milch hinterließen 0,987 Grm. Asche; die gleiche Menge condensirter Milch lieferte 3,03 Grm. Asche. Demnach enthält 1 Liter condensirter Milch die festen Bestandtheile von 4,43 Liter frischer Milch. Der Wassergehalt betrug durchschnittlich 22,44 Proc. Von der festen Substanz der condensirten Milch kommt nahezu die Hälfte auf den zugesetzten Zucker, während der Zuckergehalt etwas über 10, der Milchzuckergehalt 18 Proc. beträgt. Eßt man den fürsorglichen Extract in der 4½ bis 5fachen Menge Wasser auf, so erhält man eine Flüssigkeit, welche kaum von frisch abgeseihter, mit etwas Zucker versüßter Milch zu unterscheiden ist.

C. H.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Viereckjähriger Subscriptionspreis 25 Sgr. (A. S. 50 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Schauer-Schubert'sche Buchdruckerei in Göttingen.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Kie und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 30.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetigke'scher Verlag.

**28. Juli 1869.**

Inhalt: Die Pflanzen am Nordpol, von Karl Müller. 1. Die Pflanzenformen der arktischen Zone. — Die Schmelztheorie, von Fritz Nagel. Dritter Artikel. — Die eldenburgischen Deichbauten, von H. Gwald. Dritter Artikel.

## Die Pflanzen am Nordpol.

von Karl Müller.

### 1. Die Pflanzenformen der arktischen Zone.

In einem Augenblicke, wo die Augen der Welt auf's Neue den Polarregionen des Nordens zugetichtet sind, dürfte es von besonderem Interesse sein, einmal einen tieferen Blick auf die arktische Flora zu werfen. Ich versuche dies um so lieber, als ein vollständigeres Bild dieser Zone noch gänzlich fehlt. Dieses Interesse steigert sich durch verschiedene Gesichtspunkte. Wenn man die Erde als zwei entgegengesetzte Vergleich betrachtet, so stellen die Polarländer deren Älpen system in waagrechter Richtung dar, weil sie die Scheitelpunkte dieser beiden Kugel, die Äquatorialzone ihr Fuß sind. In diesen Räumen können wir folglich von den ersten oder von den letzten Bürgern des Gemäßigten sprechen, je nachdem wir von dem Pole oder von dem Äquator ausgehen. Beides erregt das größte Interesse: im ersten

Falle, weil wir die Pflanzendecke gleichsam als den ersten Versuch irdischer Schöpfkraft unter den ungünstigsten Verhältnissen zu begreifen hätten, im zweiten Falle, weil wir ihn als den letzten beobachten, der, wenn man sich die Külle der vorausgegangenen Zonen vergegenwärtigt, der beste Maßstab für die Schöpfkraft aller Zonen ist. Das innere Leben der arktischen Pflanzen, soweit wir es überhaupt kennen, ihre Bedeutung für das animalische und menschliche Dasein sind zugleich derart, daß man ohne diese Kenntniss gar keine genügende Vorstellung von den gemäßigteren Zonen, die wir selbst bewohnen, erhält. Jedenfalls sind die Erscheinungen in dem hochnordlichen Pflanzenleben so frappant, daß sie schon um deswillen eine genauere Darstellung vollaus rechtfertigen.



Ich habe an einem andern Orte die ganze Zahl der auf der Erde befindlichen Gefäßpflanzen nach empirischem Maßstabe auf 344,500 Arten geschätzt. Dient man sich nun diese Zahl gleichmäßig über die Erde verbreitet, so müßte sich innerhalb des Polarkreises der 25ste Theil dieser Summe, müßten sich 13,780 Pflanzenarten vorfinden, weil die Polarzone als Aequatorschritt der Erde gerade  $\frac{1}{25}$  derselben beträgt; um so mehr, als das nördliche Polarland an vielen Stellen auch beträchtliche Gebirge besitzt, welche Raum genug für die verschiedensten Regionen bieten. Leider kennen wir die arktische Flora nur unvollkommen; so viel wir sie aber kennen, bleibt die wirkliche Zahl sehr weit hinter der theoretischen zurück. Es hat freilich seine großen Schwierigkeiten, die Linie festzustellen, von welcher man auszugehen hat, um nach dem Pole vorzudringen; weder der Polarkreis, noch die Baumgrenze, noch auch die Linie des ewigen Wobens-Eises und die Methernien gewähren eine feste Grenze für die Pflanzen der gemäßigten kalten Zone. Die Zählung derselben muß daher immer einer gewissen Willkür unterliegen; sie nöthigt uns geradezu, alle diejenigen Länders der zu berücksichtigen, die wir im gewöhnlichen Leben als arktische zu bezeichnen pflegen: Labrador, Hudsonien, den ganzen amerikanischen Polar-Archipel, Grönland, Island, Spitzbergen, Lappland und das arktische Sibirien. Freilich klingt es sonderbar, wenn man ein Land wie Labrador, das zwischen 50 bis 60° nördl. Breite liegt, aufnimmt; allein es ist eben Thatsache, daß hier für den Sommer der relativ kälteste Punkt unser Halbkugel ebenso liegt, wie im grönländischen Meere; eine Thatsache, die wir tief genug empfinden, wenn uns Nordweststürme von jener Kälte mittheilen und unsere Sommertemperatur auf ein bedenkliches Minimum reduciren. Alle diese Länder befinden sich unter höchst ungleichen Wärmebedingungen, welche ihre Ursachen entweder in einem continentalen und insularen Klima oder auch in dem warmen Golfstrom befigen, der unsere nördlichen Küsten bis Spitzbergen heizt. Es ziehen sich folglich eine Menge von Pflanzen weit nördlicher, als man das der Lage ihres Wohnortes nach vermuthen sollte, und das gestattet keinerlei Zusammenverhalten der Polar- und arktischen Zone. Dies Alles muß man berücksichtigen, wenn man die mühsame Arbeit nicht scheut, die bisher in jenen Ländern beobachteten Pflanzen in eine gemeinsame Liste zu bringen. Ich habe dies gethan und gegen 1100 Arten erhalten, welche der kalten Zone ihren Charakter ausdrücken. Sagen wir diese Zahl auch auf 1500 Arten, indem wir von den späteren Forschungen noch einen beträchtlichen Zuwachs erkennen, so beträgt sie doch von den 13,780 erschlossenen Arten nur  $\frac{1}{9}$ . Diese Zahl ist um so kümmerlicher, als in den 1500 Arten nicht allein die polare, sondern die ganze arktische Zone inbegriffen ist. Denn vielleicht übersteigt die Menge der innerhalb des Polarklimas wachsenden Pflanzen nicht 500 Arten; eine Zahl, welche höchst auffallend mit einer andern von Swaid

Heer für die alpine Region der Schweiz gefundenen stimmt, die sich auf 300 Arten beläuft. Ich zähle bis heute überhaupt nur 528 alpine und nördliche Arten.

Eine solche Pflanzenarmuth entspricht zwar ganz den dürftigen Schöpfungsbedingungen der Polarzone; dennoch bleibt sie überaus selten. Denn, wie unter der Heer'schen Zahl sich 158 Arten auch in Norddeuropa oder in den Ebenen des Cantons Zürich finden, ebenso wenig gehören die auf 500 Arten geschätzten Polarpflanzen ihrer Zone ausschließlich an. Unter ihnen kommt etwa die Hälfte auch in Mitteleuropa vor, und einige andere Arten ziehen sich mindestens in die subarktische Zone. Wenn wir daher einmal für die nördliche Polarzone gegen 200 ihr eigenthümliche Pflanzenarten zählen sollten, so dürfte dies das Äußerste sein, was man in jener Zone zu erwarten haben könnte. In der That habe ich die große Zahl von gegen 1100 Pflanzen selbst für die ganze arktische Zone jenseits des 60. Breitengrades nur durch die Aufnahme von Island und Lappland gewonnen. Jenseit reicht sich mit 402, dieses mit 686 Arten ein; und obgleich beide Länder eine Menge von Arten gemeinsam mit dem hohen Norden besitzen, so erscheinen sie doch in der arktischen Zone geradezu wie deren Süden; und das um so mehr, als sie, besonders Lappland, eine Menge von Gmüchsen offenbar aus Europa bezogen haben, ja, wahrscheinlich noch beziehen.

Das geht Vermuthung nicht auf leeren Annahmen beruht, geht einfach aus den Zahlenverhältnissen der einzelnen Landstriche hervor; die Abnahme nach dem Pol ist auffallend. Wenn ganz Lappland unter der Breite von 64 bis 69° noch immer 686 Arten zählt, so sinkt diese um Quichod unter 67°3' n. Br. und 35°20' s. L., wie N. J. Andersson schon 1846 in seinem Ueberblick der Lappländischen Vegetation nachwies, auf 339 herab; eine Zahl, die durch spätere Entdeckungen auf etwa 350 stieg. Bei 68°36' n. Br. und 20°18' s. L. sammelte der als Botaniker und Zoolog gleich merkwürdige Pfarrer Lästadius um Karelsuando, wie uns Martin mittheilt, eine Liste von nur 141 Arten. Auf Spitzbergen dagegen, einer Inselgruppe, die zwischen 76°30' und 80°50' n. Br. gleichsam den äußersten Pösten Europa's gegen den Nordpol darstellt, sammelte man bis auf Ralmgren nur 93 Gefäßpflanzen, von denen 69 Arten auch in Estlandviken, 28 andere sogar bis Frankreich vorkommen, während Deutschland 37 davon kennt, und alle übrigen entweder im arktischen Amerika oder im arktischen Sibirien und auf Novaja Semlja verbreitet sind. Und doch ist Spitzbergen mit 1400 □ M. nur sehr wenig kleiner, als das schwedische, norwegische und russische Lappland zusammengenommen. Verglichen mit der Schweiz, tritt das Verhältniß der arktischen Zone zu der gemäßigten in seiner ganzen Dürftigkeit auf. Denn die Schweiz besitzt nach meiner Zählung auf 734 □ M. etwa 2374 gute Arten an einheimischen und eingebürgerten Pflanzen, so daß das doppelt größere Spitz-

bergen der Wirklichkeit nach 25 Mal, der Berechnung nach aber 50 Mal ärmer an Pflanzen ist, obgleich es ein Bergsland so gut, wie die Schweiz genannt werden muß. Noch ungünstiger wird das Verhältniß, wenn man sich östlich von Spitzbergen nach der Scheidungslinie des europäischen und asiatischen Eismeres, nach *Novaja Zemlja* wendet. Diese Insel ist gegen 4000 □ M. groß, und doch fand v. Baer nur 30 Phanerogamen, obgleich wir uns hier nur zwischen 71°—73° n. Br. bewegen. Dafür ist aber auch die Insel wegen der Nähe des arktischen Eiseslandes und des vielen Treibeises entschieden kälter als Spitzbergen. — Auf der westlichen Seite tritt kein anderes Verhältniß ein. Die verschiedenen Sammlungen, welche wir aus hohen Breiten von einzelnen Orten empfangen haben, bestehen immer aus einer kleinen Anzahl von Arten. So lieferte die *Melville-Insel* gegen 74°—75° nördl. Br., als Robert Brown die von Kap. Parry mitgebrachten Pflanzen bearbeitete, 67 Gefäßpflanzen, und Dr. Hayes brachte von seiner berühmten Nordpolfahrt nur 53 Arten zurück, die er zwischen 78°—82° n. Br. gesammelt hatte. Als Kane zurückkehrte, bearbeitete Durand seine Pflanzensammlungen von der Westküste Grönlands (bis 80°), welche etwa 106 Arten betrug, im Zusammenhange mit allen bis dahin auf Grönland gesunden Arten und setzte deren Zahl auf 284 in 109 Gattungen und 36 Familien. Später freilich setzte J. Lange in Kopenhagen die Zahl auf 320 in 32 Familien; allein dieser Unterschied kommt bei dieser Gelegenheit nicht in Betracht. Man kann über den Pflanzereichtum eines so eissigen Landes, wie Grönland ist, ersäunern; doch erklärt er sich einfach durch den Süden des Landes, wo am 60° n. Br., oder von Kap Farewell bis Sukkertoppen, ein ungleich milderes Klima als im Norden herrscht. Aber schon wenige Grade nördlicher als Sukkertoppen scheiden sich bereits nach Durand 8—10 Familien aus, und von Upernavik an, d. h. von 73° N. bis zum Ausfluß des Smithsundes, gibt es nur noch zwanzig Familien. Selbst die größte Zone, welche jemals in den arktischen Regionen an einem bestimmten Orte bei 74° N., nämlich von Middelboerff im Laimor-Lande, der nördlichsten Spitze Sibiriens, gemacht wurde, belief sich nur auf 124 Phanerogamen. Und doch herrscht für dieses Nordkap Sibiriens dasselbe Gesetz, was auch für Lappland gilt, daß es nämlich, wie dieses mit dem gemäßigten Europa zusammenhängt und von diesem einen großen Theil seiner Pflanzen empfängt, einen höchst beträchtlichen Antheil, 80 Arten, mit dem Gebirgszuge des Altai theilt. Sonst kommen von den 124 Arten auch 90 im arktischen Europa, auf Spitzbergen allein 53, und 101 im arktischen Amerika vor, so daß v. Middelboerff nur 3 dem Laimorlande eigenthümliche Arten fand.

Es geht daraus nicht nur eine große Dürftigkeit der Polarflora, sondern auch eine außerordentlich große Uebereinstimmung ihrer einzelnen Theile hervor. Wäre das Polar-

land nicht so vielfach vom Meere durchschnitten, hinge es überall wie ein Continent zusammen, so würden wir es in der That wie einen einzigen Alpenstock betrachten können, der den Scheitelpunkt der nördlichen Halbkugel bildet. Ueberall ist der Aufzug seines Pflanzentopps derselbe; der geringe Einschlag ändert sich nur nach den Himmelsrichtungen, so daß wir uns den Topps, wenn er stets zusammenhinge, wie aus vier Theilen bestehend, vorstellen müßten. Der eine Theil, welchen man den skandinavischen nennen könnte, nimmt seinen Charakter von Nordeuropa an und bezieht seine Fäden aus ihm durch Vermittelung der nordenglischen Inseln über Island nach Grönland in westlicher, durch Vermittelung Lapplands und Spitzbergens in östlicher Richtung. Der zweite Theil könnte der uralische genannt werden. Dieser hat seine Wurzeln noch in dem östlichen Theile des vorigen, bezieht aber seine Hauptfäden aus dem Uralgebirge, welches das weitläufige Gefilde Samojediens wiederum in einen westlichen und östlichen Theil scheidet. Diese Fäden ziehen sich selbstverständlich bis nach *Novaja Zemlja*, vermischen sich aber wieder mit den Fäden eines dritten Theiles, welcher seinen Charakter von dem langen altaischen Gebirgsysteme erhält. Er müßte folglich der altaische Theil genannt werden, und dieser zeichet wahrscheinlich als der herrschende durch das übrige arktische Nordasien und sendet einen Theil seiner verbreitetsten Pflanzen bis nach dem östlichen Theile Lapplands (Ostmarken) und Spitzbergen, so daß sich in beiden Ländern skandinavische und sibirische Flora mischen. Die ganze westliche Halbkugel wird von dem vierten Theile erfüllt. Wahrscheinlich nimmt dieser einen dreifachen Charakter an, d. h. er wird an seiner westlichen Seite jenseits der Felsengebirge in dem ehemals russischen Amerika ein asiatisches, dießseits der Felsengebirge durch Vermittelung Hudsons ein nordamerikanisches, an seinen äußersten Ostflanken ein europäisch-skandinavisches Gepräge annehmen, im Ganzen aber einen amerikanischen Ausdruck haben und der amerikanischen genannt werden können. Diese vier Theile müssen jedoch auch ihren Coincidenzpunkt besitzen, und dieser scheint, nach den von Kane aus den höchsten Breiten mitgebrachten Proben, ein selbständiger fünfter Theil zu sein, welcher gleichsam die Wälder der vier Abschnitte des arktischen Pflanzentopps zu einem Scheitelpunkte wie in einer Kapselform verknüpft. Es läßt sich annehmen — und das müßte gerade die künftigen Nordpolfahrten zur Entscheidung bringen — daß dieser Theil, den man den circumpolaren zu nennen haben würde, seinen Grundbestandtheilen nach völlig unabhängig von den übrigen Theilen sein und eine polare Flora bilden werde. Es ist ein Problem, dessen Lösung man mit Spannung entgegenzusehen hat, weil es sich dabei fragt, ob dieser Scheitelpunkt des arktischen Pflanzentopps sich wie der höchste Punkt eines Alpenpfeils verhalten, d. h. einen borealen Charakter haben, oder ob er, wenn ein eignes Polarmeer ein etwa vorhandenes circumpolares Land

gleich dem Golfstrome erwärmen sollte, ein australes Gepräge zeigen wie, wie die Proben Kane's vermuthen ließen.

Im Allgemeinen stimmt der arktische Pflanzenreichtum, seinem Auszuge nach, mit dem der nördlichen gemäßigten Zone überein. Nur fehlen der arktischen Flora, mit Einschluß von Island, Lappland und Labrador, 50 Familien dieser Zone: Berberiden, Cappariden, Resedaceen, Erikinen, Malvaceen, Ullaceen, Acerineen, Hippocaneen, Ampeliden, Balsamineen, Zygophyllen, Rutaceen, Celastrineen, Xeranthaceen, Gäßalpneen, Granaten, Philadelphern, Myrtaceen, Cucurbitaceen, Paronchiaceen, Cactaceen, Trillaceen, Loranthaceen, Ebeliaceen, Hippopitaceen, Ebenaceen, Aquifoliaceen, Diaceen, Jasminen, Asclepiaden, Apocynen, Convolvulaceen, Solanaceen, Verbenaceen, Acanthaceen, Globularaceen, Amarantaceen, Psittolaccaceen, Thymelaeaceen, Laurineen, Santalaceen, Ertineen, Trifoliolaceen, Juglandaceen, Burseren, Aroiden, Amarilliden, Dioscoreen und Marfiliaceen. Schon der erste Blick sagt uns, daß fast alle diese Familien mehr auf den Süden selbst in Mitteleuropa angewiesen sind, während auf die arktische Flora 84 Familien fallen, welche meist durchgängig die Hauptstämme für den nördlichen Pflanzenreichtum unserer gemäßigten Zone bilden. Ausnahme hiervon machen nur einige wenige, und diese überraschen allerdings in der arktischen Flora: Nymphaeaceen, Papaveraceen, Fumariaceen, Polygalaceen, Hypericaceen, Geraniaceen, Rineen, Draciden, Rhamneen, Pomaceen, Amygdalaceen, Tamaricaceen, Euboraceen, Scleranthaceen, Grolulariaceen, Umbelliferen, Caprifoliaceen, Valerianaceen, Corneen, Stellaten, Dipsacaceen, Pyrolaceen, Boraginaceen, Antirrhineen, Labiateen, Plumbaginaceen, Plantaginaceen, Chenopodiaceen, Polygonaceen, Eläagnaceen, Euphorbiaceen, Urticeen, Cuscutaceen, Myrticeen, Hydrocharideen, Potamoceen, Najadeen, Lemnaceen, Zephaceen, Orchideen, Zedaceen, Ullaceen (und Asparagaceen) und Colchicaceen. Diese Annäherung an einen südlichen Typus unserer gemäßigten Flora hängt fast nur von

Labrador, Island und Lappland ab, so daß diese Länder als der Süden der arktischen Flora betrachtet und mehr der kalten gemäßigten Flora zugezählt werden müssen. Darum ordnet sich auch das Verhältniß der arktischen Flora ganz anders, wenn man diese hinwegläßt. Dann empfangen wir, gegenüber den 84 Familien mit 323 Gattungen, nur 50 Familien mit 146 Gattungen.

Für die Physiognomie der Landschaft bleibt dieses Verhältniß im Ganzen ziemlich gleichgültig. Ob wir Labrador, Island und Lappland hinzunehmen oder abjählen, die Herrschaft bleibt doch bei denselben Familien und Gattungen, und das ist die Hauptfache, welche der nördlichen Pflanzendecke ihr Gepräge gibt. Groggräser, Gräser, Crucifereen, Saxifragaceen, Ranunculaceen, Rosaceen, Rhinanthaceen, Alineen, Salicaceen und Juncaceen sind und bleiben überall die herrschenden Formen, wenn auch die Zahlenverhältnisse sich wesentlich ändern, je nachdem man die südlichen arktischen Länder im Auge behält oder nicht. Unter den Gattungen stehen für beide Kreise in absteigender Zahl obenan: Carex, Salix, Draba, Saxifraga, Ranunculus, Pedicularis, Potentilla. Maßgebend für die Physiognomie der Landschaft aber sind überall: die grasartigen Pflanzen, Crucifereen, Alineen und Sileneen, Saxifragaceen; von den Gattungen: Draba, Ranunculus, Saxifraga, Carex und andere grasartige Formen, die sich dem Bilde zunächst nur als solche ausdrücken. An und für sich freilich ändert das Verhältniß oft zu Gunsten der Moosbedeckung. Dann ist diese Aufzug, alles Andere, selbst die Gräser, nur Einschlag, wie es auf den höchsten Alpen der Fall ist, wo die Grasnarbe der Moosbedeckung Platz macht. Selbst hinsichtlich der Arten geschieht es, daß oft nur eine einzige oft weite Strecken betrieft. In dieser Beziehung nimmt der arktische Moos (Papaver nudicaule) vielleicht den ersten Rang ein. Eine Dürftigkeit, die, wenn man mit ihr die Hüte der Tropengegenden vergleicht, einen Gegenlag zwischen Pol und Aequator setzt, wie er nicht größer gedacht werden kann.

## Die Schädeltheorie.

Von Fritz Nagel.

Dritter Artikel.

Nehmen wir den eigentlichen Faden unserer Darstellung wieder auf. Wir sahen, daß der Säugethierhädel, also auch der hier vorwiegend in Betracht kommende des Menschen, in seinem Gehirnteil aus drei Stücken oder Ringen besteht, von denen jeder aus fünf Strichen ursprünglich zusammengesetzt ist. Die Erkenntnis dieser Regelmäßigkeit in dem anscheinend so willkürlich gebauten Schädel war es, die zuerst sowohl Goethe als Den auf die Idee brachte, die der Schädeltheorie zu Grunde liegt ist. Die erste Spur dieser Idee bei Goethe ist wohl

in einem Briefe an Herder's Frau vom 4. Mai 1790 zu finden, worin er erzählt, daß durch einen merkwürdigen Zufall sein Diener auf dem Judenkirchhof zu Weidlich ein Bruchstück eines Thierschädels aufgehoben und ihm hingehalten habe, als wenn es ein Judenhädel wäre. „Ich habe einen großen Schritt in der Erklärung des Baues der Thiere gemacht“, setzte er hinzu. Dieser „große Schritt“ kann nur auf die Schädeltheorie gedeutet werden; denn als Goethe seine Entdeckung desselben im J. 1820 publicirte, sprach er es aus, daß er sie schon seit 30 Jahren klar erkannt

habe. Durch ein eigenthümliches Zusammentreffen von Umständen ist nun die Art, wie Ofen zu derselben Idee kam, ganz ähnlich. Auf einer Fußreise im Harz fand er im J. 1806 einen Rehschädel, und indem er ihn betrachtete, wurde ihm plötzlich die Idee klar, so daß er ausrief: Dies ist eine Wirbelsäule! Ofen aber, statt wie Goethe seine Entdeckung für sich zu behalten und sie im Stillen heranziehend auf eine passende Zeit zurückzuführen, publicirte sie im J. 1807. Nur umgab er dieselbe mit den damals fast unumgänglich gewordenen orakelnden Phrasen, was tief zu bedauern, denn er gab damit den Feinden einen Vorwand, das Ganze, das Rechte, wie den Füllterkaut, zu verwerten, und den Anhängern einen Anhalt zu noch weitergehenden phantastischen Hypothesen. Was konnte anders die Wirkung eines Ausspruchs sein, wie etwa dieses: „Der ganze Mensch ist bloß ein Wirbel?“ — Daß man Goethe später die Priorität der Entdeckung bestreiten wollte, ohne daß dies gelungen ist, sei hier nur beiläufig erwähnt; für unsere Zwecke ist diese Frage un wesentlich, wir halten uns an die Veröffentlichung Ofen's, in der die Theorie noch am klarsten ausgesprochen ist.

Ofen, nachdem er die von uns oben schon dargelegte Zusammensetzung des Gehirnschädels aus 3 Knochentringen näher erörtert, vergleicht jeden dieser Ringe einem Wirbel und spricht die Schädeltheorie damit aus; denn ihr ganzer Inhalt beruht darin, daß wie die Wirbelsäule, so auch der Schädel aus ringelnen Wirbeln bestehe. Jeder weiß, daß jedes Wirbelthier eine Wirbelsäule oder Rückgrat besitzt. In den meisten Fällen ist dies eine Säule, gebildet aus einer größeren Anzahl aufeinandergelegter Scheiben aus Knochenmasse (Fig. 3 wk); jede Scheibe aber trägt auf sich einen



Rückenmarkskanal.

Fig. 3. Querschnitt eines Rückenmarks.

knochernen Bogen, welcher aus vier Stücken besteht und gemeinsam mit der Scheibe einen Ring bildet, in welchem das Rückenmark sich befindet; die Scheibe nennt man den Körper des Wirbels, den Bogen bezeichnet man als oberem Wirbelbogen. Die Analogie mit dem Gehirnschädel lag nun sehr nahe. Das Gehirn, welches dieser umschließt, ist einfach eine Fortsetzung des Rückenmarks, das von der Wirbelsäule umschlossen wird. Was schien da natürlicher, als daß, wie das Umschlossene, so auch das Umschließende mit einander in einem ursprünglichen Zusammenhang stehe? Bis dahin war die Sache klar und hätte gewiß, wäre sie nicht weiter getrieben worden, keinen gegründeten Widerspruch erfahren. Ofen schon hatte in denselben Werken, in dem er die Schädeltheorie aufstellte, weitgehende Folgerungen

auf das eigentliche Wesen der sogenannten Gesichtsknochen gezogen. Er erklärte u. A. die Oberkinnlade den vorderen, die Unterkiefer den hinteren Extremitäten analog, und ging darin so in's Detail, daß er den Zwißhantkiefer den Händen, die Zähne aber den Fingern und Zehen verglich. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntniß ist das entschieden als falsch zu bezeichnen, nach dem jener Zeit war es eine ungerechtfertigte Phantasie. Anhänger von Ofen überrannten nach einer andern Richtung hin; sie wollten den ganzen Schädel in Wirbel auflösen, auch den Gesichtstheil, der doch mit dem Nervensystem nichts zu thun hat, und verlorien dadurch die Hauptstütze der Theorie, welche in der Gemeinsamkeit der Umschließung des Centralnervensystems von Seiten der Wirbelsäule und des Gehirnschädels beruht. Selbst Goethe schloß sich dieser den Thatsachen keine Rechnung tragenden Ausdehnung der Theorie an und bewies damit deutlich, wie selbst der größte Geist sich nicht über die Nothwendigkeit einer genau thatsächlichen Erforschung der Dinge hinwegschwingen kann, wenn die ihnen zu Grunde liegende Wahrheit erkannt werden soll.

Inbessin die neue Wahrheit machte ihren Weg trotz der Hindernisse von Geindes- und Feindesseite. Kam man auch nicht dazu, sie in einer ganz unanfechtbaren und Allen genügenden Form zu fixiren, gab es im Gegentheil fast ebenso viel verschiedene Auffassungen als Bekenner, so war denn doch der complicirte Bau des Schädels auf ein sehr einfaches Schema zurückzuführen, so abnte man doch auch in einer Sache, die zu den verwickeltesten zu gehören schien, ein geheimes Geheiß. In seiner unvergleichlichen Gabe, die Dinge und Gedanken in die passendste, handlichste Form zu gießen, hat Goethe auch in diesem Fall das Wesen dieser Theorie am besten charakterisirt, wenn er von ihr sagt: „Jedoch ein dergleichen Aperçu, ein solches Gewahren werden, Auffassen, Vorstellen, Begreifen, Idee, wie man es nennen mag, behält immerfort, man gebärde sich, wie man will, eine störrische Eigenschaft; im Ganzen läßt es sich aussprechen, aber nicht beweisen, im Einzelnen läßt es sich wohl vorgehen, doch bringt man es nicht rund und fertig.“ Die Ueberzeugung, welche zu dieser Zeit sich immer allgemeiner verbreitete, daß die organischen Wesen in Bezug auf ihren Bau in einem inneren Zusammenhang stehen, daß sie nicht willkürlich hingeworfene Getanken des Schöpfers seien, sondern daß in ihnen selbst eine tiefe Idee und Gesetzmäßigkeit walte, sie konnte durch nichts mehr gefördert werden, als durch die Schädeltheorie. Wir sind heute in der Lage, die Folgen zu würdigen, welche die Nothwendigkeit aus der Annahme eines inneren organischen Wesen zu Grunde liegenden Bildungsaufreßes sich ergeben mußten; denn wir sehen diese Folgen vor uns und können sie zusammenfassen als Erzeugung eines persönlichen Schöpfers durch die Annahme eines natürlichen Entwicklungs-

\*) Goethe, sämmtl. Werke in 40 Bdn. Bd. 36, S. 266.

ganges. Es ist der natürliche Weg des menschlichen Geistes, daß, wenn er an einem Punkte eines dunklen Gebietes einen Umland bemerkt, der die Möglichkeit an die Hand gibt, es zu erhellen, er auf allen Punkten darnach sucht; einmal auf eine Spur gebracht, kann ihn keine Macht der Erde davon abbringen, sie zu verfolgen. Dunkel war das Gebiet der Pflanzen- und Thierkunde, so lange man nur unzusammenhängende Produkte einer willkürlichen Schöpfungslaufe in ihnen sah, die man höchstens bewunderte als Zeugnisse einer unbefruchteten, unvergleichlichen Kraft und Weisheit; denn ward es aber mit der ersten Ahnung eines gesetzlichen Zusammenhangs in dieser trüben Masse, und daß die Schädeltheorie der kräftige und überraschend klare Ausdruck einer solchen Gesetzmäßigkeit ist, das ist für uns das Zeichen ihres Wertes. In diesem Sinne scheint sie uns noch immer eine Berechtigung auf unsere volle Beachtung zu haben, weil sehr sie auch von der fortgeschrittenen Wissenschaft überholt sei. Selbst grundsätzliche Gegner dieser Lehre, wie Cuvier, konnten nie behaupten, daß sie uns richtig sei, sie konnten höchstens an der Form tadeln, in der man sie bot. Als sie aber durch eine neue Richtung der Forschung ernstlich erschüttert wurde, gingen gerade aus den Erörterungen über sie neue Keime von Wahrheiten hervor. Sollte sie in der That der heutigen Wissenschaft nicht mehr lange genügen, dann werden wir uns erinnern, daß es nicht das Größte an einer wissenschaftlichen Wahrheit ist, daß sie ewig wahr sei, sondern, daß sie für eine Zeit, die ihrer bedurfte, wahr gewesen sei.

In der Zeit, welche auf die Entdeckung und Austretung der Schädeltheorie folgte, vertiefen sich die toben Wälder naturphilosophischer Richtung und zogen sich in die engen Betten reinerer Naturforschung zurück, aus welchen sie sich in die zwei stolzen Ströme ergossen, in welchen jetzt die vergleichende anatomische Wissenschaft dahin floß. Die alten Gegensätze, das Sein und das Werden, waren die Dräsen hinter verschiedenen Richtungen. Die vergleichende Anatomie erforschte den Organismus, wie er ist, die Entwicklungsgeichte, wie er wird, beide zwar mit stetem Bezug auf den Menschen, aber doch schon genug emancipiert, um ihren großen Stoff vorwiegend mit Rücksicht auf die ihm zu Grunde liegenden Gesetze zu behandeln. Für die Schädeltheorie waren diese Arbeiten von der größten Bedeutung; denn mit der größeren Menge der Fälle und ihrer genaueren Kenntniss mußte sich ja bald entscheiden, inwiefern sie als allgemeines Gesetz zu gelten berechtigt sei. In der That wiesen alle Thatfachen darauf hin, daß diese Berechtigung vorhanden sei; denn trotz der vielen, bisher ganz unerkannten Modifikationen des Grundtypus, welche besonders der Fischschädel aufwies, war doch die Einheit des Schädels und der Wirbelsäule in ihrem Grundplane nicht zu verkennen. So stark aber hier die Beweise dafür waren, den schlagendsten und triftigsten Grund konnte doch nur die Entwicklungsgeichte liefern. War die Einheit von Schä-

del und Wirbelsäule, welche die Schädeltheorie behauptete, vorhanden, so mußte sie sich jedenfalls am klaffen in der Entwicklungsgeichte aussprechen, hier mußte die später vielfach vermischte ursprüngliche Gleichheit noch rein und deutlich zu sehen sein. Freilich schien das endliche Ergebniss nicht zweifelhaft; denn wenn überhaupt ein Schluss vom dem Das Seienden auf das Werden Berechtigung hatte, so war es der, den die Schädeltheorie machte. Aber muß ja doch selbst der größten Wahrheit jede neue Stütze erwünscht sein; wie viel weniger konnte sich gerade diese noch gar nicht so allgemein anerkannte eines Beweises begeben, der entscheidend sein mußte, und den man schon sicher zu haben glaubte!

Die Thatfachen sprachen aber überraschend anders, als man gehofft hatte. Rathke, ein Forscher, dem die Entwicklungsgeichte eine große Reihe der werthvollsten Arbeiten verdankt, wies im J. 1839 nach, daß die Entwicklung des Schädels weit von der der Wirbelsäule abweicht. Er zeigte, daß in allen Wirbelthieren aus dem Ei eine Kanne sich bildet, die durch Zusammenknüpfen ihre Ränder sich zu einer Röhre schließt; diese Röhre wird zu Gehirn und Rückenmark und der Boden der Kanne und ihre Wände zu Wirbelsäule und Schädel; soweit ist die Einheit der Entwicklung gemahrt. Aber in dem Theil der die Röhre umgebenen Bildungsmaße, welcher die Wirbelsäule bilden soll, geht nun eine Zersplitterung in einzelne hinter einander liegende Abschnitte, die Wirbel, vor sich, während der Theil, welcher zum Schädel werden soll, nicht diese Segmentierung erfährt, sondern von ihr unberührt bleibt. Aus den Wirbeln entstehen die einzelnen Wirbel, die die Wirbelsäule zusammenlegen, und der hinterste der drei Knochenstübe, welche den Gehirnschädel bilden, nämlich der im Menschen zu einem zusammenhängenden Knochenring verschmolzene Hinterhauptsknochen. Aber die zwei vor ihm liegenden Stübe, nämlich der des hintern und vordern Keilbeins, entstehen nicht aus Wirbeln, sondern sind als eine zusammenhängende Knorpelmasse angelegt, in welcher erst mit der Verknöcherung eine Scheidung eintritt, und welche sich über den Gehirnschädel hinaus als dünne Lamelle, wie Fig. 1 es zeigt, bis in die Gegend der Nasenscheidewand erstreckt.

Hier ist offenbar keine Gleichartigkeit der Entwicklung zu sehen, und man muß es unumwunden anerkennen, daß in der Entwicklungsgeichte die Schädeltheorie keine Stütze findet. Folgt aber daraus eine Berechtigung, sie in ihrer Anwendbarkeit auf das fertige Thier zu leugnen oder auch nur zu beschränken? Wir nichten. Es ist eine bekannte, durch die vergleichende Anatomie der Wirbelsäule als sehr allgemein erwiesene Thatfache, daß die Wirbelsäule in sehr modificirter Form aufzutreten vermag. So, um nur ein Beispiel zu geben, ist der letzte Schwanzwirbel der Vögel zu einem von allen übrigen Wirbeln sehr verschiedenen Knochen geworden, welcher nur dazu dient, die Steuerfedern

des Schwanzes zu fügen. So ist in noch überraschender Weise der letzte Wirbel des Fisches durch Verschmelzung mehrerer Wirbel entstanden. Was hindert uns, anzunehmen, daß auch der Schädel ein derartig modificirtes Vorwärtende der Wirbelsäule sei? Oder vielmehr, welchen wissenschaftlichen Gewinn brächte es, auf die Thatfachen der Entwickelungsgeschichte hin die alte, scharfe Scheidung von

Schädel und Wirbelsäule wiederum aufzustellen? Das hieße die Wahrheitliebe bis zur Engherzigkeit treiben. Sind nun einmal die Thatfachen der vergleichenden Anatomie so, daß sie die Schädeltheorie zu ihrer Erklärung fordern, so sollte man die Thatfachen der Entwickelungsgeschichte mit ihnen in Uebereinstimmung zu bringen suchen, und das wird am besten in der eben angedeuteten Weise gelingen.

## Die oldenburgischen Deichbauten.

Von J. Ewald.

Dritter Artikel.

Je mehr die Sicherung des Landes gelang und je mehr der Deichbau von seinen ersten beiden Anfängen zur wirklichen Kunst sich entwickelte, desto mehr schritt man zur Eindeichung neu angeschwemmten Landes vor und trat so dem Meere gegenüber aus der Defensiv- gleichsam in die Offensive. Unauflöslich geht nämlich die Ausdeichung an geeigneten, d. h. vor dem herrschenden Winde geschützten Stellen vor sich. Die Fluten spülen den in feinerer Verteilung in ihnen aufgelösten Schlamm an die Küsten, bei jeder Ebbe einen Bodensatz zurücklassend, der unter günstigen Bedingungen, namentlich im Sommer, bei ruhigem Wasser, sich immer mehr ansammelt, die Consistenz und Beschaffenheit eines guten, fetten Tonens annimmt und jedem Marschbewohner unter dem Namen *Schlick* (plattdeutsch: *Süid*) bekannt ist. Der Mensch kommt diesem Naturprozeß zu Hülfe, indem er lange, aus Fässchen aufgeführte Dämme, Schlingen genannt, in das Meer hinausbaut. Diese Schlingen, indem sie die Gewalt der Wellen brechen — sie werden darum auch sehr passend Wellenbrecher genannt — schaffen ein ruhigeres Wasser, in welchem natürlich reichlicher und leichter ein Niederschlag des Schlicks erfolgt. Dieser neugebildete Boden heißt *Watt*, so lange noch täglich zwei Mal die Wellen ihn bespülen und er nur zur Ebbezeit trocken liegt. Salztrüter und Halbgäfer (*Salicornia maritima*, *Zostera marina*) sind die ersten Pflanzen, welche sich auf ihm ansiedeln. Ihre Wurzeln binden zur Befestigung des lockern Erdbereichs, ihre Blätter zerdrücken die dem Grunde nahen Wasserfässchen und geben somit Anhalt zu vermehrter Schlickbildung und zur ferneren Erhöhung des Wattes. — Es versteht sich, daß dieser Anmarsch nicht in regelmäßigem Fortschreiten vor sich geht, und daß ungünstige Witterungsverhältnisse denselben aufhalten, ja auch das ganze neugebildete Land wieder zerstören können. Allein mehrere aufeinander folgende gute, von besondern Sturmfluthen nicht heimgesuchte Jahre haben doch stets einen erheblichen Zuwachs zur Folge, wie denn z. B. zu Anfang dieses Jahrhunderts der damalige oldenburgische Deichcommissar Brandes (gest. 1834 als Professor der Physik zu Leipzig) an der östlichen Küste des Jadebusens für drei aufeinanderfolgende Jahre (1802 bis 1804) eine Erhöhung des Wattes um einen Fuß constatirte. — Hat nun das Letztere eine Höhe erreicht, welche diejenige gewöhnlicher Fluten übersteigt, so bedeckt sich dieser überaus fruchtbare jungfräuliche Boden schnell mit einer dichten Grasnarbe, und das also gebildete Vorland heißt *Gröden*. Aus Grödenland ist Eigenthum des Staates, nicht der betreffenden Privaten oder Communen, welchen

die angrenzenden Binnen- und Küstländer gehören. Zu einer Eindeichung schreitet man natürlich erst dann, wenn die Größe des gewonnenen Areals die Kosten und Mühen des Deichbaus verlohnt. Die Geschichte des oldenburgischen Regentenhauses weiß von vielen solcher Eindeichungen zu berichten; man rechnet, daß im Ganzen der durch sie ergielte Landgewinn 3 bis 6 Quadratmeilen betrage, so daß die oldenburgischen Grafen — „Herr der Reiche“ im eigentlichen Sinne — die Bezeichnung: „des heiligen römischen Reichs Baumeister an den Seekanten“, mit Fug und Recht als einen Ehrentitel tragen mochten. Freilich nimmt es sich selbstsam genug aus, wenn nach einer im J. 1574 vollendeten, besonders schwierigen Eindeichung, welche früher zu verschiedenen Malen mißlungen war, der oldenburgische Magister und Rector Beikeln in einer an den damaligen Grafen, Johann XVI. gerichteten De dieß Ereigniß mit folgenden überförmlichen Worten besingt: „Nun stauue man nicht mehr über die hängenden Semtsrambischen Gärten; nicht mehr rühme sich Memphis seiner wunderbaren Pyramiden, nicht Rhodus seines Colossus!“ Man sehe den Hohen (— so hieß der neu erdichtete Deich—) und rufe: „Graf Johann, du hast überwunden!“

Eine besonders wichtige Eindeichung ward unter dem Grafen Anton Günther vollendet. Durch die Ueberschwemmung vom J. 1511 nämlich war die Herrschaft Jever (der nordwestlichste Theil von Oldenburg) vollständig von dem eigentlichen Stammlande getrennt worden, so daß man, um nach Jever zu gelangen, das angrenzende Holfriesland passieren mußte. Diese Eindeichung nun vereinigte (im J. 1596) die beiden getrennten Landtheile wieder mit einander. Erstamter Weise wurde gegen diese Unternehmung von zwei Seiten Protest erhoben, und zwar zunächst von einem Grafen Duno von Holfriesland, sodann auch, durch ihn angereizt, von den Generalsstaaten der vereinigten Niederlande, denen Duno vorpiegelte, „daß dieses Werk nicht allein der Schiffahrt Holfrieslands, sondern auch der angrenzenden Länder Schaden stifte.“ Die Generalsstaaten wurden klugbar bei dem Reichskammergericht und drangen auf Sistirung dieser „zur Berstörung gemeinen Friedens gereichenden Arbeit.“ Die Sache jedoch blieb in aller Ruhe bei genanntem hohem Gerichtshof liegen, während die Eindeichung ihren ungehörten Fortgang nahm. Graf Anton Günther erhielt die Nachricht von ihrer Vollendung, als er gerade am kaiserlichen Hofe zu Prag sich aufhielt, und war darüber so erfreut, daß er dem Ueberbringer mit einem Geschenk von 200 Reichsthalern lohnte.

Diese Eindeichungen werden bis auf die neueste Zeit fortgesetzt und man schreitet zu ihnen, sobald ein Groben neben entsprechender Ausdehnung die erforderliche „Reise“ erlangt hat. Man rechnet, daß es zu der letzteren eines Zeitraumes von etwa 100 Jahren bedarf. Das Gegenstück zu den neuen Bedeckungen sind die sogenannten Einlagen, welche freilich auch oft genug nöthig wurden. Man versteht darunter eine Zurücklegung der Deiche in das Binnenland — gewissermaßen ein Preisgeben der Außenwerke einer Festung. Mehrere, besonders gefährdete Deiche haben zwei, drei und mehrere Male verlegt werden müssen, ehe man sie für ausreichend gesichert haben konnte. Denn selbstredend wird die Gewalt der Wellen desto mehr abgeschwächt, je größer das Vorland ist. Aus eben diesem Grunde läßt man auch den Fuß der Deiche, die sogenannte Berme, an der Außen-, d. h. der Fluß- oder Seeseite, in einem sehr spitzen Winkel gegen den Horizont verlaufen. Der eigentliche Deichkörper erhält natürlich eine steilere Böschung, doch steigt diese Dossierung wiederum an der Außenseite viel allmählicher auf, als an der Binnenseite, wo sie ziemlich plötzlich abfällt. Der ganze Deich, mit Ausnahme seines oberen, abgestumpften Theiles, der Kappe, die als Keil- und Fußweg benutzt wird, ist bedeckt mit dem für die Marschen charakteristischen, dichten, filzigen Rasen, und wo etwa biese Decke von den Wellen losgerissen oder durch Eisgang abgeschält wird, da beruht man sich die entstandene Lücke sofort durch anderweitig ausgeschogene Rasenstücke — Piaggen — die genau an einander gefügt werden, auszufüllen. — Die Höhe der Deiche variiert von 15 bis zu 30 Fuß; Höhe und Stärke wächst natürlich von den Fluß-, nach den Seeflächen zu in entsprechendem Maße. Zur möglichst großen Sicherung der Gerichte hat man an vielen, besonders exponirten Stellen Steindeckungen aufgeführt, welche ihren Zweck vortreflich erfüllen, zu ihrer Herstellung aber freilich auch einen enormen Kostenaufwand erfordern.

Für den Bau und die Instandhaltung der Deiche sorgt gegenwärtig eine eigene Deichbehörde, deren Vorstand noch heute den alten, kernigen Namen „Deichgräve“ führt. Außerdem hatte jede der vier im Herzogthum bestehenden Deichgenossenschaften — Deichbünde — als Vorstand einen Distrikts-Wasserbaubeamten, sowie eine Anzahl selbstständiger Aufschauwänner oder Deichgeschworne, welche im Verein mit den Verwaltungsämtern der betreffenden Bezirke fungierten. Von Seiten dieser vereinigten Behörden findet jährlich zwei Mal im Herbst und im Frühling eine Besichtigung der ganzen, ihrem Ressort angehörenden Deichstrecke — die Deichschauung, statt, damit bei etwa entstandenen oder drohenden Schäden sofortige Abhülfe und Gegenmaßregeln getroffen werden können. Das zur Ausbesserung eines beschädigten Deiches erforderliche Material an Erde oder Piaggen muß zunächst von den Außenländern entnommen werden. Erscheint aber die Erhaltung der letzteren durch solche Ausgrabungen gefährdet, so kann der betreffende Beamte das notwendige Material von den zunächst belegenen Binnenländern entnehmen lassen, ohne daß Ansprüche auf Entschädigung statthaft wären. In

Fällen der dringenden Noth, d. h. wenn ein Deichbruch wirklich eingetreten oder doch zu befürchten ist, verpflichtet das Gesetz jeden Theilhaber der Deichgenossenschaft zur Nothhülfe der ungesäumten persönlichen Hülfeleistung. „Jeder“, heißt es in der betreffenden Verordnung, „muß sich mit dem zur Arbeit nöthigen Geräth, also mit einem Spaten, der Zimmermann oder Tischler mit einer Art oder Säge, der Landmann mit Spannwerk einfinden.“

Läßt auch der heutige, gesicherte Zustand der Deiche der Hoffnung Raum, daß es zu dieser äußersten Anspannung aller Kräfte nur in sehr seltenen Fällen kommen werde, so zeigt doch diese Bestimmung im Verein mit allen hier angeführten Thatsachen, welcher Art die Kämpfe und Mühen waren, denen von Alters her die Bewohner dieser Gegenden sich zu unterziehen genöthigt waren. Hat nun aber unser Volk sich seinen Boden gebaut, so hat auch nicht minder der Boden sich sein Volk erzogen, — dies tropige, jähre Friesenvolk, welches sein Leben so mutbig gegen das Meer vertheidigte, wie seine Freiheit gegen die Fürsten, welche es knechten wollten. — „Es ist“, sagt Professor J. Erdmann in seinen „Psychologischen Briefen“, „das nie genug zu prelsende Verdienst des großen Schöpfers einer wissenschaftlichen Geographie — Karl Ritter — auf den engen Zusammenhang zwischen Landesbeschaffenheit und historischer Bestimmung eines Volkes aufmerksam gemacht zu haben, und dinstor kann eine philosophische oder gar pragmatische Behandlung der Geschichte diese geographische Basis nicht mehr aus den Augen lassen.“ Schlagen wir dürfte übrigens dieser Zusammenhang und diese Wechselwirkung sich selten nachweisen lassen, als in dem vorliegenden Falle.

Zum Schluß möge es noch gestattet sein, eines Dichters Ausspruches zu gedenken, der, unzählige Male als Citar angewandt, wohl als eins der „geflügeltsten Worte“ des deutschen Volkes gelten darf. In jenem merkwürdigen Buche, in welches Altmeister Goethe seinem eigenen Ausdruck nach, so viel „hineingeheimst“, hat, dem zweiten Theile des Faust, erwähnt eben dieser nämliche Faust, der Alles erlebt, Alles versucht, Alles gelitten hat, sich noch in hohem Alter, von Krankheit heimgesucht und bald erblindet, an dem Gedanken, das Ansehen auf „neuester Erde“ durch rastlose Arbeit zu ermöglichen:

„Da raste Fluth bis auf zum Rand,  
Und wie sie rascht, gewallam einzufließen,  
Gemeindrang eilt, die Räder zu verschließen.“

Fingerrissen von dieser Vorstellung ruft er dann aus:

„Nur der verdient die Freiheit und das Leben,  
Der täglich sie erobern muß!“

Es wird kaum einen Gebildeten geben, dem die zuletzt angeführte Stelle unbekannt wäre, Wenige aber werden ihren eigentlichen Zusammenhang kennen. Diesen letzteren wiederum in Anspruch zu nehmen für diejenigen, auf welche ursprünglich sich das Wort bezog, unsere deutschen „Meeresarbeiter“, war der bescheidene Zweck vorstehender Schilderung.



Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Meier und Dr. Karl Müller von Halle.

N 31.

(Mäxtester Jahrgang.)

Halle, G. Schwesfke'scher Verlag.

4. August 1869.

Inhalt: Die Farbe des Wassers, von Hermann Meier. — Bilder am Nordpol, von Otto Meier. Zweiter Artikel. — Das Kleid der Felsen, von Paul Kummer. Erster Artikel.

Die Farbe des Wassers.

Nach dem Holländischen des Dr. Modderman.

Von Hermann Meier.

Wer ein Handbuch der Geographie durchblättert und darin über das rothe, das weiße, das schwarze und das gelbe Meer, über den Drangefluß, den blauen Fluß und den Rio Negro (schwarzen Fluß) liest, könnte zu der Meinung gelangen, das Wasser könne alle möglichen Farben haben. Aber, wie man sagen, das weiß doch Jeder, daß Wasser keine Farbe hat; und daß die genannten Bezeichnungen eben so wenig buchstäblich zu nehmen sind, wie die des Rio de la Plata (Silberstrom) und die des Rio de Vinagre (Essigstrom). Doch sind beide Behauptungen: „Wasser hat keine Farbe“, und „Wasser kann verschiedene Farben haben“ eben so richtig, wie sie falsch sind. Es handelt sich nur darum, was man Wasser nennt, und auf welche Weise man es betrachtet.

Wasser, welches durch keine fremden Stoffe getrübt wird und ebenso wenig etwas enthält, das sich in der Auflösung befindet, mit andern Worten, das reine Wasser der Chemiker, sowie es durch sorgfältige Destillation gewonnen wird, ist in dünnen Schichten farblos und durchsichtig. Dasselbe gilt vom Regen- und guten Brunnenwasser, welches, obgleich im chemischen Sinne nicht rein, doch keine in Auflösung befindlichen Stoffe enthält, die ihm die Farbe geben. Hat Brunnenwasser in Karaffen und Gläsern eine sichtbare Farbe, dann enthält es aller Wahrscheinlichkeit nach für die Gesundheit schädliche Stoffe, und deshalb ist die erste Bedingung, die man an gutes Trinkwasser stellt, die, daß es farblos sei.

Deshalb ist an reinem Wasser in dünnen Schichten



keine Farbe wahrzunehmen. Aber beweist dies, daß das Wasser keine Farbe haben kann? Durchaus nicht! Denn diese kann ja so schwach sein, daß das Auge sie erst in dickeren Schichten wahrnimmt.

Dasselbe ist mit einigen andern Körpern der Fall, z. B. mit Fensterglas, welches in dünnen Schichten farblos zu sein scheint, aber sich grünlich zeigt, wenn man mehrere Scheiben auf einander legt. Aus physischen Gründen ist es unwahrscheinlich, daß es überhaupt vollkommen farblose Körper gibt. Diese sind ebenso sehr undenkbar, wie in der sittlichen Welt vollkommen parteilose Menschen. Sogar die Luft ist nicht durchaus farblos, wie solches das Blau des Himmels beweist, und das Morgen- und Abendroth verdanken wir, nach Forbes, dem Wasserdampf, der in gewissem Zustande gelbe und rothe Strahlen des Spektrums durchläßt.

Das Angeführte beweist, daß Wasser in dickeren Schichten eine Farbe haben muß, und tiefere Wasser, alle Meere und viele Landseen unterstützen dieses; doch ist dessen Farbe nicht mehr zu sehen, wenn man das Wasser in einem Glase und also in dünneren Schichten betrachtet.

Diese Farbe ist dennoch nicht bei allen Meeren und Seen dieselbe, ja, was mehr sagen will, bei demselben Wasser kann sie sehr verschieden sein. Letzteres weiß Jeder, der einen Tag am Meeresstrande verbringt hat. Die Beschaffenheit der Luft, die Art der Beleuchtung und der Standpunkt des Beobachters haben darauf einen nicht zu verkennenden Einfluß, und der unbeschreibliche Reiz des Anblicks der See ist theilweise gerade der unaufhörlichen Fintenabwechslung zuzuschreiben.

Welche Farbe hat nun das Wasser?

So lange die Gelehrten es wie die Seelente machten und das Wasser nur besahen, konnten sie sich über diese Frage unmöglich einigen. Jeder urtheilte nach den Gemäßen, die er gesehen hatte, und versuchte das Wahrgenommene durch Vermuthungen zu erklären; der Eine behauptete, daß das Wasser die rothen Lichtstrahlen durchlasse und die violetten, blauen und grünen zurückwerfe; ein Anderer nannte das Wasser blau bei zurückgeworfenem und grün bei durchfallendem Licht; ein Dritter behauptete, daß es durchaus keine Farbe habe, sondern einfach die Farbe des Himmels zurückspiegle. Alexander von Humboldt, der vielleicht von allen Naturforschern die meisten Gewässer gesehen und demnach die meisten verschiedenen Farben beobachtet hatte, äußerte sich, daß Alles, was sich auf die Farbe des Meeres beziehe, im höchsten Grade unsicher sei.

Dem berühmten Chemiker Bunsen gebührt die Ehre, dieser Unsicherheit ein Ende gemacht zu haben. Er schlug den einzigen Weg ein, der zum rechten Ziele führen konnte, nämlich den experimentalen. Eine gläserne Röhre mit schwarz gefärbten Wänden wurde an dem einen Ende mit einem Kork verschlossen und lothrecht in eine weiße Porzellan- oder Gipschale gestellt. Hierauf wurden einige Scherben weißen

Porzellan in die Röhre geworfen, und diese alsdann mit chemisch reinem Wasser angefüllt. Durch diese 7 Fuß hohe Wassersäule besehen, zeigten sich nun, bei hinlänglicher Beleuchtung, die Porzellan- oder Scherben in rein blauer Farbe. Mochte er die Säule kürzer und kürzer, so wurde die Farbe in demselben Maße schwächer, bis sie endlich gar nicht mehr zu sehen war. Diese Probe, auf welche die Farbe des Himmels keinen Einfluß haben konnte, ist nur durch die Voraussetzung zu erklären, daß reines Wasser in dicken Schichten das Licht mit blauer Farbe durchläßt. Sie ist durch andre Naturforscher, theils auf gleiche Weise, theils modificirt wiederholt worden und zwar stets mit gleichem Erfolge.

Daß hiermit eine feste Basis für die Erklärung der verschiedenen Farben der natürlichen Gewässer, die sämtlich feste Stoffe und Gase in Auflösung enthalten, gegeben ist, bedarf keines Beweises. Man hat nur noch zu untersuchen, welchen Einfluß die aufgelösten Bestandtheile auf die Farbe des reinen Wassers haben. Vor der Bunsen'schen Probe tastete man nur im Finstern, da es unmöglich war, mit einiger Sicherheit aus den Farben der durch verschiedene Stoffe verunreinigten Seen auf die reinen Wasser zu schließen.

Es gibt wenige natürliche Wasser, welche die unsprünghlich blaue Farbe behalten haben. Zu diesen gehören der Genfersee in der Schweiz, der Adense in Tirol und der Bufen von Neapel. Diese blauen Gewässer, die an den tiefsten Stellen mit einer Indigoauflösung wettelfern, haben zu allen Zeiten die Bewunderung der Touristen erregt. Es hat natürlich nicht an allerlei gewagten Vermuthungen gefehlt, um diese am Wasser selber wahrgenommene Farbe zu erklären. Bunsen's Experiment hat diese Frage auf den Kopf gestellt. Denn es bedarf jetzt keiner Erklärung mehr, warum der Genfer See blau ist, sondern warum die meisten andern Wasser dies nicht sind.

Es liegt die Vermuthung nahe, daß Wasser, die eine andere, als die blaue Farbe besitzen, einen färbenden Stoff in Auflösung enthalten, der die natürliche Farbe des Wassers modificirt. Nun sind bei weitem die meisten der großen Wasserflächen, von grünllicher Farbe (seegrün), und wir dürfen deshalb ferner schließen, daß der färbende Stoff in der Regel ein gelber sein muß. Denn gelb und blau bilden bekanntlich grün.

Die Untersuchungen von Wittstein und Andern haben diese Vermuthung bestätigt.

Außer einer Anzahl Salze, von welchen das Kochsalz, der Gips und der doppeltkohlensäure Kalk die vorzüglichsten sind, und einigen Gasen (Kohlensäure, Sauerstoff und Stickstoff) enthält das meiste natürliche Wasser organische Stoffe in Auflösung. Unter den Gasen gibt es keine, das auf die Farbe des Wassers Einfluß hätte, und die wenig gefärbten Salze, deren Vorhandensein im Seewasser nachgewiesen ist, sind darin in so reichlich geringem Quan-

itäten vorhanden, daß sie eben so wenig die Farbe merklich modificiren können. Anders ist es mit den organischen Bestandtheilen des Wassers. Von diesen haben die sog. Humussäuren, die durch die Verwesung von Blättern, Wurzeln und vielen andern organischen Theilen entstehen und also keinem Boden fehlen, der lebendige Vegetation hatte, eine dunkelbraune bis schwarze Farbe.

Ueberall nun, wo natürliche Gewässer reich an Pflanzen sind oder in Berührung mit Erbschichten kommen, in welchen Pflanzen lebten, werden sie Gelegenheit haben, Humussäuren aufzunehmen. Sie werden dies besonders thun, wenn sie Alkalien enthalten. Denn einige Humussäuren lösen sich im Wasser nur dann auf, wenn sie an Alkalien gebunden sind oder diese im Wasser antreffen.

Nach den Untersuchungen von Wietstein enthalten nun alle Wasser, welche die natürliche blaue Farbe behalten haben, wenig oder gar keine Humussäure.

Letzteres ist seiner Ansicht nach nicht eine Folge des Mangels an Humussäuren in dem Boden, über welches sie fließen, sondern eine Folge ihrer Armuth an Alkalien. Etwas reicher daran sind die See'n und Meere blaugrüner oder grüner Farbe. Die organischen Stoffe sind darin in solcher Quantität vorhanden, daß das Wasser, wenn es selbst keine Farbe hätte, dadurch hügelig bis gelb gefärbt werden müßte. In Verbindung mit dem natürlichen Blau erzeugt dieses Gelb eine grünlische Farbe. Nimmt die Quantität der aufgelösten organischen Stoffe zu, dann tritt das ursprüngliche Blau in gleicher Weise zurück. Die Farbe des Wassers wird statt grün gelb, statt gelb braun und endlich sogar schwarz werden. Letztere Farbe bemerkt man an allen Gewässern in moorigen Gegenden, z. B. am Rio Negro in Amerika.

Ist diese Erklärung Wietstein's richtig, dann wird chemisch reines Wasser in dem oben genannten Apparat von Bunten die erwähnten Farben durchlassen müssen, wenn man humusfreie Alkalien in steigenden Quantitäten hinzusetzt. Die Untersuchungen von Veeg haben dies bestätigt. Es zeigte sich ihm, daß kleine Quantitäten Carthenerauflösung schon im Stande waren, das Blau in Gelbgrün zu verändern. Durch größere Mengen nahm das Wasser erst eine hell-, dann eine dunkelbraune Farbe an.

Noch zwei Umstände wirken häufig bedeutend auf die Farbe des natürlichen Wassers ein. Bei nicht gar zu tiefem, aber hellem Wasser wird die Farbe des Bodens zur Geltung kommen, während bei trübem Wasser die Farbe größtentheils, wenn nicht ganz, von dem trübenden Stoff abhängen wird. So hat die im Allgemeinen grüne See über Sandbänken eine hellgrüne, zuweilen sogar gelbliche Farbe, während eine schwarze Farbe auf einen kieselartigen Untergrund hinweist. Aber die Farbe des Seewassers verändert sich nicht nur mit der des Bodens, sondern auch plöglche Abwechselung der Tiefe wird von großem Einfluß sein. Denn die Farbe des Bodens wird in untiefem Wasser stär-

ker durchscheinen, als in tiefem. Daher die ziemlich allgemeine wahrgenommene Erscheinung, daß See'n und Meere in der Mitte andere Tinten haben, als in der Nähe des Landes. An den Ufern und anderen untiefen Stellen ist die Farbe des Wassers nicht selten röthlich gelb. In diesem Falle braucht der Boden nicht gerade diese Farbe zu haben; sogar weißer Sand und weiße Steine können diese Erscheinung erzeugen. Einige Bodenarten, die im trocknen Zustande weiß erscheinen, nehmen nämlich durch Befruchtung mit Wasser eine rothgelbe oder fleischrothe Farbe an. Ihre Oberfläche scheint dadurch die Eigenschaft zu erhalten, vorzugsweise die rothen Lichtstrahlen zurückzuwerfen.

Trübe Wasser zeigen gewöhnlich die Farbe des trübenden Stoffes. Denn da diese letzteren die Lichtstrahlen verhindern, bis zu einer nennenswerthen Tiefe in das Wasser zu bringen, so hat die ursprüngliche blaue Farbe des Wassers hier im Ganzen keinen Antheil mehr an der schließlichen Farbe. So verdanken der gelbe Fluß und der gelbe See in China ihrer durch den Namen ange deutete Farbe einem gelben Schlamm, welchen ersterer in den letzteren trägt. Im Allgemeinen sind die meisten Flüsse trüb, der mehr oder weniger getheilten Erdbarten wegen, die sie aus den Gebirgen mitführen. Freilich setzen sie solche auf ihrem Wege nach der See theilweise ab, aber der feinste Schlamm lagert sich meistens erst in dem Schooß des Ozeans. In den Mündungen der Ströme sind die verunreinigten Stoffe zum Theil schon so fein, daß das Wasser, wenn es auch Monate lang flüßiganden hat, nicht klar wird.

Die natürliche Farbe des reinen Wassers ist also nur ausnahmsweise bei Flüssen wahrgenommen. Im Oberlauf ist dies noch möglich, aber je mehr die Flüsse sich der See nähern, desto stärker werden die fremden Stoffe, wegen des stets zunehmenden Grades von Vertheilung, die Farbe des Wassers ändern und bald diese ganz bestimmen. Hängt nun die Farbe des Flußwassers von den trübenden Stoffen ab, so wird die Farbe und Art dieser letztern natürlich durch den Boden bedingt, über welchen das Wasser strömt. Wo zwei Ströme zusammenstreffen, da ist fast immer eine scharfe Trennung der Farben wahrzunehmen. So ist das Wasser der Mosel von röthlicher Farbe als das des Rheins, und nach der Vereinigung beider Flüsse bei Koblenz bleibt dieser Unterschied noch längere Zeit sichtbar. Ja, nach heftigen Regengüssen in dem roten Sandsteingebirge, welches die Mosel in ihrem Oberlauf durchschneidet, kann man sogar die Remagen und Rolandstedt zweierlei Farbe am Rheinwasser unterscheiden. Bei Passau vereinigen sich drei Flüsse. Die dunkle, beinahe tintenschwarze Ilz (gefärbt durch moorigen Boden) und der schmutzig-weiße Inn verbinden sich hier mit der gelbgrünen Donau. Von den reizenden Höfen am Passau sieht man die drei verschieden gefärbten Gewässer nach ihrer Vereinigung noch längere Zeit neben einander dahinfließen.

Aus dem Mitgetheilten geht hervor, daß die beiden Sätze: „Wasser hat keine Farbe“ und „Wasser kann verschiedene Farben haben“, bis zu einer gewissen Grenze sich vertheiligen lassen, ja, daß man noch einen dritten hinzufügen kann: „Wasser hat eine blaue Farbe“. Ist der letztere der am meisten wissenschaftliche, so fällt die Wahrheit des ersteren im täglichen Leben zumist in's Auge, die des zweiten dem Reisenden. Schließlich sei noch bemerkt, daß die Benennungen der Gewässer nach Farben zwar oft, aber nicht immer passend sind. So trägt z. B. der Golf von Kalifornien nicht mit Unrecht den Namen der Innereesee, wegen der rothen Farbe, die ihr untriefes, klares Wasser dem mit Korallenriffen reich besetzten Boden zu danken hat. Dahingegen heißen das weiße, schwarze und rothe Meer

nicht die Farben, die ihre Namen andeuten. Hinsichtlich des letzteren Gewässers ist es allerdings wahr, daß das Wasser an einigen Stellen dann und wann eine blutrothe Farbe annimmt. Der berühmte Ehrenberg hat diese Farbe zwischen dem 11. Decbr. 1833 und dem 5. Januar 1834 viermal im Hafen bei Thor, nicht weit vom Berge Sinai, wahrgekommen. Die kurzen Wellen der ruhigen See spülten eine blutrothe, schleimige Masse an den Strand, die sich bei der Untersuchung als eine unzählige Menge von Seeegewachsen zeigte.

Auch in andern Meeren bringen große Anhäufungen von Pflanzen und Thieren oft Farbenveränderungen hervor, die dem Seemann schon in weiter Entfernung in's Auge fallen.

## Wälder am Nordpol.

Von Otto M. v.

Zweiter Artikel.

Auch die schwedische Expedition des vorigen Jahres hat so wenig ihr Ziel erreicht, als die deutsche. Sie ist weder zum Pole, noch über jenen Eisgürtel hinausgelange, der noch allen Polarfahrern im Norden Eisbergens den Eintritt in das unbekannte Polarbecken verwehrt. Aber sie hat durch die reichen Sammlungen, die sie heimbrachte, viel Großes geleistet und den Horizont unseres Wissens viel mehr erweitert, als wenn sie uns mit der Nachricht beglückt hätte, daß sie wirklich an dem Punkte der Erde gestanden habe, den man den Nordpol nennt. Unter den mitgebrachten Naturschätzen befinden sich über 2000 Stück vorweltlicher Pflanzentreste, welche Osvald Heer Gelegenheit gegeben haben, uns ein Bild der reichen Polarvegetation in der Vorzeit zu erschließen. Es waren besonders zwei Punkte, welchen die schwedischen Forscher eingehende Aufmerksamkeit gewidmet hatten, die Vänerinsel und die Fjörde Westfjörgegens. Die kleine Vänerinsel ist ein Hochland mit zahlreichen kleinen Seen und von unzähligen Steintümmern übersätet. In dieser Einside hat ein Mensch, der Norweger Tobiasen, seine Hütte aufgeschlagen und lebt hier bereits seit Jahren von den Thieren des Meeres und den Vögeln. Letztere erfüllen im Sommer die Luft stellenweise völlig und bedecken die Felsabfälle der Küstenberge dermaßen, daß sie wie besneit erscheinen. Es sind besonders Möven- und Entenarten, welche im Sommer in ungeheuren Scharen nach Norden ziehen und auf diesen Felsen brüten, im Herbst aber wieder sich dem Süden zumenden. Diese reiche Thierwelt bildet einen merkwürdigen Contrast zu der überaus dürftigen Vegetation, deren wenige krautartige Gewächse nirgends eine grüne Decke zu bilden vermögen. Dafür ruht aber im Boden dieser Insel eine verfeinerte üppige Pflanzenwelt der Vorzeit.

Eisbergens, das in diesen Blättern bereits früher aus-

föhrlich geschildert wurde, ist ein Land von der doppelten Größe der Schweiz. Große Fjörde greifen aus der Westseite tief in das Innere des Landes ein, großen Landstrich gleich von den hohen Bergen umschlossen, die rings vom Meere aufsteigen. Mächtige Gletscher reichen in alle diese Fjörde hinab, steil abfallend und in unzählige Fäden zerpalten, von denen beständig sich ablösende Bruchstücke als Eisberge dem Meere zuschwimmen. Einzelne dieser Fjörde, wie namentlich der große Eisfjord, zeigen an ihrer Südseite geschützte Stellen, an denen kleine Colonien schönblühender Alpenpflanzen in den Moostepich eingeschoßen sind. Da sieht man die rothen Rassen der Silene acaulis und blaue Polemonien, die Felsen von violetterm Steinbrech garnirt, und zwischen den Steinen die weiße Droas und die nordischen Robn; selbst der Anflug einer Grasskur zeigt sich an einigen Stellen. Aber die reichere Fior deckt auch hier wieder das Gehirge in den versteinten oder versteinerten Ueberresten der Vorzeit. Auch aus diesen Gäßern, wie aus denen der Vänerinsel, hat Osvald Heer uns Landschaftsbilder vergangener Zeiten geschaffen.

Folgen wir den Forschungen Heer's, so tritt uns schon zur uralten Steinkohlenzeit auf der Vänerinsel ein Gestalt entgegen. Die von den Naturforschern der schwedischen Expedition, Nordenfjöld und Malmgren, gesammelten Pflanzen, die theils in der dortigen Kohle selbst, theils in den sie umgebenden Gesteinen gefunden wurden, gehören sogar der untersten und ältesten Abtheilung der Steinkohlenperiode an. Die Haupttypen dieser Bäume, welche die ältesten Urwälder auf der Vänerinsel, wie bei uns in Europa, bildeten, sind die Calamiten, die Sigillarien oder Siegelbäume und die Lepidodendren oder Schuppenbäume, zu denen sich noch einige Farnekräuter gesellen. Es sind blüthenlose Bäume, denen aber, gleichsam zum Ersatz für die fehlenden Blumen, die Rinden mannigfach ver-

ziert sind, bei den Calamiten mit regelmäßigen parallelen Längsrippen, bei den Siegelbäumen mit in Reihen gestellten gleichartigen Blattnarben, bei den Schuppenbäumen mit regelmäßigen Schildein, die den ganzen Stamm überkleiden. Selbst die Wurzeln, die sogenannten Stigmarien, nehmen bei den Siegelbäumen an dieser Verzierung Theil, indem die Stellen, an welchen die langen Fasern befestigt waren, durch ringförmige Narben bezeichnet sind.

schließen, die derselben Periode der Vorzeit angehören. Da die schwedischen Naturforscher denselben Bergkalk mit seinen Verfeinerungen auch im Weisund auf Spitzbergen fanden, und da dieser Bergkalk auch die Steinkohlen der Melville-Insel bedeckt, so hat sich wahrscheinlich jene Senkung über die ganze Polarzone ausgedehnt.

Auf jene Steinkohlenzeit, in welcher es in der Polarwelt nicht anders ausah, als in dem damaligen Europa



Siegelbäume (Sigillarien) und Schuppenbäume (Lepidodendren) der Steinkohlenzeit.

Aus der Jetztwelt sind kaum Pflanzen zu nennen, die uns nur eine annähernde Vorstellung von dem Walde geben könnten, der einst die Bäreninsel bedeckt hat. Den Calamiten stehen noch die Schachtelhalme und den Schuppenbäumen die Farnpflanzen am nächsten; doch müssen wir uns diese zu riesigen Bäumen umgestaltet denken. Die Siegelbäume mit ihren säulenartigen Stämmen und ihren langen, nadelartigen Blättern, die büschelweise an das Ende des Stammes angeordnet waren, müssen ein höchst fremdartiges Aussehen gehabt haben.

Das Festland der Bäreninsel mit seinen Wäldern ist aber schon während der Steinkohlenperiode wieder versunken. Die Kohlenlager und die sie zunächst umgebenden Gesteine sind von Kalksteinen bedeckt, welche zahlreiche Meeresthiere ein-

und selbst in Indien und Südamerika, folgte auf Spitzbergen ein anderes Weltalter, dessen Ueberreste Nordenstid in einem schwarzen Schiefer entdeckte, der im Hintergrunde des Eiskjördes über dem Bergkalk lagert. Es sind zahlreiche Schnecken und Muscheln, zum Theil derselben Art, wie sie damals in dem Meere lebten, das auch unser Deutschland bedeckte, in einer Zeit, die man die Trias- oder Salzperiode genannt hat. Dazu kamen aber auch jene grossen krokodilartigen Thiere, die man unter dem Namen der Ichthyosaurus kennt. Auch auf Spitzbergen folgte dann die Jurazeit mit ihren bekannten Ammonshörnern und Tintenfischen, wie sie sich überall im Jura finden. Eine lange, dunkle Zeit folgt dann, aus der wir noch von Spitzbergen keine Kunde haben, und erst jene selbe Zeit, in welcher

wir auf Grönland einer so üppigen Flora begegneten, zeigt uns wieder mächtige Bildungen, in welchen wir ein Bild des Lebens der Vorseit aufgezeichnet finden.

In jenem tertiären oder näher als miocen bezeichneten Zeitalter war auch auf Spitzbergen wie auf Grönland ein Schiefersteine vorhanden, der von Torfsümpfen umgeben war. Das beweisen die Braunkohlenlager im Vellsund und im Eisfjord, die aus jenen Torfmooren entstanden und nun von Sandsteinen und seinen Thonschiefern umgeben sind, welche die Pflanzen jener Zeit einschließen. In diesem See-der sich wahrscheinlich über die ganze Gegend vom Vellsund zum Eisfjord ausbreitete, gab es eine Cerose und ein Laichkraut, ganz ähnlich unserm heutigen Potamogeton natans, und in seinem Wasser tummelten sich kleine Wasserläufer, deren Reste Herr in den Schieferen des Cap Etarasschin fand. An seinen Ufern wucherte hoher Schilfrohe und jene Sumpfpresse, der wir auch auf Grönland begegneten. Von der letzteren fand Herr nicht bloß die Früchte und Samen, sondern selbst die zierlichen Blüthenzweige, und er zieht daraus den Schluß, daß jene Ablagerungen sowohl im Frühling, als im Herbst stattgefunden haben müssen. Uebrigens fand er diese Sumpfpresse genau übereinstimmend mit derjenigen, die noch heute in den Vereinigten Staaten Nordamerika's die großen Moräste bedeckt. Wir haben also hier die merkwürdige Thatfache, daß ein Baum uralter Vorseit auf unsere Gegenwart übergegangen ist, daß er damals freilich bis zum 78. Breitgrad hinaufreichte, während er jetzt den 40. Grad nicht überschreitet und selbst durch künstliche Kultur nur bis 57° n. Br. erhalten werden kann.

Außer dieser Sumpfpresse kommen in den alten spitzbergischen Wäldern noch 14 Nadelholzkarten vor, unter diesen eine eigenthümliche Sequoia, zwei Lebensbäume und ein halbes Duzent Föhren und Tannen. Von den letzteren fanden sich seltsamer Weise keine Zweige, sondern nur einzelne Nadeln und Samen vor. Diese Samen aber sind gequillt und konnten daher leicht vom Winde vertragen werden. Herr schließt daraus, daß diese Bäume wohl weiter vom See abstanden, und daß die Hügel mit dunkler Nadelwaldung bedeckt waren, aus welcher dann einzelne Samen in den See gelangten. Wenn aber auch die Nadelbölzer auf Spitzbergen vorherrschten, so fehlten doch auch die Laubbäume keineswegs. Zwei Pappelarten finden sich vom Vellsund bis zur Kingsbai. Sie fanden wahrscheinlich im Sumpf oder an den Flussufern, mit Birken und Erlen gemischt, während eine großblättrige Platane, eine Linde und zwei Eichenarten, von denen freilich nur erst einzelne Blätter bekannt geworden sind, die trocknen Stellen bewohnten. Um diese Bäume ranfte sich dieselbe Epheu, der bereits in Grönland und am Wadenge nachgemessen wurde, und ihre Kronen beschatteten dieselben Sträucher, Haselnuß, Kreuzdorn, Weißdorn, Stechpalmen, Schneeball und eine Corneltirische.

Im Ganzen sind 30 Baum- und Straucharten aus Spitzbergen bekannt geworden. Dazu kommen aber noch zahlreiche krautartige Pflanzen, Gräser und Kiebsgräser, Farn und Schachtelbalm. Es ist also eine ziemlich mannigfaltige Vegetation, die wir an diesem uralten See Spitzbergens antreffen, ganz unähnlich der armenlichen Flor, die heute dort die wenigen von Eis befreiten Stellen zu beleben sucht. Es sind üppige Laub- und Nadelholzwaldungen, die sich einst da ausbreiteten, wo uns jetzt unermeßliche Gletscher entgegenstehen.

Dieses Bild vergangener Zeiten, das uns der geniale Forscher mit Hülfe der von den Polarreisenden gesammelten Schätze herausgearbeitet hat, gewinnt aber noch in mehr als einer Beziehung eine Bedeutung. Zunächst sehen wir, daß der Boden jener so abgetragenen hochnordischen Länder im Wesentlichen keine anderen Thiere und Pflanzen in seinem Schooße birgt, als sie uns aus dem Boden Europa's und anderwärts bekannt geworden sind. Das gilt von der Steinkohlenflora der Bäreninsel, wie von der Braunkohlenflora Grönlands und Spitzbergens. Treibt doch die Sumpfpresse Spitzbergens noch heute nach ungezählten Jahrtausenden in Virginien dieselben zierlichen, feierig-beblätterten Zweige und dieselben Blumen und Früchte, wie einst am Eisfjord Spitzbergens! Dasselbe gilt von der Thierwelt; die Restthiere Spitzbergens aus der Steinkohlenzeit, aus der Trias und dem Jura zeigen uns dieselben scharf ausgeprägten Formen, denen wir durch alle diese Zeitalter hindurch auch bei uns begegnen. Gleichwohl müssen die Lebensbedingungen, unter welchen sich diese übereinstimmenden Formen entwickelten, doch in einem Punkte wenigstens sehr verschiedene gewesen sein. Denn auch damals muß die Polarzone so gut wie jetzt einen langen Sommertag und eine lange Winternacht gehabt haben, und die Nacht am Eisfjord nimmt fast  $\frac{1}{2}$  des Jahres ein.

Freilich lehren uns die alten Wälder der Polarwelt auch die andere Thatfache, daß die Polarzone einst viel wärmer gewesen sein muß als gegenwärtig. Schon daß die Vegetation der Steinkohlenzeit größtentheils aus Bäumen bestand, läßt mit Sicherheit auf eine höhere Temperatur schließen. Gegenwärtig müssen die Monate Juli und August mindestens eine Mitteltemperatur von 10° C. haben, wenn noch Bäume vorkommen sollen. Auf unser nördlichen Erdbälfte fällt daher die Grenze des Baumwachthes so ziemlich mit dem Polarkreise zusammen, und auch da sind es nur noch wenige Nadelbölzer, die Birke und die Pappel, die uns entgegenreten und auch nur in verdoppelter Form. Auf der Bäreninsel aber, 8° jenseits des Polarkreises, sehen wir in der Steinkohle eine ganze Reihe von Baumarten, die zumal sämmtlich den blüthenlosen Bäumen angehören, die heute fast nur die Tropen bewohnen, wenigstens in keiner einzigen Art die gemäßigten Klimate der nördlichen Erdbälfte berühren. Diese Steinkohlenpflanzen der Bäreninsel verrathen durch nichts ein anderes Klima,

als es die Mitteleuropas genossen; sie treten in derselben Berggesellschaft auf, und ihre Stämme haben dieselbe Dide und weisen auf ein ebenso üppiges Wachstum hin. Gleichwohl liegt die Bäreninsel um 28 Grade dem Pole näher als die Vogesen, die doch in den unteren Steinkohlen dieselbe Flora aufweisen. Anders sah es bereits in der Braunkohlenzeit aus. Auch damals war muß das Klima in der Polarzone viel wärmer gewesen sein als jetzt; aber es hat doch bereits eine Abnahme der Wärme gegen den Pol hin stattgefunden. Die Palmen reichen in Deutschland nur bis 51 1/4° n. Br., die Lorbeer- und Kampherbäume nur bis zur Ostseeküste, die Magnolien und immergrünen Eichen, die Rußbäume und Weizen in Grönland bis 70°, die Sumpfpfeffern, Lebensbäume, Pappeln, Platanen und Linden auf Spitzbergen bis 78°. Wenn auch manche Arten von Spitzbergen bis nach Italien hinabreichen, so ist doch eine Vegetationsverschiedenheit nach Zonen unverkennbar, freilich noch nicht so scharf ausgeprägt, als in der heutigen Schöpfung.

Endlich wird uns durch die degradierten Wälder der Polarwelt das Geseh der mit der Zeit fortschreitenden Organisation des Pflanzenreichs bestätigt, das bisher nur auf in Europa gemachte Erfahrungen gegründet werden konnte. Die alte Steinkohlenflora der Bäreninsel besteht nur aus blütenlosen Pflanzen, die jüngere miocene Flora Spitzbergens aus höher organisierten Blütenpflanzen. Zugleich zeigt sich, daß die Ersteren viel größere Verbreitungsgebiete hatten als die Letzteren, daß die Verbreitungsgebiete sich also mit der Zeit verengten. Wahrscheinlich, sagt Heer, sind jene von einem Bildungsherde ausgegangen, konnten sich aber schnell verbreiten, da ihre mikroskopisch kleinen Samen leicht

vom Winde nach allen Weltgegenden vertragen wurden. Diese dagegen hatten mehrere Bildungsherde, und einer derselben lag offenbar in der Polarzone, von der aus die Pflanzen und Thiere sich strahlenförmig verbreiteten. Diese strahlenförmige Verbreitung ist unverkennbar. Einzige Arten, wie die Sumpfpfeffere, reichen, wie Heer nachweist, von der Polarzone in Amerika bis Alaska, in Europa bis zur Schweiz, andere, wie die Mammutbäume, in Amerika bis Vancouver, in Europa bis Griechenland, in Asien bis an den Ural. Dieses wunderbare Vorkommen der gleichen Pflanzen in den Gesteinen so weit von einander entfernter Länder findet Heer nur dann erklärlich, wenn man annimmt, daß alle diese Bäume ursprünglich in der Polarzone heimisch waren und sich von da erst südwärts verbreiteten, daß die Pflanzen also gleichsam ähnliche Wanderungen vollführten, nur im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, wie sie die leichtbeschwingten Vögel in Zeit weniger Monate ausführen.

Wälder am Nordpol! Es war es kein Märchen; sie bestehen wirklich! Können wir auch nicht mehr in ihrem Schatten ruhen und uns von ihren Wipfeln umrauschen lassen, so leben sie doch, wieder erweckt durch die Wissenschaft aus ihren Steingräbern. Und wenn die organische Natur gegen den Pol hin verarmt und endlich schwindet, wo der kalte Eismantel über alles Land sich ausbreitet, dann sind es, wie Heer seinen schönen Vortrag schließt, die Steine, welche reden und uns von den Wandern der Schöpfung erzählen, uns erzählen, daß auch in den abgelegenen Ländern und in den fernsten Zeiten dieselbe Gesetzmäßigkeit und dieselbe Harmonie Alles durchdringt, wie in der uns umgebenden Welt.

## Das Kleid der Felsen.

Von P. Sumner.

Geht Artikel.

„Unfruchtbar und öde, aber doch herrlich!“

Eine Felsengruppe des Oberharzes lag vor mir in aller malerischen Großartigkeit.

„Ja, ja“, nickte mein unter der Last leuchtender alter Führer, „die Leute von draußen sagen es so, aber es wird Einem oft sauer genug.“

Du belabener und müßiger Bergesohn, wer mag die deine Worte vertragen! Fühllos bist du darum doch nicht. Als Tourist aber, der mit dem Notiz- und Stigitz-Buch in der Tasche leicht seine Straße zieht, habe ich alle Zeit solche nackte Felsen gepriesen, die schroff und feil und wandartig anseihen oder klippenartig klein und groß sich hingelen, auf denen kein schwanker Strauch hält, die keine Alpenblume einmal zielt, auf denen kaum aus den Rissen ein Grasalm nicht.

An ein Kleid derselben nun, das manchem degeistereten Bergsteiger kaum auffällt, soll hier erinnert werden und zwar an eins, das farbenprächtig und mannigfaltig variiert ist, von fast ewiger Dauer und hie und da selbst von jartestem Dufte.

Ja, und gewiß ist's ein Kleid — und zwar ist's nicht im dichterischen Sinne etwa von dem Reibelgewande gemeint, mit dem die Wolken die Felsen umgeben, sondern ein reelles Kleid ist's, welches ihnen fast unmerkbar angehöret, das es selbst kein Sturm zerzaust und keine Gestein berührt. So oft ich in der Schmelz die großartig schönste Felsenengenden des Berner Oberlandes oder im Harze die Felsenwände der Rosttrappe durchwanderte, habe ich nicht bloß die Felsenengruppen betrachtet und mich ergriffen gefühlt von den heilig stillen Kolossen, die von Altanenbänden malerisch wild emporgerichtet standen und lagen und ragten; ich habe mich in der Nähe auch niedergehockt und das garte Gewand berührt und geprüft, das allenthalten da die Blick des Naturfreundes, noch gar nicht zu sagen, des Forscher, reizt. Während Andere nur verschwommene Erinnerungen oder mit Griffel und Carton bloße Skizzen mitnehmen von der Reise in die Berge, habe ich lebendige Stücke von dem Kleide der Felsen zu Weitem alle Zeit an mich gebracht. Wenn ich diese dabeim betrachte und von ihnen unter dem Mikroskope über seltsames Wirken und Wollen

der Natur mit ergötzen lasse, dann stehen sie alle treu zugleich wieder vor mir: die ewigen Felsensäulen und wildbewachsenen Schluchten, die Wanderwege alle mit ihrem Frohsinn und Sonnenschein. Ich freue mich dabem noch immer über den Duft des Kleides, den es Tage und Tage nicht verliert. Du kennst ihn, wenn du ihn auch dem Felsen als solchem zuschreibst, sofern du je im Harze oder im Riesengebirge gewesen bist. Man hat die zum Mindesten Steinsäckchen zum Verkauf angeboten, die man um ihres lieblichen Geruches willen „Wildenheimsche“ titulirte; da aber dort selb es in Menge zu kaufen, lautete die Antwort auf deine Frage, wo es her sei.

An den verschwiebsten Flechten, nackten Felsstellen findet sich nämlich ein dünner Sammetüberzug, an dem sich durch das bloße Auge nichts Weiteres unterscheiden läßt. Aber bei dem Fels ist er bloß zu Haufe und sammetartig an seiner Oberfläche. Bei gehöriger Vergrößerung zeigt sich die sammetartige Haut als aus flachen, einfachen und verästelten (gegliederten) Fäden zusammengefaßt zu erkennen, welche an ihren Enden oder in seitlichen Ausfaltungen ihre Samen (Sporen genannt) in kleinen Behältern entwickeln. — Es ist eine Alge, ein entfernter Anverwandter jener blüthenlosen Meerespflanzen, welche tollkühn die viele Klüfte lang auf dem Grunde der Tiefe wachsen und nach jedem Sturme abgerissen und ausgemorfen den Strand elenig und fußhoch bedecken. Ein sehr entfernter und ausgereifter Verwandter ist es, da er als eine Kustalge nach Meer und See und Bach nicht fragt, da er verlässlich duftet, während alle anderen nur den elenigen Geruch haben, und da er in seiner ganzen Entwicklung und Befruchtung so überaus einfach und anspruchslos ist. In Anbetracht des Triebes und der Aufgabe des ersten Menschenpaares, die Dinge durch einen Klang darzustellen, schwebt die Frage nach dem Namen auf der Lippe. Aber — ich kann ihn ganz und vollstündig zunächst selber die nicht nennen, weil ich kein Steinsäckchen erst sehen müßte. Es gibt eben nicht nur eine, sondern einige Arten, die, an Felsen wachsend, jenen Wildenheimschen Geruch haben. Bist du auf dem Riesengebirge gewesen und hast dort auf Felsblöcken vielfach einen sammetartigen rothen Beschlag gefunden? Es kann nichts Anderes sein, als der dort überall bekannte *Chroocolepus Jolithus*. Der wunderbarste bu im Dberharze und sanftest besonders auf dem Brocken einen rothen, einbligen Überzug? Es war *Chr. hercynicus*; oder beim Weiterwandern triffst du an den Rhododendrophen auf den flügigen, bräunlich-grünen *Chr. velutinus*. In Tirol findet sich, besonders an Felsen in der Ziller, *Chr. rupestris* als dickflügelige, fleischartige, rothbraune Felsenbefiedlung. Sonst an schattigem Gebirgsfelsen trifft man nicht selten den lockeren, goldgelben Sammet des *Chr. aureus*, und die schwarzen, polsterförmigen Überzüge des *Chr. ebeneus*. So ist die Anzahl jener duftigen Delours nicht klein, und es war für die gelehrten Menschenkinder nichts Kleines, an ihnen allen die Adamspflicht der Namensgebung zu erfüllen. In dieser Vermahnung deine Begehrung, veredelterer Leset, für das Bombardement mit lateinischen Namen!

Doch die Natur gibt, was sie gibt, nicht nur in genialer Auswahl, sie ist als ächter Genie auch eigenwillig;

so, indem sie dem Leben manchen Vorzug vor dem Tode gestattet und wiederum gütiglich beidern doch das Beste läßt. Nämlich im lebenden Zustande nur an fruchtiger Felsenwand lachen jene Chroocolepen in den lebhaft goldgelben, rothen, orangenen, braunen Farbtönen, die mit ihnen selber erstehen und alsbald in unansehnliches Graugrün oder Braungrün übergehen. Darum lüchle selber, müßst du die ganze Freude! Aber der Duft vergeht nicht, man muß sie nur, um ihn wieder zu erzeugen, leise besuchtn, — während die lebendige Farbe durch kein menschliches Mittel wieder hervorgerufen werden kann. Es sollte mich nicht wundern, wenn im Anfluge Koussaus'sern Naturschönheitsfines die elegante Dame stillt aller andern Esenzen einmal den vergeisterten Vollenstein in Form von niedlichen Grotten oder Briefbeschweimern in ihrem Boudoir heimlich macht. Der achtsame Gebirgsbewohner würde dadurch das duftige Kleid seiner Felsen doppelt suchen und schätzen, das er so nur als Sonntagsgelind kennt und liebt.

Du aber wirst Zutrauen gefast haben, da du den Duft eines gewissen Felsenkleides nicht ablegen kannst, so gesthehst du, es sei ein Duft, unter dem die Felsenjungfrau im fliegenden Wolkenkleide mit der würzigsten Ärm und der blumigsten Bergeshäute in gewissem Sinne ebenbürtig in die Reihe treten kann.

Darum nun vertrauensvoll den dünnen Felsen auch des Weiteren nicht übersehen! Es kann dir, vor Allem bei freudigem Wetter, nicht entgehen, wie allenthalben wieder andersartige, malerisch grüne, gelbe, graue, bunte Gelbe handgroß oder in weitestir Verbreitung denselben überziehen. Diefelben sind dem Gesteine wie eingewachsen, und mit den Nägeln der Finger, selbst mit dem Wasser gelangt es die nicht, nur minzige Brosamen abzugeben; aber mit Hammer und Meißel sprenzen sich mit Leichtigkeit die prächtigen Stücke mit der Felsunterlage los. Überall zerstreut auf den glatten, mehligten oder fleisigen Klüften finden sich kohl-schwarze, runde oder eckige kleine, hirschenform große Flechten eingelast. Es sind die Fruchtschleichen. Bei ansehnlicher Vergrößerung gleicht ihr Anblick einer Sonnenblumenscheibe in fast jeder Beziehung. Aber was bei dieser die einzelnen Samen sind, das sind hier fingerförmige, am Grunde zugespitzte, meist glatte Schleichen, welche auch als fertige oder durchsichtige Eiden (die Samen) je zwei übereinandergeordnet in sich enthalten. Was in der Sonnenblumenscheibe die Sperulablen sind, welche die Körner zwischen sich tragen, das sind hier die sogenannten Saft-säden, welche nach oben hin schwarzförmig anlaufen und dadurch dem Fruchtschleichen selber das kohl-schwarze Ansehen geben. Sie sind in Wahrheit nur verkrümmerte Samen-schläuche, ganz das, was die Arbeiterinnen im Stode des Bienenwaders! — Was ist nun aber das Alles, was sie geben haben? Es ist die fast ausschließlich die Felsen bewohnende Flechtengruppe der „Leiden“ oder Schleichen-töcher. Ihre kräftigen farbigen Fäden oder repräsentieren, du magst lächeln oder dich in Respekt beugen, die Blätter und Stengel. Aber weil sie als solche so außerordentlich sind und in dieser Welt doch einmal Alles Namen und Titel begehrt, haben die Botaniker sie auch mit einem besonderen Namen versehen und zwar *Thallus*, d. h. Laub, benannt.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

N<sup>o</sup> 32.

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, G. Schwetfke'scher Verlag.

11. August 1869.

Inhalt: Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 2. Die arktische und die alpine Flor. — Das Kleid der Helsen, von Paul Kummer. Zweiter Artikel. — Das Klima von Nordamerika mit dem Europa's verglichen, von Adolf Ditt in New-York. Erster Artikel.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 2. Die arktische und die alpine Flor.

Wie man auch die Zusammensetzung des arktischen Pflanzenteppichs betrachten mag, ob mit oder ohne die süßlichen Länder des hohen Nordens, überall empfängt man den Eindruck, als ob man sich in einem Alpenlande bewege. Bis zu bedeutenden Alpenhöhen steigen eine Menge Arten, welche auch in der Ebene nicht selten sind; ebenso reichen viele solcher Pflanzen der gemäßigten Zone in die arktische hinein und bilden hier den eigentlichen Charakterpflanzen gewissermaßen zur Basis. Die letzten aber gehören fast durchaus nur solchen Gattungen und Familien an, die entweder rein alpine oder doch überwiegend alpine sind.

Es gibt verschiedene Kategorien, durch welche die arktische Flor mit der eines mitteleuropäischen Alpenlandes verglichen werden kann. Zunächst sind die herrschenden

Familien in beiden Gebieten die gleichen: Ranunculaceen, Crucifereen, Sileneen und Alismeen, Rosaceen, Saxifragaceen, Compositen, Ericaceen, Rhinanthaceen, Salicaceen, Juncaceen, Cyperaceen und Gräser. Aber auch die herrschenden Charaktergattungen fallen in beiden Gebieten zusammen: Ranunkeln, Hungerkräuter, Fingerkräuter, Steinbreche, Käusekräuter, Weidensträucher, Erggen und Juncus. Wie manche dieser Typen erst in den Alpen ihren ganzen Artenreichtum entfalten, ebenso vollführen sie es in der arktischen Zone. In dieser Beziehung stehen in beiden Gebieten obenan: die Hungerkräuter, Steinbreche, Käusekräuter (*Pedicularis*), Weiden und Erggen. Dagegen ist es auffallend, daß manche Formen, die in den Alpen eine reiche Gliederung durchlaufen, im hohen Norden arm an Arten erscheinen. So stehen z. B. den



39 Habichtskräutern (Hieracium) unserer Alpenwelt innerhalb des Polarkreises kaum ein Paar Arten und nur mit den südlichen Ländern etwa 19 entgegen; auf 21 Alpenprimeln kommen im Norden nur 5 arktische, auf 15 Alpengentianen nur 2 innerhalb des Polarkreises und 10, wenn man Kappland und Island hinzurechnet, auf 14 Mannschildkräuter (Androsace) der Alpen nur 2 arktische, auf 11 alpine Gieselerbiumen nur 2 polare oder 3 arktische, auf 10 Schafgarbe-Arten nur unsere gemeine Schafgarbe, auf 11 Aislins-Arten nur 5 polare oder 6 arktische, u. s. w. Manche alpine Typen sind im arktischen Gürtel ohne alle Verrückung geblieben; z. B. Semperdiven, Kapuzeln (Phyleumia), Adelen, Astraranten, Gieselerbiumen, Goldanellen u. A. Zu andern Formen der Alpen treten in der Polarzone entsprechende Arten; denn während die nördliche Braya alpina, eine Crucifere der höchsten Alpen Kärnthens, nur noch in Kappland vorkommt, taucht eine zweite Art (Br. glabella Richards.) hoch im polarischen Norden auf der Cornwallis-Insel plötzlich wieder auf und überrascht uns hier um so mehr, als in gleicher Breite die nahegelegene Melville-Insel auch ein höchst charakteristisches Raubmoos (Vollia hyperborea) birgt, wie V. nivalis in der Umgebung des Hochnergebirges die Braya gern zu begleiten pflegt. Solcher correspondirender Arten finden sich in beiden Gebieten mehrere von gleicher Auffälligkeit. So tritt unter Anderem im arktischen Gebiete unser Butterblume (Caltha palustris) die C. arctica, unserm Sumpfs-Dergblatt (Parnassia palustris) in Grönland die P. Kotzebuei, unser alpinen Dreieck (Dryas octopetala) im polarischen Amerika die Dr. Drummondii und integrifolia, unserm Sumpfsorchis (Ledum palustre) das L. Groenlandicum, unsern Rhododendron-Arten das R. Lapponicum, unser Himmelsleiter (Polemonium coeruleum) das P. humile und pulchellum, unsern Zwerg-veggelinnich (Eritrichium nanum) das E. villosum &c. im Taimeerland entgegen. Manche Formen unserer Alpenwelt ändern sich in der Polarwelt so, daß sich auch bestimmte Gattungen entsprechen. 3. B. verwandelt sich die Form der Nierenwurz (Helieborus) in die Gattung Coplis, die Nelkenwurz (Geum) in Sieversia, die fettsame, niedliche Umbellifernform der Gaya in die Gattung Neogaya, die Form unserer Hufstattische (Tussilago) in die Nardosmia, die Form unser Gränke (Andromeda) in die Formen der Cassiope und Menziesia, unser Ewerette (Sweertia) in Pleurogyne, die Alpen-Bartschle (Bartschia) in Castilleja und Gymnandra, unser Venuschub (Cypripedium) unter den Schridder in Calypso u. s. w. —

Ein großer Theil der arktischen Gewächse ist arctisch derselbe wie in unsern Alpen. Man könnte wohl sagen, daß diese und die Arten unser Ebene den Aufzug des polarischen Pflanzenteppichs bilden, und daß nur einzelne, dem Polartande eigenthümliche Arten die Charakter-Arabesken in ihn weben. Unter diesen Alpen muß man aber auch

die alpinen Regionen des Ural, des Altai und seiner Ausläufer, selbst die des Himalaya und der Giesengebirge verstehen. Alles, was dem Nordpol zugewendet ist, trägt unter ähnlichen klimatischen Bedingungen einen ähnlichen Pflanzenscharakter. Ein Reisender, der plötzlich aus den arktischen Regionen Sibiriens zu den Riesenhöhen Tibet's versetzt wäre, würde sich ohne Zweifel noch in der Polarzone befindlich wähnen. So täuschend stimmt die allgemeine Aufsammlung des Pflanzenteppichs hier wie dort; um so mehr, da viele Arten in Tibet, wie in Sibirien und den arktischen Regionen überhaupt, als auch auf unsern Alpen die nämlichen sind. Ausbreitete Arten (z. B. Rhodiola rosea, Saxifraga cernua, Hirculus und stellaris) der arktischen Zone wachsen ebenso in den mitteleuropäischen Alpen, wie auf den Riesenhöhen von Tibet, und um die Ähnlichkeit noch überraschender zu machen, wärsch, wie Hooker fand, auf einer Höhe von 18,300 Fuß am Dents-Passe dieselbe tiefe de roche, jene merkwürdige Flechte der arktisch-amerikanischen Regionen, die den canabischen Jägern oft einzig zur Nahrung dient, und die auch der ersten Franklinschen Polarexpedition so vielfach das Leben rettete. Etwa 125 Arten zählte ich unter den früher angegebenen 1100 arktischen Pflanzen, welche die arktische Zone mit unsern deutschen und schweizerischen Alpenregionen theilt, und konnten mir die Florenzgebiete aller dem Nordpol zugewendeten Alpenländer ebenso genau wie die europäischen, so würden wir finden, daß nur ein sehr kleiner Bruchtheil von arktischen Arten der Polarzone ausschließlich angehört.

Was diese in Wahrheit für sich beanspruchen kann, sind nur alpine Formen. Von Familien hat sie nur eine einzige hervorgebracht, die Diapensiaceen; aber diese repräsentirt auch die ganze Armut der Polarzone. Denn sie besteht nur aus einer einzigen Gattung (Diapensia), und diese nur aus zwei Arten, von denen die eine (D. cuneifolia) in Nordamerika vorkommt, aus Arten, die nicht einmal einen andern, als einen grasartigen Typus erlangen. Selbst von Gattungen hat die Zone nur äußerst wenige eigenthümliche aufzuweisen; unter 322 Gattungen zählt sie im Ganzen 19, die einen arktischen Charakter an sich tragen. Doch neigt, wie ich schon vorhin ausführte, eine ganze Zahl dieser Gattungen (10) zu andern Formen unseres europäischen Florenzgebietes, so daß man sie gleichsam als arktische Variationen betrachten könnte. Selbst die übrigen 9 Gattungen zeigen meist denselben annehmenden Charakter; denn die 8 Gattungen der Cruciferen (Parrya, Eutrema, Platysepalum und Odontarrhena) und Gräser (Duponlia, Calabrosa, Colpodium und Pleuropogon) vertreten keine originelle Idee, sondern verhalten sich wie Combinationen anderer Gattungen. Selbst die einzige originelle arktische Gattung der Polygoneen (Koenigia Islandica) spiegelt in ihrer Illiputartigen Form die ganze Dürftigkeit arktischer Schöpfungskraft in sich

ab. Eines der wenigen Sommergewächse der Polarzone, erhebt sich das glerliche Pfänzchen truppweis einige Linien, 1 bis 2 Zoll hoch über den Boden, erzeugt ein Paar fleischige Blättchen, aus deren Achseln, wenn Alles recht äppig ist, ein Paar blätterige Ästchen hervordrehen, und schließlich das Stengelchen mit einem winzigen Knäuel noch kleinerer Blumen ab. Es ist ein Gebilde, das in dem kurzen Sommer der langen Polarstage seinen Lebenslauf in kurzer Zeit vollendet und, wenn wir bedenken, daß unter der Tropenzone die Polgoneen zu hohen, stattlichen Bäumen mit weit entfalteten Blattspalten sich entwickeln, so recht ein Maßstab der kalten Heimat wird. Aber auch diese Form ist nicht einmal ausschließlich der Polarzone eigen; denn unter ähnlichen Verhältnissen erscheint eine zweite Art auf den eifigen Höhen des Himalaya in Nepal, die *K. Nepalensis* Dou., ebenso winzig, ebenso vergänglich. Erwägt man nun, daß weder die Diapensiaceen noch Koenigia auf die Polarzone ausschließlich beschränkt sind, sondern auch außerhalb derselben unter ähnlichen Bedingungen der Temperatur auftreten, so hat diese Zone eigentlich keine einzige Pflanzenform hervorgebracht, die von einer besonderen Gestaltungskraft des Polar-Gebietes spräche. In diesem Sinne gibt es keine arktische Flora. Eine solche ist weiter nichts, als eine Combination alpinen Pflanzenformen, die nur hier und da einen Anlauf zu eigenen originellen Formen nimmt.

Sonderbar genug, bleiben aber auch diese Formen gleichsam auf der Stufe eines Versuches stehen. Unter den 19 der arktischen Zone eigentümlichen Gattungen erhebt sich die Form des Huflattichs (*Nardosmia*) allein zu 5 Arten; zwei Formen der Kreuzkräuter (*Parrya*) und Resaketen (*Sieversia*) bringen es zu 3, drei andere zu 2 Arten, alle übrigen Gattungen nur zu 1 Art. Damit harmoniert die große Zahl artenarmer Gattungen überhaupt, und diese ist so bedeutend, daß von den 322 Gattungen etwa 248 nicht mehr als 1 bis 3 Arten besitzen, unter denen sich allein 171 mit nur einer Art befinden. Ein ähnlicher Haß überträgt sich sogar auf die Familien; denn von den 83 arktischen Pflanzenfamilien bringen es 36 auch nicht höher, als bis zu höchstens 3 Arten. Eine so große Zahl artenarmer Typen drückt der arktischen Flor einen Charakter auf, wie ihn neuere Inseln zu haben pflegen, die, völlig vereinzelt im Ozeane, keine andere, als eine eingewanderte Flor besitzen. Wesäße die arktische Zone nicht auch artenreiche Gattungen — Ranunkeln, Hungerkleeblumen, Käusekräuter, Steinbreche, Weiden, Seggen u. A. —, so würde ihre Flor wie ein buntes Allerlei, ja vollkommen wie eingewandert erscheinen. In beiden Beziehungen ähnelt sie der Alpenflor: die artenarmen und artenreichen alpinen Gattungen sind die nämlichen auch in der arktischen Flor.

So verhält sich dieselbe zu der Alpenflor, wie sich überhaupt alpine Höhen überall, auch auf der südlichen Halbkugel zu einander verhalten: alle verrathen die Nei-

gung zu gleicher und ähnlicher Gestaltenbildung, unterscheiden sich aber durch letztere, sowie durch entsprechende (correspondirende) Formen, die wieder den Charakter ihrer nächsten Umgebung annehmen. In dieser Beziehung darf man von einem arktischen Florentypus reden, der sowohl in horizontaler als vertikaler Richtung der Pflanzenverbreitung die allmählig sich verleitende Fülle der in wärmeren Regionen so großartig entwickelten Pflanzengestaltung in höchst bescheidener Weise zum Abschlusse bringt. Mitin bilden also diese alpinen Punkte zusammengenommen die correspondirenden Variationen eines Grundthema's, das am Pol seinen reinsten Ausdruck findet.

Damit stimmt auch die innere Natur dieser arktischen Pflanzenformen auffallend überein. In allen alpinen und arktischen Regionen herrschen die ausdauernden Gewächse; einjährige und zweijährige treten auffallend zurück, die Holzgewächse nehmen sichtlich ab. Auch dieses Ortes drückt die arktische Flor in besonders auffallender Weise aus. Unter dem von mir für dieses Gebiet bisher gezählten Tausend der Pflanzenarten gehören 3,2 % den zweijährigen, 8,3 % den einjährigen, 10,4 % den holzbildenden und 77,8 % den ausdauernden Gewächsen an. Der Grund dieses bedeutenden Ubergewichtes ist klar: weil der arktische Sommer zu kurz ist, vermögen die meisten Pflanzen nicht ihr Leben während eines einzigen Sommers bis zur Fruchtreife zu vollenden. Sie sind gezwungen, sich mehr auf ihr Wurzelsystem, d. h. mehr auf den erwärmten Boden, als auf ein freies Lustleben einzurichten, dessen Wandelbarkeit in den Wärmeverhältnissen so groß ist. Darum überwiegen auch unter den perennirenden Gewächsen die grasartigen, besonders die Esgräser, diese meist an den kältesten Moorboden gebundenen Grasformen, weil sie als die genügsamsten mit der geringsten Wärmesumme vorlieb nehmen und diese zu ihrer Fortbildung verwenden. Alle zusammen bilden gegen die übrigen Familien 23,17 % aller perennirenden Pflanzen. Alle vereint zeigen, wo sie die meiste Wärme empfangen. Denn da sie ein im Verhältniß zu ihren grünen Theilen sehr kräftiges Wurzelsystem entwickeln, kann nur der Boden ihre größte Wärmequelle sein; und daß er dies sein kann, wird schon durch die Temperatur der Quellen bewiesen. Sie ist um 1 bis 2° K. höher, als die Luftmeeres und schützt die Pflanzen offenbar vor dem Erfrieren der oft eintretenden Froste grade, wie es auf den Alpen der Fall ist. Selbst die Sträucher drücken sich dem Boden an, wie es auch in unsern Alpenregionen die Weiden vollführen. Darum geschieht die Vermehrung und Fortpflanzung der meisten Arten mehr durch Sprossung als durch Ausfaat. Das ist wiederum der Grund, daß sie in der Regel dichte, nach oben in dicht aneinander getränzte Ästbüschel getheilte Rasen bilden, die, indem sie sich dem Boden anschmiegen, die Erde beschatten und deren Wärmeabstrahlung gegen den kalten Himmel wesentlich beschränken. So allein

kommt ihnen die Bodenwärme zu Gute; um so mehr, da, wenn der Schnee des Winters rasch einfällt, diese ihnen unter der schlecht leitenden Schneedecke erhalten bleibt. Daß bei solchen Verhältnissen dennoch gegen 88 einjährige Pflanzen erscheinen, erklärt sich daraus, daß ich Lappland und Island hineingezogen habe. Bis dahin sind offenbar eine Menge einjähriger Arten durch den Menschen vorgebracht oder bringen noch immer durch ihn vor; denn ich zähle etwa 75 Arten, die bei uns zu den gemeinsten gehören. Diese abgerechnet, bleibt eine kaum nennens-

werthe Anzahl einjähriger Pflanzen für die arktische Zone zurück; ich zähle etwa 5, die einen alpinen oder arktischen Charakter tragen. In der Schweiz stellt sich das Verhältniß etwas niedriger. Hier machen die ausdauernden Pflanzen 60,57% der Gefäßpflanzen aus; ein Verhältniß, das bei der großen Anzahl süblicher Pflanzen trotzdem ein hohes ist und sich in der alpinen Zone unendlich steigert. Alles in Allem genommen, fällt zwar die arktische Flor nicht mit unsern Alpenflor zusammen, beide aber sind Geschwisterkinder.

## Das Kleid der Felsen.

Von P. Sumner.

Zweiter Artikel.

Hat das Schicksal dir nicht vergönnt, auf den Bergen, sondern gleich mir in monotoner norddeutscher Ebene deinen Lebensfaden abzuspinnen, so brauchst du doch nur einen Chausseestein oder einen mächtigen erratischen Felsblock in deiner Ebene anzufehen, um Steine-Leibern kennen zu lernen. Es kann dir die gelbgrüne, oft kanariengelbe Kruste nicht entgehen, allenthalben verstreut, mit eingesenkten schwarzen Fiedern von Moosen bis Senfkorngröße. Da hast du gleich in dieser Geographische, wie sie wegen ihrer, die verschiedenen Felsarten landkartenartig trennenden schwarzen Grenzlinien heißt, eine der schönsten Leibern, die oft weltlin ganze Felspartien herrlich überkleidet, da freilich in noch ganz anderer Ueppigkeit, mit leuchtenderem Grünzeug und größeren Fruchtstücken. Daneben trägt dein erratischer Block vielleicht auch die bläuliche oder grünlich weiße Kruste der Flecksteine oder die weißen Kunkelfalten der Gneissteine mit schwarzen Fiedern — dunkle Andenken, welche die Böcke vielleicht noch aus ihrer schwelischen Heimat mitgebracht, aus der sie die Eiskugeln und Wasser der Vorzeit in unsere norddeutsche Ebene getragen und gerollt haben; vielleicht und wahrscheinlicher aber auch hier erst gewachsen, obgleich alle diese Felsenflechten, aus mannigfachen Umständen zu urtheilen, eine fast einlose Lebensdauer haben.

Trägt dich dein Fuß aber einmal nach dem Riesengebirge oder nach den Alpen, so überkleidet da nicht die pantherfärblich schön braune, mit großen, schwarzen Fiedern gemalte Täuschflechte, die im Umfange figurirte Schloßweissflechte an den Felsen des Uebergangs — und Urkaltes, die weitverbreitete Kruste der Kalk- und Breitschneeflechte an Felsgestein aller Art — ja, alle die farbenprächtige Mosaik der Leibern.

Außer diesen sind noch andere in das Kleid der Felsen hineingeschickt, manche sonst ähnliche Lecanoreen mit schüsselförmig vertiefter Fruchtstiele und eingebogenem Rande. Laß dabei die Lupe nicht aus der Hand! Name ist Schall und Hauch für den Kalen, aber er deutet die Farbenpracht

der Fruchtstiele an. So schmückt das Mutauge die Felsen mittel- und süddeutscher Gebirge; die Rubinflechte kommt durch die ganze Alpenkette hin häufig vor; die Goldflechte verleiht das Kalkgestein, und das Schöneauge glitzert Thon- und Schieferfelsen. Zwischen diesen stehen Krugflechten, Ureolaren, deren frugartig vertiefte Fruchtstiele weißmehlige Krusten bedecken.

Dies Kleid der Felsen zerfällt kein Winter. Gerade im Sommer sieht es wohl und verschaffen aus; — die Fiedern fähen da alle ein festes Leben. Alles ist stark, dürr, schnellbar abgestorben und selbst farbenrühr, weil die Gallertconsistenz dieser Gebilde eintrocknet und die Farbensubstanz fast unsichtbar macht. Sie spiegeln uns damit mitten in unserer gemäßigten Zone, wo der Sommer den Höhepunkt des Wachstums und der Farbensubstanz ist, die Vegetationsweise der gemäßigten Pflanzenwelt unter den Wendekreisen, die da zur glühenden Sommerszeit ihren Schmutz und ihre Säfte verliert und in den Samen und Wurzelrhizomen nur ein festes Leben führt, — bis die Regenzeit die Wunde löst und ein neues Regen und Bewegen im grünen Kleide weckt. Thau und Regen bringt junges Leben ähnlich auch in den vertrockneten Fichtengebüden zu Wege, und der Winter und Frühling, wo alle Schläufen des Himmels geöffnet sind, und oft genug die Kälte messerscharf schneidet, sind die Zeit des lebhaftesten Vegetirens und der prächtigsten Farbensubstanz. Da strahlt gleichsam die Felsenwand, ausgelegt mit der zartesten und schärfstgeschnittenen Mosaik der Leibern, mit Rubin und Perlen besetzt von den Lecanoreen, Diatomeen und Ureolaren, und die Krusten derselben mit ihren schwefelgelben, grasgrünen, grauen, weißen und rothbraunen Tönen schimmern vielfach in matt selbstigem Glanze.

Wollten wir über die gewöhnliche Vorstellung eines absolut nackten, aber nach unserer Auslegung doch herrlich bekleideten Felsens hinausgehen, so könnten wir noch andere nicht sowohl eingewachsene als locker anliegende, und

zierlich aufstrebende Gebilde des lichenologischen Reichs — ganz abgesehen von den überall vorhandenen Moosen — nennen. So wären die Flechten mit blätterigem Laube, Anverwandte unserer gelben gemeinen Wandflechte und gelbgrünen Steinflechte zu nennen, die auch auf den Kämmen der Gebirge nicht fehlen, während z. B. die braunschwarze singuläre Flechte, die von der Spitze des Brodens kaum einige Schritte heruntersteigt, die Altenflechte und die breit- und langlappigen Arten der Sticten ausschließlich den Gebirgen eigen sind. In niedlicher, meist kaum über zollhoher

Dort ist auch zu Ende des vorigen Jahrhunderts das wissenschaftliche Auge zuerst freudig durch die felsame Felsengewandung angezogen worden. Den Hut ab vor den Namen der schwedischen Naturforscher Elias Fries, Acharius! und doch ist selbster auf diesem Gebiete ein chaotisches Durcheinander gemessen und wie auf keinem anderen naturgeschichtlichen Gebiete die Unsicherheit der Unterscheidung an der Tagesordnung. Deutsche Gründlichkeit und Ausdauer — namentlich die mühseligen mikroskopischen Untersuchungen des Professor Körber — haben



1. *Parma parietina* (Wandflechte); 2. ein Schälchen von oben gesehen und eine im Querschnitt; 3. 200fach vergrößerter Querschnitt des Inhalts eines Schälchens; 4. *Cetraria islandica* (Isländische Moos); 5. *Cetraria pyramidalis* (Pyramidenmoos); 6. *Roccella tartarea* (Kalkmoosflechte).

Strauchform stehen ab und zu dazwischen die grau-grünen, citronengelben und braunen krausblättrigen Cetrarien, die geweihaarigen grünen oder staubiggrauen Evernien, die straff ausstrahlenden Kamalinen — Alles reizende und bis in's Detail hinein zierlich durchcomponirte Miniaturbilder. Aber sie sind aus derselben mächtigen Phantase hervorgegangen, welche die Eichen und Baobabäume in's Dasein rief, und untrennbar in unserer Anschauung von der Physiognomie eines unfruchtbaren Felsen.

Und doch, unter den deutschen Breitengraden fehlt die wahre Herrlichkeit dieses Felsenkleides, wenn wir nicht viele tausend Fuß emporschlagen. Das Eldorado der Flechten selbst in der Ebene liegt nordwärts von uns in der weiten erhabenen Oede lappländischer Landschaften, an den Fjordenseiten der schwedischen und norwegischen Küste, an den Felsenabhängen der Kiefern. Dort und so überall an den Felsen der nordischen Länder ist die wahre Farbenpracht, Formenfülle und Ausdehnung des Wahlbergischen Reichs.

aber Luft und Licht geschafft, so daß nun die einzelnen Leedreen, Lecanoreen u. s. w. fast so unterschiedlich das stehen, wie Eichen und Tulpen und Narzissen nebeneinander. Das, wodurch danach jene Gebilde sich unterscheiden, ist zunächst nicht sowohl die augenfällige Form und Farbe, als vielmehr die so charakteristisch verschiedene Form jener oben erwähnten Schläuche und der darin enthaltenen Sporen, welche letztere bald eiförmig, bald walzenförmig, gegliedert-nabelförmig oder mondchelförmig, nabelförmig gegliedert, hantel- oder vielleckchenförmig, größer oder kleiner, glashell oder gefärbt sind. Diese Sporenformen sind das immer in derselben Weise bei den speziellen Flechtenarten Ausgeprägte, während alles Andere durch die leisesten äußeren Einflüsse leicht sich ändert.

Darum Achtung vor der deutschen Wissenschaft und Bewunderung jener Gebilde, die den Felsen kleiden — bei denen das Wort dir nicht von der Seite weichen kann: „Wie sind deine Werke nicht nur so groß, sondern auch so klein und so viel, du hast sie alle weislich ge-

ordnet!“ — Man spricht von dem Sand am Meer, aber zahllose Millionen ganz regulär geformter Sporen sind es, die eine einzige Feisenwand erzeugt! Und das ist eine Fülle, von welcher der eheliche Sohn der Berge, der mit seiner Axt auf dem Rücken daran vorüberdreht, noch nicht von ferne eine Ahnung hat. Uns wunderbar begabten Menschen ist eben nach der instrumentalen Beschaffenheit unseres Auges nur vergönnt, stückweise zu schauen, nur bis zu einer gemüthlichen Grenze, und auch das nur unter lauter Schrein und Täuschungen. Aber in unseren Geist ging doch Alles hinein, und er schuf uns in den

Crown- und Flintglaslinsen das optische Mittel, auch in die sonst verschlossenen Panoramen zu blicken.

Aber, wenn du dein deutsches Gebirge durchwanderst, oder das Glück dich einmal nach den skandinavischen Felsen trägt, dann freue dich hier wie dort des prächtigen Feisenkleides mit der Freude der Erdenkinder. Freude in nur anderem Sinne hat der Flechtenforscher aber auch das beim, wenn ihm durch Instrumente „über Büchern und Papier“ verborgene Besonderheiten klar werden, von denen in dem Gefagten nur eine Andeutung gegeben werden konnte.

## Das Klima von Nordamerika mit dem Europa's verglichen.

Von Adolfs Ott in New-York.

Erster Artikel.

Im gewöhnlichen Leben denkt man sich unter dem Klima fast allgemein den jeweiligen Zustand des unsrer Planeten umgebenden Luftkreises nur in Bezug auf Wärme und Feuchtigkeit. In der Wissenschaft jedoch kommen noch andere Factoren in Betracht, wenn vom Klima die Rede ist, und zwar gehört dahin der Luftdruck, der Zustand der Atmosphäre in Bezug auf Ruhe und Beweglichkeit, dann die Richtung und Dauer der Bewegung, und nicht zu vergessen sei endlich der Betrag der elektrischen Spannung und der Grad der Durchsichtigkeit des Himmelsgewölbes. Berechnet man die mittleren Werthe dieser Größen nach Jahr und Tag für eine Anzahl von Orten der Erdoberfläche, so findet man bald, daß dieselben nicht überall sich gleich sind. Uebereinstimmung findet fast nur auf großen, innerhalb der nämlichen Zonen liegenden Wasserflächen oder Landebenen von gleichartiger Beschaffenheit statt. Der Ausdruck „mittlerer Werth“ bezieht in diesem Falle eine Schwankung in sich. Je mehr dieser Schwankungen für jeden einzelnen, das Klima beeinflussenden Factor für einen Ort und bekannt sind, desto besser ist auch sein Klima bestimmt. Bekanntlich gelangt durch die Lichtwellen, welche unser Auge treffen, je nach ihrer Größe und Geschwindigkeit stets eine ganz bestimmte Farbe zu unserm Bewußtsein. Wie diese Farbe uns Totalindruck ist, so auch das Klima. Wir können zwar den Lichtstrahl in seine einzelnen Bestandtheile zerlegen und diese letzteren für sich wahrnehmen; die ein Klima hervorruhenden (sich gegenseitig bedingenden) Factoren können wir, obgleich uns Totalindruck wahrnehmen, jedoch nur vor unserm geistigen Auge in ihrer Gesamtheit zur Anschauung bringen.

„In grauer Vorzeit“, schreibt Bernhard Cotta, „war überall Leben in der Natur. In jedem Baume, in jeder Quelle, in jedem Berge, in jedem Steine wohnte ein Geist, bald eine liebliche Nymphe, oder eine heitere Dryade, bald ein neckischer Rüdezahl oder heimtückischer Kobold.“ So gefiel es auch dem kindlichen Geiste der Naturvölker, persönliche, über den Wolken thronende Wes-

sen für die Witterung verantwortlich zu machen. In dem indischen Gesänge des Mahabharata ist es der Bergpalter, der Donnergott, der seinen Bogen, sobald er die gewaltigen Nilgipfelle versendet hat, als Regenbogen (Indra-yudha, d. h. Indra's Waffe) den Sterblichen zeigt. In Griechenland wurde ein Theil der Götter als Urheber der Erscheinungen in der Atmosphäre angesehen, und noch im Jahre 1820 fand man in der Nähe der Akropolis einen Thurm mit Nischen, worin die Winde, welche Kälte erzeugen, durch Figuren, wie sich der Athener einen Barbaren vorstellte, nämlich durch bärtige, in Pelzwert geküllte Männer personificirt, die milden Winde jedoch durch jugendliche Gestalten dargestellt waren.

An einer Ergründung der Ursachen von den Veränderungen im Luftkreise konnte freilich nicht vor der Erfindung des Thermometers und Barometers die Rede sein. Es ist interessant zu wissen, daß eine so wichtige Beobachtung, wie die der Wassermenge, welche als Regen auf die Erde fällt, ihren Ursprung in großen Zweifeln über die vormaligen, namentlich von Papin verfochtene Ansicht hatte, daß Quellen und Flüsse ausschließlich durch die atmosphärische Feuchtigkeit gespeist würden. Zwar bestanden schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in verschiedenen Ländern Warten zur regelmäßigen Beobachtung der Temperatur, der Winde, des Luftdrucks und anderer Erscheinungen; auch hatte der französische Physiker Dalibard (im J. 1752), durch die Schriften Franklin's aufmerksam gemacht, die Erfindung der Electricität im Luftkreis dargehan; doch gewann die Witterungskunde erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch die beiden, damals die Schweizer Alpen besuchenden Genfer Gelehrten, Sauffure und de Luc, eine wissenschaftlichere Gestalt. In unserem Zeitalter haben vorzugeweise Humboldt, Kämp, Maury, Fikroo und Dove, dessen geistvolle Vorträge über Meteorologie fortwährend das größte Auditorium der Berliner Universität füllten, an dem Aufbau dieses Theils der Physik gearbeitet.

Aufgabe der Klimatologie und geographischen Meteorologie ist es, den Einfluß unserer Wärmespenderin, der Sonne, auf die physikalische Beschaffenheit der Erdoberfläche darzustellen. Ihr Fortschritt wurde besonders durch die Verpflanzung europäischer Kultur nach Nordamerika begünstigt. Als die Briten nämlich nach der durch die Normannen von Island und Grönland ausgegangenen, vorübergehenden Kolonisation die Gründung zu der ersten Ansiedlung in dem weiten Ländergebiete zwischen den beiden Karolina's, Virginien und dem St. Lorenzstrom legten, waren sie erstaunt über die intensive Winterkälte, welche die in Italien, Frankreich und Schottland weit übertraf. „Eine solche klimatische Betrachtung, so anregend sie auch hätte sein sollen, trug aber nur dann erst Früchte, als man sie auf numerische Resultate mittlerer Jahreswärme gründen konnte.“ Wir verdanken diese demselben Manne, dem wir dieses Citat entlehnt haben. A. v. Humboldt ist der Erfinder der Klimatologie, Dove gebührt das Verdienst, sein System zuerst mit bedeutendem Talente nach allen Seiten hin entwickelt zu haben.

Was die Erforschung des Klima's in Amerika betrifft, so wurde der Grund dazu im J. 1783 durch die Errichtung eines meteorologischen Observatoriums in Charleston gelegt. Die daselbst gemachten Beobachtungen erstrecken sich jedoch nur auf eine kurze Zeit. Im J. 1792 folgte Cambridge mit einem Observatorium und sechs Jahre darauf Philadelphia. Die in diesen Städten gemachten Beobachtungen sind seither nicht unterbrochen worden. Durch das Vordringen der Civilisation nach dem Innern des Continents und die Ansiedlungen an der Westküste ist man nach und nach auch zu richtigern Ansichten über unser Klima gelangt, als sie so lange Zeit vorherrschten. Dazu hat jedoch die Errichtung von 35 militärischen Posten, auf denen ununterbrochen Temperatur-Beobachtungen nach einem uniformen Plane angestellt werden, das Meiste beigetragen. Sie erstrecken sich von der Spitze von Florida bis zu Council's Bluff am Missouri und wurden von John E. Calhoun gegründet. „In der Erweiterung unserer politischen Fragen“, sagt dieser, „sollen wir nicht bloß auf den Menschen für sich allein, sondern auch auf die ihn umgebende Natur Rücksicht nehmen.“ Gewiß sehr beherzigenswerthe Worte!

Ueber den Himmelsstrich jenseits der Rocky Mountains hat uns Fremont in seinem berühmten Reise-werke zuerst richtigen Aufschluß gegeben, und seine Beobachtungen sind durch die nachfolgende (zur Feststellung eines Tracé's für die pacifische Eisenbahn) im Auftrage der Regierung unternommene Expedition unter Beckwith reichlich vermehrt worden. Seit Calhoun hat sich übrigens das Smithsonian Institut in Washington unter der Leitung des verdienten Prof. Henry ganz besonders um die Erforschung des Klima's in diesem Lande

verbient gemacht. Im J. 1857 betrug die Zahl der Stationen, von denen es Beobachtungen einging und auf ihre Mittelwerthe reducierte, 383, und die Zahl der Perioden, für welche beobachtet wurde, betrug bis und mit zu jener Zeit 4065 Jahre.

Bestünde die Erdoberfläche aus einer und derselben flüssigen Masse, oder wäre sie aus flachem Lande von homogener Beschaffenheit zusammengesetzt, so müßten alle Orte desselben Breitengrades ein gleiches Klima haben, oder es würde die Temperatur eines Ortes nur noch von seiner geographischen Breite abhängen. Nun ist aber die Wirkung der Sonnenstrahlung durch mannigfaltige Ursachen modificirt, und es ist der Himmelsstrich eines Ortes nicht allein von der Stellung der Erde zur Sonne, sondern ebenfalls von der Gestalt des Festen und Flüssigen, von der Richtung und Höhe der Gebirgskette, von der Richtung der herrschenden Winde und manchen andern Ursachen bedingt. Befiehe, diese wären uns auch ganz bekannt, so würde es immerhin gewagt erscheinen, aus ihnen einen Schluß auf das Klima eines Ortes ziehen zu wollen, indem ja dasselbe durch das Klima auf der ganzen übrigen Erde mehr oder weniger beeinflusst wird. Nur durch zahlreiche, Jahre lang fortgesetzte Beobachtungen läßt sich das Klima eines Ortes genügend ermitteln.

Je größer der Winkel ist, welchen ein einfallender Strahl paralleler Sonnenstrahlen mit einer Ebene bildet, desto größer ist auch ihre erwärmende Kraft. Unter dem Äquator; wo die Sonne senkrecht steht, zeigt sich diese am meisten, es dehnt sich daher die Luft auch stärker aus, wie anderswo. Nun strebt aber die schwere Luft der kalten Zone das verloren gegangene Gleichgewicht der Atmosphäre wiederherzustellen. Sie fließt deshalb nach der Äquatorialzone zu, während die heiße Luft der letzteren über sie weg in absteigender Richtung den Polen zufließt. Befähe die Erde keine Aendrerung, so würden wir nur eine rein nördliche und südliche Luftströmung haben. Nun aber dreht sich die Erde von Osten nach Westen und so auch das Luftmeer. Der südliche Luftstrom oder obere Passat (auch Äquatorialstrom) nimmt aus diesem Grunde auf der nördlichen Hemisphäre eine Richtung von Süden nach Westen an, während der nördliche oder untere Passat (Polarstrom) in entgegengesetzter Richtung oder von Norden nach Osten fließt. Auf der südlichen Hemisphäre behält der letztere selbstverständlich eine nordwestliche und der erstere eine südöstliche Richtung. Auf unserer Halbkugel ist der herrschende nordöstliche Luftstrom für eine Westküste See, für eine Ostküste dagegen Landwind. Gewinde (wie wir sehen werden) wirken aber temperaturausgleichend, und deshalb ist es erklärlich, warum Humboldt in seinem Kosmos „die Nähe einer Westküste in der gemäßigten Zone“ zu den temperatur-erhöhdenden, „die Nähe einer Ostküste in hohen und mittleren Breiten“ jedoch zu den temperatur-vermindernden Ursachen

jählt. Zu den ersteren ist nach Humboldt, wie nun leicht ersichtlich, auch zu zählen, „das Vorherrschen von Süd- und Westwinden an der westlichen Grenze eines Continents in der gemäßigten nördlichen Zone.“

Weshalb wirkt das Meer temperaturausgleichend? — Suchen wir diese Frage zu beantworten. Das Meer bedarf, um einen bestimmten Wärmegrad zu erreichen, einer viel größeren Wärmemenge wie das Land, und da es überall von gleichförmiger Beschaffenheit ist, so gibt es die einmal erlangte Wärme nicht so schnell ab, wie das Land. Kürzer gesagt, wird das Meer nie so warm durch die Einstrahlung, oder auch nie so kalt durch die Ausstrahlung, woraus folgt, daß die Temperatur der Meeresoberfläche immer weit gleichförmiger ist, wie die der Erdoberfläche. Wir finden es deshalb auch leicht erklärlich, warum ein sich durch seine Gliederung auszeichnender Continent unter sonst gleichen Umständen immer ein milderes Klima darbieten wird, wie ein (innerhalb der nämlichen Breitengrade gelegener) massenartiger, ohne bedeutende Küstenkrümmung und Büsen. Ist ein Continent nach den Polen hin ausgedehnt, so wird dieser Umstand auch wesentlich zu seiner Temperaturverminderung beitragen, in dem der herrschende Polarstrom, über eine Fläche streichend, die einer größeren Erfrählung wie das Meer fähig ist, auch kältere Luft zuführt. „Häufiges Vorkommen von Sümpfen, welche im Norden bis in die Mitte des Sommers eine Art unterirdischer Gießfließ in der Ebene bilden“, muß daher nach von Humboldt temperaturerniedrigend wirken; gegentheils muß aber wirken „die Seitenheit von Sümpfen, die im Frühjahr und im Anfang des Sommers lange mit Eis belegt bleiben.“

Befindet sich neben einer Masse continenralen Landes in den Tropen statt Land Meer, so wird dieser Umstand, weil das Meer sich weniger stark erwärmt, wie das Land, nicht temperaturvermindernd, sondern erhöhend auf erstere einwirken. Trodener Sandboden ohne Bewaldung wirkt auf eine (innerhalb der nämlichen Längengröße liegende) Gegend in der nördlichen Zone am erwärmendsten. Nicht ganz unpaßend vergleicht daher Malte Brun die Sahara mit einem ungeheuren Ofen, der Arabien, Kleinasien und Europa mit Wärme versorge. „Europa würde demnach kälter werden, wenn Afrika, vom Meere überfluthet, unterginge, oder wenn die mythische Atlantis aufstiege und Europa mit Nordamerika verbande“ (v. Humboldt). Nordamerika dagegen würde wärmer werden, wenn festes Land, vulkanisch gehoben, sich zwischen die Westküste von Florida und Mexiko einschöbe.

Temperaturerhöhend wirken auch „Gebirgsketten, die gegen Winde aus kälteren Gegenden als Schutzmauern dienen“,.... „die stete Helterkeit des Himmels in den Sommermonaten und die Nähe eines pelagischen

Stromes, wenn er Wasser von einer höheren Temperatur, als das umliegende Meer besitzt, herbeiführt.“ Temperaturvermindernde Ursachen sind, um mit diesem zu schließen, nach A. v. Humboldt: „die Höhe eines Ortes über dem Meerespiegel, ohne daß bedeutende Höhen abwärts betraditende kalte Luftströme verursachen, ausgedehnte Wälder, welche die Insolation des Bodens hindern, durch Lebensthätigkeit der appendiculären Organe (Blätter) große Verbundung wässriger Flüssigkeit hervorbringen, mittelst der Ausdehnung dieser Organe die durch Ausstrahlung sich abkühlende Oberfläche vergrößern und also dresach: durch Schattentüble, Verbundung und Strahlung, wirken;“... „ein nebliger Sommerhimmel, der die Wirkung der Sonnenstrahlen auf ihrem Wege schwächt, und endlich ein sehr heiterer Winterhimmel, durch welchen die Wärmestrahlung begünstigt wird.“

Vergewissern wir uns für einen Augenblick die so unendlich verschiedenartige Beschaffenheit der Erdoberfläche, so ist leicht ersichtlich, daß die Vertheilung der Wärme auf derselben nicht minder mannigfaltig sein muß. Eine klare Uebersicht über dieselbe wurde erst dann möglich, als A. v. Humboldt, dieses Orakel der Natur, alle Orte derselben Hemisphäre, welche gleiche mittlere Jahreswärme, und alle diejenigen, welche gleiche mittlere Sommerwärme und Winterkälte darbieten, durch Linien verband. Man nennt die ersteren Isothermen, dagegen Isochimen die Linien gleicher Winterkälte und Isothermen die Linien gleicher Sommerwärme.

In Nordamerika verlaufen die Isothermen von der atlantischen Küste bis zum 100. Längengrade ohne Hebung fast in der Richtung der Breitengrade, um auf dem hohen Plateau jenseits der Rocky Mountains sich plötzlich zu senken und nach der pacifischen Küste zu bann wieder ebenso plötzlich zu steigen. Die der nördlichen Hälfte angehörigen Isothermen steigen anfänglich, um zwischen dem 110. und 115. Längengrade das Maximum ihrer Höhe zu erreichen, biegen dann auf einmal ein, um in schrägen Linien oft um 30° zu fallen, steigen dann wieder und senken sich nach dem stillen Ocean zu. Unter dem 40. Breitengrade ist ihr Lauf regelmäßiger; im Allgemeinen ist die Richtung eine absteigende, und die größte Senkung bietet sich innerhalb des 100. und 105. Längengrades dar; dann findet eine Hebung statt. — Nahezu so, wie die Isothermen, verlaufen die Isochimen.

Zwischen allen diesen Linien findet ein inniger und notwendiger Zusammenhang statt, der, wenn auch nicht in allen, doch in sehr vielen Fällen begreifen, d. h. auf die Ursachen zurückgeführt werden ist.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N<sup>o</sup> 33.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetfcher Verlag.

**18. August 1869.**

**Inhalt:** Vom Montrosa zum Montblanc, von Otto Me. 1. Aus der Vogelschau. — Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 3. Die Wälder bildenden Holzgewächse. — Literarische Anzeigen.

## Vom Montrosa zum Montblanc.

Von **Otto Me.**

I. Aus der Vogelschau.

Noch vor hundert Jahren waren die Alpen ein fast unbekanntes Gebiet voll Schreden und Grauen, das man gern dem Gensjäger überließ, dessen geheiligte Höhen zu betreten dem Sohn der Ebene nicht gelüftete. Seit die Eisenbahnen das Herz der Schweiz eröffnet haben, sind diese Schreden geschwunden oder doch bis auf wenige eis-umgürtete Gipfel zurückgebrängt worden, und Tausende strömen alljährlich aus allen Ländern herbei, um diese Thäler zu durchwandern und selbst diese Höhen zu erklimmen, die an schönen und erhabenen Scenen der Natur reicher als irgend ein Winkel der Erde sind. Wir Deutsche selbst vergessen unsere sächsische und böhmische und fränkische, unsere voigtländische und sogar märkliche Schweiz, die unsere erfinderische Phantasie selbst inmitten dürrer Sandebenen aufgebaut hatte, um in der wirklichen

Schweiz wirkliche Höheit und Größe der Natur zu bewundern. Freilich muß man auch die Heimat mit ihren kleinen Nachbarn vergessen, wenn man die Hochgebirge betritt. Was sind all unsere bewunderten Gebäude, was unsere Hügel und sogenannten Berge gegen diese gewaltigen Colosse, die oft in einem einzigen Abhange von 7000, 8000, ja 9000 Fuß, wie an der Südseite des Montblanc, unmittelbar emporsteigen! Was sind unsere stolzeßen Straßen- und Eisenbahndauten gegen diese großartigen Alpenstraßen, die über hohe Pässe nach Italien führen, zum Theil in Felswände eingesprengt, mit Lunnen und Galerlen, durch finstere Schluchten sich hinwindend, an Gletschern vorbei oder über blauen See'n schwebend! Da erst erfährt man, was Berge und Thäler sind, wo die Berge so himmelan streben, daß die Sonne auf



ihnen in der Mitte des Sommers nur für 3 Stunden untergeht, wo die Thäler so tief in das Gebirge eingebettet sind, daß, wie in Glarus, auch in den längsten Sommertagen die Sonne nach 5 Uhr nicht mehr gesehen wird! Da erst erfährt man aber auch, was der Fels des Menschen vermag. Denn selbst die Hochalpen bieten nur in ihren unzugänglichsten Theilen das Bild einer Einöde dar. In diesem Lande der See'n und Wasserfälle, der Felsen und Schluchten, der Gletscher und Schneegipfel steht man die grünen Matten und Wiesen von Viehweiden bevölkert, wie wir sie in unsern Ebenen nie erblicken, sieht man die Thäler mit Aush und Obstbäumen geschmückt, die wahre Obstwälder bilden, sieht man die Kultur die jähen Abhänge erklimmen und erst in schwindelnder Höhe am nackten Fels oder an der Grenze des ewigen Schnees enden. Oft, soweit das Auge reicht, erscheinen diese saftig grünen Berggelände mit Häusern und Eennhütten bedeckt, so hoch über dem Thale, auf so abschüssiger Matte, daß man kaum begreift, wie die Leute da hinaufkommen, und wie sie es möglich machen, da oben ihr Leben lang zu existiren und mit einander und der Welt unten zu verkehren!

Nirgends ist dem Fremden das Reisen so bequem gemacht wie in der Schweiz. Gute Landstraßen führen ihn im Wagen über hohe Bergkette, und wo die Fahrstraße aufhört, findet er Maulthiere bereit, ihn höher hinauf zu tragen. Wer aber den vollen Genuß einer Alpenreise haben, wer in vollen Zügen die großartige Schönheit der Alpenwelt genießen will, wer wahrhafte Erholung für seinen Geist, Kräftigung für seinen Körper sucht, der durchwandere dies Reich der Berge zu Fuß! Für den Bewohner norddeutscher Ebenen mag das freilich als eine arge Zumuthung erscheinen. Aber so anstrengend, wie er sie sich vorstellt, sind Fußreisen im Berglande keineswegs. Die beständige Veränderung des Weges, der Wechsel von bergauf und bergab, der bald diese, bald jene Muskeln in Thätigkeit setzt, läßt es zu einer Ermüdung, wie wir sie nach einer Wanderung auf ebener Straße empfinden, nicht kommen, und die eingeatmete reine Bergluft wirkt unglaublich erlindernd. Im Gefühl der größten Erschöpfung nach stundenlangem Bergsteigen an einem heißen Tage stellt sich man nur einige Minuten still stehen, um sich wieder völlig munter und kraftvoll zu fühlen. Je höher man kommt, desto mehr schwindet die Mattigkeit, und wenn man eine Höhe von 6000—8000 Fuß erreicht hat, so empfindet man eine Heiterkeit und Leichtigkeit, die sich kaum beschreiben läßt. Dazu kommt das köstliche Gefühl ungebundener Freiheit, das dem Fußwandler allein zu Theil wird. Von Nichts braucht er seine Aufmerksamkeit abzuwenden; jeden Stein, jede Pflanze, jeden Gegenstand kann er betrachten, Alles untersuchen, nach allen Punkten, die ihm etwas Werthwürdiges zu bieten scheinen, sich hinbegeben, mit jedem Menschen sich unter-

halten, nach Allem sich erkundigen, sich aufhalten, wo es ihm gefällt, wo ihm eine schöne Gegend oder eine Aussicht winkt, kurzum, jede Naturschönheit aufs Innigste genießen und sich mit Anschauungen und Kenntnissen bereichern, sobald er nur will.

Aber dem Fußwandler winkt noch ein andrer Genuß. Nur ihm steht die hohe Gebirgswelt mit ihren großartigen Naturwundern offen. Mag auch jede größere Gletscherfahrt, jede Besteigung eines der Riesengipfel der Alpen noch heute ein gefährvolles Unternehmen bleiben, das eine seltene Kaltblütigkeit, verbunden mit starken Muskeln und Echnen und völliger Schwindelfreiheit erfordert, immerhin bleiben noch Gletscherpässe und Alpengipfel genug übrig, zu denen heute auch dem gewöhnlichen Fußwandler gefahrlose Wege gebahnt sind. Und nur Der hat die Alpenennatur in ihrer ganzen Höheit und Schönheit erschaut, der in diese Eiskergien vorgebrungen und auf diesen stolzen Zinnen gefastan hat! Viele, die von den haarsträubenden Abenteuer der überdies oft mit großen Kosten verbundenen Besteigungen hoher Alpengipfel lesen, meinen wohl, daß dies nur aus dem eiteln Verlangen, sich mit waghalsigen Kletterstücken brüsten zu können, unternommen würden. In den meisten Fällen that man den kühnen Männern damit ein Unrecht. Ursprünglich jedenfalls und noch in neuerer Zeit zum größten Theil ist ein wissenschaftliches Interesse gewesen, das solche Bergbesteigungen veranlaßt hat. Fragen der physikalischen Geographie, namentlich geologische und die überaus wichtige Gletscherfrage, sollten dadurch gelöst werden, oder man wollte Karten entwerfen. Ganz natürlich freilich war es, daß die Bergbesteiger von solchen mühseligen Unternehmungen nicht zurückkehrten, ohne bleibende Eindrücke von den erhabenen Wundern der Alpenwelt heimzubringen und durch ihre Schilderungen Profanen zu machen. So kam es denn, daß allmählig vielfach der bisher unbekannte Hochgenuß, der mit solchen Bergbesteigungen verbunden ist, zum Selbstzweck wurde, und je mehr die Zahl der Besteiger stieg, desto gefahrloser wurde dieser Hochgenuß zu erlangen. Erfahrene Führer wurden herangebildet, leichtere Zugänge zu den Gipfeln aufzusuchen, und viele der Schrecken, mit denen die ersten Besteiger zu kämpfen hatten, verschwanden völlig. Gefährdete Bergbesteigungen, wie die des Montblanc, nahmen wenigstens zeitweise, wie ich es während meines vorjährlgen Aufenthaltes in Chamounix erlebte, den Anschein gefahrloser, wenn auch immerhin mühevoller Spaziergänge an. Auch diesen Hochgenuß, der so viele treibt, die erhabenen Gipfel zu erklimmen, schlägt man nicht zu gering an. Er ist eins der edelsten Gefühle, das nichts mit Eitelkeit und Ruhmverbigkeit gemein hat. Niemand hat diesem Gefühl schöner Worte gegeben, als der gründliche Kenner der Alpen, der es selbst so oft und so tief empfunden, der Verfasser des „Thierlebens der Alpenwelt“, Friedrich von

Ischudi. „Es ist das Gefühl geistiger Kraft“, sagt er, „das den Bergbesteiger durchglüht und die todten Schrecken der Materie zu überwinden treibt; es ist der Reiz, das eigene Menschenvermögen, die unendliche Kraft des intelligenten Willens an dem rohen Widerstande des Staues zu messen; es ist der heilige Trieb, im Dienste der ewigen Wissenschaft dem Bau und Leben der Erde, dem geheimnißvollen Zusammenhange alles Geschaffenen nachzuspüren; es ist vielleicht die Sehnsucht des Herrn der Erde, auf der letzten überwindenen Höhe im Ueberblick der ihm zu Füßen liegenden Welt das Bewußtsein seiner Verwandtschaft mit dem Unendlichen durch eine einzige freie That zu besiegeln.“

Ich gestehe es gern, das Verlangen nach solchem Hochgenuss war es vorzugsweise, das auch mich im vorigen Jahre in die Schneeregalen der Schweizer Alpen führte. So wenig es in meiner Absicht lag, Bergspitzen zu erklimmen, um nachher sagen zu können, ich habe einmal so und so viele tausend Fuß über dem Niveau der Alltäglichkeit gestanden, so wenig ich vollends geneigt war, Gefahren geradezu aufzufuchen, war ich doch entschlossen, Mühen und selbst erste Schwierigkeiten nicht zu scheuen, um einen Einblick in den Bau dieser gewaltigen Gebirgsmasse zu gewinnen, vor Allem aber einmal den Gletscher, den ich bisher nur in seinen unteren Theilen kennen gelernt hatte, bis zu seiner Wiege in den Firnmulden hoch oben zwischen den Zinnen der Alpen zu verfolgen. Zum Ausgangspunkt meiner Wanderungen hatte ich daher jenen riesigen Gebirgswall gewählt, der Italien von der Schweiz scheidet und an seinen Endpunkten die höchsten Erhebungen Europa's trägt, die Walliser und Savoyischen Alpen vom Monserosa bis zum Montblanc. Hier, in der Nähe der Herrscher der Alpenwelt, durfte ich am wenigsten besorgen, den Einbruch des Ganzen durch untergeordnete Bergzüge oder Berggruppen gestört zu sehen; hier konnte ich gewiss sein, die großartigsten Firnmeere, die ausgedehntesten und in allen wesentlichen Zügen ihrer Natur ausgeprägtesten Gletscher anzutreffen. Die Riesengipfel selbst, den Monserosa oder Montblanc zu bestiegen, verbot mir schon die K Rücksicht auf meine Kasse; aber die Pässe, die in unmittelbarer Nähe dieser Gipfel über den Gebirgswall hinüberführen mitten durch die Region ewigen Eises und in Höhen, die manchen bewunderten Gipfel anderer Alpengebiete unter sich lassen, versprachen mir wenigstens annähernd die Erreichung meines Zweckes. Da ich nun auf diesen Wanderungen manche Punkte berührt habe, die wenigstens von Deutschen selten besucht zu werden pflegen, und die doch die schönsten und großartigsten Scenerien der Alpenwelt darbieten, so hoffe ich, daß die nachfolgenden Schilderungen für den Leser nicht ganz ohne Interesse sein werden. Vielleicht verführen sie Manche mit nachzufolgen, wenn auch nicht auf allen den Wegen, die ich gewandelt, bis in die verberbendro-

henden Eislabyrinthe der Gletscher oder an den schwindelnden Abgründen hinan, so doch auf den gefahrlösen und reizvollen Wegen durch die Thäler, die in diesen Gebirgswall einschneiden und selbst auf manche Höhen, die den Blick in die Welt ewigen Schnees und Eises eröffnen.

Ehe ich diese Schilderungen beginne, muß ich den Leser im Geiste auf die Zinnen des Gebirges versetzen, um ihn aus der Vogelschau das Gebiet überblicken zu lassen. Man ist von den alten Karten der gewohnt sich die Alpen als fortlaufende Gebirgsketten vorzustellen. Wenn man sie von fern erblickt, glaubt man in der That diese Vorstellung bestärkt zu sehen. Wie eine ungeheure Mauer mit einzelnen Vorsprüngen und Einschnitten erscheint das Gebirge, welches sich im Süden des Rhodanethales hinzieht. Erst wenn man in das Innere dieser Berge eindringt oder aus der Höhe darüber hin schaut, überzeugt man sich, daß von einer symmetrischen Anlage überhaupt nicht die Rede sein kann. Die untergeordneten Höhen, die aus der Ebene gesehen, einander decken, verschwinden jetzt, was als Mauer erschien, löst sich in ein Gewirr von Berggruppen auf, was als schroffer Gipfel in die Lüfte ragte, wird zu einem breiten, durch Einsenkungen und Einsturzthäler zersetzten Hochlande. Wo noch kettenartige Züge übrig bleiben, da sind es gerade nur Ausläufer der Hauptmasse, und ihre Richtung ist sogar eine völlig abweichende von dem Hauptzuge des ganzen Gebirges. Man hat sich daher längst entschließen müssen, statt der Ketten in den Alpen abgesonderte Centralmassen aufzusuchen, um welche sich die untergeordneten Gebirge gruppieren, und die zugleich den kristallinischen Kern enthalten, der die Syzygie der ganzen Gebirgsgruppe veranlaßt. Zwei solcher Centralmassen haben wir hier vor uns, die gewaltigsten der Alpen überhaupt, die ausgeprägtesten und compactesten zugleich. Wie aus einem Gusse entstrungen, liegt das gigantische Bauwerk der Walliser Alpen vor uns vom Simplicio bis zum St. Bernhard, auf eine Länge von 20 Schweizerstunden ausgedehnt. Ihnen entsteigt im Monte Rosa der höchste Gebirgskopf der Schweiz, dessen Gipfelkranz wie ein leuchtendes Diadem seiner künigshoheitlichen Felspyramiden und eisbergpanzerten Zaden 14,254 p. Fuß (14,752 rh. F.) hoch in die Lüfte streckt, und eine reiche Pracht von Gletschern und Hochfennen schmückt ihre Höhen. Von dem eigentlichen Centralkamm strahlen nach Süden, Norden und Osten Seitenthäler aus, die von fast ebenso großartiger Bedeutung sind, da sich ihre Gipfel zum Theil weit über 13,000 p. Fuß erheben. Auf ihren unteren Ebenen tragen sie die Dörfer; darüber ziehen sich Wiesen und Hochwälder hin, die endlich gegen die Schneide des Grates hin baumlosen trümmerbedeckten Alptriften weichen. Je näher die Grate dem Centralstöße kommen, desto schroffer und wilder und eisreicher werden ihre Höhen. So bilden sie die grünen und grauen Coulissen, hinter denen die imposanten Felsentel und

schwarzen Nadeln, die blendenden Firnfelder und Gletscher emporragen. Wilde, graue Gletscherwasser stürmen aus den tiefen Thälern, welche diese Höhenzüge scheiden, hervor, um der Rhone oder der Dora, dem Lago Maggiore oder Lago d'Orta zuzueilen.

Im Osten und im Westen senkt sich der Hauptkamm der eis Gebirgsmasse, dort im Simplenpaß bis auf 6400 rh. Fuß, hier im St. Bernhardsübergang auf 7860 Fuß. Dazwischen gibt es nur wenige Einsattlungen, die einen Uebergang gestatten. Wer aus dem Rhonethale in das Aostathal gelangen will, hat außer dem 8700 Fuß hohen Col de Fenêtre, der vom Vagnethal in's Val Pelline führt, nur Gletscherpässe zu erklimmen, die ihn in Höhen von 10,000 Fuß und darüber führen. Da wo sich der Hochgebirgskamm der Alpen zum großen Bernhardspaß und zum Col de Jézerre ablenkt, beginnt die zweite Centralmasse, auf die sich unsere Wanderung erstreckt wird, die gewaltige, mehr durch ihre Höhe, als durch ihre Ausdehnung imponirende Masse des Montblanc. Es gibt keine zweite Centralgruppe der Alpen, die so abgetragen, so selbstständig und conform wäre, wie diese. In ihrer größten Längenausdehnung nur 7, in ihrer größten Breite nur 2 d. Meilen messend, trägt sie die höchsten Gipfel

Euopa's, die in der Basse du Dromedaire, der Spitze des Montblanc, zu 15,200 rh. Fuß ansteigen. Scharfe, kurze, starkverwittete Höhenränder laufen nach allen Seiten von dem Gipfelknoten aus, die durch tiefeingeschnittene Spaltenthäler begrenzt werden. Statt der eigentlichen Thäler, wie in den Walliser Alpen, gibt es hier nur jäb absteigende wilde Gletscherfluchten. In furchtbar schroffen, 7—8000 Fuß hohen Wänden flürzt diese Gletschermasse gegen Südosten zur Allée blanche ab, während nach Norden hin gewaltige Gletscherströme von den jädigen Flinnen in das Thal von Chamounix herabhängen. Kein dergleichen Paß führt über dieses Gebirge; der Gletscherpaß des Col du Géant ist, wie Verlepsi sich ausdrückt, nur für vermogene, an harte Strapazen gewöhnte Berggänger practicabel.

Diese höchsten Centralmassen der Alpen vom Montrosa bis zum Montblanc, im Norden, vom Rhonethal und dem Thal von Chamounix, im Süden vom Aostathal und der Allée blanche begrenzt, sind das Gebiet, auf das sich meine Wanderungen im vorigen Jahre erstreckten, und das meine Schilderungen dem Leser mit seinen großartigen und wilden Reizen, aber auch mit seinem lieblichen romantischen Schmucke vorführen sollen.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Carl Müller.

### 3. Die Wälder bildenden Holzgewächse.

Höchst auffallend erscheint in der kalten Zone die Menge der Holzgewächse. Von den 36 Familien, welche innerhalb der mitteleuropäischen Flora Holzpflanzen hervorbringen, ziehen sich noch immer 16 Familien mit etwa 125 Arten in dieselbe hinein: Rhamneen, Rosaceen, Poaceen, Amgdaleen, Grossularaceen, Caprifoliaceen, Vaccinieen, Ericineen, Ulagaceen, Empeteen, Lamiaceen, Cupulifereen, Salicaceen, Betulaceen, Myricaceen und Conifereen. Wenn die Holzpflanzen, da sie erst gegen den Aequator hin ihre größte Fülle erreichen, überhaupt der treueste Ausdruck der Schöpfungsfülle einer Zone sind, so geben sie auch für die Gestaltungskraft des kalten Erdstrichs den besten Maßstab ab.

Ein einziger Blick genügt zu erkennen, daß die 16 Familien nur solche sind, die am meisten die gemäßigste Zone charakterisiren. Unter ihnen stehen die Nadelhölzer obenan; nicht nur, weil sie fast die einzigen sind, die Wälder bildend den Polarreis überschreiten, sondern auch weil sie dies zahlreicher ausführen, als man erwarten sollte. Ich zähle noch 14 Arten, die sich in verschiedenen Abständen rings um den äußeren Saum der Polarzone stellen. In Europa, das am wenigsten an der arktischen Welt Theil nimmt, kommt zunächst für den Continent die skandinavische Halbinsel in Frage. Hier sind zwei we-

sentlich verschiedene Küstenlinien, die westliche norwegische und die östliche schwedische, zu unterscheiden; jene, weil sie, von dem warmen Golfstromee beeinflusst, ihre Baumgrenzen weiter nach Norden ausdehnt als die östliche, welche ihre Erwärmung nur aus dem continental-influensirten Klima bezieht. Darum geht unsere Kiefer (*Pinus sylvestris*) an der Westseite noch bis Alten (70°) als stattlicher Baum, während sie im russischen Koppland, obwohl durch ein Continentaliklima begünstigt, nur bis 60° in der Halbinsel Kola reicht, wo sie die Küsten umsäumt. An der Ostseite des weißen Meeres bleibt sie indeß schon bei Wesen (68°), im Ural schon bei 64° zurück. Umgekehrt die Fichte (*Picea excelsa*). Sie, welche im höchsten Norden ihr hängendes Astwerk mit einem Starr-aufrechten vertauscht, verträgt weniger gut ein Küstenlima und geht darum an der Westseite spärlich nur bis zum Meerbusen von Kunnin (67°), an der Ostseite reichlich etwa bis zum 69° n. Br., wo sie an der Windung des Kistseeis in den Bögssjöd (Hälmarmen) ihre nördlichste Grenze für Standbäume erreicht, und von wo sie sich in den östlichen Theil der Halbinsel Kola verliert, um hier wie dort ihre Polarergrenze mit jener der Kiefer zu vereinigen. Hier, im clausuralen Rußland, begegnet ihr auch eine zweite täuschend ähnliche Fichte (*Picea obovata*), die über

den Ural hinweg aus Sibirien kommt, wo sie am Jenissei zwischen  $66^{\circ}$ — $67^{\circ}$  n. Br. ihre letzten großen Wälder, bei  $69\frac{1}{2}^{\circ}$  ihre letzten Ausläufer bildet, die wie die Bäume jener Wäldungen kaum über 30 F. hoch und nur noch schenkelbildend wachsen. Auf der europäischen Seite erscheint in der arktischen Zone der Wald doch immer als Ausnahme. Längs des nördlichen Ozeans bis zum Ural kann man die Punkte zählen, welche der Wald besiedelt. Nach Castrén erscheint oberhalb Muras ein solcher auf der Halbinsel Kanin Nos, ein zweiter auf der östlich von ihr gelegenen Timan'schen Tundra, von der er sich als schmaler Saum vom  $68^{\circ}$  bis fast zum  $65^{\circ}$  herab erstreckt. Ein dritter Waldpunkt findet sich östlich der Tundra jenseits der Mündungen der Petschora in's Ozean auf der Bolschschemschen Tundra längs des  $68^{\circ}$ , ein vierter am Ufa, einem Nebenflusse der Petschora, an der Grenze des Sorjänen-Landes zwischen  $66^{\circ}$  und  $68^{\circ}$  n. Br. Die letzten Wälder, durch besonders günstige Verhältnisse hervorgerufen, drängen sich wie Pflanzeninseln vereinzelt in den Ocean des Polarlandes hin. Nur südblich übergeben sie oft Strecken von 20 Meilen Breite von Norden nach Süden, hoch und schlank, ähnlich, wie man es in Canada gewohnt ist. Soweit sonst das Auge reicht, erblickt es nichts, als das trostlose Weiß der üppig wuchernden Renthierräste, wenn nicht Sümpfe mit ebenso traurigem Eimerel von Torfmoosen abwechseln und jede kleine grüne Stelle irgend eines Gebüsches oder einer Weide sofort als eine liebliche Oase in wüster Erde erscheint.

Wie Sibirien Nordrußland einen Theil seiner Nadelhölzer aufsendet, so schickt Europa seine Kiefer nach Sibirien hinüber. Doch geht sie hier nicht über den Polarkreis hinaus, sondern bleibt bei  $66^{\circ}$  am Jenissei stehen, obgleich sie über das ganze Land verbreitet ist. Hier bildet sie gleichsam die südliche Vorhut für einige andere Nadelhölzer, die theilweis weit über den Polarkreis hinaus gehen. Zunächst für die Zirkelkiefer (*Pinus Cembra*). Auch sie durchwandert, sehr selten freilich in eigenen Beständen, Sibirien vom äußersten Osten bis zum äußersten Westen, den sie im Ural überschreitet, und erlangt über die Polarlinie am Jenissei, wo sie mit *Picea obovata* und *Abies Sibirica* in dichten Wäldern zusammen wohnt, bei  $64\frac{1}{2}^{\circ}$ . Letztere, die sibirische Tanne, der treue Gefährte unserer Kiefer, zahlreich mit ihr verbreitet, doch nur 2 F. dick wachsend, endet schon bei  $67\frac{1}{2}^{\circ}$  N. Dagegen dringt die sibirische und bairische Kiefer (*Larix Sibirica* und *daurica*) am weitesten nach dem Pole vor: die letztere im Allgemeinen bis  $72^{\circ}$ , an der Lena bis  $71\frac{1}{2}^{\circ}$ , die erstere am Ob bis  $65\frac{1}{2}^{\circ}$ , am Jenissei bis  $66^{\circ}$ , im Taimerlande bis  $72^{\circ}$  und als Strauch sogar bis  $73^{\circ}$ . Die sibirische Kiefer, berichtet v. Middendorff, steht von allen Nadelhölzern Sibiriens am unabhängigsten von subalpiner Erhebung des Bodens über die Meeressfläche da. Noch über Jeni-

sejst hinaus bildet sie Stämme von 50 Zoll im Schaft, unter  $67^{\circ}$  sogar noch einzelne Stämme von 22 Zoll. Doch nimmt auch sie gegen Norden hin ab, wie alle Nadelhölzer, und schneidet fast bei  $72\frac{1}{2}^{\circ}$  als Wald von 7—10 F. Höhe plötzlich ab. — Mit dieser Annahme der Wachstumsverhältnisse geht ein völliger Wechsel in der Physiognomie der nordibirischen Wäldungen vor sich. Keist erscheinen sie von sehr jugendlichem Alter; aber dieses ist nur ein Scheinbair, da sich das wahr bald durch dicke Flechtenbärte verräth. Die Kürze des Sommers begünstigt kein Längen-, kein Dickenwachsthum. Darum auch erscheinen die Kiefern gegen die Waldgrenze hin gipfelspindelförmig, gipfelbäum oder selbst astlos, unfähig, mehr als ein Gwieser verdorrter Stammsprossen zu bilden. Begünstigtere Stämme bleiben zwar kürzer, aber sie treiben in einer Höhe von 2 bis 5 F. einen oder mehrere horizontale Äste, die der ganzen Länge des Baumes gleichkommen. „Eine Menge verfehlter Knospen, die Wirtelsinnigkeit der Ästchen deuten auch hier, wie oft der Baum fruchtlos gekümpft. Mit diesen verkümmerten Zweigen schneidet der Wald ab, und zwar sichtlich plöglch. Die Kälte der Luft hat entschieden gesetzt; nur kümmerlich im Schooße der Erde, von Moos bedeckt, freisetzt der Stamm eines greifen Strauchs sein Leben, kaum über 1 Zoll dick, nur wenige Zoll lang. Er gebet sich nun; der längste Ast reicht an der Erde unter dem Moos verdeckt, höchstens 2 Spannen, und nur kleine einjährige Nebenastchen guden mit ihren Spizen verflochten aus dem Moos hervor, den Strauch verrathend, der gleichwohl zu derselben Art, als der Baum gehört.“ Dieser Verkrüppelung entspricht ein stetes Lichterwerden des Waldes; und doch tragen selbst noch die verkümmerten Bäumchen vollständige Zapfen mit ausgebildeten Samen, so daß manche übermäßig damit behängt sind.

Auch das arktische Amerika zeigt, nach dem Tagebuche von Franklin's erster Polartreise (1819—22) Aehnliches. — Unter allen den zahlreichen Nadelhölzern Hudsoniens geht die Weißkiefer (*Picea alba*) am nördlichsten; um so mehr, als sie, an der Hudsonbai zwischen  $60$ — $61^{\circ}$  N. beginnend, so recht eigentlich zur kalten Zone bestimmt ist. Nördlich vom Saskatdawan dehnt sie ihre Bereich über mehr als 12 Breitengrade fast ausschließlich aus, folgt der nordwestlich gegen die arktische Küste aufsteigenden Baumgrenze, erreicht unter  $67^{\circ}$  die Linie, auf welcher sie auch die Felsengebirge überschreitet, in der Nähe des großen Bärensees, und folgt nun, wenn auch nur als schmaler Saum, dem Laufe des Mackenzie fast bis zur arktischen Küste, bis  $68\frac{1}{2}^{\circ}$  n. Br., so daß die letzten Wälder, da sie nur den Jüfusern zu folgen pflegen, sich in langen Linien, nicht kreisförmig um den Pol stellen. Schlichtern folgt ihr die Schwarzkiefer (*Picea nigra*) bis zum äußersten Punkte, ohne doch mehr als ihr Trabant zu werden. Noch weiter bleibt die kleinfrüchtige

Lärche (*Larix microcarpa*), bei 61° zurück, obgleich sie im Süden Hudsoniens oft meilenlange Wälder bildet. Nördlich vom 65° N. sinkt sie schon zu einem Strauche von 6 bis 8 F. Höhe herab und neigt an ihren Grenzen so zur Krummholzform, daß sie von den Cree-Inulanen der gedrückte Baum genannt wird. Auch die Banks'sche Kiefer (*Pinus Banksiana*) reicht nur um einen Grad nördlicher (68°) und bewohnt den Sandboden.

Zwar nehmen diese Wälder auch hier gegen Norden hin merklich ab, doch bewahren sie im Thale des Mackenzie bis fast zu dessen Mündung eine merkwürdige Frische und Kraft. Weibschiden, die im Süden noch 4 bis 5 F. im Umfange bei 60 bis 120 F. Höhe zeigen, sinken bei 68° N. auf eine Höhe von 40 bis 50 F. und mischen sich an den Delta-Inseln mit Balsampappeln (*Populus balsamifera*), ganz wie im südlicheren Sibirien. Ein Saum von Weiden, Felsenmispeln, Delmeiden (*Elaeagnus argentea*) und Kudornen (*Shepherdia*-Arten) begleitet den Wald im Süden, während unter 68½° N. ein gegen 20 Fuß hohes Gestrüpp von Pappelerleiden (*Betula papyracea*), Balsampappeln, Grünselen (*Alnus viridis*) und Weiden (*Salix speciosa*) die Deltainseln des Mackenzie umringt. Rote Johannisbeeren, weiße Rosen (*Rosa blanda*), Preiselbeeren, Kalmien, Muldebeeren mischen sich als Sträucher, Lupinen (*Lupinus perennis*) und Huflattich (*Nardosmia palmata*) als Kräuter ein. Bei 68° 55' geht auch diese Herrlichkeit zu Ende, nur verkrüppelte Fichten und Birken wagen es noch, einzeln weiter zu dringen. Aber auch hier kehrt das Bild der Jugend wieder, das v. Middendorff so bezeichnend für die letzten Wälder Sibiriens fand, das aber ebenso auch auf unsern Alpen, besonders bei der Zirbelkiefer wiederkehrt. Weiden (*S. speciosa*) von 20 F. Höhe und 5 Zoll Dicke fand man im nordwestlichen Eskimolande von so jugendlichem Aussehen, daß man sie für 5- bis 6-jährig halten mußte, während sie nach ihren Jahresringen doch schon Greise von 80 Jahren waren.

Wir zählten folglich 3 Lärchen, 4 Fichten, 3 Kiefern und 1 Tanne, welche in verschiedenen Linien den Polarkreis überschreiten oder ihn nahezu erreichen. Ihr Dasein und ihr Aufhören in ungleichen Abständen bewirkt mithin, daß das Polarland, wenn man es sich als einen zusammenhängenden Kugelabschnitt vorstellt, wie ein kahler Scheitel erscheint, dessen Ledenschmuck sich in einer curvenreichen Linie fast überall unter derselben Form um diesen Scheitel lückenhaft windet. Freilich tritt zu den 4 Nadelholzformen noch die des Wacholders (*Juniperus*) hinzu; allein sie reicht nicht mehr aus, etwas Bestimmtes zu diesem Scheitelschmucke hinzuzufügen. Sämmtliche 3 Arten, welche den Polarkreis überschreiten, sinken zu Zwergen herab, unfähig, mehr als ein Unterholz zu bilden. Wie sie rings um die nördliche Halbkugel wachsen, ebenso umringen sie auch das Polarland als die letzten Strahlen

ihrer Gattung. Das bezieht sich namentlich auf den gemeinen und den Zwergwacholder (*J. communis* und *nana*). Weide bringen auf der östlichen Halbkugel am weitesten, auf der Insel Wagerö bis 70°, auf der Insel Kalligew bis 69¼° vor, während der Zwergwacholder sowohl auf Grönland wie auf Island das einzige Nadelholz ist, dessen Stamm sich nur wenig über den Erdboden erhebt. In Hudsonien sinkt der virginische Wacholder, sonst bis 60° ein stattlicher Baum, zum Strauche herab, sowie er den 68° n. Br. erreicht.

In Lappland, überhaupt im Norden, folgt auf die Form der Nadelhölzer die Birke, welche in der subalpinen Breite eine eigene Region bildet. Wie dies in senkrechter Richtung geschieht, ebenso geht es in waagrechter Richtung vor sich, so daß sich auch hier das Bild der Alpenwelt — Nadelhölzer, Birken und Alpenkräuter — in drei verschiedenen Gürteln wiederholt. Doch ist es mehr nur eine Erinnerung an diese Stufenfolge, wie eine massige Ausführung. Die Weibsbirke (*Betula pubescens* oder *glutinosa*), die sonst jene Birkenregion in Baumform bewirkt, sinkt, sobald sie den Polarkreis berührt, zum Zwergstrauche herab und bleibt in Lappland zwischen 70 bis 71° zurück. Auf Island wird sie nur noch 4 Ellen hoch. Auf Grönland sah ich Egebe zwischen 60—61° n. Br. noch als Bäumchen von 2—3 Klaftern (à 6 F.) Höhe und von der Dicke eines Mannes-Armes; unter 72° 25' könnte sich allenfalls noch ein Kesthler in einem solchen Birkenwalde verbergen. Nördlicher kriechen Birken und Weiden 3 bis 4 Ellen lang, über der Wurzel 2 bis 3 Zoll dick, am Boden hin, selten bis 1½ Ellen hoch erhebend und sich gegenseitig stützend. In Lappland tritt sie noch am stattlichsten, eine eigene Region bildend, in zwei Formen (*B. pubescens* und *glutinosa*) auf, die aber so langsam an der obersten Grenze der Birkenregion (432 bis 534 Meter) wachsen, daß N. J. Andersson auf einem Querschnitte von 8 Centimeter Dicke 70 Jahresringe zählte. In Sibirien traf v. Middendorff noch Birken von Manneshöhe und 4 Zoll im Durchmesser bei 69¼°, allein so morsch, daß der leichteste Anstoß einen solchen Stamm zerbrach. Sonst breitet sie in diesem Lande ihre Sprosskraft immer mehr aus, je mehr der Ackerbau den Nadelwald zurückdrängt und je zahlreicher die Waldbrände sind, durch welche der Boden mit Asche bedünkt wird. Man muß jedoch ausdrücklich wissen, daß immer nur die *Betula glutinosa* gemeint ist, wenn von der Birkenregion im Norden gesprochen wird, obgleich sie Andere nur als Form der *B. alba* betrachten. Es steht dahin, ob auch 2 andere, aber strauchartige Birken (*B. fruticosa* Horn. oder *pumila* Vahl. und *alpensis* Fr. oder *humilis* Horn.) nur Abänderungen der Weibsbirke oder Bastarde zwischen dieser und der Zwergbirke sind. Jedenfalls scheiden auch sie sich nicht weit vor, da sie nur die südlichen Theile Lapplands und Grönlands bewohnen. Nur die wirklich selbständig als

Art daselbende *Amegdicke* (*B. nana*) reicht, freilich meist knieholzartig auf den Boden zurückgekrümmt, dem sie kaum entsprossen, meist über den Polarkreis hinaus. Bewohnerin von Lappland, Island, Labrador und Grönland, ist sie auch Sibirien eigenthümlich und erreicht hier im Taimerlande bei 75° einen der nördlichsten Punkte aller Strauchpflanzen. In Hudsonien begleitet die drüsige Birke (*B. glandulosa*) die Weißfichte als die nördlichste Holzpflanze bis zu den Mündungen des Madensie.

Erlen und Weiden vermögen ebenso wenig ein dichtes Pflanzengleid zu wehen. Doch sind sie als Ufersträucher und Sumpfbewohner unter den letzten Bürgern des Gemäßigten Reiches. Die Erle bringt nur in 3 Formen vor. Die Grauerle (*Alnus incana*) verliert sich in Lappland in die obere Region der Nadelbölzer, reicht aber nicht so weit, als in Sibirien, wo sie bei 66° an der Boganida endet. Sie stellt sich aber auch noch in Labrador unter geringeren Breiten ein und wird in höheren von der Grün-erle abgelöst. An der Boganida gesellt sich ihr auch die Strauch-erle (*A. fruticosa* Rupr.) zu. In Grönland tritt dafür die kriechende Erle (*A. repens* Wormskj.) hinzu, die bis 64° geht. — Ganz anders die Weiden. Diese vertreten durch den Reichthum ihrer Formen noch am meisten die Form der Laubbölzer. Sie zählt fast gegen 50 Arten, die wir hier aus den arktischen Regionen kennen gelernt haben. Ein großer Theil hiervon gehört Lappland und Hudsonien an und könnte einen südlichen Typus vertreten, während ein anderer Theil zu Altpflanzsträuchern herabsinkt und durch Kleinheit sowohl, als auch durch kriechende Stämmchen einen rein arktischen Typus annimmt. Eine Menge geben rings um den Pol als die gleichen Arten; andere gesellen sich ihnen zu, welche nur der östlichen oder westlichen Halbkugel vorbehalten bleiben. Im Taimerlande, wo v. Middendorff überhaupt nur noch 8 Holzgewächse sammelte (*Betula nana*, *Salix polaris*, *lanata*, *glauca*, *arctica*, *taimyrensis*, *Cassiope tetragona*, *Ledum palustre*) geben ein Paar Arten noch über 75°; nördlich vom Whalesund oberhalb der Baffinsbay, d. h. jenseits 78° n. Br. sammelte Dr. Hare 6 unter 8 zwerghigen Holzpflanzen (*Vryas integrifolia*, *oclopetala*, *Vaccinium uliginosum*, *Cassiope tetragona*, *Empetrum nigrum*, *Betula nana*) noch 2 Weidenarten (*Salix arctica*, *herbacea*), die freilich leicht Weiden bilden, die man in die Tasche stecken kann. —

Alles Uebrige von Holzpflanzen ist Unterholz, soweit es nicht eine eigene Region bildet. Die Zitterpappel (*Populus tremula*) gehört der Birkenregion Lapplands bis Polmak (vgl. unten) an, geht aber in Samojebien nur bis 66°, wo sie mit Tannen, Fichten, Birken, Weiden, Erlen und Ebereschen (*Sorbus aucuparia*) vereint wächst, sobald die Flussufer höher werden und somit das Erscheinen von Wäldern begünstigt wird. An der Boganida reicht die Eberesche nur bis 64°; in Lappland wird sie zu einem

matten Charakterbaume, dessen Blüthenreichtum nicht nur die Birkenregion, sondern auch die höheren Regionen bis zu 600 Metern vertikaler Erhebung schmückt, obgleich sie im Allgemeinen hinter der Birke etwas zurückbleibt. Auf Island, wo sie als höchster Baum gegen 15 bis 20 F. hoch wird, und in Labrador vorkommt sie ein Gleiches, am letzten Orte verbündet mit Felsenmispeln (*Aronia ovalis*) und Rothdornen (*Crataegus coccinea*). Der amerikanische Apfel (*Pyrus Americana*) und die Zwergmispel (*Cotoneaster vulgaris*), die mit den 4 letzten Arten die letzten Vertreter der Pomaceen darstellt, geben (der erstere) weder in Hudsonien und in Grönland, noch (die letztere) in der Halbinsel Kola im russischen Lappland über den Polarkreis hinaus. Auch der Faulbaum (*Prunus Padus*), der letzte Vertreter der Amegdalen, fürchtet ihn weit zu überschreiten. Denn obgleich er in Lappland noch in der Birkenregion innerhalb 64° erscheint und in Ostfinmarken am Tanael, 6 Meilen von dessen Mündung in das Eismeer, bei dem Kappenbors Polmak seine nördliche Grenze erreicht, so endet er an der Boganida in Sibirien schon bei 61°. Ähnliches geschieht vom Schneeball (*Viburnum Opulus*) zu sagen; er verschwindet als Bewohner der unteren Waldregion (Kiefer und Fichte) bei 64° 16', während sein Vertreter, der abornidätrige Schneeball (*V. acerifolium*) und das familiäremwandte Gelbblatt (*Lonicera coerulea*) in Labrador nicht einmal diese Breite erreichen. Letzteres umsäumt im russischen Lappland besonders die Buchsener und bringt mit Weidengehölz (*Salix rosmarinifolia* und *myrtillifolia*) bis zu dem schönen See von Imandra bei fast 68° n. Br. vor. — Die Haselnuss (*Corylus Avelana*), der einzige Vertreter der Cupuliferen, wagt es nur an der norwegischen Küste, wo die See nie gefriert, bis in die Umgegend von Helgeland (65½°) und Ålsten (66°) zu gehen und bleibt an der Schwelle schon an der Angerman-Eis bei 63° zurück. Auch die Myricarie (*Myricaria germanica*), diese Polararte der gemäßigten Flora, welche den Flussufern unserer Hochgebirge ein so merkwürdiges Ansehen gibt, verliert sich in Lappland nur bis in die Waldregion, wo sie mit Kiefern, Birken, Erlen, Wacholder, rothem Johannishbeerstrauch und der Aderbuche häufig einen seltsamen Verein bildet. — Selbst die Stachelbeersträucher verhalten sich wie südliche Formen. Im norwegischen Lappland geht die Alpenjohannishbeere (*Ribes alpinum*) bis nach Nordland und Allen (70°); die rothe Johannishbeere (*R. rubrum*), ebenso weit reichend, ist ein Mitglied der Birkenregion, die schwarze (*R. nigrum*) eine Bewohnerin des russischen Lappland, wo sie bis nach Kola reicht, während eine vierte Art (*R. propinquum* Turcz.) die Baumregion an der Boganida, eine fünfte (*R. prostratum*) Labrador und Hudsonien bewohnt. — Der gemeine Kreuzdorn (*Rhamnus Frangula*) bildet eine Linie durch das ganze Schweden von Schoonen bis Vitebsk-Lappland (65½°), wo er die Region der Kiefer

und Fichte schmückt; der Purgleedorn (*Rh. cathartica*) ist schon bei 61° 40' zurückgeblieben. — Von den 15 Rosaceen fällt eine Rose (*R. blanda*) auf Hudsonien, eine zweite (*R. acicularis*) auf die Baumregion der Bogantba, eine dritte (*R. Carelica*) auf das russische Lappland, eine vierte (*R. cinnamomea*) auf die Bienenregion Lapplands; eine fünfte (*R. canina*) und eine sechste (*R. mollissima*) gleiten wie die vorigen die norwegische Küste bis Alten (70°), die fünfte geht um den ganzen Pol. Rosen, Rubus-Arten und Heidelbeersträucher bilden in der arktischen Tiefebene Rußlands nach Blasius häufig ausgebreitete und eigenthümliche Formationen. Von den 7 Rubus-Arten erzeugt nur die Himbeere (*R. Idaeus*) perennirende Stengel in der mittleren und oberen Waldregion Lapplands, sowie in Nordeusland, Labrador und den übrigen Polarländern bis 70° n. Br.; die andern sinken zu Zwergen herab, die jährlich ihre Stengel einziehen. Davon kommen 2 (*R. acaulis*, *flagellaris*) ausschließlich auf Labrador; 1 Art (*R. castoreus*) gehört in Lappland den Distrikten von Umeå, Piteå und Luleå an, wo sie in Weidenbüscheln wächst; die Felsenbeere (*R. saxatilis*) erscheint nur südlich auf Grönland und Island bei 60°; die rothblumige Ackerbeere (*R. arcticus*) und die schneebloomige Muldbeere der Skandinavier oder die Maroscha der Russen (*R. Chamaemorus*) gehen allein rings um den Pol. Erstere gehört der Waldregion an und geht bis Alten in Norwegen (70° N.). Letztere, eine Moorpflanze, reift in Grönland ihre Frucht nicht mehr, blüht aber noch am Nordcap bei 71° 10' 15". Wie sie in Europa noch bis auf die schottischen Hochgebirge und die Subeten geht, ebenso steigt sie in Hudsonien als „Cloudberry“ auf die höheren Berge von Maine und New-Hampshire hinauf und ist in den beiden Canada's allgemein verbreitet. — Keine einzige Schlingpflanze vertritt sich in diese Regionen, obgleich die Wald bildenden Nadelbölzer an ihren äußersten Punkten doch noch ein Paar Fuß hoch werden.

Eine eigene Region bildet der balsamische Gagel (*Myrica Gale*). Auch dieser geht an der norwegischen Küste bis zum Nordcap, wo er sich mit dem Audorn (*Hippophaë rhamnoides*) vergesellschaftet. Beide fehlen der Ostküste Skandinaviens und hängen an der Westküste nur als Bewohner des vom Golfstrom erwärmten Strandes aus, ohne sich wie die vorigen zu der Stufe eines Unterholzes zu erheben. Sie theilen diese Eigenschaften mit den letzten der Holzpflanzen, den beiden Draciden, den Heidelbeersträuchern und Ericinen, die, wenn sie sich auch einmal in den Waldverband verlieren, doch eine selbstän-

dige Region, nämlich die Region der Alpensträucher bilden.

### Literarische Anzeigen.

Von dem Verfasser des Werkes „Der fossile Mensch“, Herrn Professor Dr. Fuhlrott erschien so eben bei J. Neuberger in Leipzig:

### Die Höhlen und Grotten in Rheinland-Westphalen.

Schilderung und Plan der neuentdeckten prähistorischen Denkmale.  
V. Dr. Fuhlrott.  
Ebd. 15 Sgr.

Der Verfasser gibt neue Aufschlüsse über die Entdeckung der Höhlen im Allgemeinen und ihre Geschichte, über die Tropfsteingebilde, fossilen Thierreste und andere Funde darin, in anziehender Form, und beschreibt insbesondere die in der „Gartenlaube“ von Herrn Professor E. Vogt kurz geschilderte neue Grüner Höhle.

Im unterzeichneten Verlage erschienen soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Monatliche Mittel des Jahrganges 1868

für **Druck, Temperatur, Feuchtigkeit**  
und **Niederschläge**  
und **fünftägige Wärmemittel**

nebst Abweichungen derselben für die Jahre  
1866, 1867, 1868.

Veröffentlicht von **H. W. Dove**.

7 1/4 Bogen in Royal-Quart. broch.

Preis 18 Sgr.

Berlin. Verlag des königl. statist. Bureau's (Dr. Engel).

### Alexander v. Humboldt in seiner Bibliothek.

Dieses in farbereichem Aquarell von dem jüngst verstorbenen Professor Eduard Hildebrandt im Jahre 1856 ausgeführte Tableau wurde auf das Anbringen der Freunde Humboldt's kurz nachher in dem Atelier von Storch u. Kramer in Berlin mit 18 Platten in genauer Uebereinstimmung mit dem Originale durch Delbrück vervielfältigt. Die Exemplare waren im Jahre 1863 vollständig vergiffen, und erst neuerdings sind in dem Nachlaß des Berechtigten eine kleine Anzahl von Exemplaren aufgefunden worden und in den Besitz der Kunsthandlung von Eduard Quast in Berlin übergegangen. Der Preis des großen, 28 Zoll hohen und 38 Zoll breiten Tableau's ist 2 Friedrich'sdor. Da die Platten vernichtet sind, neue Exemplare also nicht hergestellt werden können, so wird das Bild für Freunde und Verehrer des großen Gelehrten sehr bald ein nicht wieder zu beschaffendes werthvolles Andenken sein.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Sgr. (1 R. 30 Kr.)  
Für Buchhandlungen und Verkäufer nehmen Bestellungen an.



## Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 34.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetitsch'scher Verlag.

**25. August 1869.**

**Inhalt:** Das Klima von Nordamerika mit dem Europa's verglichen, von Adolf Ott in New-York. Zweiter Artikel. — Vom Montrose zum Montblanc, von Otto Me. 2. Vom Senefse zum Waddi. — Ein Liebhaber der Heinschneider, von Georg Stier. Erster Artikel.

### Das Klima von Nordamerika mit dem Europa's verglichen.

Von **Adolf Ott** in New-York.

Zweiter Artikel.

Wenn in gesellschaftlichen Kreisen vom Klima dieses Landes die Rede ist, hört man gewöhnlich die Frage aufwerfen, um wie viele Grade dasselbe kälter oder wärmer sei, als dasjenige von Europa, oder um wie viel Grade die Wärme in Californien größer sei, wie die an der atlantischen Küste. So allgemein ausgedrückt, haben solche Fragen keinen Sinn, da der Wärmeunterschied unter jedem Breitengrade ein anderer ist. Noch mehr aber müssen wir uns wundern, wenn der berühmte Geograph Maltzbrün die Frage vom Klima Nordamerika's zu erledigen sucht, indem er sagt, daß es vom Frost Norwegens rasch zu der verdorrenden Hitze Afrika's und von der Feuchtigkeit der Niederlande zu der Trockenheit Kasiliens übergehe. Solche allgemeine Sätze sind nicht geeignet, uns ein Bild von der Wärmevertheilung auf diesem Conti-

nent zu verschaffen. Allerdings gestattet die große Mannigfaltigkeit der ein Klima bedingenden Ursachen auf engem Raume auch nur eine einfache Skizze zu liefern. Doch wie eine solche oft einen nachhaltigeren Eindruck in der Seele des Beschauers zurückläßt, als eine bis in das kleinste Detail ausgeführte Zeichnung, so hoffen auch wir, daß dies mit dem hier zu entwerfenden Bilde der Fall sein werde.

„Nicht Meere, sondern Gebirge bilden die Grenzscheiden der Witterung, sowie der Völker.“ Mit diesem Satze hat Carl Ritter in seiner markigen Weise eine tiefbedeutsame Wahrheit ausgesprochen, und wir finden dieselbe in ihrer ganzen Bedeutung auf dem Kontinent, den wir bewohnen, bewahrheitet.

Wir können in Bezug auf das Klima von Nordames-



rika vier verschiedene Regionen unterscheiden: 1. die Region der atlantischen Staaten östlich von den Alleghans; 2. das weite, zwischen den letzteren und den (die Fortsetzung der Cordilleras bildenden) Rocky Mountains liegende Mississippibecken; 3. das Tafelland zwischen den Rocky Mountains und den Seerälen der pacifischen Küste; und 4. das Küstenland vom stillen Ocean.

Wir haben hier je zwei Klimate, welche sich in Hinsicht auf die periodischen jährlichen Fluktuationen (Sommerwärme und Winterkälte) entgegengesetzt sind, Klimate, um mit Schouw zu sprechen, mit großer und solche mit geringer Amplitude, excessive und limitirte, oder Binnenlands- und Seeklimate. Nichtbedeutsamer sind dieselben unter einander wieder sehr verschieden. Wenn wir z. B. an der atlantischen Küste Winter von intensiver Kälte haben, so zeichnet sich diese Jahreszeit an der ganzen Westküste durch große Milde aus. Fünf Grade nördlich von der Stadt New-York in Oregon überdauert das Gemüse im Garten den Winter; die Rebe gedeiht dort unter dem Breitengrad von Montreal (45° 30') und die Lilie unter der Breite von 38°. In Sietka im jetzigen Alaska (russisch: Atjaskaja<sup>1)</sup>) fällt die mittlere Kälte nur 2¼° Fähr. über den Gefrierpunkt<sup>2)</sup>, während sie in Labrador unter dem nämlichen Parallel nicht weniger wie 36° unter diesen Punkt fällt. Die Verschiedenheit im Klima der oben genannten, durch die hohen Gebirgsrücken getrennten Länder ist ebenfalls sehr auffallend. Während das durch seinen Flußreichtum sich auszeichnende Mississippibecken sich im Allgemeinen durch seine strengen Winter und tropischen Sommer charakterisiert (die Winterkälte ist an einzelnen Tagen — 32° und — 37° Fähr. und die Sommerhize 69,8 bis 71,3° Fähr. Mitteltemperatur), nähert sich das Klima des hohen, durch untergeordnete Thalbildung sich auszeichnenden Tafellandes schon mehr der atlantischen Küstenregion; auch bietet die Luft dort eine außerordentliche Trockenheit dar, und es nimmt daher der Himmelsstrich, so wunderbar es auch erscheinen mag, vielfach einen innerasiatischen Charakter an.

Untermessen wir zuerst die Wärme- und Feuchtigkeitsvertheilung der Ost- und Westküste unserer Betrachtung. Ihre ungleichförmige Beschaffenheit ist vorzüglich durch Luft- und Meeresströmungen bedingt. Während erstens der herrschende, von Norden nach Süden fluthende, Weststrom an der Westküste Seewind ist, ist er an der Ostküste (von Kanada kommend) Landwind, und weil das

Meer sich niemals so stark erkaltet wie das Land, so ist auch der Seewind von milderndem Einfluß. Während ferner die Westküste von einem warmen Meeresstrom<sup>3)</sup> bespült wird, welcher, im indischen Ocean gefoht und an Formosa und Japan vorbeileitend, sich gegenüber den Loo-Choo und Bonin-Inseln 500 Meilen weit fächerartig ausbreitet, um ähnlich, wie der Geißstrom, sonst unwirthliche Länder menschlicher Kultur zugänglich zu machen, drängt sich an der Ostküste ein von Spitzbergen kommender Meeresstrom zwischen den Geißstrom und die Küste ein, um erst unter dem 41. Breitengrade sich in diesen zu ergießen. Wo das Klima einer Gegend nicht durch Lokaleinflüsse verändert wird, wie z. B. im südlichen Theile von New-Jersey, läßt sich der erkaltende Einfluß dieses Polarstroms recht deutlich erkennen. Ich fand es daselbst während eines mehrwöchentlichen Sommeraufenthaltes an der Küste immer empfindlich kälter, wie in der inneren Landesgegend.

Wie bedeutend das Klima der genannten Regionen von diesen Strömungen abhängt, geht auch daraus hervor, daß in Californien die Temperatur im Juli dienteilgen im Januar nur um 8—9° Fähr. übersteigt. Der türksische Welgen kommt aus diesem Grunde nicht zur Reife, während Gerste und andere Cerealien, sowie alle Arten Früchte bekanntlich vorzüglich gedeihen. Wurden ja schon die ersten Ansiedler durch die wunderschönen Fruchtgärten der spanischen Missionäre von Entzünden hingerissen! Während an der atlantischen Küste der Herbst die angenehmste Jahreszeit ist, ist es dort der Winter; ja der Sommer am stillen Ocean<sup>4)</sup> ist des öfter bedeckten Himmels wegen, obwohl wärmer, im Gegensatz zum Winter eher rauh zu nennen, während wir uns in dieser Hinsicht wahrhaftig nicht beklagen können.

Was die atmosphärischen Niederschläge betrifft, so sind dieselben an der pacifischen Küste periodisch, was sie an der atlantischen nicht sind; auch sind sie dort auf die verschiedenen Breiten sehr ungleichartig vertheilt. Schnee ist der mehr gleichförmigen und selten sehr niedrigen Temperatur wegen selten. So schneit es in Fort Humboldt in Californien unter der Breite von New-York jährlich kaum mehr wie eine Woche. Im Sacramentothal fällt der Regen nur innerhalb 3 oder 4 Monate; auch beträgt die Anzahl regnerischer Tage nicht ¼ von denen in Philadelphia; sie steigt jedoch gegen den Norden zu ganz bedeutend, um im jetzigen Alaska ihren Höhepunkt zu erreichen. Nach v. Klotzsch, welcher uns eine sehrreiche Beschreibung dieses Landes in seinen Bildern vom stillen Ocean gegeben hat, ist in den Waldbildnissen die Masse eine ganz ungewöhnliche, und sämtliche Pflanzen, zumal die feinen Partien der Nadelbölzer, sind fortwährend wie

1) „Der Anlauf des russischen Küstentreibens“, sagt das „Ausland“, „ist, obwohl kein Gewinn eines einseitigen Gebietes, doch nicht bloß ein geographisches Gaudium, sondern von symbolischer Bedeutung, weil die Union gleichsam ihre rechte Welt an der nordwestlichen Sandbabe ergreift und sich zugleich zwischen das russische Asien und das britische Nordamerika hineinsetzt.“ Das „Ausland“ scheint jedoch wenig von dem Winters- und Flußreichtum Alaska's zu wissen.

2) Sietka hat deshalb den Winter von Washington.

3) Kuroo — Siroo genannt.

4) September ist dort der wärmste Monat.

mit Wasser überzogen, was ihrem Wachstume überigens sehr förderlich ist.

Nicht weniger verschieden, wie die beiden Küstentlimate, sind die der oben genannten Binnenlandregionen. Hier ist es die physikalische Gestalt der Erdoberfläche, welche die Witterung schafft. Wir haben einerseits ein ungeheures Thal, welches sich durch seinen Flußreichthum auszeichnet, aber nur von wenigen Gebirgsketten, die zudem nur geringe mittlere Erhebung besitzen, durchzogen ist. Im Norden wird dieses Thal vom Polarmeer und im Süden vom mexikanischen Golf begrenzt. Ueberbleib ist sein oberer Theil durch die großen See'n flankirt, die nach einer ungefähren Schätzung nahezu die Hälfte des Queerwasser der Erde in sich fassen. Andererseits würde sich, falls wir uns hoch genug über die Erdoberfläche erheben könnten, ein bedeutendes Tafelland<sup>5)</sup> darbieten, mit nur untergeordneter Thalbildung, circusartigen Kesseln und Wasseransammlungen ohne äußeren Abfluß.

Es liegt in der Natur der Sache selbst, daß die Klimate der eben bezeichneten Regionen nicht scharf von einander abstecken, sondern zum Theil in einander übergehen, sowohl unter sich, als mit den sie begrenzenden Küstenregionen. Daß sie daher dem Forscher noch viel mehr unaufgeklärte Erscheinungen darbieten, wie letztere, darf uns nicht wundern. Den Normalcharakter beider zu bestimmen, dürfte schwer sein. Jedoch zeichnet sich das westliche Tafelland mit geringen Ausnahmen durch große Trockenheit, sowie die Abwesenheit so bedeutend mildern der Einflüsse aus, wie es der mexikanische Golf und die kanabischen See'n für die Mississippi-Niederung sind.

Fragen wir nach den Ursachen jener großen Dürre, welcher so manche Touristen erlitten sind, die sich durch die Sierra-Nevada den Weg nach dem einstigen Eldorado Californien zu bahnen vermaßen, so liegt sie weniger in der Wasserarmuth, als in der Abwesenheit äußerer Wasserabflüsse. Durch die Vermittlung, der die kristallinischen Gesteine der Erdrinde durch die Einwirkung der Atmosphäre unausgesetzt unterliegen, und der selbst der härteste Felsen nicht widersteht, werden Salze erzeugt, welche, falls sie nicht weggeschwemmt werden, den Boden bald mit einer Salzkruste überziehen, die der Entwicklung blüthenreicher, die Fruchtigkeit anziehender Pflanzen geblühter Grenzen setzt.

5) Karl Ritter spricht in seiner „Gefunkte“ von der neuen Welt als sich charakterisirend durch ein „Artenbüthum mit untergeordneter Plateaubildung, welche ein nur sporadisch vertheilt, oder als hochschwebende Ringenbänder mit oceanischen Abhängungen sich zeigen.“ Diese Ansicht muß fallen, seitdem das weite Küstengebiet jenseits des Pazifischen Ozeans (seine Erhebung über den Niveaufuß beträgt 4000 bis 5600 Fuß) nicht mehr so ganz terra incognita ist.

Ähnliche, wenn auch minder ungünstige Verhältnisse, finden sich auf den weiten Grasflächen der Mississippi-Niederung, in denen der Buffalo und der Bisonstier heutzutage weiden. In den Prairien, sowie in den mehr nördlichen Theilen des hohen Plateau's sind es die Artemisien, welche der Gegend ihren Hauptcharakter verleihen, im Süden des letzteren jedoch übernehmen die Cacteen (von Bernardin de St. Pierre ihres säuerlichen Saftes wegen bezeichnet die vegetabilischen Quellen der Wüste genannt) diese Rolle. Fremont spricht daher von seinem Charakter als vielfach asiatische, nicht amerikanische Ideen erweckend. Ganz besonders soll dies mit dem Bassin des Salzsee's der Fall sein, das den Rees's und Humboldt-River und Washoe-county in sich schließt. Reisende beschreiben es als ein höchst unfruchtbares, düstres Land.

In Salt-Lake-City, in einer Höhe von 4350' und in der Breite von 40° 46', gewissermaßen dem Centrum des großen Bassins, beträgt die mittlere Temperatur der drei Sommermonate fast die von Philadelphia (Br. 39° 57'), und der Winter ist nur um wenig kälter, wie der unter dem nördlichen Gürtel im Osten. Jedoch finden bedeutende tägliche Schwankungen statt; oft ist die Temperatur bei Sonnenaufgang 24° Fähr. und zu Mittag 80° Fähr. Der herrschende Wind, ein wahrer Sierrero, ist der Südwest (Chinook genannt); er weht von Anfang December bis Anfang März. Kühle, feuchte Seewinde bringen, temperaturausgleichend, zeitweilig durch die Pässe der Sierra Nevada. Ihrem Einflusse ist es zuzuschreiben, daß trotz der bedeutenden Höhe manche Territorien, namentlich die nördlichen, ein milderes Klima darbieten, als die unter derselben Zone im Osten liegenden.

In Utah fällt sechs bis acht Monate im Jahr kein Regen. In Austin (ungefähr 39° 25' Br. und nahezu 117° mittlere Länge) im Rees-River-Valley im westlich angrenzenden Nevada<sup>7)</sup> betrug die Zahl der Schneefälle im Winter 1863/64 nur drei, wovon der stärkste den Boden bis zu drei Zoll bedeckte. Keiner währte länger wie drei Tage. Sonst — schreibt der Correspondent, dem wir diese Angaben verdanken — war der Boden trocken, der Himmel unbedeckt, das Wetter warm und freundlich, wie im Indian-Sommer; der tiefste Stand des Quecksilbers erreichte nicht fünf Grade unterhalb des Gefrierpunktes.

7) Nevada, der „Silberstaat“, war vor 8 Jahren noch ein Theil des Territoriums Utah; seine Bodenhöhe beträgt 10, mal diejenige vom Staate New-York und nahezu die Hälfte von der von Californien.

## Vom Ronterosa zum Montblanc.

Von Otto Wic.

### 2. Vom Bodensee zum Wallis.

Es war an einem der heißesten Augusttage des vorliegenden Jahres, als ich nach ermüdender Eisenbahnfahrt den Bodensee bei Lindau erreichte. Wundervoll lag die grüne Wasserfläche vor mir, von einem Gewitterwinde leicht erregt, so daß die weißen Wogenkämme im Sonnenschein wecheln leuchteten. So stand ich nun an der Pforte der Schweiz, und mehr als ein Weg war mir offen, der mich an mein nächstes Reiseziel, in das Wallis, führte. Ich konnte der Eisenbahn bis Chur folgen und dann durch das Vordererheinthal über die Oberalp und die Zuckastraße von Osten her in das Wallis eintreten. Oder ich konnte mich von der Eisenbahn über Bern und Lausanne direct zum westlichen Ausgange des Walliser Thals in den Genfer See führen lassen. Oder ich konnte über den Vierwaldstätter See und Altorf die Gotthardstraße einschlagen, um über die Furka in das Rhonethal zu gelangen. Aber alle diese Wege, allerdings die bequemsten und am schnellsten zurückzulegenden, hätten mich durch Gegenstände geführt, die mir von früher her bereits bekannt waren. Mich aber lockte es, auch auf dem Wege zum Ziel neue Blicke in die reiche Welt der Alpen zu thun, und so entschloß ich mich, allerdings dem Vierwaldstätter See und seiner großartigen Natur im Vorübergehen einen Tag zu widmen, dann aber über den Brünigpaß mich dem Brienzler und Thuner See zuzuwenden und von hier aus mitten durch das Herz der Berner Alpen, durch das Kandertal und über die Gemmi in das Wallis hinunter zu mahnen. Herrlich war der Spoziergang durch das freundliche Sarner Thal an den schönen Seen von Sarnen und Lungern vorüber, dann im stillen Ansteigen zur Paszhöhe des Brünig hinauf, bald im Anblick rauschender Wasserfälle, bald über lebliche Matten oder durch stille erwürdigte Wälder, und entzückend war der Blick von der Höhe auf das tief unten liegende Thal von Meringen, durch dessen grünen Boden die Aar sich einst in lustigen Windungen schlängelte, während die Kultur hier jetzt einen schnurgeraden Lauf angenommen hat, von dessen Felswänden drüben aber alle Kultur die reizenden Wasserfälle nicht hat nehmen können, die aus der Ferne gesehen, wie lustige Bänder herabschweben. Bald trug mich das Dampfschiff im Fluge über den Brienzler See, an dem gefeierten Gletschbachfall vorüber zu dem schönen Hauptquartier aller Berner Oberlandstouristen, Interlaken. Aber weder die schöne Damenwelt im Glanz der Toilette noch der Anblick der herrlichen Jungfrau, die so eben aus dem zerschneidenden Nebel über dem Lauterbrunnenthal hervorbrach, vermochten mich zu halten. Ich eilte, um nach Neuchâtel zu gelangen und abermals den Dampfer zu besteigen, der mich

über den Thuner See nach Spiez, dem Anfangspunkt meiner Wanderung über die Berner Alpen, tragen sollte. Hier, am Fuße dieses mächtigen, am meisten von der deutschen Touristenwelt besuchten und bewunderten Gebirges sei es gestattet, einen flüchtigen Blick auf seinen Bau und die Gruppirung und die Physiognomie seiner Berge zu werfen.

Die Berner Alpen, in ihrem bekanntesten Theile gewöhnlich das Berner Oberland genannt, sind die ausgedehnteste, gipfel- und gletscherreichste und für das Auge imposanteste aller Centralmassen der Alpen. Von der Grimsel bis zur Dent de Morcles im südwestlichen Rhodanewinkel erstrecken sie sich auf eine Länge von 23 Schweizerstunden bei einer durchschnittlichen Breite von 12 Stunden und grenzen auf diese Strecke das Thal von Wallis im Norden gegen die schweizerische Ebene ab. Von Bern aus stellen sie sich als eine wunderbare Kette weiß schimmernder Gipfel dar, und doch trägt kaum ein Gebirge weniger den Charakter eines Kettengebirges, als dies. Schon in der äußeren Physiognomie unterscheidet das Auge von fern eine östliche und eine westliche Hälfte. Während in der östlichen alle Gipfel in scharf zugespitzten, obeliskartigen Formen als sogenannte Hörner entgegen treten, bauen sich in der westlichen die Berge in behäbig breiten, pyramidalen Massen auf. Diese Verschiedenheit hat ihren Grund in dem Bau des Gebirges. Während es sich nämlich in dem östlichen Theile zu 3 bis 4 hintereinander aufsteigenden Gebirgswällen gruppiert, die in der Richtung von Nordwest nach Südost verlaufen und darum dem nordwärts stehenden Beschauer ihre schmalen, scharfen Kanten darbieten, halten im westlichen Theile die 5 hintereinander liegenden Gebirgswälle eine südwest-nordöstliche Richtung ein und stellen sich darum, von Norden gesehen, mit ihrer breiten Flächenseite dar. Aber die Verschiedenheit ist noch tiefer begründet. Die Alpen der östlichen Hälfte gehören den plutonischen oder kryptalpinischen Gebirgen an, sind aus Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Hornblendgesteinen aufgebaut; die Alpen des westlichen Theils sind neptunischen Ursprungs, bestehen von der Gemmi und der Aletsch an aus Jurakalk, Kreide, Nummulitenkalk und Gips.

Dieser innere Bau erklärt sich nun auch Manches in der äußeren Physiognomie und den Höhenverhältnissen dieser Alpen. Wenn wir von ihrem äußersten westlichen Gipfelpunkt, der Dent de Morcles, beginnen, so sehen wir in ihm das Gebirge sich ziemlich schnell über den steil aus dem Rhonethal emporstrebenden bewaldeten Hängen und Hängen zu einer Höhe von 9470 rh. F.

auffspringen. Von hier setzt sich der Centralkamm in ziemlich gleichbleibender Höhe von 9500 F. bis zur Gemmi fort. Die Kammböden sind meist nackt und stark verwittert und fallen nach Süden in steilen Felswänden ab, während sie an der Nordseite nur hie und da in imposanten Felsmassen zu Taae treten. Die Gipfel erheben sich nicht bedeutend über den Kamm und zeigen selten kühne Profile. Nur in dem zweifackigen Gipfel der Dent de Morcles, in dem schönen Dom der Diablerets, in dem gietlichen Schneekopf des Widborns und den weithin strahlenden Zinnen des Strubels spricht sich ein gewisser Charakter aus. Auch fast nur diese letzteren Gipfel überragen die Höhe von 10,000 Fuß und sind von ewigem Schnee bedeckt und von zahlreichen Gletschern umlagert. Von der Gemmi, in der sich das Gebirge auf 7300 Fuß erniedrigt, beginnt die großartigere Erhebung und der kühnere Aufschwung der Gipfel. Schon unmittelbar neben dem Gemmipass steigen die Schneegipfel des Kinderhorns, des Aletsch und des Balmhorns zu 11,000 bis 11,750 F. empor. Aber erst jenseits des Fötschenpasses, in welchem das Gebirge noch einmal auf 8500 rh. Fuß herabsinkt, beginnt die höchste Massenerhebung in der eigentlichen Centralmasse des Finsteraarhorns. In drei mächtigen Gliedern tritt uns diese Centralmasse entgegen, zwischen denen sich ein Fön- und Gletschergebiet ausbreitet, wie es großartiger in ganz Europa nicht wieder vorkommt. Gletscher, wie der Aletschgletscher, der 5 Schweizerkanten in der Länge mißt, und dessen Zinnen eine Fläche von mehreren Quadratmeilen bedeckt, besetzt kaum ein anderes Gebirge der Erde. Das nördlichste dieser Glieder ist der scharf zulaufende Kamm, der sich vom Randerthal zum Lättschinenthal erstreckt und die im prächtigen Eisschmuck blinkenden Gipfel des Doldenhorns, der Blümlialp und des Spaltenhorns trägt. Das zweite, von höheren Gipfeln gezielte Glied beginnt vom Balmhorn und dehnt sich östwärts bis gegen Grindelwald aus. Ihm gehört jene glänzende himmelhohe Eismauer an, die im Hintergrunde des Lauterbrunnenthals erscheint und die Zinnen des Fingelhorns, Breitthorns, der Ebenenfluh und des Gletscherhorns trägt. Weiter östlich entziehen ihm jene weit in's Land hinaus reichenden, wegen ihres reichen Farnschmucks und ihrer riesigen Felsmassen vieldemundeten Gipfel der Jungfrau, des Mönchs und des Eggers, in der ersten die Höhe von 13,270 rh. F. erreichend. Weiter südlich, durch die Spalte des Fötschenthals von jenem getrennt, erhebt sich das dritte Glied dieser Centralmasse, in scharfem Kamm aus dem Rhonethal aufsteigend und sehr bald von gewaltigen Gipfeln gekrönt, die in dem Bieschhorn, dem Fötschthale Breitthorn, dem Risthorn und der schönen Pyramide des Aletschhorns Höhen von 12,100 bis 13,300 rh. Fuß erreichen. Gegen Süden schließt dieser Hauptkamm einige scharfkantige, steile Grate gegen das Rhonethal und das Thal des großen Aletschgletschers aus, die zwischen sich

enge, tiefe Thalschluchten einschließen, durch welche die Gletscherwasser der Rhone zugeführt werden. Jenseits des Thales, in welchem der Aletschgletscher die von den Hochfarnen der Fötschenlücke, des Jungfrauthales und des Bieschergrats herabfließenden Eismassen vereinigt, beginnt eine völlig veränderte Gestaltung der Kammböden. Von Süden her steigen aus dem Rhonethale zwei Reihen auf, von denen die eine an ihrem unteren Ende das aussehensreiche Eggishorn trägt und sich dann über die finsternen Walliser Biescherhörner und Grindhörner bis zu den Grindelwalder Biescherhörnern emporzieht, das östliche Ufer des Aletschgletschers bildend, die andere über die Galmishörner zum Rothhorn und Oberaarhorn ansteigt und sich durch das Struberhorn an das Finsteraarhorn anlehnt. Von diesem erhebsten Gipfelstumpfen der ganzen Centralmasse, der eine Höhe von 13,600 rh. Fuß erreicht, läuft dann der fienbedeckte Kamm der Grindelwalder Biescherhörner in einer mittleren Höhe von 11,800 Fuß, aber überträgt von den stolzen Gipfeln des Aaafishorns und des hintern und großen Bieschhorns, in nordwestlicher Richtung bis zum Mönch fort und vereinigt sich hier durch ein hohes Foch mit jenem vom Fingelhorn über die Jungfrau bis zum Eiger fortlaufenden Gebirgskamm. Im Osten der gewaltigen Centralmasse erheben sich, steil gegen Norden abfallend, die milden Kämme, welche das Schneehorn, der Bergfloss, die Wetterhörner, das Weißhorn, das Kenfthorn und Aiglithorn krönen, während vom östlichen und südlichen Rande des Massivs in der Richtung des Hauptzuges drei Kämme ausgehen, deren einer die Gipfel des Emig-Schneehorns und des Rothhorns, der andere die Zinkenstöcke, der dritte die Eidelhörner trägt. Diese merkwürdige Gliederung mit den fast strahlenförmigen Thalschnitten läßt die Vermuthung als gerechtfertigt erscheinen, daß die Centralerhebung des Finsteraarhorns, bevor die Alpen ihre heutige Gestalt erhielten, der Heerd gewaltiger Katastrophen gewesen sein muß.

Die wenigsten Reisenden dringen in das Innere dieses gematigten Gebirges ein, die meisten berühren nur ihren Fuß und erfreuen sich an seinen nördlichen Vorker. Gerade gegen Norden hin senket der Centralkamm ein ganzes Neb von Höhenzügen aus, die meist ein sehr scharf geschnittenes Profil zeigen, in ihren Anfängen als kahle, wilde Felskämme auftretend und noch mit ewigem Schnee und kleinen Gletschern belastet sind, weiter unten aber sich zu begrasten Bergrücken gestalten, deren Hänge von Wäldern umgürtet sind, und deren Gipfel und Abhänge nur noch blumigen kühnen Felsgebilde aufweisen. In ihrem Schooß bergen diese Höhenzüge eine Fülle der fruchtbarsten Alpenweiden, aber auch wilde Fels und Schluchten, aus denen nicht selten verberende Schlammströme in die bewohnten Thalebenen herniederbraufen. In den Thälern, welche sie einschließen, und aus denen die Hauptströme des inneren Schwyz und die

herrlichsten Fierden des ebenen Landes, die maledischen Ser'en, ihren Ursprung nehmen, wechselt das Schauerliche mit dem Lieblichen, das Maledische mit der Einöde. Im Ganzen trägt dieses Reg von Bergen ein ernsteres nordisches Gepräge. Aber schmerzlich vermist ihre dunkeln, hochstämmigen Tannenwälder und das saftige Grün der Wiesen und Weiden ihrer Thäler und Berghöhen, wor durch einen der Pässe, den Sanatsch, Krawl oder die Gemmi, hinübersteigt in das Thal von Wallis. Hier, am Südschloß, abhang der Walliser Alpen trifft der Reisende, wenn er die Schneeregion des Hochgebirges hinter sich hat, nur auf baumlose Alpenweiden und kahle, oft in erschaunder Nachtzeit sich ausprägende Klüben und Felsgrate, die ihm in ihrer Stille bald den Anblick der hohen Schneegipfel entziehen. Weiter unten folgen zwar Hochwälder von Tannen und Lärchen, die allmählig in Laubwälder und endlich Obstgärten und Weinberge übergehen, welche überall im Rhodethal die unteren Bergterrassen bekrönen. Aber diese Hochwälder und Alpenweiden und nackten Felsen bieten wenigstens im Hochsommer, wo Alles verbrannt ist, ein trostloses Ansehen, und wenn noch irgendwo auf einer Hochterrasse ein felsgrüner Rasenflack erscheint, so hat sicher nur eine künstliche Wasserleitung dort den vernichtenden Einflüssen der sengenden Sonnenstrahlen gewiehet. Nur im oberen Rhodethal erscheint auch die süßliche Abdachung des Gebirges von freischerer Vegetation geschmückt, und die scharf aufsteigenden Grate, die auch hier dem Auge des Thalbewohners den Anblick der Gletscherwelt und der fienbedekten Gipfel fast überall entziehen, zeigen hier wenigstens begraste, wenn auch meist baumlose Gehänge.

Manche Pässe führen über diese mächtige Gebirgsgruppe in das Wallis hinüber. Wollte ich aber nicht gerade einen der Gletscherpässe, wie den über die Strahllegg oder den Föschepass wählen, so gab es keinen, der mich besser in das Herz der Alpenwelt geleitete, als den alt berühmten Gemmipass. So wanderte ich denn von Spiez über Mühlenen dem schönen Thal der Kander zu. Bald war das freundliche Frutigen erreicht, und bald winkten mir hoch oben von steilem, tannenbewachsenem Fels die wilden Ruinen der Felsenburg. Das Thal wird enger, einsamer, und die Straße beginnt zu steigen. Da liegt in wilder Umgebung auf grünen Matten zerstreut das letzte Dorf des Thales, Andersteg. Ein wundervolles Panorama eröffnet sich; links schimmert die weiße Spitze der Frau oder der Blümlisalp, weiterhin broht die nackte Bergmasse des Jistsch und darüber das mächtige Doldhorn; vor mir erheben sich die schneebedeckten Altsen,

die nackte Pyramide des Rinderhorns und das stolze Gellhorn mit seinem langen Rücken. Nun geht es auf engem Pfade in steilen Windungen die Bergwand hinauf, die das Thal zu schließen scheint. Zur Linken öffnet sich das wilde Gasterthal, aus welchem die Kander durch den Felsen Engpaß der Kluse in gewaltigen Cascadeen hervorbricht. Immer einsamer, immer rauber wird die Gegend. Ueber scharfes Gestein windet sich die enge Felsengasse unter dem Gellhorn hin. Endlich sind die armenigen Hüten der Winterg, bald auch die der Spitalmatt erreicht, und die Thalmulde erweitert sich nun wieder. Immer massiger senken sich die Schneefelder der Altsen herab. In der wildesten Einöde an einem düsteren, in einem Felskessel eingeschlossenen See liegt hier zwischen gewaltigen Steintrümmern das Bergwirthshaus „An der Schwarrendach“, in welches Zacharias Werner den Schauplatz seines blutigen Trauerspiels „Der 24. Februar“ verlegte. Auf steinigem Pfad geht es nun an dem schmutzigen Daubensee entlang endlich zur Pashöhe der Gemmi hinan, zu der Steinhütte auf der Daube. Von einer kleinen felsigen Anhöhe in der Nähe geniesst man hier aus einer Höhe von 7086 p. Fuß (7339 rh. Fuß) einen Blick in das Wallis, wie ihn wunderbarer kaum eine andere Höhe in der Schweiz gewährt. Man sieht am Rande eines plötzlich sich öffnenden Abgrunds. Tief unten liegt im frischen Grün das Leukerbad; weithin überschaut man das schöne Rhodethal, und drüben erhebt sich die gewaltige Bergmasse der Walliser Alpen, aus denen in blendendem Glanze die mächtigen Schneegipfel der Mischabelhörner, das gewaltige Weißhorn, die thurmartige Pyramide des Matterhorns und das fähngeschwungene Horn der Dent Blanche hervortreten. Fast begreift man nicht, wie es möglich sein solle, an den Klippen dieser fast senkrechten Wand in das Thal hinabzugelangen. Aber die Kunst hat hier im vorigen Jahrhundert eine Straße erbaut, die gemüß zu den kühnsten und merkwürdigsten Alpenstraßen gehört. In sinnreichen Windungen, zum Theil in den Felsen eingebauenen und oft einer Wendeltreppe nicht unähnlich, so daß bisweilen die obere Windung über der unteren hervorragt, führt der lustige Weg ohne jede Gefahr, wenn man nicht so sinnlos ist, reiten zu wollen, nach Leukerbad hinab. Staunend schaut man von da zu dem himmelstehenden Felswand zurück, die selbst im höchsten Sommer bereit um 5 Uhr dem Thalbewohner den Anblick der Sonne entzieht. Um so hellerer erscheint uns das Thal der Rhone, das wir bei dem maledisch gelegenen Städtchen Leuk erreichen. Hier stehen wir nun dem mächtigen Gebirgswall gegenüber, der das erste Ziel unserer Wanderung sein soll.

## Ein Liebling der Feinschmecker.

Von Georg Meier.

Ärztler Artikel.

Was der Mensch zu leisten vermag, ist wirklich höchst bewundernswerth und muß uns mit dem größten Staunen in die höchsten Achtung erfüllen. Die Erde ist ihm nicht zu groß, er durchforstet sie von einem Ende bis zum andern, und die Gefahren der Wildniß, die Schrecken der Wüste vermögen nicht ihn in seinem Vordringen aufzuhalten. Das Meer ist ihm nicht zu weit, er steuert kühn hinaus auf die offene See und trotz den Gefahren der rücksichtigen Wellen. Die Erde ist ihm nicht zu dicht; muthig bringt er in sie ein und durchwühlt sie nach den edelsten Erzen. Das Meer ist ihm nicht zu tief, er taucht furchtlos in die Fluthen und löst die köstliche Perle. — Die ganze Natur hat er sich dienstbar gemacht und herrscht über sie im wahren Sinne des Wortes. Nichts bleibt seinem Entdeckungsgeliste verborgen, er zieht Alles einmal an das Licht hervor, und was noch nicht ist, ruft sein schöpferischer Geist selbst in's Dasein. — Diese Erfindungs- und Entdeckungsgabe des Menschen ist aber gewiß nicht weniger Achtung gebietend, wenn es darauf ankommt, sein Wohlbefinden zu fördern, wenn es sich darum handelt, seinen Genuß zu steigern. Da weiß er auch dem unscheinbarsten Dinge einen Reiz zu geben, einen Reiz abzugewinnen. Müssen wir seinen Erfindungsgeist nicht bewundern, wenn wir bedenken, wie mannigfach er die an und für sich so unscheinbaren Schwämme genießbar zu machen versteht? — Er weiß sie zu braten, zu rösten, zu backen, zu kochen, zu dämpfen; er versteht sie zu pulverisiren und als Gewürz zu gebrauchen; er weiß sie mit Salz, Essig und Del jahrelang brauchbar zu erbalten.

Aber dem Geist der Erfindung steht der Geist der Entdeckung nicht nach. Der Mensch scheut weder Zeit noch Mühen, sondern denkt: „Suche, wo wirst du finden!“ Es bewährte sich auch das Wort: er suchte und fand — die Trüffel, wo es doch suchen heißt in des Wortes verwegener Bedeutung; denn dieser Pilz befindet sich nicht über, sondern unter der Erde, ist somit dem menschlichen Auge verborgen.

Die Schwämme im Allgemeinen lassen sich von dem Menschen nicht nur in den Küssen verwenden, sondern sie liefern ihm auch eins der angenehmsten und gesündesten Nahrungsmittel. Dies letztere wird freilich noch von vielen bestritten, indem sie behaupten, die Schwämme enthalten keinen Nahrungsstoff, sondern belästigen nur die Verdauungsorgane. Die wahre Ursache, warum die Pilze bel in Verfall gekommen sind, ist aber wohl in den oft geschehenen Verwechslungen zwischen essbaren und giftigen Schwämmen zu suchen. Denn daß sie Nahrungsstoff enthalten, ist wohl nicht in Frage zu stellen; sind sie doch während der Fastenzeit beinahe die einzige

Speise der Russen, Ungarn, Teskaner, und wurden sie ja auch im Alterthume genossen!

Freilich heißt es auch hier: „Alzuviel ist ungesund!“ Wenn sie im Uebermaße genossen werden, verursachen sie wohl Krankheiten. Ist das aber nicht auch bei andern Speisen der Fall, wenn man sie im Uebermaße zu sich nimmt?

Bei den Alten fanden die Schwämme in hohem Ansehen. Die den Freuden der Tafel Huldigenden, vielerles voluptarii, sagt Plinius, übernahmen die Sorge ihrer Zubereitung selbst. Sie richteten sie, als eine köstliche Gabe, in silbernen Gefäßen an, schnitten und zerlegten sie mit Instrumenten von demselben Metalle oder von Elctrum (einer Legirung von Gold und Silber). Hauptsächlich liebten sie die Trüffel und den Kalfertling, und da erstere auch jetzt noch die Favoritin aller Gourmands ist, wollen wir sie in Nachfolgendem etwas näher betrachten.

Die Trüffel ist eine schon seit Jahrtausenden als Lederpreise berühmte Pflanze, welche unter der Erde wächst, lebt und stirbt, eine kugelige oder eis- oder nierenförmige Gestalt hat und im Innern ein fleischig enthält, welches von helleren und dunkleren Adern durchzogen ist. — Es kommt sehr Vielen höchst eigenthümlich vor, wenn sie hören: Pilze sind Pflanzen, sind vegetabilische Wesen. Ich glaube auch, daß ihr Staunen vollkommen gerechtfertigt ist; denn wenn im gewöhnlichen Leben von Pflanzen gesprochen wird, denken wir doch am allerwenigsten an Pilze, sondern wir stellen uns Naturprodukte vor, an welchen Wurzel, Stengel, Blätter, Blüthe und Frucht deutlich zu unterscheiden sind; wir sehen im Geste den Blumentisch vor uns oder den noch herrlicheren bunten Blumentepich in Gottes schöner Natur! Wo ist aber zwischen den Gebilden, die uns hier entgegen treten, und den Pilzen eine Aehnlichkeit zu suchen? — Statt der eigentlichen Wurzel finden wir ein filziges Fadengewebe, mit welchem die Schwämme auf der Erde oder den Gegenständen, auf welchen sie wachsen, befestigt sind; statt des oft recht netten Stengels finden wir einen dicken, fleischigen Strunk, statt der mannigfachen Blätter eiförmige Falten oder Kamellen, die an der Unterseite des Hutes sitzen, und auch diese Zelle finden wir nur bei den vollkommenen Pilzen, wie z. B. dem Blätterstamm (Agaricus). Bei den niederen Arten ist von einem Strunke, von einem Hute, von Kamellen keine Rede, und statt des filzigen Gewebes zeigt sich da, wo der Schwamm aufsteht, nur ein durch eine Flüssigkeit gefärbter Fied und öfters nicht einmal dieser. Dies gilt, wie von so vielen andern Pilzen, auch von unser Trüffel. Wel ihr lassen sich weder Lagerfasern, noch Strunk, noch Hut, noch Kamellen un-

terscheiden; sie ist ein kugelig, knolliger, wie die Nuß oder Kartoffel in sich selbst abgeschlossener Schwamm.

Von Blüthe und Frucht oder eigentlichem Samen endlich findet sich sowohl bei den höheren, als auch den niederen Pilzen nicht die mindeste Spur, und doch sind diese Naturprodukte Pflanzen, und zwar bilden sie mit den Algen, Flechten, Farn und Moosen eine besondere Klasse, nämlich die der Kryptogamen (d. h. Verborgenenblüthenden).

Die andere Hauptklasse der vegetabilischen Gewächse, bei denen man eine deutliche Blüthe und Frucht unterscheiden kann, ist die der Phanerogamen (d. h. Sichtbarblüthenden). Diese pflanzen sich, wie bekannt, durch Samen fort. Da diese aber, wie wir gesehen, den Pilzen oder überhaupt den Kryptogamen abgehen, so müssen diese nothwendiger Weise andere Organe haben, durch welche sie sich fortpflanzen vermögen, und diese anderen Organe sind die sogenannten Sporen oder Keimkörner (spora), welcher Name der griechischen Sprache entlehnt ist und soviel als seinen zur Ausfaat bestimmten Theil bedeutet.]

Die Sporen unterscheiden sich von den Samen der Phanerogamen dadurch, daß sie weder aus einem mit der Frucht in Verbindung stehenden Ei hervorgegangen sind, noch einen Keim (d. h. die neue Pflanze im Knospenzustande) enthalten, sondern in ihren Hüllen frei liegen und eine gleichförmige, ölige oder schleimige Masse einschließen, welche mit körnerähnlichen Bläschen vermischt ist. Mit einem Worte, die Sporen sind einfache Zellen oder zellige Körper ohne Keim und ohne Samenlappen, bei denen durch fortgesetzte Zellanlage unmittelbar die neue Pflanze entsteht oder sich erst ein Vorkeim bildet, aus welchem dann die junge Pflanze hervorsproßt. Da den Sporenpflanzen die Samenlappen fehlen, nennt man sie auch Samenlappenlose, Nacktkeimer, Acrotyphen.

Was die Dauer der Keimfähigkeit der Sporen angeht, so haben die bisher angestellten Versuche ergeben, daß sie, wenn auch nicht so lange wie die Samen, mitunter doch geraume Zeit keimfähig bleiben. Die Art und Weise aber, wie sie sich dann entwickeln, ist von dem Keimungsacte der Samen ganz verschieden. Während bei der Keimung der Samen der in denselben schon vorgebildete Keim sich unmittelbar zur jungen Pflanze entwickelt, muß sich bei den Sporen, da sie keinen Keim enthalten, ein solcher erst während der Keimung erzeugen. Deshalb sehen wir bei den Sporen immer erst nach und nach ein zelliges Gebilde entstehen, welches sehr häufig wieder einen der Mutterpflanze ähnlichen Bau besitzt, noch auch sich unmittelbar zur neuen Pflanze entwickelt, sondern einen ganz einfachen Bau zeigt, und aus dem erst die junge, dem Keimspärlingchen der Samen entsprechende Pflanze hervorgeht. Dieses zellige Gebilde, auch Vorkeim genannt, kann Wochen und Monate lang für sich bestehen, ehe die eigentliche Pflanze sich aus ihm entwickelt; ja, bei manchen Pilzen dauert der Vorkeim oft das ganze Leben der Pflanze aus, und er wird dann von den Naturforschern Unterlager, von den Gärtnern Schwammwurz genannt. Bei manchen Pilzen, z. B. den Champignons (*Agaricus campestris*), besteht dies Unterlager oder Schwammwurz mehrere Jahre, so daß man durch Zertheilung desselben den Schwamm auf künstliche Weise vermehren kann.

Wollte man den Vorkeim mit dem Samenlappenkörper der Phanerogamen vergleichen, was übrigens schon oft geschehen ist, so wäre dies unrichtig. Denn der Samenlappenkörper gehört ja zum Keim, wenn dieser vollständig sein soll, ist also der integrierende Theil desselben und kann sich in Folge seiner Abhängigkeit auch nur mit ihm entwickeln. Der Vorkeim der Sporenpflanzen hingegen ist nicht in den Sporen enthalten, sondern er entwickelt sich erst während der Keimung, treibt dann seine eignen Wurzelhaare und ernährt sich selbst, ist auch nicht ein Theil der Keimpflanze, die sich erst aus ihm entwickeln soll, stellt also ein unabhängiges, selbstständiges Wesen dar. — Wollen wir aber einen Vergleich zwischen den Sporen und den Samen anstellen, so müssen wir bis zum Ei der Phanerogamen zurückgehen. Wie sich da aus dem Keimfaden der Keim entwickelt, so entwickelt sich aus dem Vorkeim die Keimpflanze, und wie der Keim aus dem Keimfaden seine erste Nahrung erhält, so erhält die Keimpflanze aus dem Vorkeim ihre erste Nahrung.

So viel über die Beschaffenheit und Keimung der Sporen! Wir wollen nur noch in aller Kürze ein Wort über die Anheftungswiese derselben sagen, welche bei den verschiedenen Pilzen eine verschiedene ist. Bei den Keulenpilzen (*Clavaria*) und den Keulenpilzen (*Geoglossum*) überlebt die Schlauchschicht (d. h. die die Reproduktionsorgane tragende Haut) den oberen Theil des Stunkes nach allen Seiten, bei den Hühnerpilzen (*Exidia*) und den Weicherpilzen (*Peziza*) aber nur die obere verteilte Fläche desselben; bei der Morchel (*Morchella*) und den Galtzerpilzen (*Helvella*) hingegen befindet sie sich auf der äußeren, faltigen und runzligen Fläche des scheinfarnen Hutes. Die ächten Hutpilze jedoch tragen die Schlauchschicht mit den Sporenschläuchen (d. h. den die Sporen einschließenden Behältern) auf der unteren Seite des Hutes, wo dieselbe bei den Ackerpilzen (*Merulius*) vorstehende Aehren, bei den Blätterchwämmen (*Agaricus*) strahlige Blättchen oder Lamellen, bei den Stachelpilzen (*Hydnium*) stachelähnliche Spigen und bei den Röhrenpilzen (*Boletus*) nebeneinander stehende Röhren bildet, auf welchen Theilen sich dann die Sporenschläuche mit den Sporen befinden. Bei den Bitterpilzen (*Tremella*) befinden sich die nackten Sporen (d. h. Sporen, die nicht in Schläuche eingeschlossen sind) bald auf der einen, bald auf allen Seiten der äußeren Fläche, so daß also von einer Schlauchschicht nicht die Rede sein kann. Bei den Wauchpilzen (*Gasteromyces*) sind die Sporen und ihre Schläuche in einer einfachen, sackförmigen Hülle oder einem Balge eingeschlossen, welcher sich z. B. beim Boßst (*Scieroderma*) zur Zeit der Reife an der Spitze öffnet, um die nackten Sporen hindurch gehen zu lassen, welche sich in Gestalt eines feinen Staubes austreuen. — Bei der Trüffel (*Tuber*) endlich finden wir in den Adern, die das Fleisch durchziehen, zellenähnliche Räume, und in diesen ruhen die Sporen einschließenden Sporengehäuse (*Peridien*), welche unter dem Vergrößerungsglase als hellere Flecken erscheinen. Hat sich dann die Trüffel zerlegt, so zerstreuen sich die Sporen unter der Erde und erwachen durch unmittelbare Ausdehnung zu neuen Schwämmen. Diese eigenthümliche Entwicklungsweise bezeugt der Dichter mit dem Dilekton:

Semina nulla damus, sine semine nascitur illo,  
At qui nos mandit, semen habere putat.



# Beitrag zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 35.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwetschke'scher Verlag.

**1. September 1869.**

**Inhalt:** Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 4. Die Holzpflanzen der baumlosen Flächen. — Vom Monterosa zum Rentiblanco, von Otto Ule. 3. Ballis und das Diopthal. — Literaturbericht. — Literarische Anzeige.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 1. Die Holzpflanzen der baumlosen Flächen.

Wo die Landschaft nicht mehr von Wäldern bekleidet ist, gleicht sie den offenen Fluren der alpinen Regionen, auf denen die Kräuterdecke das Hauptkleid, alles Andere nur Belwerk ist. Einige und zwanzig Holzgewächse vertreten hier noch immer diese stattliche aller Pflanzenformen, bis auch sie gegen den Pol hin allmählich erlischt und die Kräuter höher als die Sträucher werden.

Zunächst eröffnen die Heidelbeersträucher den bescheidenen Kranz, der sich rings um den Pol schlingt; dasselbe Bild, das wir auf unseren Halden empfangen. Von diesen Sträuchern geht die Sumpfs- und Preiselbeere (*Vaccinium uliginosum* und *Vitis idaea*), aber auch die Moosbeere (*V. Oxycoccus*) rings um den Pol. In Grönland reicht die erstere bis zum 72° N. und bis zu 1000 Fuß senkrechter Höhe, im Smithsund sogar bis 80°, in Sud-

fonien bis zur arktischen Küste. Die Preiselbeere tritt auf die Bushman-Insel bei 76° über und steigt in Grönland bis 2000 Fuß Höhe. Die Moosbeere gehört mehr der Baumregion an, in Lappland der Region der Birke. Die Heidelbeere (*V. Myrtillus*) beschränkt sich auf Island und Lappland, tritt aber für Labrador und Hudsonien in zwei eigenen Arten (*V. myrtilloides*, *fissum*) auf, die sammt den Preiselbeeren und andern Früchten das Dasein wilder Vögel noch bis zum hohen Norden bedingen; um so mehr, da hier die Beeren jeder einzelnen Art den ganzen Winter über bis zur neuen Blüthezeit an dem Stengel zu haften pflegen und unter dem Schnee ihren vollen Nahrungswert behalten.

Zwei Gattungen sind es namentlich, die hierzu ebenso wesentlich beitragen, wie sie einen bedeutsamen Antheil an



der Strauchflor der Polarzone abgeben: die Krähenbeere (*Empetrum nigrum*) und die preißelbeerartige Bärentraube (*Arctostaphylos*). Erstere geht im Verein mit Heißelbeersträuchern eins um den Pol und gehört hieselbst zu den verbreitetsten Formen, höchst bedeutsam durch ihre schwarzen Beeren, die sie bis 72° reift, wie sie in Lappland bis zur Schneegrenze geht. Gleich den *Vaccinien* und *Ericinen* ist sie so recht für den Moorboden geschaffen, der in so ausgedehntem Maße das Polarland charakterisirt; ihn bekleidet sie mit ihrem dichten, merthenähnlichen Gestrüpp auf weite Strecken höchst wohlthätig. In Hudsonien tritt eine zweite Art (*E. lucidum*) an ihre Stelle. Die Bärentraube ist in 2 Arten vorhanden, die auch Europa angehören. Die erstere (*A. officinalis*), bezeichnend für unsere norddeutschen Halben, vertritt die südliche Form und reicht darum nicht über die subalpine Virenregion Lapplands, nicht über 66° in Grönland und Island hinaus. Die zweite Art (*A. alpina*) vertritt den hohen Norden, erscheint in Lappland darum als Charakterpflanze der alpinen Region, aus der sie nur vertritt bis zu der Züchtengrenze herabsteigt, und umsäumt den Pol in Sibirien, Island, Labrador, Hudsonien bis zur arktischen Küste und dem arktischen Archipel. Sie liebt die Abhänge der Berge und reift ihre Beeren massenhaft bis über 70° n. Br., wo sie Franklin an der äußersten Spitze Hudsoniens, die er Cap Bathurst nannte, im Ueberflus fand.

Alles Uebrige von Strauchwerk ist nur Schmuck der Landschaft, obenan die lapplische Alpenrose (*Rhododendron Lapponicum*). Gemein in Torned's und Luleå-Lappland, verbündet sie sich auf den Alpen Stenbinaviens auf trocknen Lehnen gern mit der vorigen Pflanze und ähnlichen Gamlienverwandten (*Azalea procumbens*, *Menziesia coerulea*, *Cassiope tetragona*, *Andromeda hypnoides* und *polifolia*), deren Gesellschaft wiederum acht arktische Kräuter sind (*Arnica alpina*, *Pedicularis hirsuta*, *Stamnea*, *Draba alpina*, *Campanula uniflora*, *Oxytropis Lapponica* u. A.). Sie schmückt die unfruchtbaren Hochflächen, erscheint auch in Grönland von 66°–72°, um hier bis zu einer senkrechten Höhe von 1000 F. zu steigen, wendet sich von da westlich nach Labrador und erreicht die arktische Küste Hudsoniens. Sämmtliche ihrer strauchartigen Verbündeten, die ich oben genannt habe, überschreiten den Polarkreis. Die nießliche *Azalea*, dieser kriechende Strauch, der mit seinen zierlichen Blumen eine so hohe Zierde unserer Alpen ist, reicht von der subalpinen Region Lapplands über Island und Grönland, wo er bis 2000 Fuß hoch steigt, nach Labrador und Hudsonien, um sich bis zur arktischen Küste und darüber hinaus, etwa bis 72° N. auszudehnen. Die der Krähenbeere im Laube so ähnliche, aber durch die halbenartigen Stodend Blumen so verschiedene Menziesie schlägt einen ähnlichen Weg nach dem Westen ein. In Lappland gehört sie der alpinen Region bis herab zur Züchtengrenze an, der sie mit der zierlichen

*Linnaea borealis* und der gelben *Pedicularis Lapponica* ein arktisches Gepräge gibt. In Grönland, wo sie bis 72° wandert, steigt sie noch 100 F. senkrecht empor und taucht dann wieder in Labrador auf. Die nießliche und zwerge *Cassiope* mit halbartiger Tracht und Gränke-artiger Blume umringt, die windblägen Kuppen mit ihren dunkelgrünen Räschen oft ganz überziehend und die lapplische Alpenrose gern begleitend, nicht allein den Pol, sondern dringt leicht unter allen Holzpflanzen am weitesten vor. So geht sie in Sibirien bis zum Taimerlande, der nördlichsten Spitze des Continents; in Lappland beginnt sie bereits bei 64° in den Distrikten von Torned, Luleå und Piteå; auf Spitzbergen ist sie nebst *Dryas octopetala*, Krähenbeere und 2 Weidenarten (*Salix polaris* und *reticulata*) die einzige Holzpflanze; auf Grönland erscheint sie selbst an der eleganzartigen Küste, wendet sich dann nach Labrador und Hudsonien, wo sie die arktische Küste erreicht, und tritt hier auf den arktischen Archipel bis zu den Parro-Inseln (76½°) über, während sie im Smith'sund noch bei 80° gesammelt ist. Hier bildet sie mit 2 *Draden*, der *Cassiope* und Krähenbeere, der Zwergbirke und 2 Weiden (*Salix arctica* und *herbacea*) die letzten Anklänge an eine Holzbildung, die sich nicht mehr von dem Boden erhebt. Drei nahe Verwandte aus der Gattung der Gränke (*Andromeda*), von der sie häufig so wenig als die Menziesie unterschieden wird, bleiben bei südlicheren Graden stehen. Die eine (*A. calyculata*) sendet ihre letzten Ausläufer bis Labiau und Kognit in Ostpreußen, gehört aber dem russischen Lappland eigenthümlich an, dessen Moorland sie mit ihren üppigen, weißen Blüthenrauten wahrhaft einladend macht; die zweite (*A. polifolia*), dort oft mit der vorigen verbunden, die gewöhnliche Art unserer Torfmoore, wandert bis zur alpinen Region Lapplands, erscheint auch in Sibirien an der Bogalniba innerhalb der Baumgrenze und springt dann nach Labrador über; die dritte Art (*A. hypnoides*) von halbkrautartiger Tracht, weiche aber mehr an die Wiberthensmoose (*Polytrichum*) erinnert, erscheint bereits auf den Alpen von Jemtland, wird in Torned, Luleå und Piteå-Lappland Charakterpflanze, zieht sich östlich bis zum Taimerlande, westlich nach Island und Grönland, wo sie bis 72° reicht und bis 2600 Fuß aufwärts steigt. Sie bildet in der Alpenregion den schönsten Zwergstrauch, der durch seine moosartigen Rasen und seine kleinen milchweißen, am Rande röthlich gefärbten Glöckchen etwas unbeschreiblich Zierliches erlangt. — Alle diese Holzpflanzen werden von der Form unseres Sumpfsperstes (*Sedum pulustre*) treu begleitet. Er wandert in seiner gewöhnlichen und einer dreiblättrigen Form (*L. latifolium*) rings um den Pol, erreicht im Taimerlande etwa 74°, auf Grönland 70° und eine senkrechte Höhe von 1500 F. Sein naher Verwandter (*L. Groenlandicum*) dagegen verhält sich wie eine südliche Form, die in der subalpinen

Birkentregion Lapplands mit der vorigen Art ebenso verbündet, auf Grönland bis 67° und auf Labrador auftritt. Die dem Porphyr so nahe stehende amerikanische Form der Kalmien sendet *Kalmia glauca* am weitesten nach Labrador und Hudsonien vor. Das gemeine Haldbkraut endlich (*Calluna vulgaris*), in Europa sonst so verbreitet, erscheint nur auf Island in der Birkentregion Lapplands, magt es aber kaum mehr, den Ural zu überschreiten und endet plötzlich an dessen östlichen Gehängen zwischen 67° — 68° n. Br.; eine Erscheinung, die mit Recht schon seit langer Zeit (vgl. Humboldt, Ansichten der Natur II. S. 173 u. f.) die Verwunderung aller Forscher erregt hat. Nur das insularische Neufundland kann sich für die westliche Halbkugel rühmen, diesen seltsamen, fast vorweltlichen Pflanzentypus zu besitzen.

So sind uns denn die schon genannten Dredgen unter den Holzgewächsen allein zur Betrachtung übrig geblieben. In der That haben sie mit der Region der vorigen nichts mehr gemein. Diese vertreten das halbrunde Moorland durchweg; jene flüchten sich lieber wie ächte Kufasien an den Ufern der Felsen, wo sie, mit kriechenden oder Zweigenden verbunden, wie auf unsern flachen ausgebreiteten Rasen wehen, auf denen die achselblättrigen Rosenblumen in ihrem weissen Atlas anmuthig absteigen. Zwei Arten bebühen ihren Bezirk bis zum höchsten Norden aus: die eine (*Dryas octopetala*) von der alpinen Region Lapplands bis nach Novaja Semlja, wo sie alle Bergeshänge Rasen bildend bedeckt, nach dem Zaimmerlande, Spitzbergen und Grönland, wo sie am Smithsund bei 79° am Rensselaers-Hafen und anderwärts erscheint, die andere (*Dr. integrifolia*), nur auf der westlichen Halbkugel in Grönland von 60° bis 72° und 1500 f. senkrechter Höhe nicht selten, sogar bis zu der höchsten Station des Smithsundes, und von Labrador bis zur arktischen Küste und dem arktischen Archipel, wo sie noch die Cornwallis- und Beechey-Insel bewohnt. Eine dritte Art (*Dr. Drummondii*) fällt allein auf das nördliche Hudsonien, wo sie besonders das Kalkgebirge bedeckt.

An und für sich betrachtet, ist der Formkreis, den alle diese Spitzpflanzen durchlaufen, ein sehr beschränkter. Gleichwie in den trockensten Wüsten, in trocknen Ländern überhaupt, eine Neigung des Laubes zur linearen Form sich kund gibt, ebenso hier. Die meisten Ericineen, deren Laub oft an das der Laubmoose erinnert, lehnen sich an diesen Typus an, und die Nadelhölzer vollenden ihn. Eine Menge anderer Arten — Heidebeersträucher, Birken, Erle, Weiden, ein Theil der Ericineen, Kudoen u. A. — strebt zwar der ovalen Laubform nach, erreicht aber nur in sehr wenigen Fällen, nur in den südlichsten Arten (Haselstrauch, Zitterpappel, Kreuzdorn, Schneeball u. A.), eine breitere Laubfläche, die hier und da eine Ausbuchtung der Peripherie magt. Gefiederte Blätter allein stellen sich als die vollendetste Form dar, aber auch sie meist nur in

den südlichsten Arten: in Rosen, Himbeeren, Brombeeren, Ebereschen, Faulbaum; die sonst den Fingersträutern so nahe verwandten Dredgen erreichen als die nördlichsten Sträucher fühlbarer Familien dies nicht mehr und werden den elliptischen Blatttrant nur noch zahnartig ein.

Die Gegenleistung des Strauchs verhält sich eben vollkommen getreu der Leistung ihrer Heimat. Am Aequator strebt Alles in die Höhe und dehnt sich nach allen Seiten behaglich aus, gleich den Licht- und Wärmestrahlen; die gleichsam strahlenförmig aus senkrechter Höhe nach allen Richtungen auslaufen. Am Pol zieht sich Alles in sich selbst zusammen, das Leben im kleinsten Raume concentrirt. Alles flüchtet mit vollendeter Genügsamkeit in den Schoos des Mutterbodens, der den Strauch geboren; gleich den perennirenden Kräutern vollbringt er den größten Theil seines Lebens unter der Erde und bildet hier einen unterirdischen Stamm aus, der die oft nur winzigen Schößlinge über der Erde um ein Laufenfaches übertreift. Auf dem eisigen Novaja Semlja sah von Baer Weidenarten (*Salix herbacea* und *pygmaea*) kaum 2 Zoll hoch aus den Erbspalten hervorwachsen, während doch die Stämmchen, 1 — 1½ Zoll dick, oft die ganze Länge der Spalten einnahmen und so zu einem Baume wurden, der niederliegend auf der wärmeren Erde in seiner ganzen Länge Wachsen trieb. Nur *Salix Braya* wächst etwa eine Spanne aus der Erde hervor. Tief in Moos versteckt, wuchert die Polarweide (*S. polaris*), die hier fast ausschließlich den Pyramidenwald bildet, gleich dem letzten Ende eines Zweigleins, das man in die Erde pflanzte, um einen Baum aus ihm zu erzielen. Dieser Baum aber bleibt immer auf dieser Stufe seiner Größe stehen und treibt alljährlich einen Wipfel, der — aus zwei Blättern und einem Kähnen an jedem Astchen besteht, welche größer als diese selbst sind. Die meisten Kräuter, erschreckt durch die eilige Luft, wachsen nur 2 — 3 Zoll, selten 4 — 5 Zoll, noch seltener 6 Zoll hoch, weil diese Höhe im Allgemeinen die der warmen Luftsäule ist, während der größte Theil der Wärme unter die Erde sinkt. Im Zaimmerlande fand v. Middendorff Aehnliches. Hier bleiben, obwohl die Pflanzen die Günst eines continentalen Klima's genießen, 93 Arten unter der Höhe von 6 f., 31 schwanken zwischen 6 — 14 f., die 8 Sträucher aber erreichen nicht einmal eine mittlere Höhe von 4, die höchsten kaum 6 f. Darum drängen sich auch hier nur wenige Blätter rosettenartig an dem Grunde ihres Zweigleins zusammen; die Zweiggleier strecken sich nicht, sondern bleiben bei der raschen Entwicklung der Blätter und Blumen, auf welche der Strauch seine ganze Kraft verwendet, auf ihrer Stufe verkürzt stehen; das oberste Stengelglied allein, welches die Blumenthülle trägt, ist dazu erforsen, sich für Alle zu entwickeln. Diese Art des Wachstums zeigt sich, nach einer seinen Bemerkungen von Martins, in Lappland selbst bei der Birke da, wo sie

noch Baum wird, und übt auf deren Tracht einen großen Einfluß aus. Ueberall nämlich, wo sie schuglos dem strengen Klima preisgegeben ist, entwickelt die Frühlingsknospe nur ein sehr kurzes Zweigglieð, das an seiner Spitze 4—6 rosettenförmig gestellte Blätter trägt. Wiederholt sich das jährlich, so wachsen die Zweige aufrecht und drücken dem Baume etwas Stumpes auf. Umgekehrt in wärmeren Lagen. Hier verlängern sich regelmäßig die jährlich entwickelten Zweigglieðer bedeutender, das Zweigwerk nimmt ein rutenförmiges Ansehen an und erlangt in dieser Trauerform ihre gräßliche, südlichere Tracht wieder. Ähnliches beobachtet man z. B. von Hammerfest aus, wo die starre Form am Seegefläße auftritt, binnenwärts nach dem Eismeere zu an den Gewässern des Altensels um Eiby (etwa 70°), wo die Birken immer noch zwischen 40—50 F. hoch werden. Das nebenbei. Darum erkennt man aber auch innerhalb des eigentlichen Polarlandes den Eintritt des Frühlings nur an den äußersten Spitzen der Zwergsträucher. Unter 79° n. Br. bemerkte Kane am 23. Mal zuerst grüne Spitzen an der niedlichen Cassiope, während erst am 9. Juni die Zwergweiden ihre Blätter zu treiben begannen. Ueberall im Polarlande wiederholt sich dieses Bild und an denselben Formen; überall, wo sich auf den baumlosen Flächen noch ein Wald, ein Gestrüpp zeigt, da ist es mehr ein Rasen, dessen Stämme die größte Holzmasse unter der Erde produciren. Kein Wunder darum, daß sich weder hier noch selbst in der Baumregion eine Schlingpflanze zeigt, die sich an einen Mutterstamm angulehnen suchte. Keiner vermöchte ihm die Wärme zu bieten, deren sie doch bedürfte; nur was sich an den Boden anlehnt, aus ihm seine Wärme begiebt, hat Anspruch auf Leben. Nur die Lieblinge der eisigen Stürme, die Flechten, vertreten die ganze Vergierungsform der Pflanzenwelt, und es ist darum sehr bezeichnend,

daß der Lappe eine dieser Bartflechten (*Usnea plicata*), von denen das Renthier schmaukt, wenn ihm die Renthierflechte durch den Schnee versagt ist, „Lapp“ nennt und sich selbst nach ihr taufte.

Bei einem Rückblick auf die Holzvegetation hat man nach allem Gefagten deutlich 2 Regionen zu unterscheiden: die Wald- und die Strauchregion. Aber beide gliedern sich wieder in je 2 Abtheilungen. Die erstere zerfällt in den Radelwald und in den Birkenwald, d. h. in eine südliche und eine nördliche Region. Die Strauchregion setzt die nördliche Baumregion fort und zerfällt ebenfalls in eine südliche und eine nördliche. Beide gehören den baumlosen Flächen (*Barren Grounds* in Hudsonien, *Tundra* in Sibirien) an. Die südliche Strauchregion hat vor der nördlichen voraus, daß ihre Formen noch immer aufrecht gegen den Himmel wachsen. Sie liegt da, wo noch Alpenrosen, Heidelbeersträucher, Krähenbeere, Porst und Kalmien wachsen; denn diese treten überall am liebsten an den lichter Stellen der Wälder auf, an denen sie sich gern mit der Aderbeere und der Mutterbeere verbänden. Wo sie nicht mehr vorkommen, tritt die nördliche Strauchregion an ihre Stelle. Drusen und Zwergweiden, hier und da mit Cassiope und *Agalea* oder auch mit einer ausgestreckten Zwergbirke vereint, vertreten sie. Die letztere bleibt schließlich ebenfalls zurück, der letzte Anklang an den Wald; die Cassiope setzt mit Zwergweiden die Strauchregion des Halbes oder Moorlandes fort; die Drusen dürften die polarsten Äer sein. Das ist der polare Wald, wenn man sich einen solchen Ausdruck da noch gestattet darf, wo nur noch die Sahara des Polarlandes uneingeschränkt herrscht, und der Wald unter einer Moos- oder einer Kräuterbede lebt, die er unter besseren Verhältnissen in seinen Schutz genommen haben würde.

## Vom Monterosa zum Montblanc.

Von Otto Alt.

### 3. Wallis und das Vispfla.

Unter den mannigfachen Eindrücken, die eine Alpenwanderung gewährt, ist für mich immer einer der eigenstümlichsten und mächtigsten das Gefühl gewesen, das ich empfand, wenn ich nach einer Tageswanderung durch menschenleere Einden wieder in die bewohnten Gegenden hinabstieg. Ganz besonders lebhaft aber gestaltete sich dieser Eindruck, wenn, wie hier, das Gebirgsgesch, das ich überstieg, nicht bloß Thäler, sondern auch Menschen und menschliche Sprache und Sitte schied. Am Morgen noch hatte ich die schönen, kräftigen, heiteren und selbstigen Berner Oberländer verlassen, am Abend sah ich mich unter dunkelfarbigen, schmutzigen, miszmüthig blickenden und unthätig auf Straßen und Plätzen umherlungernenden Wal-

lisern. Allerdings bildet erst der Weiler Pfen, oberhalb Eibers die Sprachgrenzen, und wurde früher sogar die deutsche Sprache noch weit in das untere Wallis hinein gesprochen. Aber das romanische Element und die romanische Bevölkerung dringt immer weiter in das Thal hinein und untermischt in Sitte und Sprache die deutschen Walliser, die aus demselben burgundischen Blute stammen, wie die Berner jenseits der eisumpanzerten Berge. Nur in den abgeköstigten östlichen Seitenthälern hält die Bevölkerung noch treu an deutscher Sitte und Sprache fest, und in dem Nicolathal traf ich sogar Führer, die nicht ein Wort Französisch oder Wälisch verstanden und durch ihr schlechtes Walliser Deutsch ebenso wie durch ihren

kräftigen Giebelbau, ihren Fleiß und ihre Sitteneinfalt ihre deutsche Natur unverkennbar bekundeten. Das übrige nur ein Volk ursprünglich das ganze Rhonethal bewohnte, bezeugt die übereinstimmende Bauart aller malerischen Städtchen von dem engen Felsenpasse zwischen der Dent du Midi und der Dent de Morcles, der die Grenze des Waadtlandes bezeichnet, bis zum Fuße des Simplon. Ueberall findet man dieselben engen, winkligen, schlecht gepflasterten Straßen, dieselben statlichen und oft zahlreichen Kirchen, dieselben hohen, düsteren Steinhäuser zwischen elenden Lehm- und Holzhütten.

Wo man bei Leuk das Rhonethal betritt, entwickelt es gerade seinen anmuthigsten Charakter. Nicht drängt sich der Fuß an den Fuß der nördlichen Berge, die von Weinbergen und Wiesen umflaumt sind. Gegen Ebers hin erhebt man eine Reihe malerisch gestatteter grüner Schutthügel, die sich unmittelbar vom südlichen Fußufer erheben, und die einst in ihrem Kiefern- und Berberitzen-gestrüpp verächtlichen Räuberbanden einen willkommenen Aufenthalt boten. Wahrscheinlich sind sie die Trümmen und Reste alter Schlammschichten, namentlich die Trümmer der beim Durchbruch der Dala gestörten Kalt- und Schiefermassen, die vor der Öffnung der Dalaflucht angehäuften, von der Rhone durchwühlt und durchfurcht wurden. Dort neben dem grünen Hügel, von welchem die euphorbiamenten Mauern des alten Städtchens Leuk mit seinen zahlreichen Thürmen und seiner altsteinernen Burg herabschauen, öffnet sich der schauerliche Dalaflucht selbst, eine wilde Felsenklüfte, durch welche die von der Gemmi und dem Leukerbad herabkommende Dala in schäumenden Gassen und oft dem Auge in Abgründen verborgen ihre Gewässer der Rhone zuführt. Hoch darüber erhebt man auf grüner, abschüssiger Matte die braunen Häuschen von Albinen malerisch um ihre weiße Kirche gruppiert, zu denen man von Leukerbad aus auf gebrechlichen Leitern hinaufsteigt.

Wie von Norden her die Dala mit ihren Schlammschichten das Rhonethal bedroht, so bereitet ihm von Süden her, von den Abhängen der Walliser Alpen, der berüchtigte Jügraben Gefahr. Man erkennt dies an den gewaltigen Schutt- und Schlammschichten, welche Leuk gegenüber den Hauptstrom ganz auf die nördliche Seite hinübergebrängt haben. Dieser Jügraben ist der Abfluß des zwischen Schwarz- und Jühorn in einer Höhe von 7000 Fuß gelegenen Jüfers. Seine gelben, trüben Schlammschichten oder erhält er aus einer kalten Seitenflucht, einem furchtbaren, 1 Stunde langen Felsenkeßel oder Trichter, dessen unbemittelte gelbe Wände man von der Straße her erblickt. 6—8000 Fuß hoch umfließen diese Wände den Trichter so eng, daß kaum die Mittagssonne des Hochsommers ihre Strahlen zum Grunde hinabzusenden vermag. Kein lebendes Wesen zeigt sich in dieser schauerlichen Tiefe, die der Aberglaube der Umwohner zum Aufenthalt

böser Geister gemacht hat. Mit dumpfem Rauschen fließt das Wasser zwischen großen Blöcken herab und arbeitet unablässig an der Zerkörung der an sich bröckeligen Kalk-, Gips- und Quarzgesteine. Bei heftigem Regen brausen Fluthen über die Felswände herab und verwandeln sich durch die aufgelösten und losgerissenen Massen in Schlammströme, die den ganzen Graben bis zur Rhone hin mit einem biden, gelben Brei füllen, aus welchem mächtige Blöcke schwimmend fortgetragen werden.

Sehr bald, noch unterhalb Turtman ändert sich der Charakter des Rhonethales. Die Sohle wird breiter, flacher; die Kiese- und Geröllflächen wechseln mit dichtem Röhricht, zwischen dem überall trübes Sumpfwasser sichtbar wird. Die Straße selbst ist oft noch an den Ufern schwemmt. Einige Tage vor meiner Ankunft im Wallis war ein Volksbruch im oberen Vispithale gefallen und hatte die Vesp mit so furchtbaren Fluthen erfüllt, daß noch die Rhone bis weit hinab hoch über ihre Ufer anstiege. Noch waren die Gewässer nicht ganz verlaufen, und deshalb waren die Zerkörungen, die sie überall in dem Thale angerichtet hatten. Der Verkehr mit der Simphonstraße war unterbrochen, und mir selbst erklärte man ein Vordringen des Vesp auf der überschwemmten Straße als unmöglich. Allerdings wäre ich genöthigt gewesen, an mehreren Stellen Strecken von mehreren hundert Schritt Länge durch knietiefes Wasser zu waten, wenn mir nicht ein Wagen zu Hülfe gekommen wäre, dessen Lenker mich bereitwillig aufnahm.

Wäre nicht die großartige Umgebung gewesen, hätte nicht zur Linken das schneebedeckte Bleifhorn, zur Rechten die blendende Zirkuppe des Balserin in das Thal hernieder geblickt, hätten sich nicht vor mir die gewaltigen Bergmassen der Simphongruppe, coulisförmig in einander geschoben, aufgethan, es wäre eine trübe und einsame Fahrt gewesen durch die sumpfige Einöde zwischen Turtman und Vesp. Aber freudig ruhten namentlich meine Blicke auf der nördlichen Thalwand, wo sich die dunklen, bleifach zerklüfteten Felsflächen von zahlreichen grünen Nasen unterbrochen zeigten und zwischen zerstreuten Eennhöfen von einem reizenden Vorsprung eine weißleuchtende Kette herüberblickt. Wald und Gebüsch, nach oben in scharfer Linie abgegrenzt, stehen sich, unten in sterbliche Zweige auslaufend, tief an den steilen Wänden herab, die künstlichen Wasserleitungen andeutend, in deren Anlage die Walliser Meister sind. Aus unzugänglichen Klüften, oft aus der unmittelbaren Nähe der Gletscher der sieben bis hundertweit durch die Wildnis, oft in schwebender Höhe mit eisernen Klammern an die Felswand befestigt oder in künstlichen Galerien durch Felsen hindurch oder in hölzernen Kinnen über Thäler hinweg laufend. Drei oder vier solcher Wasserleitungen bringen dort drüben aus der finsternen Schlucht des Baltschieder Thales hervor, eine über der andern, die oberste 2000 Fuß über der Thalsohle. Mit

ängstlicher Sorgfalt überwacht man aber auch das mühsam gewonnene Wasser, und mit peinlicher Gerechtigkeit wird jeder Wiese für jeden Tag der Woche und selbst für jede Stunde des Tages ihr Antheil zugetheilt.

Wir müssen unsere Blicke jetzt der südlichen Seite des Thales zuwenden, jener gewaltigen Gebirgsmasse der Walliser Alpen, die das Ziel unser Wanderung sein sollen. Furchtbar steil und geklüftet, von Eis und Firn überzogen, oft kaum dem Hauptkamm an Höhe weichen, strahlen hier von diesem zahlreiche Seitenthäler nordwärts aus. In den Thälern, welche diese Seitenthäler einschließen, sammeln sich die Gletschergewässer, um der Rhone zuzuströmen. So eng sind oft die Ausgänge dieser Thäler, daß man sie vom Rhonethal kaum bemerkt. Fünf größere, in ihrem oberen Theile meist gegabelte und den steilabfallenden Gerat eines kurzen Querschnitts umschließende und sechs kleinere Quertäler sind es, die von Martigny bis Vispach einander folgen. Die fünf größeren Thäler sind: das Vagnethal, das Erlingerthal oder Val d'Hérens, das Einsichtthal oder Val d'Anniviers, das Turmmanthal und das Vispalthal.

Das letzte wird der Weg sein, den wir einzuschlagen haben, um in das Innere des Walliseraltengebietes einzubringen. Es ist das größte und zugleich das am tiefsten einsinkende aller Walliser Thäler. Ehe wir es betreten, wollen wir aber die Gruppierung des Gebirges in seiner Umgebung näher in's Auge fassen. Dem malerisch gelegenen Städtchen Siders, 1 1/2 Stunden unterhalb Reut, gegenüber erblickt man zwischen den grünen Schutthügeln hindurch die Mündung einer schmalen Schlucht, über welcher aus weiter Ferne der Schneegipfel des Weißhorns in das Hauptthal hinableuchtet. Es ist der enge Eingang des Einsichtthales, aus welchem die rauschende Rhavansche hervorströmt. Eine riesige Gebirgskette trennt gegen Westen das Thal von dem Erlingerthal und steigt allmählig über den Gerat des Grand-Cornier zu der herrlichen 13,480 par. Fuß hohen Pyramide des Steinbockhorns oder der Dent-blanche empor. Eine Wildnis von Gletschern, Firnsfeldern und gewaltigen Felsabhängen zieht sich von hier südlich bis zum Hauptkamm fort, wo derselben der prächtige Keil der Dent de Kong entspringt. Dort, am westlichen Fuße desselben, führt der wenig begangene Gletscherpaß des Col de Colles aus dem Erlingerthal in das Val Pellina zur Südseite der Alpen hinüber, und er scheidet von dem Hauptkern der Walliser Alpen eine westliche Gruppe, aus welcher der Grand-Combin und der große St. Bernhard emporragen. Kehren wir aber zur schönen Dent-blanche zurück, so sehen wir von ihr noch zwei andere gewaltige Gebirgswälle auslaufen, den einen kurz, scharf und steil sich zwischen die beiden Arme des Einsichtthales hinein schiebend, den andern, anfangs östlich zum stolzen Doppelgipfel des Gabelhorns ziehend, dann plötzlich nach Norden umbiegend, um die westliche Wand des Ni-

colaithales, wie der westliche Arm des Vispalthales genannt wird, zu bilden. Diesem Wall entspringen das Trifthorn und Ainal:Kothhorn, von dessen Abhängen nach Osten der Trifthalterser steil gegen Zermatt abfällt, während seine Nordseite das Firnmeer des 3 Stunden langen, gegen das obere Einsichtthal sich hinabschlängelnden Ainalgletschers speist. Vom Kothhorn selbst laufen rechtwinklig zwei Querwälle aus, der eine im Keil des Mittelhorns endend, der südn gegen Zermatt vorspringt, der andere gegen das Einsichtthal die schlanke Ziespyramide des Lo Besso bildend. Der Hauptwall selbst zieht sich nördlich zu dem 13,900 Fuß hohen Weißhorn fort, jener stolzen, gegen Norden und Westen in fadenlosem Weiß schimmernden Pyramide, deren Anblick den Wanderer im oberen Rhonethal überall begleitet, und von der nach Osten der furchtbar steile Wiesgletscher brohend in das Nicolaitthal hinabfällt. Von diesem schönen Gipfel beginnt eine abramliche Gabelung des Gebirgskammes. Ein gewaltiger Gebirgswall schiebt sich nordwestlich zwischen das Einsicht- und das Turmmanthal hinein, die wegen ihrer Aueficht berühmte Bella Zola, das Vortorhorn und den erwähnten Höhlentempel des Jühorns tragend; ein anderer zieht sich nördlich fort zum schönen Keil des Bruneggshorns, der, weitlich sichtbar, zwischen St. Nikolaus und Etalben majestätisch in das Nicolaitthal hinabfällt, dann zum Varrhorn, Kothhorn, Angstbockhorn, immer die Scheidewand zwischen Turmmanthal und Nicolaitthal bildend.

Um auch die östliche Wand des Vispalthales kennen zu lernen, müssen wir zum Hauptkamm der Walliser Alpen zurückkehren. Von der Dent de Kong aus, die wir als westlichen Grenzpfiler der Hauptgruppe der Walliser Alpen bezeichnen, folgen wir dem Zuge des Gebirges gegen Osten und sehen vor uns die wunderbare, fast 4000 Fuß über dem schneebedeckten Kamm emporstarrende, 13,898 par. Fuß hohe Felsnadel des großen Matterhorns oder Grand-Cornin. Eine riesige Schildmaße nennt sie Desfor, zwischen den Centralmassen der westlichen Walliser Alpen und des Monterosa hingestellt. Denn hier muß der Geolog in der That eine Scheidung der Gebirgsgruppen vornehmen. Und zwar ist es nicht bloß die Einsattlung des hier über den Kamm führenden 10,116 Fuß hohen Matterhornpasses oder Col de St. Theobald, die ihn zu dieser Scheidung zwingt, sondern das Auftreten schieferiger und metamorphischer Gesteine, die sich von Süden her bis zur Höhe des Matterhorns zwischen die kristallinen Centralmassen der eigentlichen Monterosa-Gruppe und der Gruppe der Dent-blanche einschieben. Die eigentliche Monterosa-Gruppe beginnt also erst jenseits des Theobaldpasses mit dem kleinen Matterhorn oder Nishorn und steigt allmählig durch das malerisch geformte Breithorn, die rundlichen Kuppen der Arollinge und den schönen weit hin leuchtenden Roskamm zu den eisbepanzerten Gipfeln

des Monterosa an, unter denen die 4 nördlichsten, die Signalkuppe, Zumbstein Spitze, höchste oder Dufour Spitze und Nordend oder Gornnerhorn, sich zu Höhen von 14,016 bis 14,257 par. Fuß erheben. Von den gewaltigen Firnschnecken, die sich namentlich auf der Nord- und Ostseite des Monterosa ausbreiten, und über welche früher der jetzt ungangbare alte Weisthorpfuß nach Italien hinüberführte, steigt der Gornnergletscher, nach dem Aletschgletscher der größte der Alpen, herab, der sich um den Gornnergrat und den Niffelberg herum bis in die Nähe von Zermatt im Vöspthale windet.

Als nördlichster Gipfel des Monterosa und mit dem Nordend durch das erwähnte Firnplateau verbunden, erhebt sich endlich die viel von Touristen besuchte 11,760 F. hohe Elma de Jazi. Von dieser laufen nun 3 mächtige Gebirgswälle aus, nach Westen ein kurzer, der erwähnten Gornnergrat bildet und im Niffelhorn endet, nach Osten ein mächtigerer, der sich vom Montemoro plötzlich nach Norden wendet und die Simplonkette, das letzte Glied der Walliser Alpen und die östliche Grenzmauer des Vöspthales, bildet, und eine nördliche endlich, die an Gröfartigkeit nur dem Monterosa selbst weicht, und die sich als eine riesige Scheidewand in das Vöspthal hinein streckt, es in zwei Arme, das Nicolathal und das Saasthal, trennend. Dieser über 8 Schmelzestunden langen, in ewigem Schnee leuchtenden Felsmauer, von der sich der Fingelengletscher nach Zermatt hinabsenkt und zahlreicher größerer und kleinerer Gletscher in das Saas- und das Nicolathal niederhängen, entspringen nacheinander das Strathhorn, Disethorn, Aualinhorn und der Alphubel, zwischen denen beschwerliche und gefährvolle Gletscherpässe vom Nicolathal zum Saasthal hinüberführen. Nur selten und nur von kühnen Bergsteigern werden diese Pässe betreten, die über Höhen von mehr als 12,400 Fuß führen und eine 12 stündige Wanderung erfordern, trotzdem die directe Entfernung beider Thäler kaum 2 Stunden beträgt. Ihre stolze Höhe erreicht diese großartige Felsmauer, die den Namen des Saasgrates führt, in den

14,000 Fuß hohen Mischabelhörnern, die nach beiden Seiten hin coulissenartig scharfe, schwarze Felsrippen in die Thäler vorstrecken, zwischen denen kleinere und größere Gletscher ihre Eisarme ausbreiten. Gegen Norden hin stürzen diese Hörner steil in ein weites Firnmeer ab, das den mächtigen Niedgletscher gegen St. Nicolaus hin absendet, und an dessen Nordseite ebenso steil die eisigen Felsbörner des Balferin aufsteigen, der endlich als grünes, waldfreies Vorgebirge unter dem Namen des Ebibergs am Vereinigungspunkte der beiden Vöspthäler die riesige Gebirgsmauer abschleift.

Diese hochgipfelige Mauer des Saasgrates ist es, welche von Norden der überall in schönen Schneegipfeln des Monterosa dem Auge entzieht. Um so freier stellt er sich gegen Süden hin. Hier gleiten sich nur unbedeutende, selbst in ihren Gipfeln schnell unter die Schneegrenze sinkende Gebirgskämme in das piemontesische Hügelland hinab, zwischen sich die romantischen Thäler von Tournanche, Chalais, Gressoney und Aignas einschließend. Der Anblick, den der Monterosa von den östlichsten dieser Thäler, namentlich dem von Gressoney aus gewährt, ist überwältigend. In seiner ganzen heitern Majestät steht er da, in fadenlosom Schneegewande bis herab zu dem riesigen Felsmauern, in denen er gegen Süden abstürzt. Selbst der vielgerühmte Anblick des Monterosa aus dem Anzasacathale und dem Zersentel von Macugnaga, den ein Seitenkamm der Simplonkette und ein von den südlichsten Rosapfaffen auslaufender hoher Gebirgswall einschließen, ist mit diesem an wirklicher Schönheit nicht zu vergleichen. Er mag großartiger sein, aber er bleibt karger, roher; es fehlt ihm der Zauber anmuthiger Formen, und der Eindruck der nahen, 8000 Fuß hohen weißen Felswände ist zu mächtig, um die Schneegipfel darüber zur Wirkung kommen zu lassen.

Nach dieser flüchtigen Ueberschau über die Walliser Alpen, ihre Gipfel und Kämme, ihre Thäler und Gletscher, können wir unsere Wanderung fortsetzen und uns ungesfört den Einbrüden hingeben, die ihre großartige Natur für uns bereit hat.

## Literaturbericht.

Reisen im Hindischen Archipel in den Jahren 1865 und 1866. Von Albert S. Bidmore. Jena, bei Hermann Cotta'sche. 1869. 8. 443 S. nebst 36 Illustrationen in Holzschnitt und 2 Karten in Farbenbrud. Preis: 2 Thlr. 20 Sgr.

Dieses Reiseverwerk ist in mehr als einer Hinsicht bemerkenswerth. Zunächst behandelt es einen Gegenstand, über welchen man in Europa wenig Belehrung empfangt, da Reisen selten sind, welche außer Java und Sumatra auch die übrigen Inseln des indischen Archipels zu besuchen vrliegen. Dieses hat der Hr. des vorliegenden Buches aber in einer ziemlich umfassenen Art durchzuführen gewußt; und das um so mehr, als ihm von der niederländisch-indischen Regie-

tungsgewalt in überraschender Weise die frätmäße Unterstützung zu Theil wurde. Aber auch der Hr. eigener Zweck unterstützte ihn bei weisentlich. Denn es galt, diejenigen Aufschü zu sammeln, welche der unbekante deutsche Naturforscher Humboldt's seiner Zeit auf Ambolia und den umliegenden Korallenriffen entdeckt und beschrieben hatte. Ein solcher Zweck mußte den Hr. nothwendig mehr auf die kleineren, als auf die größten Inseln führen, und gerade erstere sind es, von denen man in der Regel so wenig erfährt. So wenig aber auch der wissenschaftliche Zweck erweist, so hat er doch der Hr.'s Blick nicht ebenfö eingengt. Der Reisende hat ein offenes Auge für die gesammten Natur- und Völkerausball, eine vorurtheilsfreie Weltanschauung und die kritische Rücktenheit des nordamerikanischen Volkes.

Alle diese Eigenschaften stützen schon von vornherein so viel Vertrauen ein, daß man nur Gutes von dem Reisewerke eines Mannes erwarten kann, der, seinen Forscherblick auf ein abgegrenztes Feld richtend, doch noch Fernblick genug für das große Ganze übrig hat. Ich habe sein Buch mit Spannung und hohem Genuß, zum Theil auch zu hoher Belehrung durchgelesen. Denn wenn uns auch der Vf. seine neuen Entdeckungen im geographischen Gebiete vorführt, so ergibt er sich doch häufig mit tiefer Sachkenntnis über Dinge, die in aller Munde und doch häufig noch sehr wenig bekannt sind. Von den Menschenwelt, Thierreich und Menschenwelt, Meer und Klima, Korallenriffe und Vulkane, — Alles giebt der Vf. in seinen Gesichtskreis, und die persönlichen Erlebnisse sind der angenehme blinde Faden, welcher das Ganze zusammenhält.

In dieser Weise erhält der Leser in 17 Kapiteln eine mehr oder minder ausführliche Beschreibung von der Sundaitraße und Satalia, von Samarang und Surabada, von der Flora und Fauna des indischen Archipels, von Celebes und Timor, von Amboina, Illakker und Seram, von Banda und Buru, Ternate, Tidore und Gilolo, von der nördlichen Halbinsel Celebes, von der Minabassa und Sumatra. Zahlreiche Illustrationen, meist nach Photographien ausgeführt, unterstützen die Anschauung in bezeichnender Weise, obgleich einige von ihnen besser weggelassen wären. Dagegen vermag der Leser auf den beiden Karten, von denen die eine Sumatra, die andere

den ganzen ostindischen Archipel darstellt, die vollständige Reisekarte des Vfs. zu verfolgen. Ein Gesamtmaterial, für welches wir den oben angegebenen Preis höchst mäßig finden. Ref. ist überzeugt, daß der Leser das gut übersehte Buch nur mit Vergnügen aus der Hand legen wird.

R. R.

**Alexander von Humboldt. Biographie für alle Völker der Erde, von Otto Ullt. Verlag von R. Keffler in Berlin. Preis 10 Sgr. 3. Aufl.**

Dieses Buch, auf welches in der „Natur“ (Nr. 22) bereits im Voraus aufmerksam gemacht wurde, und das nun bereits kaum 2 Wochen nach seinem Erscheinen die 3. Auflage erlebt hat, ist in Wahrheit ein Volksbuch im besten Sinne des Wortes, das Jedem, dem wissenschaftlich Gebildeten, wie dem Laien, hohen Genuß gewährt. Es ist ein treues, lebensvolles, anziehendes Bild des großen Meisters, dessen hundertjährigen Geburtstag wir und mit uns die meisten gebildeten Völker der Erde in Kürzen begehen werden.

Wage es Allen empfohlen sein, die sich erbauen und erheben wollen an dem Lebensbilde eines Mannes, der für hohe ideale Ziele alle Genüsse des Lebens opferte und bis an sein spätes Greisenalter in rastloser Arbeit für die Vervollständigung der Wissenschaft und zugleich für die geistige Befreiung des Volkes wirkte.

## Literarische Anzeige.

So eben ist erschienen:

### das erste der Ergänzungs-Hefte zur „Natur“.

Die freundliche Aufnahme, welche die früheren Hefte in vielen Leserkreisen gefunden, haben uns veranlaßt, abermals eine Auswahl umfassenderer Aufsätze aus verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaften zu treffen, die wir sowohl als eine angenehme und unterhaltende, wie belehrende und den praktischen Zwecken des Lebens dienende Lektüre auch den Abonnenten dieser Zeitschrift angelegentlich empfehlen. Den Inhalt dieses ersten Heftes bilden: Zur Statistik von Griechenland, von D. Kind; Die Gezeiten der Ebbe und Fluth, von Karl Schmeling; Der Varsch. Nach dem Holländischen des Dr. J. G. Winkler, von Hermann Meier; Beiträge zur Kenntniss des Alters, der Kultur und Verfassungsweise der Trolere, von M. G. Grandjean; Die Atmosphäre und das Leben, von Otto Ullt.

Halle, den 18. August 1869.

Die Herausgeber.

Der Preis der **Ergänzungs-Hefte zur „Natur“**, welche zwanglos erscheinen, ist für jedes Heft 10 Sgr. (35 Kr. rheinl.) — Niemand verpflichtet sich durch Behalten eines Heftes zur Annahme der Fortsetzung. Diejenigen Abonnenten, welche die „Natur“ durch eine **Buchhandlung** beziehen, werden die Ergänzungs-Hefte durch dieselbe Buchhandlung zugestellt erhalten.

Die Abonnenten, welche die „Natur“ von der **Post** entnehmen, wollen entweder die Ergänzungs-Hefte bei einer ihnen nahegelegenen Buchhandlung oder unter Franco-Einsendung des Betrages bei dem unterzeichneten Verlage direct beziehen, worauf ihnen das betreffende Heft franco unter Kreuzband zugesandt werden wird.

Halle, den 18. August 1869.

**G. Schwetschke'scher Verlag.**

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 25 Sgr. (1 fl. 30 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Gebauert, Schwetschke'sche Buchdruckerei in Halle.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me. und Dr. Karl Müller von Halle.

**N<sup>o</sup> 36.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetfke'scher Verlag.

**8. September 1869.**

**Inhalt:** Das Klima von Nordamerika mit dem Europa's verglichen, von Adolf Ott in New-York. Dritter Artikel. — Vom Monterosa zum Montblanc, von Otto Me. 4. Fortsetzung. — Ein Liebling der Feinschmecker, von Georg Eiser. Zweiter Artikel.

## Das Klima von Nordamerika mit dem Europa's verglichen.

Von Adolf Ott in New-York.

Dritter Artikel.

Das Klima westlich von den Rocky Mountains (schon Forcy spricht dies aus) besitzt einen eigentlichen Continentalcharakter, d. h. nordische Winter und tropische Sommer; nur die Golfstaaten machen hiervon eine Ausnahme. Auch ist das Klima viel milder und gleichmäßiger in der Nähe der fünf See'n, obgleich deren Spiegel bedeutend höher über der Meeresfläche liegt, wie ein großer Theil des südlich von ihnen gelegenen Bodens. Fern von den See'n in Dr. 44° 53', am Zusammenfluß des St. Peter's River mit dem Mississippi, im Fort Snelling, hat man eine mittlere Wintertemperatur von 15,8 Fähr. ausgemittelt, während sie in der Nähe der See'n nur einen halben Grad unter dem Gefrierpunkt erreicht. Noch differirender ist die Temperatur im Norden und Süden. Wäh-

tend z. B. der Unterschied zwischen der mittleren Sommerwärme und Winterkälte in Iowa 56° Fähr. beträgt, ist er in Texas nur 12°, und an der Mississippi-Ausmündung ist die mittlere Jahreswärme 72°, während sie an seinen Quellen zu 40° Fähr. gefunden wurde.

Pflanzen mit vorherrschendem Zuckergehalt und narkotischen Stoffen, sowie die Baumwolle haben hier ein ausgedehntes Feld, ja Weizenfora gedeiht weit über die Grenzen hinaus, innerhalb welcher es in Europa vorkommt; auch gedehnen Hanf und Pfirsiche, überhaupt Vegetabilien, welche ein rasches Wachsthum verlangen, vortreflich und sind ungewöhnlich verbreitet. Was die atmosphärischen Niederschläge anbetrifft, so sind sie bedeutend in dem wärmeren Theil des Jahres; ihre Intensität



tät ist im südlichen Theil größer, als im nördlichen, obwohl derselbe im Durchschnitt 30 Regentage im Jahre hat \*). Westwärts vom Staate Ohio nimmt die Zahl der Regentage mit der Entfernung ab, und zwar ist ihre Zahl in Nebraska nicht halb so groß wie in Tennessee, Kentucky und Ohio. In Regenarmuth kommt aber, nach den bisherigen Messungen, kein Theil der Vereinigten Staaten der Gegend am Zusammenfluss des Colorado- und Arkansasflusses gleich.

Betrachten wir die nördliche Grenze der Ansiedlung und Kultivations auf dem nordamerikanischen Continente, so wird dieselbe anfänglich durch eine Isotherme von 38 Fähr. gebildet, welche sich von dem St. Lorenzfluß unterhalb Quebec nach dem westlichen Ende des Obren See's (Br. 48°) erstreckt, eine Distanz von ungefähr 25 Längengraden durchlaufend. Von da ab westwärts darf die Isotherme (Kline mittlerer Sommerwärme) von 38° Fähr. als die Grenze bezeichnet werden. Sie zieht sich von dem Hochlande des Lake Superior nach den Rocky Mountains in Mittelsch-Amerika hin. Innerhalb dieser nördlichen Grenze existirt ein sibirischer Sommer, welcher Cerealien und ausdauernde Gemüse zur Reife bringt. Jene Isotherme nimmt eine Länge von ungefähr 30 Grad in Anspruch. 15 Grade westlich vom Felsengebirge und dem nördlichen Theile des Stillen Oceans entlang, zwischen 50 und 58° n. Br., macht sich ein dem Anbau von Körnerfrüchten ungünstiger Einfluß geltend; doch mag Fischerel und Handel vielleicht hier den Grund zur Ansiedlung eines kräftigen Menschenstammes bilden.

Zur Vervollständigung des Obigen haben wir hier in 4 Tabellen eine Anzahl von Städten und militärischen Stationen der Vereinigten Staaten, welche zwischen gewissen Grenzen schwankende mittlere Jahreswärmen besitzen, zusammengestellt.

Orte mit einer mittleren Jahreswärme von 40° bis 48° Fähr.

Orte	Höhe	Breite	Länge	Mittl. Jahreswärme
	800			Seitenb.
Portsmouth, N. H., Fort Constitution	40	43°04'	70°49'	46°
Burlington Bl.	205			45°
Lagdenburgh, N. Y.	225	44°41'	75°32'	44°
Dowag, N. Y., Fort Ontario	250	43°20'	76°40'	49°
Orin, Penn.	600	42°08'	80°10'	47°
Fort Macinac, Mich.	728	45°15'	84°33'	40°
Albuquerque, N. M.	600	43°04'	87°57'	46°
Fort Snelling, nahe St. Paul, Minn.	820	44°53'	93°10'	45°
Fort Union	1130	40°19'	94°19'	40°
Fort Benten, Montana	2063	47°50'	110°36'	48°

\*) An den See'n kommen überdies 117 schöne Tage auf's Jahr, in den Golfstaaten aber 250.

Orte mit einer mittleren Jahrestemperatur zwischen 48° und 52° Fähr.

Orte	Höhe	Breite	Länge	Mittl. Jahreswärme
	800			Seitenb.
Boßen, Meß., Fort Independence	50	42°20'	71°	49°
New-York, Fort Columbus	23	40°42'	74°01'	51°
Beck-Point, N. Y.	167	41°23'	74°	50°
Philadelphia, Girard College	30	39°57'	75°13'	52°
Pittsburg, Penn.	704	40°32'	80°02'	50°
Council Bluffs, Nebraska	1200	41°30'	95°48'	49°
Fort Karamie, Dakota	4519	42°12'	101°17'	50°
Santa Fe, New-Mexico	6846	35°45'	106°01'	50°
Fort Hancock, Oregon	50	45°40'	122°30'	52°
Fort Steiencover, Washington Territory	300	47°10'	122°15'	50°

Orte mit einer mittleren Jahrestemperatur zwischen 52° und 60° Fähr.

Orte	Höhe	Breite	Länge	Mittl. Jahreswärme
	800			Seitenb.
Fort Mc. Denno, nahe Baltimore, Md.	30	39°17'	76°35'	54°
Washington City, National-Obervatorium	60	38°53'	77°2'	56°
Fort Monroe, nahe Norfolk, Va.	10	37°	76°18'	54°
Cincinnati, Ohio	550	39°07'	84°31'	53°
Louisville, Ky.	200	38°03'		54°
Memphis, Tenn.	400	35°48'	88°	60°
St. Louis-Krystal, Mo.	450	38°40'	90°05'	54½°
Albuquerque, New-Mexico	5032	35°45'	106°38'	50°
Great Salt Lake City, Utah	4351	41°45'	112°48'	53°
San Francisco, Cal.	150	37°48'	122°28'	50°

Orte mit einer mittleren Jahrestemperatur zwischen 60° und 70° Fähr.

Orte	Höhe	Breite	Länge	Mittl. Jahreswärme
	800			Seitenb.
Fort Johnston, N. C.	20	34°	78°05'	65°
Augusta-Krystal, Geo.	50	32°8'	81°53'	64°
St. Augustine, Fla., Fort Marion	25	29°48'	81°35'	66°
Fort Mearns, Ala.	20	30°14'	88°	67°
Baton Rouge, La.	10	29°57'	90°	70°
New-Orleans La.	40	30°26'	91°18'	68°
Fort Tazewell, Ind. Territory	300	34°	95°33'	61°
Galveston, Texas	10	29°18'	94°16'	69°
Austin, Texas	200	30°20'	97°46'	69°
Fort Duncan, Eagle-Flag	80	28°42'	100°30'	70°
San Diego, Cal.	650	32°42'	117°14'	62°

Obwohl mit den Ursachen der Temperatur-Ernieuerung und Erhöhung im Allgemeinen bekannt, sind wir doch noch weit davon entfernt, mit ihrer Hilfe das Klima einer Gegend oder eines Landes festzustellen. Gar Manches geht am Himmel vor, was uns noch keineswegs erklärlich ist. Bilden doch die Witterungserscheinungen einen Kreis, von dem wir weder Anfang noch Ende bestimmen können. Nicht einer Folgerung a priori, sondern nur einer Lust zu Generalisirungen ist es inbeffen zuzuschreiben, wenn man das Klima der Westküsten der alten Feste als gleichartig mit demjenigen der Westküsten

des neuen Erdtheils bezeichnet hat. Während dieses nach unserm jetzigen Wissen wohl für die respektiven Oeffnungen austritt (der Himmelsstrich der Oeffnungen der Vereinigten Staaten stimmt in auffallender Weise mit dem der sibirischen und chinesischen Oeffnungen der alten Feste überein<sup>9)</sup>), ist es mit den ersten, wenigstens für auch für korrespondierende Breitengrade gleiche numerische Werthe bezüglich der mittleren Jahreswärme darboten, keineswegs der Fall. Um nur auf einige Punkte aufmerkiam zu machen, so ist der Sommer an der pacifischen Küste viel kühler als in Europa, die Regen sind daseibst periodisch, und es ist der Luftdruck sehr gleichförmig.

Berücksichtigt man das über die Ursachen der Wärme-Vermindeung und Erhöhung Gesagte, so folgt, daß der Himmelsstrich des an Asien sich anknüpfenden Nachbars — sein edelstes Pflanzfeld — nicht unbedeutend von dem Klima des keineswegs später „aus der chaotischen Wasserbedeckung hervorgetretenen“ Amerika differiren muß. In der That ist dieses auch der Fall und ist ein Blick auf die Karte genügend, um über die Hauptursachen dieses Unterschiedes belehrt zu werden. Hier bietet sich uns einerseits eine kompakte, in der ganzen gemäßigten Zone wenig Küstentrümmung darbietende Gestalt dar, dort ein Erdtheil von starkgegliedelter Form; hier ein fast bis zum Nordpol erstreckender Continent, dort eine Feste mit einem offenen Polarmeer; hier fast nur Meer unter den Tropen, dort eine endlose Sandwüste und um der herrschenden Winde zu erwähnen, so sind es in Europa nördlich abkühlende in der warmen und südlich erwärmende in der kalten Jahreszeit; hier findet das umgekehrte Verhältniß statt, und dies erklärt nun auch, weshalb der Frühling „alle Bande brechend“, so mächtig in das Land hineinsaut.

Im Allgemeinen ist die mittlere Jahreswärme<sup>10)</sup> in Amerika unter gleicher Breite niedriger als in Europa.

Während in Norwegen noch Roggen gebaut wird, steht in Nordamerika in gleicher Breite Alles fast während des ganzen Sommers von Eis und Schnee, und während bei Drontheim noch Weizen wächst, ist an der Hudsonthal unter korrespondierendem Breitengrade keine menschliche Niederlassung mehr. Nach zehnjährigen Beobachtungen beginnt die Schiffsahrt der Cieseland auf dem Eise erst am 23. März, und erst einen

vollen Monat später wird bei Buffalo die See frei; Buffalo liegt aber südlicher als Florenz. In New-York in der Breite von Neapel blühen die Bäume erst zu derselben Zeit wie in Upsala.

Philadelphia, mit der mittleren Jahreswärme von Genf, besitzt den Sommer von Mailand und den Winter von Berlin. In Charleston ist es im Sommer fast so heiß wie in Catania in Sizilien, dagegen im Winter nur so kalt wie in Lissabon. St. Louis hat den Winter von Genf und den Sommer von Lissabon; im Winter ist es daseibst jedoch kälter, wie auf dem Bernhardshof in einer Höhe von 7670 Fuß. New-York mit der mittleren Jahreswärme von Paris besitzt den Sommer von Rom und den Winter von Kopenhagen.

Was die atmosphärischen Niederschläge betrifft, so sind dieselben in Europa mehr allgemein, hier mehr lokal; auch ist die Intensität des Regens hier größer als in Europa, doch ist dieser im Allgemeinen hier wie dort auf fallend gleich auf das Jahr vertheilt. Mit der großen, gerade an dieser Küste herrschenden Trockenheit scheint das Gesagte freilich nicht in Einklang zu stehen; allein bedenkt man, daß die Luft sehr trocken sein kann, wenn auch ihr Wassergehalt groß ist, falls ihre Temperatur nur weit entfernt vom Taupunkte ist, so erklärt sich obige Erscheinung von selbst. Beiläufig gesagt, besitzen die physikalischen Wirkungen eines evaporirend kräftigen Klima's in Beförderung der Hauttätigkeit mit reichlicher Absonderung, Vermehrung des Durstes und vermehrter Kohlen säureauscheidung.

Wir haben hier, gestützt auf die Angaben des Prof. Draper in seiner Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs, verschiedene Länder des alten und neuen Continents, die einen ähnlichen Himmelsstrich darbieten, zusammengestellt.

Atlantische Staaten . . .	Oeffnungen von China.
Westlich: Amerika . . .	Sibirien u. europ. Rußland.
Prairie-Region . . .	Moldau und Wallachei
Pacifische Küste . . .	Peru.
Sonora . . . . .	Perisien.
Vancouver's Insel . . .	England.
Großes Bassin . . .	Umgebung d. kaspisch. Meeres.
Sandwüste von Utah . .	Arabien.
New-Mexiko . . . . .	Palästina.
Küste d. kalifornischen Meeres	Umgebung des rothen Meeres.
Idaho . . . . .	Schweiz.
Oregon . . . . .	Deutschland.

Spanien findet sich theilweise an der pacifischen Küste ebenfalls repräsentirt, für Frankreich jedoch ist kein gleichartiger Himmelsstrich aufzufinden.

Es darf uns nicht wundern, in den genannten amerikanischen Ländern zum Theil auch die Flora identisch mit derjenigen der resp. Gegenden der alten Feste zu sein

9) Wir besitzen freilich keine Theobisstritte, doch liegen diese auch in den erdlichen, inneren Landegegenten Gb'no's. Vögelst (f. dessen Agricultural Climatology of the United States compared with that of other parts of the globe, Agrikultur-Report für's Jahr 1853) glaubt jedoch, daß, wenn die Theobisstränge in die Umgebung von Nankasala in Japan (Breite von Barcelona) mit Erfolg gezogen werde, wie es behauptet wird, die Zone im Innern der Union, welche 2 Grade nördlicher liegt, sich dazu eignen dürfte.

10) Al. v. Humboldt bemerkt, wohl irrthümlich, „Sommerwärme“. (Siehe „Anfängen der Natur“. I. S. 102. 1849).

den. Viele der Baumformen der atlantischen Region finden sich wieder in China. In Sonora und Unter-Californien gedeiht die Palme, die Orange, Citrone, Feige und Dattel, ja man findet sogar die Cypresse, und kein Grund liegt vor, warum der Rio Grande, der Gila- und Coloradoßuß nicht mit einer halbtropischen Flora umgeben sein sollten, wie diejenige des Tigris und obern Indus ist. Wenn Draper dagegen die vielgestaltige Familie der Fackelsteine als charakteristisch für Asien auführt, so ist er damit im Irrthum. Roxburgh führt in seiner Flora indica nur zwei Cactus-Arten auf, die dem südöstlichen Asien eigenthümlich sein sollen; auch hat die indische Pflanze nach A. v. Humboldt keinen alten Sanskritnamen.

Wir fühlen uns freudig angeregt an einem sonnens hellen Frühlingstag; Unlust und Verstimmung bemächtigt sich unser, wenn im Herbst ein kalter Regenschauer durch die dürrn Blätter bricht. Keiner wohl wird sich des kühnen Schwunges rühmen, zu welchem ihn der erstere mit all seiner Pracht erhebt, und Keiner, selbst der Mächtigste nicht, vermag sich zu hüten vor der trüben Stimmung, zu der eine mit Feuchtigkeit beladene Atmosphäre ihn veranlaßt.

Wir Alle fühlen uns wie von unsichtbaren Banden gefesselt.

Fretlich der vermessene Wahn des Einzelnen straubt sich gegen das Erkenntniß einer Abhängigkeit seines Ichs von der ihn umgebenden Natur. Selbst ihr Kind, glaubt er, daß kein Einbruch so mächtig sei, um eine dauernde Wirkung auf ihn hinterlassen zu können.

Doch die Erfahrung lehrt uns gerade in Bezug auf

das Klima das Gegentheil. Sie lehrt uns, daß der Mensch stets in irgend einem Grade seinem Einfluß unterliegt. Verdunkelung und Modifizirung des Tageslichtes, Wolkengefall und Himmelsbläue haben ihren Antheil daran, so gut wie Wärme und Feuchtigkeit.

„Wie mächtig“, um A. v. Humboldt's schöne Worte hier einzuschalten, „hat nicht der gleichliche Himmel auf seine Bewohner gewirkt! Wie sind nicht in dem schönen und glücklichen Erdtheile zwischen dem Euphrat, dem Nilus und dem ägäischen Meere die sich ansiedelnden Völker früh zu sittlicher Anmuth und zarteren Gefühlen erwacht!“ Und haben nicht, als Europa in neue Barbarei versank und religiöse Begeisterung plötzlich den heiligen Orient öffnete, unsere Voreltern aus jenen milden Thälern von Neuem mildere Sitten heimgebracht? Und hat nicht der Dichter des Mignonliedes in unachabmlicher Weise die Charaktereigenthümlichkeiten südllicher Völker aus dem Licht- und Farbenverhältniß ihrer Landesnatur herzuleiten gesucht? — Auch in der Neuen Welt wird der Mensch Veränderungen unterliegen, und da sein Wesen unter gleichen Verhältnissen sich ewig gleich bleibt, so werden wir auf diesem Continente die Ideen und Sitten der Alten Welt, wenn auch in mehr oder minder hohem Grade modificirt, wiederkehren sehen.

Wenn auch nicht zu hoffen ist, daß der pittoreske Orientale auf der sandigen Wüste Utah's wiedererscheine, und seine Zaubersagen noch einmal ausleben, oder Liebesgesänge eines modernen Hafis in Sonora und Neu-Mexiko wieder ertönen, so ist doch zu erwarten, daß in Oregon ein Geschlecht erstehe, das, unerfährig und frei, bereinigt dem Brudervolke jenseits des Oceans die Hand reichen möge.

## Vom Monterosa zum Montblanc.

Von Otto Ulr.

4. Bernall.

Es war 6 Uhr Abends vorüber, als ich am 22. August vor. Jahres in oder vielmehr vor Bispach anlangte. Denn in die Stadt selbst zu gelangen, war ohne erhebliche Schwierigkeiten nicht möglich, da in Folge der vorangegangenen Wasserverheerungen jede Verbindung mit ihr abgeschnitten war. Das Bett der Alpe, die hier an sich schon weit größere Wassermassen in die Rhone ergießt, als diese selbst führt, liegt 13 Fuß höher als ein Theil des Städtchens, und man hat deshalb Dämme aufgeworfen, um den Verheerungen dieses oft furchtbar angeschwollenen Baches Einhalt zu thun. Diese Dämme aber waren durch die Fluth, welche 8 Tage vorher Wellenbrüche in den oberen Theilen des Thales veranlaßt hatten, durchbrochen worden, und so hatte sich die ganze Wassermasse über die unglückliche Stadt ergossen. Der Anblick

war ein entsetzlicher. 11 Häuser waren gänzlich zerstört; nur einzelne Mauerreste zeigten noch die Stelle, wo sie gestanden hatten. In dem Gasthose diesseits der Alpe, den ich noch erreichen konnte, waren die unteren Räume zur halben Höhe mit Schlamm erfüllt, und in der Haustür hatten die Furchen einen Wagen so tief in den Boden versenkt, daß nur die Deichsel und ein Theil der Vorderäder hervorragten. In der Nähe erblickte man ein Haus, von dem die eine Hälfte ganz weggerissen war, während auf der andern Seite ein Bollwerk von Trümmern, Balken, Baumzweigen und Steinen aufgethürmt war. In diesem Hause hatte eine Familie während der Katastrophe eine schreckliche Nacht verleben, bis es den ermüdeten Anstrengungen des Pfarrers und einiger andern modernen Männer auf Stundenmelten Umwegen gelun-

gen war, heranzukommen und ihre Rettung zu bewirken. Alle Brücken waren verschwunden, und erst jetzt war es möglich geworden, große Baumstämme herbeizuschaffen und in den reißenden Strom zu legen, um eine stellenweise bedenkliche Verbindung zwischen beiden Ufern herzustellen. Ueber diesen gefährlichen Steg wurden auch Fremde, die etwa von der Simplonstrasse kamen und durchaus nicht umkehren wollten, von kräftigen Burschen getragen. Auch ich hätte mich zu dieser Passage entschließen müssen, wenn ich den gewöhnlichen Weg in das Vispethal hinauf einschlagen wollte, da dieser 1½ Stunde weit

Indes auf Gebirgswanderungen muß man sich durch solche Verlegenheiten nicht stören lassen. Irgendwo mußte doch der Pfad seine Fortsetzung haben, und es galt nur diese zu entdecken. Da bemerkte ich unten auf einer Sandbank im Flusse menschliche Fußspuren. Sofort kletterte ich über das Geröll zum Wasser hinab und fand in der That die Fußspuren längs der Felswand fortlaufen bis zu einer Stelle, wo in das Wasser gelegte Steine zum Durchwaten an's Ufer aufforderten. Hier war in der That wieder ein schmaler Pfad sichtbar, der die Fortsetzung des vorhin abgebrochenen bildete.



Der Kontrolleur von Gressoney auf gesehen.

bis zur Neubrück auf dem jenseitigen Ufer der Visp fortführt. Ich zog es indes vor, dem Rathe meines freundlichen Wirthes zu folgen und einen wenig betretenen Fußpfad einzuschlagen, der dieselbe, also auf dem linken Ufer der Visp in das Thal hinaufführte. Die Dämmerung war bereits eingetreten, als ich meine Wanderung begann. Der Pfad war schmal und tief, oft kaum sichtbar, etwa 100 Fuß über der rauschenden Visp an der steilen Bergwand hin. Nach Dreiviertelstunden hörte er plötzlich an einer Mauer gewaltiger Felsblöcke auf. Meine Lage war keine besonders angenehme. Umzukehren und in der Dunkelheit den erst mühsam überstandenen Weg rückwärts zu suchen, war wenig lochend. Aber wie war diese Mauer zu überwinden, die bis zum rauschenden Fluß hinabstieß!

Glücklich gelangte ich bei Neubrück auf die Straße, die von hier an der dünnen Felswand, die nur die und da für terrassenförmige Weinberge nutzbar gemacht wurde, nach Stalben, dem Sammelpunkt der meisten nach Zermatt wallenden Touristen, führte. Dunkle Nacht war es, als ich den schmalen, in die Glimmerschleiferselsen eingehauenen Weg zur Kirche des Dorfes hinaufstieg und endlich das einsame, aber überaus gastliche Wirthshaus „Zur Traube“ erreichte, das stellenweise selten Raum für alle einklebenden Gäste bietet und so auch mich bei dem Pfarrer des Dorfes ausmieten mußte. Stalben ist ein ächtes Gebirgsdorf, das sich an einem Bergvorsprunge gerade dem Zusammenfluß der beiden Visps, der Saaser und der Gornner Visp, gegenüber stellt hinanzieht. Fuhrwerk irgend welcher Art sieht

man in seinen Gassen nicht, die oft geradezu die Gestalt steiniger Treppen annehmen. Aber die Lage des Dorfes ist wundervoll; fast ganz zwischen Weinbergen und Obstgärten versteckt und von mächtigen Nußbäumen überschattet, läßt es die Nähe der Eis- und Schneewelt, zu der es die Pforte bildet, kaum ahnen.

Auf schönem, nur anfangs steil ansteigendem Wege, setzte ich meine Wanderung das Nicolaital aufwärts fort. Ueber den Abhängen zur Rechten schaute aus der Höhe die Kirche von Emb herab, dessen Häuser auf einer so abschüssigen Matte liegen, daß der Volksmund im Thale scherzend behauptet, selbst die Häuser von Emb müßten mit Eisen beschlagen werden, um sich auf der steilen Matte zu halten. Im Hintergrunde leuchtet der Schneegipfel des Brunckhorns. Bald auf dem rechten, bald auf dem linken Ufer der Wisp, deren Brücken fast sämmtlich durch die Fluthen der vorigen Woche zerstört waren, führt der Weg immer höher hinauf, und immer wilder gestaltet sich die Landschaft. Wasserfälle draussen von den Abhängen nieder, und einem gefornen Wasserfall gleich hängt zur Rechten der steile Wiegletscher drohend vom Weisshorn herab, während zur Linken hoch oben an den Felswänden des Grabenhorns, der höchsten der Misthabelspitzen, der Grabengletscher leuchtet. Der überraschendste Anblick aber erwartet den Wanderer hinter dem Dorfe Tschä, wenn man die Brücke überschreitet, unter welcher tief unten im engen Felsenklunde die Wisp sich schäumend hinwälzt. Ein Berggücken schien hier noch so eben das Thal zu verschließen. Da öffnet sich plötzlich der Hintergrund, und fast erschreckend tritt rechts aus den Bergen, hoch über Eiskelder aufragend, die gewaltige Felspyramide des Matterhorns oder Monte Cervin hervor. Unten im Thale selbst winkt das freundliche Jermatt, auf grüner Matte gelegen und von fichtenbewachsenen Hügeln umgeben, über welche rings starke Gletscher herabschauen und solche Schneegipfel den Horizont begrenzen.

Den meisten Touristen mag der Aufenthalt in dem engen Thale zwischen den himmelhohen Bergen und in der unmittelbaren Nähe der Gletscher, die sich zur Thalsoble herabsenken, wenig behaglich erscheinen. Wenn man freilich Interlaken mit seinen blaugrünen See'n, seinen Nußbaumalleen und seinen äppigen Gärten und Wiesen dagegen hält, dann ist Jermatt in einer Meereshöhe von 5000 par. F. eine Einöde voll düstern Erstes. Jedem aber geht das Herz auf, wenn er den 2500 F. über das Thal sich erhebenden Niffelberg erstiegen hat, oder wenn er vollends die Mühe nicht scheut hat, noch 2000 F. höher hinauf zu dem nackten, trümmerteckten Felskamm des Gornegrats zu wandern. Da im Anblick all dieser riesigen Berggipfel, dieser unaussprechlichen Felsenfelder und Gletscher wird man von Gefühlen übermältigt, die gemischt sind aus der stolzen Empfindung des Siegers, der nach mühevoller Kampfe seine Fahne auf der eroberten

Festung aufpflanzt, und der bescheidenen Demuth, die sich anbetend beugt vor der Majestät der Natur. Solch ein Anblick geböt zu den großartigsten Genüssen des Lebens. Tief zu unsern Füßen windet sich der gewaltige Gornegletscher vom Weisshorn her, zahlreiche kleine Gletscher in sich aufnehmend, um den Niffelberg herum, bis zu dem gähnenden Gletscherthor, aus dem dort unten die Wisp hervorbricht. Hier gegen Nordosten hin schweift der Blick über den grünen Spalt des Wispthales in weite Ferne bis zu den Schneehäuptern der Berner Alpen, die durch das schöne Wiegletscher und die Blümthalp uns einen Gruß zusenden. Rings umgibt uns ein strahlender Felskreislauf der Walliser Alpen. Dort neben den Berner Gipseln erheben sich zur Rechten die gewaltigen Misthabelhörner, während zur Linken das Brunckhorn und die stolze Pyramide des Weisshorns in die Lüfte ragen. Weiter gegen Norden folgen das Rothhorn und das Trift- und Gabelhorn, von dem der Triftgletscher in das Thal hinabhängt, und neben dem tiefen Steinbockhorn erscheint, Alles beherrschend, einem stolzen Peller gleich über den Schneefels dem aufragend, der Felsgahn des Matterhorns. Da, wo zur Linken dieser Scherckensgestalt der Zuckengletscher und die beiden Theodulgletscher herabsinken, führt der Throdbüpf über die Schneefelsen hinüber in das romantische Thal von Tournanche und zu den warmen Gefilden Italiens. Weiter gegen Westen flarrt ein zweriges Abbild jenes mächtigen Matterhorns, das kleine Matterhorn oder der petit Mont-Cervin, des Jodherörnli, wie es die Walliser nennen, aus dem Elfe empor. Dann folgt der prachtvolle, schön geschwungene Rücken des Breitthorns in blendendem Schneegewande und die beiden runden fienbedeckten Kuppen der Zwillinge. Immer massenhafter dehnt sich die gewaltige Gebirgsmauer aus, immer enbloser werden die Schneefelder gegen Süden hin, wo der Lokkamm sich erhebt, und ein weites Finimmer seine halbentblößten Felswände mit dem König der Walliser Berge, dem Monte Rosa, verbindet, an dessen Fuß zur Linken an der Elma de Tazi hin der beschwerliche Weisthorpf nach Italien hinabführt. So großartig und übermächtig das ganze Panorama von diesem hohen Standpunkte ist, so mag dennoch Mancher sich enttäuscht fühlen, wenn er, die Gedanken erfüllt von der Pracht und Herrlichkeit des höchsten Berges der Schweizer Alpen, seinen Blick dem Monte Rosa zuwendet. Es sind freilich die höchsten Gipfel selbst, die man hier erblickt, das Nordend und die höchste Spitze, und untrennbar ist das Schneegewand, das sie vom Fuß bis zum Scheitel bekleidet. Aber das Fußgefälle, von dem sie sich erheben, ist zu gemaltig; sind es doch 12—13,000 F. hohe Felsenplateaus, die sie zu beiden Seiten umgeben! Man muß in der That den Monte Rosa von Süden her, am besten von dem Thale von Gressoney aus betrachten, wie ihn die beistehende Abbildung zeigt, wenn man ihn in seiner vollen Schönheit kennen lernen will. Dort treten die Vorberge

bescheiden genug zurück, um der Majestät des Kiesen über ungeschwächte Wirkung zu lassen, und verbeden doch wieder hinreichend die schauerlichen, schroffen Wände, in denen der Monte Rosa gegen den Kessel von Macugnaga abflürzt, und die der Landschaft etwas Raubes und Starres verleihen.

Wenn man auf dem Scheitel des Gornergrats steht, begreift man es kaum, daß dieser Berg so lange für unerreichbar gelten konnte, und daß seine Besteigung noch heute mit so vielen Mühen und selbst Gefahren verbunden sein soll. So greifbar nahe erscheinen ja seine Gipfel, in so anmuthigen, sanften Linien ziehen sich die Schneefelder zu ihnen hinan! In der That gelangt man nirgends in den Alpen mit so geringen Anstrengungen in solche Höhen wie hier; denn selbst die 13,240 Fuß hohe Cima de Jazi kann gefahrlos von jedem Touristen von hier aus erreicht werden. Aber mit den Gipfeln des Monte Rosa selbst verhält es sich doch anders; die blendende Schneedecke ist nicht, wie es dem Auge scheint, eine ununterbrochene und verdeckt dem Fernsehenden manchen Abgrund und manche bedenkliche Steilwand.

Der Monte Rosa erhebt sich in neun Gipfeln, von denen die vier nördlichen und höchsten sich in einem Halbkreis um das Anzaacathal gruppieren, während die fünf südlichen in gerader südlicher Richtung sich anschließen und gleichsam den Stengel der Rose bilden, wenn man, durch den Namen verleitet, jenen Halbkreis mit einer Rose vergleicht. In Wahrheit hat freilich der Berg von dieser Gestalt seinen Namen nicht erhalten, der wohl eher von dem keltischen Worte *ros*, welches ein Vorgebirge bedeutet, abzuweisen sein möchte. Der südlichste der Monte Rosa-Gipfel, die in fast senkrechter Felswand 6000 F. gegen das Thal von Valagna abflügende Vincentpyramide, ist zuerst unter allen Gipfeln vom Vincent und Zumstein aus Gressoney im J. 1819 erstiegen worden. Auch die

andern südlichen Gipfel, besonders die Zumsteinspize, wurde wiederholt von Süden her bestiegen. Aber den nördlichen Gipfeln, namentlich der höchsten Spitze, ist von der Südseite nicht beizukommen, da eine furchtbare Schlucht sie von der nächstliegenden Zumsteinspize trennt. Versuche, diese höchste Spitze von Norden, von dem Riffelsberge her zu besteigen, begannen mit dem Jahre 1847. Diese „höchste Spitze“ ist aber keineswegs eine Spitze, wie sie von unten gesehen erscheint, sondern ein kammartiges Gebirge, das sich von Osten gegen Westen in gleitlicher Ausdehnung hinzieht und durch einen Sattel, der in fast rechtem Winkel abbiegt, mit dem Nordend verbunden ist. Dieser Kamm endet in zwei Kuppen, von denen die westliche etwa 22 Fuß höher als die östliche ist. Der Eisgrat, der beide Kuppen verbindet, ist kaum 1 Fuß breit und stürzt im Osten gegen Macugnaga gegen 8000 Fuß senkrecht ab. Gegen Westen senkt er sich in mehreren Abstufungen gegen den Gornerhornletscher hin, im Süden rückt er wieder mehrere Tausend Fuß fast senkrecht zum Monte Rosa-Gletscher ab, der die höchste Spitze mit dem Eiskamm verbindet, und gegen Norden findet sich der erwähnte Sattel, über dem er sich etwa 400 Fuß hoch in einer Neigung von 60–70° erhebt. Die Felsen sind glatt und vereist; nirgends bieten sie Anhaltspunkte, nirgends Ruhepunkte für das Auge, das immer in die Tiefe des Abgrundes blickt. Ueber diesen Eisgrat war es nicht möglich die westliche höchste Kuppe zu erreichen, während die östliche mehrmals erstiegen wurde. Erst im J. 1855 gelang es 3 Engländern, den Gebirgsrücken Smith, über die Abstufungen, die sich vom Gornerhornletscher zum Kamm der höchsten Spitze hinaufziehen, auch diese westliche Kuppe zu erreichen. Seitdem ist die Besteigung alljährlich wiederholt worden, und seit 10 oder 12 Jahren finden wohl 8 Monte Rosa-Besteigungen jährlich statt, so daß diese zu den minder gefahrvollen Unternehmungen in den Hochalpen gerechnet werden.

## Ein Kiebling der Feinschmecker.

Von Georg Siller.

Zweiter Artikel.

Nachdem wir diese allgemeinen Bemerkungen vorausgeschickt, wollen wir nun specieller auf unsere unterirdischen Pilz, die Trüffel, eingehen.

Man unterscheidet hauptsächlich eine schwarze, eine graue und eine weiße Trüffel. Die schwarze Trüffel (*Tuber cibarium*), auch gemeine essbare Trüffel, Schweinetrüffel, Erdmorchel genannt, hat eine mehr oder weniger kugelige, oder eis-, oder auch nierenförmige Gestalt und wird gewöhnlich von der Größe einer Walnuß bis zu der eines Apfels, oft auch noch größer gefunden. Die harte Oberfläche ist mit vielen kleinen

Wargen besetzt und hat, wie schon der Name anzeigt, eine schwärzliche Farbe; das Fleisch ist weißlich und mit vielen braunen, grauen, blauen und röthlichen Adern durchzogen; — je weniger Adern vorhanden, desto lieberlicher soll das Fleisch schmecken. Die schwarze Trüffel gibt einen moschusähnlichen, im Alter jedoch unangenehmen, fauligen Geruch von sich und erlangt ihre Reife im Herbst, der daher die beste Zeit zum Einsammeln ist, da sie dann am schmackhaftesten. Man findet sie 1 bis 12 Zoll tief, einzeln oder auch in Haufen von 3 bis 7 Stück unter der Erde, manchmal aber auch an der Oberfläche

des Bodens, was namentlich nach einem warmen Regen der Fall ist. Sie ist namentlich im mittleren und südlicheren Deutschland, im Süden und Osten von Frankreich, in Spanien, Italien und Böhmen zu Hause und wächst am liebsten in lockern, sandigem, etwas feuchtem Waldboden, in Waldblößen, welche mit wenig Gestrüpp bewachsen sind, auch unter Heibuchen und Laubbäumen. Am besten gedeiht sie in nicht zu dichten Eichen- und Kastanienwäldern, in welchen sie den feinsten Wohlgeschmack und oft eine Schwere von  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Pfund erreicht.

Die graue Trüffel (Tuber griseum) wird ebenso geschätzt, wie die schwarze, und vorzüglich als Gewürz gebraucht. Sie erreicht bei einer ziemlich runden Gestalt die Größe einer tüchtigen Nuß, wächst am liebsten in sandigem Boden und erlangt ihre Reife im Herbst. Die Oberfläche hat keine Erhöhungen, wie die des schwarzen Trüffels, sondern ist glatt und grau, während die Farbe des fleischartigen, stark nach Knoblauch riechenden Fleisches schon mehr ins Röthliche spielt.

Die weiße Trüffel (Tuber album) wird, wie die schwarze und graue, zur Speise gesucht, ist aber weniger geschätzt als diese. Sie hat die Größe und Gestalt einer Kartoffel und wächst besonders in lehmigem Boden in Nadelholzwäldern, wo man sie 3 bis 6 Zoll tief unter der Erde findet. Die Oberfläche hat unregelmäßige Vertiefungen und eine weißgelbe, oft auch bräunliche Farbe, und das Fleisch ist mit wasserhellen Adern durchzogen.

Im Königreich Neapel fand man unter Anderen eine Trüffel von der Größe des Kopfes eines sechs- bis achtjährigen Kindes.

Da dieser Pilz nur unter der Erde wächst und lebt, so ist es gewiß nicht leicht, denselben aufzufinden; doch der Mensch hat diese schwierige Aufgabe sehr geschickt zu lösen verstanden. Was sollte sich auch seinem Entdeckungsgeliste verbergen können? Einmal zieht er es doch an das Licht hervor, sei es nun nach längerer oder kürzerer Zeit. Man glaubte zuerst die Trüffeln nach bestimmten Zeichen auffinden zu können; doch bald sah man ein, daß dieselben nicht immer zuverlässig waren oder doch nur von den Sachverständigen gebreut werden konnten. Ein solches Merkmal fand z. B. die Erhöhungen und Risse der Erde und der dumpfe Ton, den dieselbe vom sich gibt, wenn man mit einem Stöcke auf sie schlägt. Der eigenthümliche Geruch, den die Trüffeln von sich geben, ist ein zweites, aber noch weit schwereres Zeichen, da der Mensch nicht empfänglich für denselben ist. Desto mehr sind es aber wohl Hausthiere — der Hund und das Schwein, — und diesen Umstand hat denn der Mensch sofort, wie er bei ähnlichen Gelegenheiten ja immer thut, zu seinem Vortheile ausgenutzt.

Da das Schwein die Trüffeln von selbst begierig aufsucht, so führt man es, nachdem man ihm einen Ring oder Klemm um den Rüssel gelegt, damit es den Schwamm nicht fressen kann, auf Plätze, wo man glaubt oder weiß, daß Trüffeln stecken, und sobald man bemerkt, daß es den Boden aufwühlt, jagt man dasselbe der Selte und nimmt den Pilz heraus. Da dies Thier jedoch zu unlenksam ist, oft auch nach andern Gegenständen nühlt, so hat man zu dieser „Trüffeljagd“ Hunde abgerichtet. Man schneidet die Trüffeln ganz klein und thut sie unter

das Futter des Hundes, und nach kurzer Zeit gewöhnt er sich daran, den Schwamm, den er von Haus aus nicht liebt, zu fressen. Dann läßt man ihn einige solche Futter unter der Erde aufsuchen, und bald kann man ihn zum Trüffelsuchen denken. Man läßt ihn wohl auch bei der Abrichtung hungern und gibt ihm dann Brod mit Trüffeln, wodurch er sie auch fressen lernt und sich, was die Hauptsache ist, den Geruch derselben merkt. Dann führt man ihn hungrig hinaus und läßt ihn Brod und Trüffeln, welche man unter der Erde verstreut hat, aufsuchen, und wenn er darin eine ziemliche Fertigkeit erlangt hat, bringt man ihn auf Trüffelläger, wo er durch Kraben bald die Stelle bezeichnen wird, wo die gesuchten Schwämme verborgen sind.

Will man die Trüffel aufbewahren, so ist das Einfachste, sie zu trocknen. Zu diesem Zwecke werden sie geschält, dann in Scheiben geschnitten, auf Fäden wie ein Rosenkranz an einander gereiht und an die frische Luft gehängt, worauf man sie an einem trocknen Orte aufbewahrt und des Sommers einige Male umschüttelt, damit sich kein Schimmel bildet. Man kann sie auch in Backöfen trocknen, doch stehen diese den an der Luft gehangenen an Werth nach. Im Sand oder getrocknetem und pulverisirtem Thon halten sie sich auch gut, am besten aber in derselben Erde, in welcher sie gewachsen sind; nur muß man dieser die Feuchtigkeit entziehen, da sie sonst leicht faulen. Man legt sie auch in Del, Essig, Salzwasser oder Wein, oder man pulverisirt und gebraucht sie als Gewürz; am besten jedoch sind sie frisch. Was nun die Zubereitung betrifft, so muß man wirklich Rauen, auf welche verschiedene Bereitungsarten der Essenzgeist der Küche gekommen ist. Nichts hat er unversucht gelassen, wodurch dem Menschen ein Genuß gestattet werden könnte. Man hat Trüffeln in Asche gebraten (truffes à la inache), Trüffeln nach italienischer Art (truffes à l'italienne), Trüffelpastete (truffes en pâte), Trüffeln à la périgord (truffes à la périgord), Trüffeln in Weinbampf gekocht (truffes à la vapeur de vin), und wie diese Arten alle heißen mögen. Am meisten werden die von Perigord und Angoumois geschätzt. Am einfachsten braten man sie in Papier, das man mit Del getränkt, in heißer Asche und ist sie dann ohne jede fernere Zubereitung. Einige schneiden sie in Scheiben und braten sie in Butter, Andere füllen Geflügel damit, und noch Andere gewinnen eine Art Trüffelsauce daraus (sromage à la truffe). Indem sie den Schwamm in Milch legen und so das Gerinnen derselben beschleunigen.

Wie so viele Handelsartikel, so ist auch die Trüffel oft dem traurigen Schicksal unterworfen, nicht in reinem Zustande, sondern verfälscht zu uns zu kommen, und zwar wird sie mit dem gemeinen Hartdovsig (Scleroderma vulgare) verfälscht, dessen Genuß höchst schädlich ist. Um sich vor Betrug zu wahren, muß man hauptsächlich auf die marmorirte Farbe des Fleisches achten.

Man hat auch versucht, künstliche Trüffelpilze anzulegen, und die Resultate sind im Ganzen auch recht befriedigend gewesen, so daß man die Versuche gewiß wiederholen wird, und wir vielleicht noch die Freude erleben, daß die Trüffel allgemeiner und dabei auch billiger werde.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

N<sup>o</sup> 37.

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

15. September 1869.

Inhalt: Am hundertsten Geburtstage Alexander von Humboldt's. — Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 5. Die artistischen Stiegen. — Die Befruchtung der Blüten unter Vermittelung der Insekten, von Ludwig Glaeser. — Literarische Anzeige. Literaturbericht. — Humboldt-Verein für Volksbildung.

## Am hundertsten Geburtstage Alexander von Humboldt's

den 14. September 1869.

Hundert Jahre sind seit jenem 14. September 1769 verfloßen, an welchem Alexander von Humboldt das Licht der Welt erblickte. Welch einen Fortschritt im Geistesleben der Menschheit umfaßt dieser Zeitraum! Für diesen Fortschritt hat aber keiner mächtiger gewirkt, als Humboldt, den man als die Denks- und Ruhmesäule der geistigen Siege dieses Jahrhunderts bezeichnen möchte.

Wer hätte es vor hundert Jahren gedacht, daß aus dem Herzen der Mark, der „Sandbüche des heiligen römischen Reiches“, der größte Kenner der Natur, der Begründer des Kosmos hervorgehen werde, daß man den Sohn eines preussischen Kammerherrn und märkischen Edelmannes einst als den Stolz deutscher Gelehrten, als den größten Denker und Forscher des Jahrhunderts feiern werde, daß der Sohn eines Kriegeshelden des siebenjährigen Krieges einst ausleben werde, die „neue Welt“ der Wissenschaft zu er-

obern! Aber nicht den berühmten Gelehrten, nicht den glücklichen wissenschaftlichen Entdecker allein feiern wir und mit uns alle gebildeten Völker der Erde heute in ihm. So Großes er auch für die Wissenschaft gethan, ein so erhabenes Beispiel er uns auch durch jene grenzenlose Hingebung gegeben, mit der er sein ganzes äußeres und inneres Dasein, Vermögen, Familienglück, Wohlleben, ehrenvolle Laufbahn, Gesundheit und Leben den idealen Zwecken der Wissenschaft opferte, so wenig erblickt gerade wir Deutsche es vergessen wollen, daß die hohe Geltung, die er der deutschen Wissenschaft im Auslande verschaffte, den Aufschwung des deutschen Nationalgefühls vorbereiten half, der uns jetzt mit solchem Stolz erfüllt; sein höchstes Verdienst liegt doch nicht in dem, was er für die Wissenschaft, sondern was er durch die Wissenschaft für die allgemeine Befreiung des Volkes that. Man hat es wie eine



wunderbare Erscheinung angestaunt, daß der 90jährige Humboldt kein Fremder in der Gedankenwelt unserer Tage geworden war, daß der müde Greis am Rande des Grabes noch zu schaffen vermochte mit jugendlicher Kraft. Das Wunderbare schwindet, wenn wir erwägen, daß die Welt, die ihn als Greis umgab, durch ihn erst ihr Gepräge erhalten hatte, daß die Welt um ihn erst durch ihn zu seiner Jugendschauung sich entwickelt hatte. Was in seiner Jugendzeit nur vereinzelt in ihm gelebt hatte, das lebte jetzt im ganzen Volke, nicht in der Wissenschaft allein, sondern in der ganzen Bildung unserer Zeit. Kein Deutscher, kein Gebildeter irgend einer Nation lebt, der es zu leugnen wagte, daß er ihm einen Theil seiner Bildung, insbesondere seiner Weltanschauung danke. Daß wir im Einzelnen nicht mehr zu bezeichnen vermögen, was wir ihm danken, das ist der glänzendste Beweis seines gewaltigen Einflusses. Die Wissenschaft ist in die Bildung übergeossen, hat das ganze geistige Leben des Volkes überfluthet. Humboldt hat die Schranke durchbrochen, die Jahrhunderte

lang den Mann der Wissenschaft vom Volke trennte, indem er die Naturwissenschaft zu einer Gesamtwissenschaft erhob, die den Wurm im Staube, wie die Welten des Himmels umfaßt, deren Gesetze das stille Treiben der Kräfte in der Pflanzengelle, wie das Werden und Vergehen der Völker in der Geschichte regeln. Die Naturwissenschaft in den Mittelpunkt der Volksbildung gestellt, sie zur Volkswissenschaft erhoben und von ihr aus die geistige Belebung und Erhebung der Volksmassen angeregt zu haben, das ist sein größtes Verdienst. Des Freiheitsgefühles, das er selbst sein theuerstes und unentzehlbares Gut nannte, durch seine Wissenschaft auch das Volk theilhaftig zu machen, das war sein edelstes Ziel.

Dessen wollen wir an dem Tage gedenken, der seinem Gedächtniß geweiht ist. Seine Stelle im Leben ist leer; sorgen wir dafür, daß sie in seinem Geiste ausgefüllt werde durch ein freies, durch Bildung frei gewordenes Volk!

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 5. Die arktischen Steppen.

Schon Lappland gewährt eine hinreichende Vorstellung von den offenen Flächen, die, ohne Baum und ohne aufrechte Sträucher, so recht das Wahrzeichen des Polarlandes sind. Wenn man von Helsingfors im nordwestlichen Lappland, d. h. von 69° 58' n. Br. und 21° 4' 15" ö. L. am Eismeer, dem Bottenischen Meerbusen im Süden, d. h. dem Polarkreise bei Torned, auf einem der Wege zukehrt, die Leopold v. Buch oder auch die Herren Martins und Bravais ihrer Zeit einschlugen, so erreicht man am nächsten Tage an den Gehängen des Kjölen die letzten Flecken der 766 par. F. Bei 1169 F. löst die Birke ihren Walverband auf, bringt nur vereinzelt im verkrüppelten Zustande aufwärts und verschwindet gänzlich bei 1330 F. Erst, nachdem man das nördlichste Kettenglied des Kjölen bei 1718 F. überschritten, beginnt sie 74 F. tiefer am Südhänge, d. h. schon bei 1644 F., verkrüppelt selbst in geschützter Lage, wieder aufzutreten. Bei 1302 F. verbündet sie sich in dem Thale des Karajodi, einem Seitenthale des Aitenelf, mit Weiden über einem freundlichen grünen Graslande, das nichtbedeutend weniger doch selbst im Sommer nicht gänzlich schneefrei wird. Sowie man sie aber hier zurückläßt, um nun den Nordabhang einer zweiten Bergkette zu übersteigen, hat man bei 1847 Fuß die erste Stufe des Bergmassivs, d. h. ein Plateau erreicht, welches man unter dem Namen Nappivara kennt. Damit sind wir auf eine jener offenen Flächen des Polarlandes getreten. Nicht, schreibt Martins in seiner Reise durch Lappland, vermag eine Vorstellung von

dem eben und doch großartigen Anblick dieser Hochebene zu geben. Die breiten, wellenförmigen Erhebungen wechseln auf unabsehbare Strecken in derselben Art. Eiten unterbricht ein scharf geformter Fels auf Augenblicke die Einförmigkeit der Landschaft. Naht liegt er das nur hier und da verbergen sich verkrüppelte Zwergbirken und andere noch zwergigere Pflanzen (Krabbenbete, *Lychnis alpina*, *Cassiope*, *Poa alpina*) in den Bodensenken, wo sie gegen die eifigen Winde geschützt sind, die frei auf den entblästen Flächen ihr Unwesen treiben. In den größeren Bodensenken schlummern einsame See'n, kleiner oder von außerordentlichem Umfang. Doch weder die einen noch die andern tragen zur Belebung der Hochfläche bei: kein Baum, kein Kraut babet seine Wurzeln in dem gelblichen Wasser, kein Weidhügel reicht an ihren naekten Ufern, kein Vogel bestreicht ihre Oberfläche, — denn es ist eben schon September, in welcher Jahreszeit allein eine Reise durch das sonst so morastige Land gemagt werden kann, — nur ihre Tiefen sind von zahlreichen Fischen belebt, zu deren Fänge die Lappen im Herbst kommen. Während des Sommers steigen Myriaden von Schnaken aus diesen See'n auf und verbleten dem Reisenden jede Wanderung über diese Hochfläche. Im Winter erstarrt Alles, 8 Monate lang verschwinden Erde und Wasser unter einer Decke von Schnee. Einsam und verlassen fühlt sich der Reisende, denn Nichts um ihn her lebt in dieser entseßlichen Dede. Immer im Mittelpunkte einer Landschaft, die sich nie verändert, immer in derselben Richtung die Schnee-

kuppen der fernen im Westen sich verlierenden Lengen: Kette vor sich, möchte er fast glauben, daß er immer still stehe oder sich unaufhörlich in einem magischen Kreise drehe. Nur der Wappus (lappische Führer) betritt ohne Zaubern, ohne sich zu irren, in gleichmäßigem Schritte Torfmoore und Abhänge, den langen Wanderstab auf seiner Schulter haltend. Ein einfaches Renthier, mehr noch Laufende von Lemmingen (*Mus lemmings*), die, von dem Getrappel der Pferde aufgeschreckt, hin und wieder laufen, — diese allein bringen einige Abwechselung in die Eintönigkeit des Marsches. Sie allein vermögen noch auf den trockensten und dürrsten Stellen, ja hier am meisten zu leben, wo das Pferd keine Spur von Weid, der Mensch keinen Punkt antreffen würde, um ein Feuer anzujünden.

Ein solcher Punkt erscheint erst unterhalb des östlichen Ufers des Lärö-Sees bei 1878 Fuß. Hier tauchen die ersten Weiden (*Salix Lapponum*), mit dem gemeinen Wachholder bunt durcheinander wachsend, die ersten, wenn auch sumpfigen Grasplätze auf; um so mehr eine freundliche Erscheinung, als die Weiden an den Ufern eines vorüberströmenden Flusses eine Höhe bis zu 2 Metern erreichen. Erst in weiterer Entfernung leidet an ähnlichen Flußufern dasselbe Pflanzenbild wieder; denn jene Weide liebt es, an den Ufern der Gebirgshüfte aufwärts zu steigen, weil, wo Wasser strömt, auch die Luft eine wärmere ist. Je nach dieser Wärme und je nach der Lage erreicht sie bei 1635 F. eine Höhe von 3 Metern. Ähnliche Verhältnisse bewirken auch, daß sich endlich einmal wieder die Birke an südlich geneigten Abhängen der Hochflächen einstellt, je weiter südlich wir wandern. Dies ergibt sich, sonderbar genug, bei einer Erhebung von 1468 F. auf einem freien Plateau, wo Birken freilich nur verkrüppelt kaum 1 Meter Höhe erlangen. Doch nehmen sie rasch an Höhe zu, je mehr man gegen Süden herabsteigt. Schon eine Stunde weiter von diesem Punkte, 1376 F. hoch, erreichen sie eine Größe von 5 Metern, und augenblicklich taucht hier die erste Eberesche auf. Noch weiter südlich stellt die Birke unter dem dünnen Plateau des Alla Alpja auch ihren Waldbestand wieder her; obgleich sie sich in einer Höhe von 1478 F. befindet, Zwergbirken, Krähenbeere und lappische Weide die Fläche bedecken, erlangen sie doch schon eine Höhe von 2 bis 3 Metern. In Kautokelno endlich (69° 0' 34" und 20° 50' 51" ö. L.) erscheint sie einzeln auch als stattlicher Baum, der sich ebenfalls hier bei 986 Fuß Erhebung selbst mit Kiefern verbündete, deren Verschwinden der Mensch verschuldet. Helvelbergesträup (*Vaccinium Myrtillus*, *Vitis Idaea*, *uliginosa*, *Arctostaphylos uva ursi*, *alpina*) taucht üppig auf; zu rissigen Formen erheben sich einzelne Gräser (*Festuca ovina*, *Aira flexuosa*): wir befinden uns in einer lappischen Dase, welche sofort zu einer größeren Ansiedlung Gelegenheit gab und Kautokelno zum Mittelpunkt

des norwegischen Lappland machte. Inmitten großer Weiden liegen die Wohnungen der Finnen und Lappen über die Felse gestreut.

Daß sie wirklich nur eine solche ist, erweist sich so gleich, wenn man nach Kalanito aufbricht. Auch hier zeichnet sich die Bodenoberfläche durch wellenförmige Erhebungen aus, die aber mit großen trichterförmigen Vertiefungen abwechseln. Weitbin ist der Boden in eine schwefelgelbe Farbe, d. h. in Fichten gehüllt, welche die Reisenden als die „Weisse“ der Lappen oder als Renthierflechte (*Conomyce rangiferina*) deuten, die aber mit einer Verwandten des isländischen Moores, mit gelben Extracien gemischt zu sein scheint. Sie schließt fast jede andere Vegetation aus und wird damit zur Flechten-Tundra (Flechtensteppe). Doch gelangt sie in dieser Breite noch nicht zur vollen Entfaltung; denn um Kalanito sehen Birken und Weiden, die hier bei einer Erhebung von 945 Fuß die Ebene bewalden und etwa 10 Meter hoch werden, ihrem Verdrängen ein Ende und schließen sofort eine bunte Kräuterbede ein (*Polemonium coeruleum*, *Geranium sylvaticum*, *Veronica longifolia*, *Carduus heterophyllus*, *Galium uliginosum*, *Alopecurus fulvus*, *Calamagrostis phragmitoides*, *Triticum repens* u. A.). Sonderbar genug, taucht nun die Kiefer in Wirklichkeit, aber über der Birke bei 1050 und 1151 F. auf, und zwar an den nach Westen getehrten Abhängen des Plateaus, wo sie gegen fünf Meter hoch wächst, während die östlichen Abhängen keine Spur von ihr zeigen. Zahlreiche See'n streichen sich in die Landschaft abwärts ein, weniger durch ihre Ausdehnung, als dadurch merkwürdig, daß ihre Gewässer oft viel höher, als ihre Ufer liegen. Nach Martins erklärt sich diese seltsame Erscheinung sehr einfach durch die Pflanzen, welche die Ufer gleichsam mit einem Walle umgeben, der, obgleich er nur aus Torfpfeilern und Weiden besteht, doch durch das innige Wachstum von Moosen, Weiden, Binsen und Riedgräsern das Wasser vollständig zusammenhält. Selbst die vorhin angegebenen wellenförmigen Erhebungen der Hochebene muß ich mit Letztern in Verbindung bringen. Denn wie sie auf unseren Mooren jene jährlichen Hügel hervorbringen, die der Döhrle Wälden nennt, ebenso erzeugen sie dieselben in Lappland entweder in Hügel- oder in länglicher Form. Wenn dann ein solches Sumpfland durch seine eigene Vegetation allmählich zu einem trocknen Halbelande wird, so gewinnen diese Hügel in der Landschaft eine besondere Bedeutung und ähneln oft Grabbügeln, welche in allen Richtungen durcheinander geworfen sind.

Endlich überschreitet man bei 1638 F. die Wasserscheide beider Meere und tritt nun aus dem Quellgebiete des Allen in das des Muonio ein. Die Kiefer ist wieder verschwunden; dafür stellt sich bei 1333 F. die Birke auf's Neue, wenn auch verkrüppelt, auf dem Plateau wieder ein und reicht in östlichen Lagen an Hügeln bis 1601 F.,

In südwestlichen sogar bis 1632  $\text{F.}$  An denselben Gehängen aber erlangt die Ebersche nur eine Erhebung von 1159  $\text{F.}$  Mit den Birken wechselt die oben beschriebene Flechtensteppe nochmals der Art, daß sie auch hier kaum der Kräbenbeere und der Bärentraube einigen Platz läßt. Ihre eigentliche Region liegt überhaupt zwischen 1077 bis 1540  $\text{F.}$ , also zwischen den Grenzen der Kiefer und Birke, so daß hier ein ewiger Kampf von Flechtensteppe und den letzten Pionieren der Wälder unverkennbar ist. Erst mit dem Eintritt in das Gebiet von Kareluando ( $68^{\circ}36' \text{ n. Br.}, 20^{\circ}14' \text{ ö. L.}$ ) erlangt dieser Wald seine volle Kraft. Bei 1263  $\text{F.}$  erscheint die Kiefer in west-süd-westlichen Lagen als 10 Meter hoher Baum, der anderwärts noch bis 1417  $\text{F.}$  reicht, bei seinem nächsten Auftreten aber schon große Wälder bildet, die nun ohne Unterbrechung bis zum Bottnischen Meerbusen herrschen.

Mit diesen Wäldern verwandelt sich augenblicklich die ganze Natur. Während man auf dem lappischen Hochlande nur ausnahmsweise einige wenige Kräutrerformen antrifft, sammelt man um Kareluando, das hiermit sofort auch der Mittelpunkt für das schwedische Lappland wird, gegen 141 Arten, die sich in 27 Familien und 58 Gattungen gliedern und schon 21 Holzpflanzen unter sich zählen, von denen freilich 12 allein zu den Weiden gehören. Hier liegt die Grenze der Civilisation. Bald kehren auch die ersten Fichten oberhalb Kareluando bei 770  $\text{F.}$  ü. M. wieder, und obwohl sie noch die starre, polare Tracht besitzen, so schiebt sich doch bald auch der Ackerbau in ihre Region. Er beginnt schon um Unter-Muonioniska mit der Gerste. Freundlich, an die Harpfen der deutschen Alpen erinnernde Trockengerüste für dieses Getreide versehen uns weit hinweg in südlichere Gefilde. Der Muonio rauscht durch große Fichten- und Kiefernwälder, deren Uferbäume seinem Spiegel das Bild einer Wildniß aufdrücken. Oft wief der Wald durch einen großen Sumpf unterbrochen, auf dessen Vichtung sich nur verkrüppelte Kiefern wagen. Wie durch Savannen durchzogen der Strom in majestätischer Kube oder in imposanten Stromschnellen die weite Ebene. Auch der Zorned, in den wir uns nun begeben, wiederholt das gleiche Bild, aber mit den ersten Erinnerungen an den Süden. Um Kenäs droht schon wieder der Eisenhammer, und die ersten Sperlinge flattern um uns her. Um Pello kräut uns schon der aromatische Kainfarn (*Tanacetum vulgare*), selbst der kriechende Ake, um Tortula, auf dem linken (russischen) Ufer des Flusses, der äußerste Vorposten des Poppendaues; schon erreicht die Fichte einen Umfang von 2,44 Meter; behagliche Landhäuser treten in die Landschaft ein, mit ihnen der behagliche Lebensgenuß, dessen Einzelheiten nach Süden zu nun ebenso zunehmen, wie die Vegetation. Nach Torned hin trennen sich die Felder schon durch Hecken, Wiesen und Schlagbäume; zur Gerste gesellt

sich der Roggen, zum Getreidebau die Windmühle, welche die Gipfel der Hügel überragt. Wir vergessen fast, daß wir uns noch immer unter dem Polarkreise befinden, wo die Sonne auf dem Äkrafara im Juni eine Woche lang nicht mehr untergeht.

Erst, nachdem man diesen reichen Wechsel von Baum- und Strauchleben, von Kräutern, Moos- und Flechtenleben durchschritten, versteht man, daß die offenen Flächen des Polarlandes ihren Ursprung nur den eisigen Winden verdanken, die ungehindert sich auf ihnen herum tummeln. Man muß aber offenbar auch hier wieder mehrere Regionen unterscheiden, welche nicht allein die Wärme- und Höhenverhältnisse, sondern auch die Gestaltung des Bodens und seine geognostische Zusammensetzung in sich اسپiegeln. Im Allgemeinen wage ich fünf solcher Regionen in der arktischen Steppe zu unterscheiden: die Formation der Gräser, der Stauden, der Moose, der Flechten und das felsige Land. Die Grasoase gehört offenbar den wärmsten, geschäftigsten Lagen des Flachlandes an und nimmt füglich in einer aufsteigenden Folge die unterste Stelle ein. Mit ihr wetteifert die Formation der Stauden oder die Kräuterkflur, die an den unteren Gehängen, welche ihre Schneewasser zeitig im Frühjahr verlieren und darum wärmer sind, auftritt. Wie alle folgenden Formationen vielfach gemischt, selten rein vorkommen, ebenso fällt sie in den meisten Fällen mit der vorigen oder auch mit der folgenden zusammen. Die Moosbede erscheint vorzugsweise auf dem Sumpflande, das seiner Natur nach den kältesten Boden, nämlich einen Moorboden voraussetzt. Die Flechtenbede behauptet die trockene, oberste Region und vertritt gleichsam die Halsteppe. Flechten allein sind unter den letzten Bürgern des Schwächerlebens auf den Alpen wie am Pol, und sie vermögen das auch, da sie gewissermaßen für den Sturm geschaffen sind, den sie am meisten lieben, unter dessen Einwirkung sie am besten gedeihen. Wo auch sie, aus Mangel einer horizontalen Fläche, keine zusammenhängende Decke mehr zu bilden vermögen, der Boden naßt und nur von einzelnen sehr genügsamen Pflanzenformen bewohnt wird, da tritt die eifigste aller Regionen, das Bergland auf; das eifigste, weil einen großen Theil des Sommers unaussprechlich ein bis zum Nullpunkte erkältes Schneewasser an den Gehängen hernieder träufelt und jede Vegetation von Zusammenhang unterbrückt. Diese Formation könnte man die eigentliche Polarformation nennen. Denn sie ist es, welche den ganzen Pflanzenverband in seine letzten Theile auflöst und diese zum Pole vorschleibt. Hier gedeiht nur noch der Polarfuchs und der Eisbär.

Aber auch damit hat man erst eine allgemeine Vorstellung von der arktischen Steppe erlangt. Das Leben der einzelnen Formationen ist, bei aller Kürzlichkeit der Verhältnisse, reicher, als der erste Blick vermuthen läßt,

und das Polarland ist viel zu ausgedehnt, als daß man einen solchen Reichthum von einem einzelnen Punkte aus

richtig beurtheilen konnte. Jedenfalls verlangt es eine eigene Betrachtung, um ihn verstehen zu lernen.

## Die Befruchtung der Blüthen unter Vermittelung der Insekten.

Von Ludwig Clafer.

Auf den Umstand der Blüthenbefruchtung durch Insekten ist man noch nicht sehr lange aufmerksam geworden, obgleich man Jahrtausende lang den ganzen Vorgang, so zu sagen, offen vor Augen hatte und ihn bei einiger Absicht leicht hätte bemerken können. Mit manchem Andern ist es ganz ähnlich zugegangen. Hat man doch z. B. seit dem Bestehen der Menschheit tagtäglich den Vorgang des Brennens vor Augen gehabt und bei jedem Athemzuge denjenigen Stoff in die Lunge geschafft, der alles Verbrennen und Atmen bedingt und unterhält, und kennt man denselben doch erst seit noch nicht hundert Jahren! Haben doch seit Anbeginn Dämpfe den Menschen dieselbe Gewalt gezeigt, welche sie auch jetzt noch hervorbringen, und hat man sie doch erst in diesem Jahrhundert recht zu benutzen, mittelst eigentlicher Dampfmaschinen zu großen Zwecken verwenden gelernt! — Die in der Ueberschrift genannte Entdeckung ist fast ebenso neu, als die des Sauerstoffes und der Dampfmaschine. Sie wurde zuerst von Konrad Sprengel in seiner Schrift: „Das entdeckte Geheimniß der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen (Berlin, 1793)“ vor der naturwissenschaftlichen Welt ausgesprochen.

Entdeckungen in der Wissenschaft, wie überhaupt, werden gewöhnlich nicht ganz plötzlich gemacht, sondern kommen viel öfter nur allmählig zum Bewußtsein, zur allgemeinen Kenntnis, zur Anwendung und Benützung, so wie zur Aufnahme in die Wissenschaft. Es ist wie mit einem großen Strom, dessen eigentliche Quelle man nicht angeben kann, da er sich aus vielen Quellen und unzähligen Bächen erst allmählig bildet und zusammenfließt. Zuverlässig weiß man jetzt, daß Amerika lange vorher gefunden war, ehe es Columbus entdeckte; ebenso soll das Schießpulver, die Buchdruckerkunst, der Kompaß, das Porzellan, Glas u. s. w. schon andern Völkern im fernen Asien bekannt gewesen sein, ehe man diese Dinge in Europa erfand oder doch gebrauchte lernte und sie in allgemeine Aufnahme kamen. So haben auch sicher schon die Gärtner der alten Völker ihre Gedanken wegen Beförderung der Fruchtbarkeit der Obstbäume und Fruchtsträucher durch die Bienen und andere Insekten gehabt, welche sie die duftenden, honighaltigen Blüthen emsig besuchen sahen, ohne mit Klarheit und Bestimmtheit den Thatbestand zu erkennen, der nummehr in neuerer Zeit als naturwissenschaftliche Errungenschaft festgesetzt ist.

Wenn die Welt der Insekten auf der einen Seite hauptsächlich der Vegetation feindlich gegenübersteht, und

sich das Ungeziefer dadurch verhaßt macht, daß es die Hoffnung des Menschen auf reiche Ernten vielmals schmähtlich zu Schanden macht, indem seine jungen Brutten, die vom Landmann als „Würmer“ bezeichneten Larven, entweder die Knospen und Sprossen, oder die Blüthen und Aehren, die Stengel und Halme, oder die Früchte bei ihrer Entwicklung zerstören und ihren Unterhalt davon beziehen, so ist diese üble, dem Menschen nachtheilige und verdrüßliche Sache theilweise doch auch wieder ausgemacht durch den das Pflanzenleben auf der andern Seite unterstützenden Umstand, daß Insekten die Vermittelung der Blüthenhülle, ihre gegenseitige Befruchtung vermitteln und befördern helfen und dadurch die doppelte, fünffache und zehnfache Zahl der Früchte hervorbringen, in manchen Fällen die Befruchtung überhaupt nur möglich machen. Das Verhältniß des Ungezieferschadens wird hierdurch in den Augen Billigdenker wesentlich geändert und die Härte dieses Naturzustandes gemildert, indem das Zerstören vieler Früchte durch die Insektenlarven nummehr bloß in dem Rechte einer Abschlagnablung für geleistete Dienste erscheint.

Die wesentliche Vorbedingung für das Zustandekommen der Befruchtung ist, wie Seubert in seinem Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde (4. Aufl. 1866. S. 223) auseinandersetzt, „daß der im Innern der Staubbeutel erzeugte Blüthenhaub auf die Narbe gelangt. Der Zeitpunkt, in dem dies geschieht, trifft in der Regel mit dem der vollständigen Entfaltung der Blüthe zusammen; dann öffnen sich die Fächer der Anthere, und das aus den Pollenkörnern bestehende Pulver, welches ihren Inhalt bildet, verfliehet. Bei der großen Mehrheit der zwittrerbüthigen Pflanzen wird das Gelangen des Pollens auf die Narbe dadurch sehr erleichtert, daß die Staubgefäße unmittelbar um die in der Mitte der Blüthe befindlichen Stempel herumstehen, so daß der ausfallende Blüthenhaub leicht auf die Narbe gelangt, um so mehr, als die Pollenkörner meist in außerordentlich großer Menge vorhanden sind und häufig durch das elastische Aufspringen der Antheren weit verstreut werden. Auch kommt es, z. B. bei der Parnassie und der Gartenraute, vor, daß sich die Staubgefäße abwechselnd über die Narbe biegen und in dieser Stellung ihren Blüthenhaub entleeren. Endlich spielen die Insekten, welche die Blüthen wegen des Pollens oder des meist an inneren, verborgenenliegenden Theilen abgesonderten Honigsaftes besuchen, mittelst ihrer Bewegungen eine wichtige Rolle bei der Uebertragung des

Pollens auf die Narbe. Diese Vermittelung der Insekten ist namentlich bei denjenigen Blüten unerlässlich, wo besondere Organisationsverhältnisse das Gelangen des Pollens auf die Narbe erschweren, wie das u. A. bei den Orchideen und Akeleipladen (Wachspflanzen) der Fall ist, deren Pollenkörner in kompakten Massen zusammenhängen."

Auch für alle diejenigen Pflanzen besonders, deren Blüten getrennten Geschlechtes sind, so daß also die männlichen und weiblichen Blüthenhülle sich weit auseinander befinden, ist die Einwirkung der Insekten höchst wichtig, ja mitunter zur Befruchtung unbedingt erforderlich. Es gehören hierher fast alle Waldbäume und Sträucher, überhaupt die Kähnen- und zapfentragenden Holzgewächse, worunter nicht wenige, wie Nüsse, Eichen, Ebern, Kastanien u. s. w., dem Menschen wichtige Früchte tragen; sodann von sonstigen Kulturpflanzen, z. B. der Hanf und der Hopfen, die Gurken und Kürbisse. Diese letzteren würden keine Früchte tragen, wenn nicht Bienen und andere Honigsäfte liebende Insekten aus einer Blüthe in die andere kröchen und den Blütenstaub aus den männlichen auf die Narben in den weiblichen Blüten hinüberbringen.

Aber auch für die meisten zweigeschlechtigen oder Zwitterblüthen, wie z. B. die der Obstbäume, Weidensträucher, Dillamengewächse, die Schmetterlingsblüthen der Hülsenpflanzen u. s. f., ist zur vollkommenen Befruchtung aller Blüten die Vermittelung der sie besuchenden und mit den staubigen Füßen und Rüsseln bearbeitenden Insekten erforderlich. Gebien diese, z. B. wegen mangelnden Sonnenscheins während der Blüthezeit, so bleiben unzählige Blüten unbefruchtet und sehen nicht an. Dies ist vielfach der Grund, daß trotz reicher Blüten in manchen Jahren, wo es an der belebenden, die Insekten antreibenden Sonne fehlt, die Obsternte gering ausfällt, auch wenn der Ungelehrter eben nicht sehr stark statfindet. Daß in Gemächshäusern, wo den Bienen und sonstigen Insekten der Zutritt verwehrt ist, viele Blüten nie anzusehen pflegen, beweist dasselbe.

Unter allen Insekten sind in dieser Beziehung die gewöhnlichen Honigbienen, sowie nicht minder eine Menge sonstiger großer und kleiner wilder Bienenarten (wie der bicken Hummeln und der verschiedenen kleinen Sand-, Wollen-, Seiden-, Blumen- oder Blatt- und anderer Bienen) für die Blüten der Fruchtbäume, der Weidensträucher und verschiedener Kulturgewächse von hoher Wichtigkeit. Die Aussendung von Bienenständen in Gärten ist daher weit entfernt, den Gemächsen derselben zu schaden und dem Gewinn des Menschen aus denselben Eintrag zu thun, vielmehr ganz besonders geeignet, die Fruchtbarkeit der Blüten zu befördern und so die Obst- und Samenerte zu erhöhen. Wögen in den Kirschen, Pflaumen-, Birn- und Apfelblüthen die Bienen sich nur recht herumtum-

mein, — dies bewirkt nur reiche Ernten, weil dann weit mehr von den zahllosen Blüten tüchtig und grünlüch befruchtet werden, kräftig ansehn und dann dem Baum erhalten bleiben. Die Stachel- und Johannisbeerblüthen werden nach der Reihe einzeln alle von Hummeln und Bienen besucht, weil sie darin bequem zu reichlichem Honigsafte gelangen; darum pflegt davon auch nicht eine fehzufschlagen.

Ähnlich ist es mit Honig lebenden Fliegen mancherlei Art, wie um die Blüthezeit mit den schlanken, schwarzhaarigen Markuschwämmen, selbst mit grauen Schweiß-, Raupen-, Schnepfen-, Roth- und Tagfliegen u. a. m. der Fall. — Der blühende Raps leidet nicht bloß durch die massenhaft auftretenden Glang-, oder Rapskäfer Roth, sondern veranlaßt diesen zudringlich sich in die Blüten einnistenden Käferchen zugleich die Befruchtung fast aller Blüten, und es fragt sich, ob sie in gewöhnlichen Fällen für die Samenerte mehr Nachtheil als Vortheil bringen, obgleich ihre Larven, wie man jetzt weiß, in den grünen Samenhschoten von weichen Körnern leben. — Ähnlich ist es mit vielen Leuteninsekten, z. B. den winzigen Blafensfüßen (Thrips), mit den verschiedenen Getreidefliegen, den Korn-, Gersten- und Roggenhalmfliegen u. s. w. (Cecidomyia destructor, tritici u. s. w.), die sich in der Blüthezeit oft in ungemeiner Menge auf den Aehren einsinken, ohne daß die Ernte schlicht ausfällt, obgleich sie bekanntlich als Larven theils in den Aehren, theils in den zarten Halmen innerhalb der Scheiden leben. Offenbar wird ihr auf der einen Seite verübter Schaden wieder durch reichlichere Befruchtung der Aehren in allen ihren einzelnen Blüten aufgewogen. So bemerkt z. B. Hagen in seinem Bericht über die in der Provinz Preußen von 1857 — 1859 schädlich aufgetretenen Insekten (Stettiner entom. Zeitschr. 1860, S. 26 f.), „daß Cecidellie, die Weizenmücke oder der sogenannte „rotte Wibel“, um Königseberg in Masse auf den Weizenähren sitzend, als wenn dieser blühte, zu sehen gewesen sei, und daß dennoch eine gute Ernte erfolgt sei."

Andere, in dieser Beziehung wichtige Insekten sind sodann noch sehr viele sonstige, die Blüten besuchende oder sich darauf versammelnde und einander aufsuchende Käfer, wie größere metallische Goldkäfer (Cetonia), zottige Pinselkäfer (Trichius), Gallkäfer (Cryptocephalus), Gartenkäfer (Melolontha horticola, ähnlich Maltkäfer, nur viel kleiner), schmale, weichebige Blumenkäfer (Anthicus), Bienenkäfer (Clerus s. Trichodes), Schmalböcke (Leptura), Kronenkäfer (Cecocoma), Wargenkäfer (Malachius) u. a. m. — Besonders ersprießliche Dienste in Ansehung der Blütenbefruchtung leisten viele Schmetterlinge, indem sie ihre Rüssel aus Blüme in Blüme tauchen, entweder frei davor schwebend als Schwärmer oder auch darauf sich niederlassend und umherkriechend, um wie Tagfalter, Eulen, Spinner, Bünler und Moten zu sau-

gen. Von einigen Arten der letzteren hat Ch. Darwin die Befruchtung gewisser Orchideen\*) nachgewiesen. Von Fliegen sind die Wollschweber (Bombylius), welche schwebend ihre langen Sauger tief in die Blumen senken, besonders für Weidenarten zur Befruchtung sehr geschaffen. Spengereisen zusammengefügter Art (Compositen), wie Scorzonere, Eicherie, Salat u. s. w.) verdanken bessere und durchgehendere Befruchtung kleinen, darin herumkriechenden Staphelinen, Stängkäferchen (Meligethes aeneus) oder Rapskäferchen u. a.) und Flohkäfern (Mordellen). Welden besonders kleinen, auch ohrwurmartig gestalteten Blasenfüßen (Thrips physapus u. s. w.), erschöpfen auch, wie bereits angedeutet, die Getreideähren.

Es ist uns bisher noch zu wenig gelungen, der Natur alle Geheimnisse ihres Haushalts abzulauschen; sonst würden wir Manches, was uns bisher nur im Lichte vertilgungswürdigen Ungelesers erschien, segnen und als nothwendiges, selbst zum Vortheil des Menschen gereichendes Glied der Schöpfungskette erkennen. Daß das, was man unter der Benennung „schädlichen Ungelesers“ von jeher zu verwünschen gewohnt war, eine directe Beförderung der Fruchtbarkeit bewirken hilft, ist nächst dem Umstande, daß solches dem Uebermaaß der Production wehrt und der damit verbundenen Kümmerlichkeit der einzelnen Früchte entgegenarbeitet, gemäß Grund genug, die Bedeutung und Nützlichkeit auch dieser Geschöpfe anzuerkennen. Daneben dürfen wir aber endlich nicht übersehen, daß alles Geleser und Geschmeißte, wenn auch Menschen und Vieh oft läßt und unbequem, doch Bedingung für das Dasein unzähliger höherer Wesen ist, die mit ihrem bunten, mannigfaltigen und reichen Leben die Erde verschönern.

\*) Ch. Darwin, über die Einrichtungen zur Befruchtung brit. und amer. Orchideen durch Insekten u. s. w. (Aus dem Englischen von Dr. Brenn, 1867.)

Der Mensch hat sich eben denjenigen Geschöpfe, die ihm zu nahe treten, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu erwehren, ohne wie jener Thor in der Fabel vom Eichbaum und Kürbis zu denken, daß die Welt besser eingerichtet sein könnte, besonders auch, indem sie eben von allem widerwärtigen Geschmeiß verschont geblieben wäre. Was ihm und seinen Erzeugnissen entgeht, ist darum nicht unnütz und überflüssig. Sicherlich hat es auch im Schöpfungsplan und Naturgängen immer die Bedeutung eines nicht unwichtigen Gliedes, und es ist von größtem Interesse, durch irgend eine Entdeckung, einen Zufall oder glücklichen Einsall, wie der von der Blütenbefruchtung durch Insekten, über den inneren, weisen Zusammenhang der Naturverhältnisse allmählig immer mehr Aufklärung zu erlangen.

### Literarische Anzeige.

Verlag von H. Kesser in Berlin.

## Alexander von Humboldt. Biographie für alle Völker der Erde von Otto Ale.

3. Aufl. Preis 10 Sgr.

Dieses Buch, auf welches in der „Natur“ (Nr. 22) bereits im Voraus aufmerksam gemacht wurde, und das nun bereits laum 4 Wochen nach seinem Erscheinen einer 4. Auflage entgegensteht, ist in Wahrheit ein Volksbuch im besten Sinne des Wortes, das Jedem, dem wissenschaftlich Gebildeten, wie dem Laien, hohen Genuß gewährt. Es ist ein treues, lebensvolles, anziehendes Bild des großen Meisters, dessen hundertjährigen Geburtstag wir und mit uns die meisten gebildeten Völker der Erde in diesen Tagen begehen.

Möge es Allen empfohlen sein, die sich erheben und erheben wollen an dem Lebensbilde eines Mannes, der für hohe ideale Ziele alle Genüsse des Lebens opferte und bis an sein spätestes Alter in rastloser Arbeit für die Bereicherung der Wissenschaft und zugleich für die geistige Befreiung des Volkes wirkte.

## Literaturbericht.

Der naturwissenschaftliche Unterricht in Bürger-, Mittel- und höheren Mädterschulen. Methodisch beleuchtet von C. Wernig. Berlin, 1869, bei Gebrüder Bornträger. Preis 8 Sgr.

Ein empfehlenswertes Schriftchen, das sich von aller Polemik entfernt hält und sicher darauf rechnet, daß dem naturwissenschaftlichen Unterrichte die Zukunft gebührt. Es geht deshalb auch sofort in die Sache hinein, indem es das Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts zunächst und zwar so hinstellt, daß durch denselben vor Allem die Einheit der Natur und des Lebens erkannt werde. Hierzu gehört der Anschauungsunterricht und die logische Gruppierung der ein-

zelnen Disciplinen. Die letzteren anzugehen sei, lehrt eben der Verf. aus eigener Erfahrung sogleich. Kurz und bündig seht er den Verlauf der verschiedenen Klassen auseinander und gibt dem betreffenden Lehrer mit ein Paar Strichen an, wie und was er darin zu lehren habe. Der angehende Lehrer empfängt darum eine scharf und präcis gehaltene Anleitung des methodischen Unterrichts, und Wes. begt auch nicht den geringsten Zweifel, daß jeder Lehrer auf dem vom Verf. eingeschlagenen Wege vorwärts kommen müsse. Wie sind um so mehr mit ihm einverstanden, als es sich ihm nicht um Kleinliches, um das nackte Wissen, sondern um Verständnis handelt, wodurch die naturwissenschaftlichen allein geistig und herbeibildend gemacht werden können. Wollten sich nur recht viele seiner Kollegen ihm anschließen!

A. M.

## Humboldt-Verein für Volksbildung.

In Breslau ist am 21. Juli d. J. ein Humboldt-Verein für Volksbildung gegründet worden, dessen Aufruf an alle freibekennenden Männer Deutschlands wir hier nachfolgen lassen. Möge dieses Vergehen aller Orten Nachahmung finden, möge die Humboldtsfeier überall zu dem festen Entschlusse anregen, den Namen Humboldt's ehren zu wollen durch ein Wirken in seinem Geiste, durch ein unablässiges Schaffen für Bildung und Verehrung des Volkes!

„In keinem Jahrhundert hat der menschliche Geist so riesenmäßige Fortschritte gemacht, als in dem unsrigen; der geistliche Aufschwung der Culturvölker in der Gegenwart ist ein ganz außerordentlicher, Bildung und Gesittung dehnen immer weiter, immer mächtiger sich aus.

Aber nicht alle Kreise der Gesellschaft schreiten in der Bildung gleichmäßig fort, ja es sind umfangreiche Volksklassen von dem allgemeinen Fortschritt fast noch ganz unberührt geblieben, so daß sie noch jetzt auf einem Standpunkte der Anschauung und Gesittung stehen, der uns an hinter uns liegende Jahrhunderte erinnert.

Zu beklagen ist hierbei hauptsächlich, daß von verschiedenen Seiten her der weiteren und schnelleren Ausbreitung der Volksbildung mit großer Kraft und mit bedeutenden Mitteln entgegengewirkt wird, so daß die Kluft zwischen den in der Bildung fortschreitenden und den rückständigen Volksklassen immer breiter und tiefer wird.

Solchen Bestrebungen mit aller Macht entgegenzutreten und die Bildung und Gesittung der Gegenwart in immer weitere Kreise des Volkes verbreiten zu helfen, sollte deshalb Jeder für seine erste und heilige Pflicht halten, dem das Wohl und das Gedeihen seines Volkes am Herzen liegt; denn Volkswohlthat und Volksgedeihen haben ihre Wurzel leblich in der Volksbildung.

In Anerkennung dieser Pflicht ist in Breslau eine Anzahl freibekennender Männer zu einem Vereine zusammengetreten, der es sich zur Aufgabe machen will, „durch Veröffentlichung und Verbreitung von Schriften, durch Vorträge, durch Gewährung von Lehrmitteln und in jeder sonst geeigneten Weise für Volksbildung zu wirken.“ Insbesondere wird sein Streben darauf gerichtet sein, „die Ideen der Humanität auszustreuen und zur Geltung zu bringen.“

Um das Andenken Alexander von Humboldt's zu ehren, nennt sich der Verein „Humboldt-Verein.“ Jeder Mann, welcher das 24. Lebensjahr erreicht und im Vollbesitz der bürgerlichen Rechte ist, kann als Mitglied aufgenommen werden.

Das aufgenommene Mitglied hat einen jährlichen Beitrag von mindestens 20 Sgr. zu zahlen.

Außerdem wird der Verein für seine Vereinszwecke Humboldt-Pfennige sammeln.

Wer einen laufenden oder einmaligen Beitrag als Humboldt-Pfennig zur Vereinskasse zahlt, ohne Mitglied des Vereins zu sein, gilt als Gönner des Humboldt-Vereins.

Der Verein wird selbstverständlich um so mehr wirken können, je mehr er Mitglieder und Gönner erwirbt.

Er richtet hierdurch an alle freibekennenden Männer unserer Stadt, sowie der Provinz, ja des ganzen deutschen Volkes die Aufforderung, die Zwecke des Vereins, sei es als Mitglieder, sei es als Gönner, fördern zu helfen.

Aber auch die deutschen Frauen mögen nicht zurückbleiben, wo es die höchsten Interessen des Volkes gilt, sondern mögen als Spenderinnen und Sammlerinnen von Humboldt-Pfennigen an unsern Bestrebungen wirkfördernden Antheil nehmen!

Schon sind dem Verein auch von Auswärtigen Bitttelts-Anmeldungen zugegangen. Der Verein hofft, daß die Zahl derselben sich stetig mehren wird. Erwünscht wird es dem Vereine sein, wenn sich die auswärtigen Mitglieder bemühen, ihm neue Mitglieder und Gönner zuzuführen, noch erwünschter, wenn sich auch an anderen Orten Vereine mit gleicher Tendenz zu gleichen Bestrebungen constituiren.

### Es gilt dem Licht!

Es gilt, den Bestrebungen jener finsternen Mächte entgegenzuwirken, die das Licht nicht kommen lassen wollen, die darauf ausgeben, uns in die Nacht mittelalterlicher Unwissenheit, mittelalterlichen Aberglaubens zurückzuführen.

### Es gilt der Humanität!

Es gilt, einen mächtigen Schutzwall aufzurichten gegen die Wiederkehr der Noth, der Unsitte und des Fanatismus früherer Jahrhunderte und das Unsere zu thun zur fortschreitenden Verehrung und Vervollkommenung des menschlichen Geschlechts.

Breslau, den 21. Juli 1869.

Der Vorstand und der Ausschuß des Humboldt-Vereins für Volksbildung.

Jeder Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 15 Sgr. (1 fl. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Buchhändler nehmen Bestellungen an.

Verleger: Scherz'sche Buchdruckerei in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me. und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 38.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwetschke'scher Verlag.

**22. September 1869.**

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Abonnement für das nächste Vierteljahr (October bis December 1869) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für diejenigen, welche unsrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1868, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben sind.

Halle, den 22. September 1869.

**Inhalt:** Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. A. Die Gras- und Kräutlerdecke. Erster Artikel. — Vom Monticola zum Monte Blanc, von Otto Me. B. Uebergang über den St. Eberdulpsh. — Der Farbenwechsel bei den Pflanzen, von Hermann Meier.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### A. Die Gras- und Kräutlerdecke.

Erster Artikel.

Die erfreulichste Erscheinung des offenen Polarlandes sind wie überall die Wiesen. Sie liegen außerhalb des Polarkreises oder dringen doch nicht weit über denselben hinaus. Island, das ihn nur mit seinen Nordspitzen berührt, ist verhältnismäßig reich an ihnen. Gleich den Far-Deern, hat es einen kräftigen Graswuchs, obgleich es, außer einer 18 F. hohen Eberecke bei Akurevi im

Norden, nur 8—10 F. hohe Birkenwälder in den geschützten Thälern besitzt. Hier, vor den furchtbaren Winden der Insel gebekt, sproßt das Gras gegen 5 F. hoch auf aus einem Boden, den die Flüsse alljährlich im Frühjahr überschwemmen und bängen. Sonst reicht diese mildere untere Region bis zu 1500 F. Höhe, wo Halben (Hraunen) und Flechtensteppen (Deräfi, von Dräfa = Einöde) mit



Haidekraut und Heidelbeeren, Auergeleien und vereinzelt Gräsern ihr eine Grenze setzen. Etwa 15 Grasarten, Simsen, Ampfer (*Rumex Acetosella*, *Acetosella pratensis*), Anderelch (*Polygonum Persicaria*, *Hydropiper*), Wegbreit (*Plantago major*, *lanceolata*), Schaumkraut (*Cardamine pratensis*), Wilde (*Vicia Cracca*), Frauenmantel (*Alchemilla vulgaris*), Wiesenklapper (*Alectorolophus minor*), Augentrost (*Euphrasia officinalis*) u. A. geben diesen Wiesen ein vollkommen nördropäisches Gepräge. Wenn auf ihrer oberen Region nur noch das genügsame Schaafe hinlängliche Weide findet, um sich von diesem spärlichen Graswuchs der Steppen und Halben zu ernähren, so weilt hier unten Alles gleichsam in Wohlleben und Ueppigkeit. Bis zum 15. Juli frühestens ist besonders der SW. und Norden des Landes, das hier die meisten und längsten Flußthäler hat, in eine dicke Grasdecke gehüllt, welche Thäler und Bergabhänge bedeckt. Von jener Zeit ab, wo bis zum September kein Schnee mehr fällt, die Sonne mild über dem Gefilde lächelt, kein Frost mehr den Gesang der Vögel in den Auergebüschken stört, noch die Kühe, Pferde und Schaafe hindert, auf den entfernteren Weideländern zu grasen: da beginnt des Isländers ibyllische Zeit, die Zeit des Heumachens. Die Sense rührt sich jetzt auch hier, wie andermwärts, soweit die Matte nicht für das weidende Vieh ungemäht liegen bleiben muß. Alles, Jung und Alt, nimmt Theil an der Beschäftigung des Heumachens; denn das Heu ist nicht allein die Grundlage der Existenz Aller, sondern seine Gewinnung führt den Menschen auf ein Gefilde, über welches nun — freilich auf so kurze Zeit! — die Natur ihre ganze Wonne ausschüttet. In dieser Beziehung gleicht der Isländer vollkommen unsern Aeltern. Das beste Heu gewinnt er auf Dächern und Mauern, da der geringere Mann gleichsam in einem Kastenhaus, d. h. in einem Erdbause wohnt, dem der Dünger auch mehr als den Wiesen zugeführt wird. Derselben Thatfache bezeugen wir auch in dem Polarlande überall da, wo die Niederlassungen der Eingeborenen standen oder wo der Polarfuchs seine Baue gräbt. Auch im äußersten Lappland lehrt die Erfahrung auf den Wohnungen (Zingammen) der Fischer wohnen, die ihre Häuser zwar von Holz bauen, aber mit Erde decken, wodurch diese Wohnungen einem grasbewachsenen Erdbügel ähnlich werden. Auf Island pflegt man überdies in der Nähe des Hauses einen Fleck mit Steinen einzuhägen (darum der Tun = Jaun genannt); er liefert das kräftigste Heu aus gleichem Grunde.

Diesem Graslande gegenüber verhält sich der Isländer, wie der letzte Mensch in den Alpen. Das Dasein der Wiesen und Weiden macht ihn augenblicklich schaft und zum letzten Träger einer Civilisation, die ohne feste Wohnsitze nicht mehr gedeiht. Darum auch ist das Heu dem Isländer Alles in Allem, und hoch steigt die Noth, wenn, wie es glücklicherweise nur selten geschieht, das

alljährlich im Frühling von Norden und Osten her all Hjerde und Küstennilken verbaarlickende Treibels bis in den Sommer liegen bleibt und, die Luft erlähmt, den Graswuchs niederhält. Dann ist der wohltätige Einfluß des warmen Golfstromes, dem Island sein mildes Küstenklima verdankt, nur zu fürchterlich ausgeglichen. Die Tausende von Pferden, für welche die Insel keinen Hafer mehr reist, ohne welche aber der Isländer kaum zu leben vermöchte, die Tausende von Kühen, die ihn zum Ernter machen und durch ihr Dasein auf den Weidelägen zahlreich Eiter (Blehhäuser) hervorgerufen, welche lebendig an unsere Stennhütten erinnern, die Tausende von Schafen, welche Milch und Wolle zu Nahrung und Kleidung liefern, — Alles geht einer ungewissen Zukunft entgegen, da nur dürftige Eurogate — Fischgräten, Eretana, Kassenfische u. dgl. — ersparen, was der Sommer zu wenig gab.

In dieser Weise lebet nirgends in der arktischen Zone auch nur entfernt ein ähnliches Leben wieder, das an diese Civilisation erinnerte. In Lappland zwar stellt sich theilweise noch ein entsprechendes Grasland ein; doch werden hier die Gräser noch seltener. Ich zähle, nach Anderson, unter den (reichlich) 100 Arten, welche das ganze Polarland besetzt, nur etwa 61 für das ganze Lappland, während Estlandbarnen 141 Arten besitzt. Diesen stehen etwa 87 Copergräser zur Seite, während Estlandbarnen 144 zählt. Ebenso treten von den 35 Estlandbarnen Binsengräsern nur noch 25 Arten in Lappland auf. Alle vereint, bilden das Gras- und Weidland. Weide jedoch erzeugen kaum noch eine Pflanzenbedeckung, welche man Wiese nennen könnte; der dichteste Graswuchs wächst sich in die Region der Birke, und zwar in ihrer unteren, wie uns Lund berichtet. Hier, besonders auf feuchten Strominseln, sproßt das Gras mitunter zu Manneshöhe auf, weil es meist von schlafartigen Gräsern (*Calamagrostis Lapponica*, *strigosa*, *phragmitoides*) gebildet wird, denen sich nur wenige kürzere Arten zugesellen (*Phleum alpinum*, *Agrostis rubra* *f. borealis*, *Hierochloa borealis*, *Anthoxanthum odoratum*, *Festuca ovina*, *rubra*, *Aira hexosus*, *Poa pratensis*, *alpina*). Wollgräser (*Eriophorum capitatum*), Seggen (*Carex lagopina*, *pauciflora*, *Persoonii*, *atrata*, *alpina*, *rotundata*), Binsen (*Juncus alpinus*) und Warbigräser (*Luzula glaberrima*) vermehren den Graswuchs. Der Einslag besteht aus Pflanzen des ebenen Landes, welche in ganz Estlandbarnen vorkommen und, da sie förmlich aus Deutschland angeboren, dem Graslande ein mitteleuropäisches Ansehen verleihen. Nur viele, mehr alpine oder arktische Formen geben ihm ein fremdes Gepräge (*Rubus arcticus*, *Lynchnis alpina*, *Cerastium alpinum*, *Potentilla maculata*, *Thalictrum Kemptense*, eine der gemeinsten Pflanzen in Ostmarken, *Mulgedium Sibericum*, *Hieracium prenanthoides*, *Polemonium coeruleum*, *Myosotis sylvatica*, *Phaca astragalina*, *Epilobium*

originifolium, Rumex Acetos.-alpina u. A.). Auch das Kiefland zeigt dieses Doppelgesicht; zu vielen mitteleuropäischen Arten gesellen sich hochnordische (Rubus Chamaemorus, Ranunculus hyperboreus, Pinguicula villosa u. A.). In der oberen Region, welcher die Gebirgslehen angehören, finden wir ein ähnliches Bild, wie auf unsern Almen, einen niedrigeren Graswuchs mit alpinen Pflanzen, zu denen sich arktische sammeln (Menziesia coerulea, Pedicularis Lapponica, Potentilla nivea, Saucurea alpina, Alchemilla alpina, Gnaphalium Norvegicum, Agrostis borealis, Sibbaldia procumbens u. A.), vermischt mit Formen der Ebene (Arctostaphylos uva ursi, Pyrola minor, Veronica saxatilis, Melampyrum pratense, sylvaticum, Archangelica officinalis u. A.). Ein Gestrüpp von Weiden (*Salix hastata*, *phylicifolia*, *glauca*, *Lapponum*), an den Sümpfen ein Gestrüpp von Erlen (*Alnus incana* *ß.* *virescens*), mischt sich in die untere Grasregion; die obere löst ihren Verband in ein Gestrüpp von halbkrautartigen Pflanzen auf, wo Heide- und Preiselbeere, Krähenbeere und die schöne, wenn auch zwergeige und krautartige schwedische Cornelkirsche (*Cornus Suecica*) die Kafenbildung übernehmen.

So reich aber auch das Ganze erscheint, so ist es doch nicht ausgedehnt genug, um sämtliche Bewohner sesshaft zu machen. Nur der Waldläpper sesselt sich an eine Hölle; denn ihm gehört die Waldregion mit ihren schönen Waldweiden. Doch ist er weit davon entfernt, nach Art des Isländers oder des Kelpers eine Art Sennerei zu treiben; er verpacket lieber seine Weiden und geht, wie der Fischerlapper ausschließlich, der Fischerei nach. Auf diese Art gibt er dem Berglappen seine Existenz. Dieser fußt mit seinen Kienheerden gerade auf die untere Waldregion, die ihm den Süden vertritt, und flachtet das untere Grasland in den Kreislauf seines Nomadenlebens ein. Die Unfertigkeit des Mens ist gerade so groß, wie die Hochlandflächen unendlich, die Weiden zerstreut sind. Beides hat tief in das Leben des Lappen eingegriffen. Es ist ein Leben, das gleichsam zwischen Grasland und Flechtensteppe gestellt ist und somit Weide vermittelt, soweit sie im Leben des Menschen Bedeutung haben. An den äußersten Kapfen Lapplands gibt es darum entweder fast gar keine Bevölkerung mehr, obschon sich grasreiche Strandebenen am Fuße sandigener Berge im Innern der tiefen Florbe um den Varangerfiord ausbreiten, oder der Mensch lebt im russischen Kappland bis zum Weissen Meere ein wenig menschenwürdiges Dasein. Er weiß kaum, um mit Nyländer zu reden, was Kalm oder Wiese sagen will; wer leicht 50 Kühe halten könnte, besitzet nur eine und in diesem Verhältniß Alles.

In der That trägt das eigentliche Hochland in seiner baumlosen, alpinen Region eine Pflanzendecke die man kaum noch mit dem Namen eines Graslandes beehren

kann. Sie entspricht etwa derjenigen, die man in den Alpen oft mit dem Ausdruck „Brett- oder bürter Boden“ bezeichnet, weil kurze, starre Gräser und Stinsen von dichtem Zusammenhange nur einen sehr geringen Kräutereinschlag gestatten. In Kappland breitet sich diese derbe Formation, die man unter dem Fuße wie eine harte Bretterunterlage empfindet, über beide Zimmarthen aus und fließt, nach Lund, dem ich hier folge, in deren Norden unmittelbar mit der Küstenregion zusammen. Auch der fester Aufbau wird von starren, grasartigen Pflanzenformen gebildet (*Juncus triglumis*, *biglumis*, *trifidus*, *Diapensia Lapponica*), gemildert nur von weichen Gräsern (*Poa cenisia*), die dem Kienthier besonders lieb sind, und andern Arten (*Avena subspicata*, *Aira flexuosa*, *Agrostis rubra* *ß.* *borealis*, *Festuca ovina*), Seggen (*Carex rigida*, *lagopina*, *rupestris*) und Marbelgräsern (*Luzula spicata*, *hyperborea*). Was diese aber lockern, geben wieder verschiedene Holzpflanzen zusammen, indem sie sich entweder mit ihrem Wurzel- oder selbst mit ihrem Zweigwerk in die Wafendecke einschieben (*Andromeda hypnoides*, *Arctostaphylos alpina*, *Azalea procumbens*, *Betula nana*, *Dryas octopetala*, *Salix reticulata*, *polaris*, *herbacea*, *myrsinites*, *lanata*). Sie charakterisiren die Formation als ein Halbrasland und lassen kaum andere Kräuter zu, als die sich selbst durch Kafenbildung zu schützen vermögen. Darum stehen Kapfenstüben (*Gnaphalium alpinum*, *supinum*) obenan und dorfstengliche, robuste Compositen (*Hieracium alpinum*) mit großen Goldblüthen sorgen ihnen. Spärlich flechten sich ein: Weiden (*Viola biflora*), Ranunkeln (*R. nivalis*, *glacialis*, *pygmaeus*), Cruciferen (*Draba Lapponica*, *Cardamine helidifolia*), Reifenartige (*Silene acaulis*), Stellanien (*St. cerastoides*), Weidenröschen (*Epilobium alpinum*), Steinbrech (*Saxifraga oppositifolia*, *nivalis*, *cernua*, *cespitosa*), Alpenrhabarber (*Oxyria digyna*), *Rhodiola rosea* u. A. Ein Rand von Weidengestrüpp (*Salix lanata*, *glauca*, *pyrenaica*, *Norvegica*) umschließt dicht über der Mischengrenze das Ganze, während es an seiner oberen Grenze abermals in ein Gestrüppland übergeht, auf welchem die Krähenbeere, Cassiope und *Dryas octopetala* den Kafen auflösen, nur wenige Kräuter (*Gentiana nivalis*, *Campanula uniflora*, *Ranunculus nivalis*, *Saxifraga nivalis*) charakteristisch hervortreten und die nival Region ankündigen. Wie schon gesagt, steigt die Formation im russischen Kappland zur Meeresebene herab und vereinigt sich hier mit der Tundra, der sie nun, indem sie dieselbe durchsetzt, einen unbestimmten Charakter aufdrückt, wie ich das später zu zeigen haben werde. Die weitaus merkwürdigste Pflanze dieser Region ist die felsame *Diapensia*, welche auch auf Island unter gleichen Verhältnissen wiederkehrt. Der Blume nach zu den Polemoniaceen gehörig, ist sie dem Laube nach ganz Wiesengras mit starren, zurückgekrümmten Blättern, die sich zu einem dichten, starren,

dunkelgrünen Rasen zusammendrängen. Ohne den armbüschigen Blumenstiel mit seinen blassgelben Blumen würde man die Pflanze sicher zu den Gräsern zählen. Aber nicht einmal das Schaf läßt sich dadurch täuschen; es rührt, wie man sagt, das Kraut nicht mehr an. Kein Wunder, daß auf den Dolapensia-Weiden, welche den „Fraunen“ Jeslands entsprechen und kaum im Stande sind, das Bodens Böse überall zu bedecken, das Kind, das Schaf, das Pferd nicht mehr gedeiht. Nur das Ren vermag auf diesen unendlichen Flächen, die in ihrer kargen, starren Pflanzendecke alle Zeichen eines rauhen und stürmischen Klima's an sich tragen, auszubauern. Sie ist darum zugleich diejenige Region, in welche der lappische Renthier: Hirt im Sommer zieht, wenn in den Thälern Moskitoschwärme die Luft verfinstern und das Leben unerträglich machen.

In der arktischen Lesebene Rußlands fand Blas

sius die Wiesen nur an das Bergland geknüpft. Doch treten sie hier nur noch im Süden der arktischen Zone an der Grenze des Waldlandes auf, wo sie als reizende, mit Orchideen geschmückte Bergwiesen einen äußerst freundlichen Gegensatz zu dem Sumpflande der Niederung bilden. Dieses nimmt einen völlig norddeutschen Charakter an. Denn wo an den Waldrändern irgend ein Sumpf erscheint, da umsäumt ihn eine dichte Vegetation (*Stratiotes aloides*, *Caltha palustris*, *Ranunculus-Arten*), während der Wasserpegel von Leichroden (*Nuphar intermedium*), *Hydrocharis morsus ranae* und anderen schwimmenden Pflanzen besetzt wird. Das ist aber die Zone, wo noch das Elen zahlreich weidet, noch Lemminge, Hasel- und Schneehühner, Birk- und Auerhühner den Schutz des Waldes suchen. Nördlich von ihr liegt das Polarsteeland.

## Vom Monterosa zum Montblanc.

Von Otto Ullrich.

### 5. Uebergang über den St. Theodulpas.

Wer Zermatt auf einem andern Wege, als er gekommen, dem Laufe der Visp folgend, verlassen will, dem bleiben nur beschwerliche Gletscherpässe übrig. Will er sich nach Osten zum benachbarten Saasthal wenden, so muß er die schroffe Gebirgsmauer des Saastgates übersteigen, und dort hinüber führen ihn nur 12—13,000 Fuß hohe Pässe, wie der Alphubalp, über gefahrvolle, steile und spaltenreiche Gletscher, wie den Täsch, und den Klein-gletscher. Will er in die westlichen Nachbarchäler, das Einsiedenthal oder das Eingerethal, so steht ihm nur einer der großartigsten, aber auch beschwerlichsten Gletscherpässe, der Evolunapass offen. Ist Italien sein Ziel, und will er in das Anzascardal und von da zu den italienischen Seen gelangen, so muß er sich für den beschwerlichsten, jedenfalls mühevollen und einen schwindelhaften Kopf verlangenden Weißthorpass entscheiden. Will er endlich — und das war mein Fall — zu dem schönen Thale am Südfuß der Alpen, dem Aostathal, hinübersteigen, um sich von diesem an den Südfuß des Königs der Alpen, des Montblanc, geleiten zu lassen, so hat er den zwar wenig gefahrvollen, aber keineswegs ganz unbeschwerlichen St. Theodulpas oder das Matterjoch zu überschreiten.

So entbehrlich auch ein Führer in den Alpen ist, so lange man auf Touristenpfaden wandert, wo die Wege leicht zu finden und überall Menschen sind, bei denen man Erkundigungen einholen kann, so dringend ist ein solcher bei Gletscherwanderungen geboten, wo verborgene Spalten drohen und ein kleiner Unfall für den Kleinstehenden von den verhängnisvollsten Folgen werden kann. Ich hatte für meine Wanderung über das Matterjoch bereits in Randa, unterhalb Zermatt, einen vorzüglichen Führer

gewonnen, der freilich über seine Walliser Berge noch nicht viel hinausgekommen war, diese aber auch als Gensjäger und später als Fremdenführer recht gründlich kennen gelernt hatte, so daß es kaum einen Gletscherpass und kaum einen Stoppel gab, dem er nicht schon einen Besuch abgestattet hatte. Seinen Führerberuf schien er nur gelegentlich auszuüben, da er eine eigene kleine Wirthschaft in Randa hatte; aber man sah es ihm auch an, wie es weniger die Sucht nach Erwerb, als die angeborene Wanderlust war, die ihn immer wieder selbst zu gefahrvollen Gletscherfahrten und Bergbesteigungen trieb. Von kräftigem Körperbau und großer Gewandtheit, unerschrocken und unermüdet und dabei besonnen und kaltblütig in Gefahr, mußte Johann Schaller das Vertrauen jedes Reisenden gewinnen, der sich seiner Leitung übergeben hatte, wie er ihm durch seine unverwundliche Heiterkeit, seine Bescheidenheit und Aufmerksamkeit ein angenehmer Gefährte wurde.

Der Himmel schien meine Wanderung nicht besonders begünstigen zu wollen. Da man auf den Marsch von Zermatt bis Val-Tournaire gewöhnlich 10—12 Stunden rechnet, und da ich mein Ziel gern noch vor Abend erreichen wollte, so war es meine Absicht, wie es überhaupt bei Gletscherwanderungen rathsam ist, in möglichst früher Morgenstunde aufzubrechen. Als mich aber mein Führer weckte, hätte es des unverkennbaren Gedränges draußen gar nicht bedurft, und schon ein Blick in das niedergeschlagene Gesicht meines Führers hätte mir sagen müssen, daß es regne. Zu keiner Zeit ist der Regen so arg der Störenfee, als wenn man einen Ausflug in die Hochgebirgsregionen vor sich hat. Das Raswerden ist

das Geringste; aber aller Reiz der Wanderung ist vernichtet, wenn man im Nebel an den großartigen Scenen der Natur vorübergehen soll, auf schlüpfrigen Pfaden, an Abgründen hin, deren Schreden, aber auch deren Reize der tückische Nebel verhüllt. Was hilft es, wenn man nach stundenlangen Anstrengungen die Höhe erklimmen hat! Der Blick auf die vereisten Zinnen des Gebirges, in die Schluchten und Thäler ist versagt, der Uebers-

werden einen herrlichen Tag haben. Meine letzten Zweifel besiegte mein freundlicher Wirth. Dort oben, meinte er, hat es so arg nicht geschneit, und der Gletscher ist überhaupt nicht schlimm; nur der Weg wird etwas schlüpfrig sein und Vorsicht erfordern. Das kümmerte mich wenig, und nach einer halben Stunde trat ich wirklich heiteren Sinnes meine schon aufgegebene Wanderung an.



Das Thal von Val-Tourmaire und das Matterhorn.

blick, den man gewinnen wollte, der Einblick in den Bau des Gebirges, der Hochgenuss des Gefühls, eine Welt zu seinen Füßen zu sehen, Alles ist vereitelt. Aber was noch schlimmer ist, der Regen im Thale verwandelt sich im Hochgebirge in Schnee; denn in Höhen von 8—9000 Fuß fällt in den Alpen selten noch Regen. Man hat also die Aussicht, durch knietiefen lockern Schnee zu waten, der jeden Schritt erschwert, der zugleich die gähnenden Spalten und Klüfte des Gletschers mit täuschender Hülle verdeckt und jeden Schritt zu einem gefährvollen macht. Daß ich unter solchen Umständen auf die Ausföhrung meines Unternehmens verzichtete, fand selbst der Führer selbstverständlich. Als ich daher ziemlich verdrießlich gegen 7 Uhr in den Frühstücksalon des Hótel's eintrat, war ich nicht wenig verwundert, meinen Führer freudigen Muthes zu finden. Das Wetter klärt sich auf, sagte er, und wir

Führer und Wirth hatten recht prophezeit. Noch ehe ich das Dorf verlassen hatte, hörte der Regen auf, und bald wölbte sich über mir ein Himmel von seltener Reinheit. Rüstig ging es nun die steile Bergwand hinauf, die gegen Süden das Thal von Zermatt verschließt. Bald hatten wir die Wälder unter uns, und bald war auch der Furenbach überschritten, der aus dem gewaltigen Eisthor des Furengletschers hervortritt und quer über den schmalen Pfad schäumend die von Schiefergeröll bedeckte Wand hinabstürzt. Vor uns eröffnete sich ein wunderbarer Blick auf den mächtigen Schneehäupter zum linken, über dem sich die zahlreichen Gletscher zur Linken, während zur Rechten über dem Furengletscher der wunderbare Felszahn des Matterhorn's in die Lüfte ragte. Am Fuße des Theodulgletschers überholten wir eine Gesellschaft von Engländern, deren

Damen sich von Maulthieren bis auf diese Höhe hatten tragen lassen, obwohl ich sie später recht mager durch den Schnee waren sah. Mein Wirth in Zermatt hatte Recht gehabt, die felsche Schneedecke des Gletschers war nur schwach und erschwerte das Gehen kaum; der Gletscher selbst zeigte auch wenige Spalten, und die meisten waren von sicheren Eisbrücken überdeckt. Die ganze, zweistündige Wanderung auf dem Gletscher glich einem behaglichen Spaziergang. Auch der kleine Schneefall, der uns auf der Höhe überraschte, trug nur zur Erhöhung des Genusses bei. In diesen Regionen fällt der Schnee nicht in Form großer, lockerer Flocken wie bei uns, sondern als feiner, nadelartiger, kristallinischer Staub. Man bemerkt ihn kaum, wenn er in glühenden Pünktchen die Luft erfüllt, und saunt, wie schnell er sich am Boden anhäuft. Wegen seiner staubartigen Beschaffenheit haftet dieser Hochschnee an stark geneigten Wänden nicht leicht, da er, ein Spiel der Lüfte, vom leichtesten Windstoß aufgewiebelt und den tiefer liegenden Firnmulden zugetragen wird. Aber so unschuldig in kaum bewegter Luft dieser Schnee miterschen, so konnte ich mir doch vorstellen, wie gefährlich er dem Wanderer werden kann, wenn er mit Stürmen sich verbündet, die zu dem niederrieselnden Staube die lockeren Schneefächeln aufwühlen und die Luft in dichte Finsterniß hüllen, so daß der künftige Führer die Richtung verliert, während unter den Füßen von loedern Schnee verwehte Spalten drohen, und die Glieder von dem eiligen Staube, der die dichtesten Kleider durchdringt, erstarren.

Endlich war die Passhöhe erreicht. Zur Rechten steigt aus der Schneefäche ein Felsenkamm auf, wie eine Klippe im Polarmeer, kalt und nackt; denn der Sturmwind, der ihn beständig umstößt, bildet kleinen Schnee an seinen Wänden. Am Rande dieses Kamms erhebt sich ein seltsames Bauwerk — eine Reboute mit Schießscharten, 10,500 Fuß über dem Meere, hoch über jeder menschlichen Wohnung, gewiß das höchste Festungswerk in Europa. In Verbindung mit einem zweiten Werke gleicher Art bildet diese Schanze eine Reihe von Verteidigungswerken, welche die Bewohner von Val-Tournanche wahrscheinlich im Mittelalter gegen die Einfälle der Wälfier errichtet haben, jedenfalls zu einer Zeit, wo der Paß noch leichter gangbar war als heute. Jetzt sind diese Bauwerke nur Ruinen. Aber neben ihnen erheben sich andere friedlicherer Natur, in neuester Zeit erst errichtet, von gleich festen Mauern umgeben, die der Wanderer mit Freuden begrüßt, wenn er vom Gletscher über wild durcheinandergeworfene Felsblöcke zur Kammhöhe emporgeklettert ist. Es ist die höchste Werkstätte der Wissenschaft, das von dem berühmten Eisfässer Gletscherforscher Dollfus-Auffet errichtete Gletscher-Observatorium. Schon seit länger als 25 Jahren ist dieser verdienstvolle Gelehrte mit Untersuchungen beschäftigt, welche die Begleibungen feststellen sollen, die

zwischen den Erscheinungen der Atmosphäre und der Bildung der Gletscher stattfinden. Nicht bloß in der Schweiz, auch in Schottland und Spanien, auf den Pyrenäen, in den Bergen von Wales und in der Sierra Nevada hat er seine Beobachtungen angestellt. Der Eisavallum am Rande des Unteraargletschers ist sein Werk, und wochenlang hat er in manchem Sommer in dieser Einsamkeit verweilt, um die Veränderungen des Gletschers zu beobachten. Noch in seinem 71. Jahre schlug er seine Beobachtungsstätte auf dem Theodulpaß auf. Hier hatte schon der berühmte Saussure im J. 1792 seine Hütte errichtet, von der noch lange Spuren sichtbar waren, und mit seinem Sohne 3 Tage lang darin verweilt, um Gletschersbeobachtungen zu machen. Er hatte damals sein Bedauern ausgesprochen, diesen Platz nicht früher gekannt zu haben, da er höher liegt und der Zugang weit unsicherer ist, als jene Stelle des Col du Grand auf dem Montblanc, an der er lange Zeit unter unsäglichem Mühen und Kelden seine wichtigsten Untersuchungen angestellt hatte. Dollfus kam zuerst im J. 1864 hierher und verweilte einige Sommerwochen in seiner einsamen Hütte. Im August 1865 aber, wo er zum zweiten Mal hereaufkam, ließ er zwei Führer, Gaspard und Jacob Blatter, die er in seinen Beobachtungsmethoden unterrichtet hatte, hier zurück, und diese haben 13 Monate hier zugebracht, im Winter oft wochenlang von jedem Verkehr mit den Thälern abgeschnitten, von wilden Stürmen umstößt, denen ihre Hütte kaum Widerstand zu leisten vermochte, so daß sie von den Bewohnern von Val-Tournanche bereits als verloren betrachtet wurden. Das Ergebnis der von ihnen angestellten Beobachtungen ist ein höchst interessantes. Die mittlere Temperatur des Jahres betrug in dieser Höhe nur  $-6^{\circ},11^{\circ}\text{C.}$ , und der kälteste Monat war der März mit einer Mitteltemperatur von  $-12^{\circ},79$ . Existirt kein Sommermonat dergl., in dem nicht das Thermometer unter den Gefrierpunkt gesunken wäre, und im Juli und August sank es sogar einige Male auf  $-9$  und  $10^{\circ}$ . Der wärmste Monat, der September, hatte doch nur eine Mitteltemperatur von  $+1^{\circ},16$ . Man wird es bei solchem Klima begreifen, wenn der Wanderer, der diese Elnöde betritt, sich in eine spitzbergische Landschaft versetzt glaubt. Ein eisiger scharfer Wind weht ihm entgegen, und wohn er das Auge wendet, erblickt er nur Schneefächeln, in denen die Steinhütten und die schwarzen Klippen des Kammes die einzige Unterbrechung bilden. Kein Thier belebt diese Elnöde, die einzige Schneemaus ausgenommen; selbst Gamsen und Murmelthiere gibt es hier nicht, nur eine Alpenkrähe oder eine verlorne Lerche sieht man blöwellen. Die Pflanzenwelt ist zwar noch nicht ganz verschwunden, aber sie erregt doch keine Aufmerksamkeit. Trotz der niedrigen Temperatur und trotz des fast nie weichen Schnees entlockt doch die Sonne dem Schlehtoden des Kammes selbst einige Blüthenpflanzen, deren

bereits 23 Arten gesammelt wurden. Ich fand nur einen Raum von wenigen Quadratruthen in der Nähe der Hütten vom Schnee entblößt und offenbar auch erst seit wenigen Tagen, und auf diesem blühten einige verkrümmete *Ranunculus glacialis*.

In solcher Einöde wendet sich das Auge unwillkürlich in die Ferne. Die Aussicht ist zwar beschränkt, namentlich nach der italienischen Seite, aber der Blick in die Hochgebirgswelt ist großartiger als irgendwo, selbst als die berühmte Aussicht vom Gornegrat. Da stehen sie vor uns, greifbar nahe, wie man von der in solchen Höhen gewöhnlichen Täufchung besangen wähnt, die schneebedeckten Riesenhäupter der Alpen, die Monte Rosa-Gipfel, der Eyskamm, die Zwillinge, das schöngeschwungene Breithorn, da steht sie vor uns zur Rechten in furchtbarer Majestät, die Riesensäule des Matterhorns. Man habe ich einen so stolzen Gipfel gesehen, und einzig vielleicht steht er unter den Bergen der Erde da. Wie scharf sind diese Kanten, wie schroff diese Wände, an denen kein Schnee haftet; und doch hat sie der Mensch bewungen, doch hat sein Fuß diesen drohenden Felsgahn erklimmen und erklimmt er ihn jetzt noch alljährlich! Freilich hat auch seine Besiegung blutige Opfer gekostet; dort, von jener breiten Wand,

führten vor wenigen Jahren zwei kühne Engländer beim Herabsteigen von dem bewungenen Gipfel mit zweien ihrer Führer in den gähnenden Abgrund.

Lange hat diese wunderbare Felsbildung auch den Geologen Kopfzerbrechen verursacht. So in seiner scharf begrenzten Form konnte dieses Felsstück nicht aus dem Erdenchoß aufsteigen sein. Noch räthselhafter erschien seine deutliche Schichtung, die man selbst aus der Ferne erkennt, und die darauf deutet, daß ein Schiefergesein, also ein Sedimentgebilde seine Masse zusammenfand. In der That haben die Befieger seine Gipfel aus demselben grünen Schiefer gebildet gefunden, der 3000 Fuß tiefer an den Gehängen des Gebirges hervortritt, und der hier auf einer Unterlage von Gneis und Glimmerschiefer ruht. Wie kommt ein Meeresegebilde auf diese Höhe, die der des Montblanc nur um wenige Hundert Fuß nachsteht? Gewaltige Umlagerungen müssen stattgefunden haben, bevor die Alpen hier ihre heutige Gestalt erhielten. Zu einem mächtigen Gewölbe muß der geschichtete Boden einst emporgeschwollen sein, und ein furchtbarer Zusammensturz dann dieses Gewölbe zertrümmert haben, aus dem eine letzte Säule, das Matterhorn, noch zeugt von der Höhe des gesunkenen Bau's.

## Der Farbenwechsel bei den Pflanzen.

Von Hermann Meier.

Die Farben der Pflanzen verändern sich oft. Für Menschen ist es bekannt genug, daß z. B. Pflanzen, wenn ihnen theilweise das Licht entzogen wird, blaß werden, daß ihre Früchte sich bei der Reife färben, daß die Blätter im Herbst gelb, braun, roth u. s. w. werden. Andere Farbenveränderungen sind weniger bekannt, weil sie erst nach längerer Zeit in's Auge fallen. Die Koggenfelder zeigen z. B. im Winter eine der schönsten grünen Tinten, welche wir kennen. Man besuche sich nun Blatt und Stiel derselben Pflanze in ihrem blühenden Zustande, und man wird die Farbe in eine bläuliche oder meergrünliche verändert finden. *Brassica Napus* und *B. Rapa* sind im Winter leicht zu unterscheiden; erstere ist bläulich, letztere dunkelgrün; erstere hat anfangs feinhaarige, später kahle, letztere rauhaarige Blätter. In der Blüthezeit haben beide dagegen bläulich-grüne Blätter und sind sehr schwer von einander zu unterscheiden.

Die Farbe der Pflanzen ist bei Weltem nicht so stetig, als bei der Thiere. Theilweise rührt dies daher, daß die Farbe der Oberfläche bei den Thieren nicht in einer Färbung der Zellenwände selbst besteht, sondern von dem Inhalt der Zellen oder eigentlich von gefärbten Theilchen in dem Zellenfakt, dessen Farbe man durch die durchscheinenden Wände der Zellen wahrnehmen kann, abhängig ist. Eine gefärbte Flüssigkeit hat natürlich eine viel beweglichere und veränderlichere Färbung, als wenn die Färbung in das feste Gewebe des Stoffes selbst eingedrungen ist. Die gefärbten Theilchen heißen Blattgrün oder Chlorophyll und fehlen nur in den allereinfachsten Pflanzen, z. B. bei den Schwämmen und Flechten (*Lichenes*), bei welchen letzteren man nur leise Andeutungen jenes Farbestoffes gewahrt.

Das Blattgrün besteht aus einer nachartigen Menge und aus dem eigentlich färbenden Stoff. Dieser letztere

wird durch den Einfluß des Lichtes gebildet und verschwindet langsam wieder, wenn die Pflanzen dem Licht nicht mehr ausgesetzt sind. Dann bleibt eine gelbliche Farbe zurück. Eine grünlige Färbung findet man nur bei den gefunden Pflanzen. Daher kommt es, daß die gelbliche Farbe unseres Winterkorns oder anderer Gewächse mit Recht als ein Zeichen des Kränkels angesehen wird. Im Frühling ist die Farbe der Blätter erst blaß, weil die Blätter dann noch zu jung und dadurch zu hart sind, um ihre volle grüne Farbe zu entwickeln. Man sieht dies besonders, wenn im Frühling die Wärme oft plötzlich sich einstellt, so daß die Blätter durch die Wärme sofort erscheinen, aber noch nicht die Zeit gehabt haben, ihre gute grüne Farbe zu bilden. Vor einigen Jahren las man einen Bericht aus Nord-Amerika, wo bekanntlich eine Jahreszeit direkt der andern folgt, daß daselbst ein ganzes Gebüsch durch plötzlich auftretende Wärme sich vollständig belüftet habe, sich aber anfangs fast ganz weiß zeigte, welche weiße Farbe allmählig in eine grüne überlag.

Kossmäler macht in seinem Buche „Für freie Stunden“ S. 101 die hübsche Bemerkung, daß das Grün vielleicht darum symbolisch die Farbe der Hoffnung genannt werde, weil wir jedes Jahr dem Wiedereerscheinen des neuen Grüns mit dem größten Verlangen entgegensehen.

Es ist für die Bildung der echten, grünen Farbe wohl erforderlich, daß das Licht die Pflanze erreicht, aber das Grün kann sich auch in Pflanzentheilen zeigen, die nicht unmittelbar dem Licht ausgesetzt sind. Wenn man z. B. die silberfarbige dicke Dberhaut des Hollunders (*Sambucus nigra*) abschabt, zeigt sich darunter eine sehr dunkelgrün gefärbte Rinde. Wenn man die hübschen orangefarbenen Früchte des Spindelbaums (*Eriomyrus europaeus*) und deren Samen durchschneidet, fallen die

deutlich grünen Samenlappen mitten im Einwick sehr in's Auge.

Durch unmittelbare Einwirkung des Lichtes bildet sich auch, wiewohl seltener, in einzelnen Theilen eine grüne Farbe, wo solche sonst im natürlichen Wege nicht erscheint. Man sieht dies in den über dem Boden wachsenden Wurzeln der Knabenkräuter (Drachiden), bei verschiedenen Polihos-Arten in unseren Gewächshäusern, bei *Phalangium viviparum* u. s. w. Rosmäpfer (a. o. D. S. 108) sah auf einer Auskultung alle in offenen Kästchen dem Licht ausgesetzten Kartoffeln grün werden, so daß sie wie Binsen aussehcn, während alle die, welche tiefer in den Kästchen lagen, ihre natürliche gelbliche Farbe behielten hatten. Kartoffeln, die über der Erde wachsen, erhalten meistens eine grüne Farbe und sind wegen des darin sich bildenden Solanin schädlich. Beim Zubereiten der Speisen sollte man sie wegwerfen.

Die Herbstfarbe der Blätter steht mit ihrem Abgelbstsein in dieser Jahreszeit in Verbindung. Die Blätter haben dann ihr Alter, folglich nicht mehr die Kraft, die grüne Farbe zu bilden. Daher kommt es, daß bei vielen Gewächsen — *Melaleuca* und *Meteorosideros* — die Herbstfärbung mit der des ersten Frühlings übereinstimmt. Die Färbung der abgelebten oder, wie man auch sagen könnte — der reifen Blätter gleicht in der Hauptsache der der reif werdenden Früchte. Die rothe, gelbe und braune Farbe der Früchte ist freilich oft anders als die Linte der im Späthjahr gefärbten Blätter; aber beide Erscheinungen haben den Mangel an grünem Farbstoff gemein, trotzdem sie dem Lichte vollkommen ausgesetzt waren. Keingrüne Früchte sind selten.

Auch bei den Blumen sieht man mancherlei Farbenwechsel. Nicht nur, daß von weißen roth oder blau oder anders gefärbten Blumen auch viele Varietäten auftreten, z. B. beim Fingerhut (*Digitalis purpurea*), *Viola* *fraxinella*, *Polemonium coeruleum* u. s. w.; auch die Farbe einer und derselben Blume verändert sich nach dem Maße ihres jüngeren oder späteren Lebens. Eine hübsche Veräggemeinschaft (*Myosotis stricta*), durch ihre fast ungetheilten Blumen von den andern Arten leicht zu unterscheiden, hat Anfangs eine weiß-gelbe Blumentrone, die zuletzt eine hübsche blaue Farbe annimmt. Etwas Ähnliches findet bei Arten von *Symphylum*, *Pulmonaria* und *Anchusa* statt.

Die in unsern Gärten nicht selten vorkommenden Arten von *Lantana* haben erst entweder gelbe Blumen, die in Orange übergehen, oder weiße, die später rosenroth werden. Der in warmen Ländern vorkommende *Hibiscus molubilis* hat an einem und demselben Tage erst weiße, dann rothe und zuletzt violette Blumen. Solcher Beispiele wären noch mehrere anzuführen.

Bunte, besonders blassfarbige Blätter sind durchgehend schwächer als gewöhnliche grüne. Wenn man z. B. eine bunte, blassgelbe Ulme hat, an welcher sich zwischen den blassgelben einzelne grüne Zweige entwickeln, so werden erstere von letzteren in kurzer Zeit vollständig verdrängt.

Chemische Einflüsse können auch, da sie die Säfte der Pflanzen verändern, eine Veränderung der Farbe erzeugen. Bekannt ist die blaue Färbung der sonst rosen-

rothen Blumen der *Hortensia*, wenn man der Erde Eisen beimischt. Auch bei andern Pflanzen findet man in Folge verschlehten Bodens eine Farbenänderung.

Die Farben der Pflanzen können auch noch durch andere Ursachen erzeugt werden, als durch Veränderungen im Saft der Zellen, z. B. durch das Vorkommen von Haaren, wie man es am deutlichsten bei den *Platanen* sieht. Die dichtbehaarten Blätter zeigen sich im Juli als weiße Fiedle zwischen dem übrigen dunkelgrünen Laub. Wenn später die Blätter die Haare verändern, erscheinen jene wieder grün. Eine gleiche Ursache haben die erst weißen, dann gelben oder braunen Fiedle der *Walnuß* (*Juglans regia*), der *Linde*, des *Weinstocks* u. s. w. Früher zählte man diese farbigen Fiedle zu den Schwämmen, jetzt hat man aber längst eingesehen, daß solche einfach Anhäufungen von aus der Oberfläche der Blätter hervorsprossenden Haaren sind.

Daß übrigens auf der Oberfläche der Pflanzen wachsender Raß, Schimmel: oder andere Wucherpflanzen die Oberfläche ein anderes Ansehen und zugleich häufig eine andere Farbe geben, liegt auf der Hand.

In betterer Stelle verändern kleine Lufthöhlen, die sich an der Unterseite der Blätter befinden, die Farbe der Oberfläche. Darum haben so viele Blätter an der unteren Fläche eine bläuliche Farbe als an der oberen. Wenn man ein solches Blatt unter die Luftpumpe bringt, die Luft so weit als möglich daraus entfernt und es dann sofort in's Wasser steckt, so daß sich die kleinen Lufthöhlen mit Wasser füllen können, so ist die blaue Farbe ganz oder größtentheils verschwunden.

Eine noch zu wenig beachtete Ursache der Farbenveränderung ist die Aufschwemmung meistens wachstüchtiger Stoffe an der Oberfläche. Drartig ist das Wachs der blauen Pfäumen, die weißliche Färbung der Blätter einiger *Callia* und *Mesembryanthemum*-Arten, die weißliche Farbe des blühenden Krogens, der Blattfcheiden der sechszelligen Gerste (*Hordeum hexastichon*) und einiger Weizenarten, welche, wie bei den Pfäumen, sich durch Abwischen entfernen läßt. Vielleicht dient diese wachstüchtige Bedeckung der Oberfläche zugleich dazu, um die sonst zu starke Aethmung der Wassertheile bei warmer und trocknerwitterung zurückhalten (wie das Verschließen vieler Spaltöffnungen durch ausgeschwittes Harz bei einigen Nadelholzarten) und umgekehrt, um saftreiche Früchte und Blätter gegen den nachtheiligen Einfluß von Plagregen zu schützen. Man kann die mit dem angedeuteten weißlichen Duft bedeckten Arten von *Callia* in's Wasser stecken, ohne daß sie naß werden; solches geschieht aber sofort, sobald jener Duft entfernt und die grüne Farbe hervorgehoben ist.

Man weiß, daß Regen, die nach langer Dürre die Erde erfrischen, allen grünen Theilen ihre hübsche Farbe wie in einem Augenblicke zurückgeben. Theilweise ist dies allerdings dem Abwaschen der Pflanzen zuzuschreiben, so wie dem Umstande, daß die Zellen der Oberfläche nun von Staub gesäubert in lebendiger Spannung arbeiten; aber theilweise scheint auch das Abregnen der wachstüchtigen und anderer an der Oberfläche ausgeschwittter Stoffe hier in Betracht zu kommen.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Bereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 39.**

[Nachzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schencks'scher Verlag.

**29. September 1869.**

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Abonnement für das nächste Vierteljahr (October bis December 1869) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Fortsetzung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unsrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1868, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben sind.

Halle, den 22. September 1869.

Inhalt: Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 6. Die Gras- und Kräuterdecke. Zweiter Artikel. — Haselnuß und Urke, von G. Dener. — Die nassauische Dillagerde, von Karl Rub.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 6. Die Gras- und Kräuterdecke.

Zweiter Artikel.

Der Charakter des Polargraslandes ist der, daß es zusammenhangslos als Dase in der Steppe oder auch selbständig auftaucht. Diesen größten Zusammenhang erlangt es noch an den Ufern der See'n und Flüsse, und darum unterscheidet man es auch im Taimyrlande Nord Sibiriens als Kalby, d. h. als eine Kieflähe, die, weil sie im Frühjahr von den anschwellenden See'n und Flüssen zeitweise überschwemmt und gebüngt wird, noch eine Pflanz-

genbede hervorbringt, die man allenfalls eine Grasnarbe nennen könnte. Sie besteht aus Gräsern, Niedgräsern und Wiesengetreiden (Juncaceen), in die sich arktische Zwergweiden und Kräuter weben. Hier ist es, wo das Renthier im Sommer seine Weide sucht und diese um so mehr findet, als das Grasland an seiner Grenze in eine Kräuterflur ausläuft. Ganze Flächen sind mit einem lebhaften Grün, mit Farben aller Art geschmückt; besonders



gegen das Wasser der Laimmer fließen die Kräuter 1 f. hoch auf: blaue Polemonien (*Polemonium humile*), rothe Anätheide (*Polygonum bistorta*), der artische Mohn (*Papaver nudicaule*) mit seinen Schmelzblumen, feinklättrige Kressen (*Sisymbrium siphoides*), Kittersporen (*Delphinium Middendorffii*), Käufstraüter (*Pedicularis hirsuta*, *Langsdorffii*, *capitata*, *Sudetica*), Johannis (*Oxytropis Middendorffii*, *arctica*, *nigrescens*), Grasnelken (*Armeria*), Steinbreche (*Saxifraga aestivalis*, *serpyllifolia*, *bronchialis*, *oppositifolia*, *stellaris*, *cespitosa*, *cernua*, *nivalis*, *rivularis*, *angelaris*), nelkenwurzelähnliche Stiefversen mit gelbigen Blumen (*Sieversia glacialis*), verschiedene Compositen (*Nardosmia Gmelini*, *Chrysanthemum Sibiticum*, *Senecio rosedifolius*, *Saussurea alpina*) u. A.; — eine Pracht, die man kaum zwischen 74—75° n. Br. erwartet! Mit Recht betrachtet man darum auch das Auftreten von Grasoasen als das Zeichen eines milderen Klima's.

Solche Erscheinungen hat jedes Polarland aufzuweisen, je nachdem der Pflanzenwelt die Verhältnisse günstig sind. In der Regel ist dann aber die Kräuterkflur mit dem Graslande verbunden. Von den landschaftlichen Zeichen, die man der grönländischen Küste um die Discoebucht im Sommer nachrühmt, will ich nicht einmal reden, da sie zu süßlich liegt. Aber selbst unter 72° n. Br. fand es Hr. HAYES bei Proben im mittleren Grönland kaum anders. Ein dichter Rasen von Moos und Gräsern bedeckt hier ein schönes Thal, welches, eingeschlossen von Felsen, nicht allein durch die Wärmestrahlung ein milderes Klima, sondern auch durch die vielen kleinen Ströme von Schmelzwasser hinlängliche Feuchtigkeit erhält. Oft erinnert die Ueppigkeit der Gräser (*Poa arctica*, *Glyceria arctica*, *Alopecurus alpinus*) an ein Marschland voll der schönsten Blumen. Ueber dem Grün flattern Vorlader kleiner Möhre mit goldenen Blumentronen; der Löwenzahn (*Taraxacum officinale* var. *lividum*) leistet ihnen Gesellschaft; zuweilen läßt sich ein Hahnenfuß (*Ranunculus nivalis*) sehen, und sowohl Fingerkraut wie purpurne Käufstraüter stehen hier und dort; auch die Steinsbreche, — purpurn, gelb und weiß, — sind sehr zahlreich und liefern gegen 7 Arten; die Birke, die schwarze Krähenbere und die schöne Grante (Grönlands Haldekraut) wachsen zusammengeflochten in geschützten Winkeln zwischen den Felsen, und die Weiden küssen auf dem schwammigen Rasen schwach um ihr Dasein, so daß man einen ganzen Wald mit seiner Mäße bedecken könnte. Solcher Däsen kennt man an der Westküste Grönlands mehrere. Unter Anderen beobachtete Inglesfeld eine solche unter 77½° N. am Eingange des Whales-Sundes, die, aus Gräsern (*Alopecurus alpinus*, *Poa alpina*, *caesia*) bestehend, „mit der Sense hätte gemähet werden können.“ Selbst an der eisgepanzerten Ostküste fand SCOCROFT das Gras einmal „so dicht und grün wie eine Wiese,“ aber auch die Sommerwärme auf Fel-

senboden drückend. Westlich von Grönland, ist die Pondöbal am Eingange zum Eilpse-Sund durch Mac CLINTOCK als eine Fertlichkeit bekannt geworden, die einen „sehr süßlichen Charakter“ an sich trägt. An den 7 bis 800 Fuß hohen Küstenerhebungen steigt eine üppig grüne Vegetation von unten bis oben die Klippen hinauf, und augenblicklich finden wir auf ihr Däsen ein Sommerdorf der Eskimo's hier angelegt. Eine ähnliche Dase beobachtete Mac CLINTOCK, der berühmte Entdecker der „nordwestlichen Durchfahrt“, auf der langen Küstestrecke des nordamerikanischen Continents am Cap Bathurst. Gleichzeitig stellt sich aber auch hier eine bedeutende Menge von Wild ein, das wiederum zahlreiche Eskimo's dahin lockt.

Im Allgemeinen ist derjenige Boden der günstigste, welcher der geringste und poröseste ist. Ein solcher läßt das Eiswasser rasch abfließen, wenn er hart, und schnell durch sich hindurchfließen, wenn er kieselig ist. Daber kommt es, nach EUTHERLAND, daß die Melville-Insel, Westgrönland und Spitzbergen eine weit reichere Flora besitzen, als das unter gleichen Verhältnissen gelegene Cornwallis im arktisch-amerikanischen Archipel. Dieses hat einen thonigen und mergeligen Boden, welcher das Wasser zurückhält und stehende Moräste, Flechtentundren erzeugt, während jene Länder reich an Sandstein, reich aber auch an anheimelnden Grasoasen sind. Darum fand auch FRANKLIN an der Stromschnelle des „Wassfalls“, vor der Mündung des Kupfermineralflusses in das arktisch-amerikanische Eismeer, den aus rothem Sandstein zusammengesetzten Boden reich mit Gras bewachsen, während die feuchteren Regionen der Kupferblauer reine Steppenländer sind. Wesentlich fördert thierischer Dung diese natürliche Güte. In dieser Beziehung wirken die Regionen arktischer Seevögel höchst vorthellhaft ein. Wo sie ihre Brutplätze haben, berühren sie sich häufig zu Tausenden; oft kann man keinen Schritt vorwärts thun, ohne sich eine Gasse durch ihre Eier bahnen zu müssen. Hier legen die Vögel einen Guano ab, der, durch die atmosphärischen Niederschläge von den Höhen zu den Niederungen geführt, diese alljährlich auf's Neue düngt. Niemand stellen sich wahrhafte Däsen ein; wahrscheinlich, weil durch die Zerlegung des Düngers zugleich eine größere Wärmesumme erzeugt wird. Wo Solches geschieht, erzählt MALMGREN von Spitzbergen, da wird man nicht weniger von der bunten Mannigfaltigkeit der Pflanzendecke, als auch von ihrer außerordentlichen Ueppigkeit und Reizung in Erstaunen versetzt. Hier wird der Hahnenfuß (*Ranunculus sulfureus*) über 1 Fuß hoch; unter Kiesel- und Hornkräutern (*Cochlearia fenestrata* und *Cerastium alpinum*) kann man bis an die Knie waten. Steinbreche (*S. nivalis* und *hieraicifolia*), Käufstraüter (*P. hirsuta*) und Alpenhabarber (*Oxyria digyna*) wachsen hoch über ihr gewöhnliches Maß hinaus; grasartige Pflanzen (*Luzula hyperborea*, *Alopecurus alpinus*, *Dupontia psillo-*

santha und Fischer!) steigen, odgleich sonst niedrige arktische Pflanzen, dicht empor aus dem Moosbette, das am Fuße des Berges eine ausgebreitete grüne Matte bildet; selbst zwerge Gräser (*Poa cenisia* und *stricta*) gedeihen in großer Ueppigkeit und doch wehen nicht diese Gräser, sondern Moose (*Hyppnum* und *Aulacomnion*) die zusammenhängende grüne Matte. Nur ausnahmsweise sollen an den Fjorden der Süd- und Südwestküste, die von dem Golfstrome getroffen wird, Grastratten vorkommen; im Norden des Landes unter 80° n. Br. finden sie sich nicht mehr, sowie sich auch die gefüllerten Nasen nur einschießen, wo Granit, Gneis und Schiefer als die Wärme am meisten bindenden Gesteinsarten die Lehnen der Gehänge bilden. Wo sedimentärer Kalk auftritt, da flüchtet die Vegetation wie vor einem Feinde; selten ist ein grüner Fleck von Moosen, selbst die genügsamsten aller Pflanzen, die Fischen, weichen ihn. Soweit das Auge reicht, schmelzt es über nichts, als über eine weißgraue Decke getrümmerten Kalksteins. Offenbar ist derselbe viel zu kalt, weil er als weißes Gestein die Wärme sofort wieder an das Luftmeer abgibt. Auch in unseren Alpen, besonders den dolomitischen, bemerkt man diese Thatsache, zu der sich oft als zweites Hinderniß einer kräftigen Vegetation der Mangel an Kalk, also eine schwere Vermwitterbarkeit des Kalksteins gesellt. Selbst auf dem noch eiskigeren Nónaja Semlja fand v. Baer doch noch zerstreute Grasnasen, ob schon nicht einmal eine zusammenhängende Moosdecke hier mehr vorkommt.

Nicht das Bodeneis hindert so sehr die Entwicklung des Pflanzenreichs, wie die physikalische Eigenschaft der Bodenunterlage. Sonst verkündete man in der That auch nicht mehr, daß noch eine Pflanze überhaupt den Polarkreis zu überschreiten vermöchte, sobald man sich nur erinnert, daß man schon unter 62° n. Br. zu Jakutsk in Sibirien bei einer Brunnentiefe von 382 engl. Fuß, wobei aber die Grenze des Bodeneises noch nicht erreicht war, die Temperatur fast noch 3° unter dem Nullpunkte, bei 7 Fuß Tiefe aber — 17° R. fand. Die den Boden bis zu ein Paar Fuß Tiefe aufbauende Sommerwärme, die zu Jakutsk noch bis + 14° R. steigt, reicht hin, den Pflanzen dasselbe Leben zu bringen, was viele Alpenpflanzen mitten im ewigen Schnee oder mitten auf 1000 Fuß mächtigen Gletschern führen. Darum kann es uns nicht mehr überraschen, wenn an dem angegebenen Punkte noch Rärdenmüher, Sommerweizen, Roggen, Kartoffeln, Kohl und Rüben gedeihen, oder wenn Berthold Seemann von einer Fior auf Eisbergen am Kobsbuesund erzählt, wie sie nur günstigeren Klimaten eigen zu sein pflegt. „Hier giebt sich“, erzählt uns derselbe, „eine 70—90 Fuß hohe Klippenkette hin, die, wie keine andere, das Pflanzenwachsthum der Nordpolregion veranschaulicht. Diese Klippen sind aus 3 bestimmtem Lagen gebildet. Die unterste besteht aus Eis von 20—30 Fuß

Höhe; die mittlere ist eine Thonschicht von 2—20 Fuß Dicke, mit Ueberbleibseln fossiler Elephanten, Pferde, Dammhirsche und Moschusochsen untermischt. Die Thonschicht ist von Torf bedeckt, welcher die dritte Schicht bildet und die Vegetation, der er seine Existenz verdankt, trägt. Während der Monate Juli bis September eines jeden Jahres schmelzen Massen Eis, wodurch die obersten Lagen ihre Stütze verlieren und in die Tiefe rollen. Dadurch entsteht ein förmliches Chaos. Eis und Pflanzen, Knochen, Torf und Thon sind in größter Unordnung durcheinander geworfen. Einen groteskeren Anblick kann man sich kaum denken. Hier liegen Massen, noch mit Moosen und Flechten, dort mit Weidenbüschen bedeckt; hier ein Haufen mit Kreuzkräutern (*Senecio*) und Knötericharten (*Polygonum*), dort die Ueberreste des Mammuth, Büschel von Haaren, und ein brauner eigenthümlicher Staub, der wie Kirchhoferde riecht und augenscheinlich aus zerlegten thierischen Stoffen besteht. Man strauchelt oft über ungeheure Knochenreste, und mancher der hier liegenden Elephantenähne mißt über 12 Fuß in der Länge und wiegt über 240 Pfd.“ Und dennoch auf diesem Chaos eine üppige Kräuterkor? Man begreift den Eskimo, der sich seine Hütte in Eis und Schnee baut und darin durch seine Thranlampe eine Hitze entwickelt, die man eine tropische nennen könnte. Die Lampe aber ist für die Landschaft die Sonne, welche ununterbrochen strahlt und die warme Luftschicht, die, vom Äquator aufsteigend, sich an den Polen niedersenkt, um die Oberfläche der Erde in einen warmen Mantel zu hüllen, ohne welchen selbst die Sonne keine Kraft haben würde, die unermeßlichen Schnee- und Eismassen, wenn auch nur theilweise, zu schmelzen. Was der Jöhn, ein warmer, feuchter, subtropischer Wind, für die Alpen, das sind diese wärmeren Luftschichten für das Polarland: die warme Luftzugung, unter deren Einflusse erst die Sonne ihre volle Kraft erlangt. Selbst im Winter führen sämtliche Winde eine wärmere Luft zu. Gleichzeitig kommen sie aber auch mit Feuchtigkeit gesättigt, weil nur die wärmere Luft das im Stande ist. Darum bringen sie dem Polarlande seine bekannten Nebel, unter deren Einwirkung sich die Polarpflanzen so wohl fühlen, ohne welche sie nicht zu leben vermögen. Von einer Menge lebender Pflanzen, welche v. Baer aus Nónaja-Semlja mitbrachte, erhielt er keine bis in den Anfang des Petersburger Sommers am Leben; alle starben, nachdem die Blätter verschumpft, voll von kleinen Kugeln waren, an der Trockenheit der Luft, in welcher ihre Ausbünstung zu stark ist.

So begreift man erst, wenn Berthold Seemann Cap Esburne im westlichen Eskimolande (69° n. Br.) einen Garten nennt, in welchem die goldige *Sieversia glacialis* mit der purpurrothen *Claytonia sarnentosa*, einer Portulakpflanze, mit Anemonen, Steindreharten und ultramarinblauem Alpenvergissmännchen den Ton an-

geben. Das westliche Eskimoland ist eben bedeutend milder als das östliche und wird darum im Sommer durch ein stürmisches Nebelklima ausgezeichnet, unter dessen Einfluß die Kräuterbede sich besonders gut entwickeln muß. Abgesehen aber von dieser Eigenthümlichkeit des Westens, scheint doch an der ganzen arktischen Küste Amerika's vielfach ein Gras- und Kräuterland wiederzukehren; um so mehr, als sie ein ähnliches Flachland darstellt, das nur von einzelnen Höhenzügen unterbrochen wird. Es sind eben die Barren Ground's Franklin's, und diese bewohnt noch der Bisamochs sammt dem Renthier, welche sie als ihre eigentliche Heimat auch für den Winter betrachten, indem sie von hier aus im Sommer weite Auszüge bis zur Melvilleinsel machen. In der That sah Franklin die fruchtbarsten Stellen mit Gras, die trockeneren mit Flechten bedeckt; in der Umgebung des Detentionshafens und des Barthurstundes theilten sich selbst die sanft geneigten Bergabhänge mit frischem Grün, während die hohen Felsen von grauen Föhnen durchbrochen waren. Massenhaft bedeckt der Süßklee (*Hedysarum boreale*) die Kü-

sten und liefert damit selbst dem Wägen ein vorzügliches Futter, obgleich eine zweite Art (*H. Mackenzii*) giftige Wurzeln erzeugt. Auch hier leidet der Sandstein vielfach wieder, und gerade der Sandboden ist es, welcher im Sommer tiefer aufthaut, als jeder andere. Kein Wunder, daß auf der Melvilleinsel noch 20 gradartige Pflanzen, fast  $\frac{1}{2}$  aller Phanerogamen, von *Parry* gefunden wurden und Gräser überhaupt verwalteten. Sonst flüchtet sich auch hier der arktische Mohr ein, vereint mit *Rasunklein* (*R. nivalis*, *Sabinii*, *hyperboreus*, *affinis*), *Süßklee* (*Cochl. fenestrata*), *Nelken* (*Lychuis apetalis*), *Hornkraut* (*Cerastium alpinum*), *Stellarien* (*St. Edward-sii*), *9 Steinbrecharten*, *Potentillen* (*P. pulchella*, *nivea*), *Papilionaceen* (*Phacelia angustifolia* und *Oxytropis arctica*), *Glockenblumen* (*Cumpanula uniflora*), *Läusekräutern* (*Pedicularis arctica*), einigen *Compositen* (*Turaxacum lividum*, *Arnica angustifolia*, *Cineraria congesta*, *Nardosmia corymbosa*), *Sieversien* (*S. Rossii*) u. A. Ein Wild, das seiner Zusammensetzung nach ganz das sibirische vom *Taimyr*, nur theilweise in andern Formen, wiederholt.

## Haselnuß und Erle.

Von C. Heyer.

Jeder Mensch ist einmal jung gewesen, und derjenige, dem es vergönnt war, seine Kindheit auf dem Lande oder in einer kleinen Stadt, wo man es ja nicht weit bis vor die Thore hat, zu verleben, der trägt sicherlich andere Jugenderinnerungen in sich, als derjenige, welcher in einer großen Stadt geboren und groß gezogen wurde. O, es ist ein Geschenk des Himmels, seine Jugend in der freien Natur hindringen zu können, nicht in den düstern Gassen, sondern draußen in Feld, Wald und Garten! Die Einbrücke, welche das Kind in seines Daseins ersten Jahren von Gottes schöner Natur erblut, bleiben für das ganze Leben. Wohl dem Glücklichen, dem ein gütiges Schicksal die Tummelplätze seiner Kindheit in ein Dorf oder vor die Thore einer Stadt verlegte. Kräftiger wird die Anlage seines Körpers sein, und das Herz wird bei guter Erziehung länger einfältig — wie die Bibel sagt — bleiben, als bei demjenigen, welcher nie wusste, was Dorfleben und Landluft ist. Das Leben jagt den Menschen doch in die Welt hinaus, in fremde Städte, fremde Länder. Die Einfachheit des Herzens verschwindet mit den Jahren doch mehr und mehr, mit dem Anschauen und Eingreifen in den Strudel des Lebens. Wohl dem — ich muß es wiederholen — dem die Natur schon in der Kindheit ihre wohlthunenden Lehren eingeimpfte und mit ihnen einen kräftigen Körper, einen gesunden Geist und ein einfaches Herz gab.

Ich habe etwas weit ausgeholt, und der freundliche Leser betrachtet nach Lesung dieser Zeilen vielleicht mit

Bewunderung die Ueberschrift der kleinen Abhandlung. Und doch muß ich wieder an den langen Vordersatz anknüpfen. Eben der Theil meiner freundlichen Leser, welcher seine Jugend in ländlicher Natur verlebt, wird recht verstehen, was Haselnuß und Erle für ihn einst gewesen und noch sind, diese beiden Bäume, ohne welche kein heimlicher Frühling, kein vaterländischer Herbst gedacht werden kann. Als freundliche Erinnerung werden die beiden ihm im Herzen blühen. Des vaterländischen Gartens Hecke mit ihren Ruffsträuchern, mit seinen düstern Erlen der Bach, welcher sich durch das Thal schlängelt, wo das Vaterhaus stand, ein friedliches Dörfchen mit grauem Kirchthurn und der ewig klappernden Mühle, — das ist vielleicht das Bild, welches bei Nennung von Haselbaum und Erle die Erinnerung dem geübten Leser malt.

Im nördlichen Deutschland zu Anfang des März, im südliden und am Rhein im Februar fangen beide Bäume an zu blühen. Freilich hängt an ihren blätterlosen Zweigen dann keine rosenähnliche Blütenkrone, auch nicht einmal eine durch ihre Farbe ausgezeichnete Wüthe — wie bei dem in südlidenen Gegenden um dieselbe Zeit röthlich blühenden, ebenfalls noch blätterlosen Seidelbast (*Vaphne mezeurum*) etwa — nein, die Natur liebt eine ewige Abwechslung.

Wer kennt aber nicht die sogenannten „Käpfchen“ der Hasel oder der Erle? Schon im Herbst des vergangenen Jahres kann der Beobachter an den bereits entblätterten Zweigen den Anfang zu denselben bemerken. Von

graugrünlicher Farbe, einer festgewickelten, panzerähnlichen kleinen Kugel gleich, hängen dieselben dann an der trauern den Haselnuß, den Keim zu dem Leben enthaltend, welcher im kommenden Frühjahr fröhlich erblühen und Früchte bringen soll. Kommt jedoch der März des jungen Jahres, so werden diese Kellen größer und länger, ihre Farbe spielt in ein helles Grün über, und an einem wärmeren Nachmittag öffnen sie den Panzer und ergeben sich nach

demnächst zur Fruchtbildung vollkommen vorhanden ist, und die zur Befruchtung gehörigen Factoren, d. h. die Staubfäden mit ihren Staubbeuteln und der Stempel mit seinen den Staub aufnehmenden Narben — in einer Blüthe vereinigt sind, so tritt uns bei den Haselblüthen des Haselstrauchs eine ganz andere Erscheinung entgegen. Betrachten wir ein sogenanntes Käpfchen genauer.

Um einen gemeinschaftlichen, 3 bis 4 Zoll langen



Blüthen und Früchte des Haselstrauchs.

a weibliche Blüthen, b, c, d dieselben im längerwachsamen nach Entfernung der verblühten Kätzchen, e das Blumenkränzen selbst, f, g Griffel und Schuppen der weiblichen Blüthe, h männliche Blüthen, i der Wäpchenhöcker, k Anheftung der Staubbeutel, l ein einziger Staubbeutel, m Pollenkorn, n entfaltete Kneife, o treite Frucht, p vermachene Fruchtzotten.

fünf- bis sechsmonatlichem Winterschlaf und Widerstand vertrauensvoll der Alles beglückenden Sommerwärme.

Wie wunderbar spielt die Natur! Den meisten unserer Pflanzen schenkte sie zuerst die Blätter, dann die Blüthen. Hier ist das Umgekehrte der Fall, und auch in diesem ansehnlichen Verkehren müssen wir den weisen Haushalt der Schöpfung bewundern.

Die Blüthen der Haselnuß sind nämlich ganz anderer Art, wie bei den meisten unserer Pflanzen. Während z. B. bei der allbekannten Linde die 6 Staubgefäße um einen gemeinschaftlichen Stengel herumstehen, und so das Erfors-

Stiel herum, steht eine Menge angehefteter Deckschuppen, welche je 2 Schuppchen umhüllen, die auf ihrer Innenseite 8 regelrecht ausgebildete Staubgefäße tragen. Von weiblichen Pflanzenorganen, den Stempeln hingegen, finden wir keine Spur. Sie sind eben nicht vorhanden. Da der Nussstrauch aber doch, wie allbekannt, nichtsdestoweniger seine süßen und wolfschmedenden Nüsse trägt, so muß auch nothwendiger Weise irgendwo die Anlage zur Frucht vorhanden sein. Und so ist es in der That. Die Haselnuß besitzt außer den gewöhnlichen Blattknospen ganz ähnlich gestaltete Knospen, welche sich weit eher als die

ersteren erschließen und hat der grünen Blätterspitzen dann rothe Narbenbüschel aus den umgebenden braunen Schuppen hervorstrecken lassen. Das sind die weiblichen Blüten. Der Rußbaum trägt Staubgefäße und Stempel nicht in einer Krone beisammen, sondern getrennt. Man findet auf demselben Strauch weibliche und männliche Käpchen. Die letzteren sind in bedeutend überwiegender Anzahl vorhanden und schützen ihren befruchtenden Staub auf die Narben der weiblichen, knospenförmigen Blütenhüllen hinab. Der leiste Blindhauch und die Stellung der weiblichen Blüten zu den männlichen unterstützt dieses Bestreben.

Ähnlich ist es bei der Erle. Auch sie besitzt männliche und weibliche Käpchen, nur bedecken die männlichen Käpchen schuppen 3 Blüten statt 2 wie bei der Hasel, auch ist die Anzahl der Staubgefäße 4. Die Früchte der weiblichen sind zusammengebrüht, zweifächerige Nüsse, die jedoch, ganz wie bei der Hasel, durch mangelhafte Ausbildung des einen Faches, einsächerig werden, und welche gegen den Herbst auf den Boden hinabfallen, ihre winzigen Größe wegen jedoch selten von Jemandem beachtet werden. Die verholzten Schuppen der weiblichen Blütenhüllen bleiben jedoch meistens bis zum nächsten Jahre auf den Zweigen der Erläube sitzen und bilden jene braunschwarzen, länglich eiförmigen Häpfchen, die ja Jedermann schon bemerkt hat und aus seinen Kinderjahren kennt.

Durch die erwähnte Art der Befruchtung ist nun auch erklärt, warum bei Haselnuß und Erle die Natur zuerst die Blüten und dann erst die Blätter sich erschließen ließ. Wie ungleich schwieriger würde die Befruchtung zu Stande kommen, wenn die entwickelten Blätter derselben hindernd entgegenstünden und mit ihren breiten untergetheilten Ähren den Blütenhaub, der doch für die weiblichen Blütenhüllen bestimmt ist, aufgingen!

Hasel und Erle gehören, ihrer abweichenden Blütengestalt und Stellung wegen zu den sogenannten käpchentragenden Pflanzen (Amentaceae) und zu den engern Familien der Eupulliferen und Bienenartigen (Betulaceae).

Die Blüthenknospen des Rußbaumes und der Erle öffnen sich nach erfolgtem Verblühen der männlichen Käpchen, welche nach Erfüllung ihres Lebenszweckes zu Boden fallen, bekanntlich im Monat Mai.

Das Blatt der Haselnuß ist rundlich herzförmig, ein breites, großes Laub, das bei im Winter so durchsichtigen, oft schlant und gerade in die Höhe geschossenen Zweige im Sommer undurchdringlich macht.

Das in der Jugend klebrige, rundliche und stumpfe Blatt der Erle ist weniger groß; seine Farbe ist ein dunkles, trauerndes Grün. Der Erlbaum wächst, wo von andern Bäumen höchstens noch die Weide geblüht; sie gehört zu Bach- und Wiesengrund und verleiht unter Umständen einer solchen Landschaft den Charakter des Geheimnißvollen. Ein einsamer Teich, von tief herabhängenden Erlen umgeben, darüber der Gesang eines lauen, stillen Sommerabends ausgebreitet — welcher Beobachter und empfindliche Naturfreund hätte sich dabei nicht schon zu träumen versucht gefühlt, daß eine feuchte Wäffernymphe sich aus den schweigenden, düsteren Gärten heben könne, schön und verlockend, mit süßem Gesang und den weißen Armen der Prinzessin Jiser! Unsere Dichter — und besonders die einer früheren Periode — haben den Erlbaum genugsam gefeiert und auch wohl die und da ge-

mißbraucht. Gab es doch eine Zeit, wo keine Schauder Geschichte ihrer dünnen Äden ohne Erlengebüsch, Teiche und Trauerweiden fortspinnen konnte!

Die Haselnuß hingegen ist der freundliche Baum unserer Kinderjahre. Das helle Grün seiner Blätter erfreut und erheitert das Auge, und im Herbst, wenn es im Walde Gold regnet und die milden Strahlen der Septembersonne den Altenweibersommer auf Feld und Garten legen, da beschient er und gültig mit Nüssen. Eingeln oder zu zweien, dreien und mehr sitzen sie in den umgebenden glockenförmigen, tief- und lappig-geäderten Hüllsen, und lassen sich, wenn sie völlig gereift und dann eine bräunliche, von unten nach oben aufsteigende Färbung angenommen, aus denselben herauschütteln. Das ist eine Freude für die Jugend, die Nüsse herabklopfen zu können. Die meisten meiner gebrühten Leser wissen ja aus ihrer Jugend genugsam, wie's herrliches Fest es für sie war, wenn in des Vaters Garten die Haselnußsträucher geschützt wurden. Emsig wurden die Nüsse in leinene Säcken gesammelt und in den Rauch gehängt, damit sie einen noch süßern und angenehmern Geschmack erzielten. Zu Weibnachten aber, wo sie aus ihrer Haft befreit wurden, pranzten sie auf dem Festische. Sie halfen dem Kinde die langen Winterabende verfliegen, wenn die Familie dabeim zusammenfas, und der Großvater so spannende Kriegsgeschichten aus seiner Jugend erzählte. Wie herrlich knaeten sie sich dann, und wie töstlich war ihr Geschmack! Ja bekennen wir es offen: der Haselnußstrauch ist der Freund unsrer Kindheit, und leben wir ihn und seine Früchte, so müssen wir ihnen gedenken. Gesegnet sei er dafür!

Die Hasel hat auch noch einen Bruder, den Lampertnußstrauch (*Corylus tubulosa*), welchen man hin und wieder in unsern Gärten angepflanzt findet. Seine Heimat ist das sübliche Europa. Die Kerne seiner größten, mehr länglichen Nüsse sind jedoch lange nicht so wohltschmedend, wie die des gewöhnlichen helmattlichen Haselstrauchs.

Die Kerne der Haselnuß enthalten ein fettes, leicht gelbes und geruchloses Öl von mildem Geschmack, welches man durch Pressen der zerstampften Samen erhält. Früher wurde es wohl häufiger — und besonders in der Medicin — angewandt als jetzt, wo es durch das Mandelöl verdrängt worden. Es erstarrt, wenn es Jemanden interessiren sollte, bei  $-19^{\circ}$ , ist in Weingeist wenig löslich und wird durch rauchende Salpetersäure bräunlichgrün gefärbt.

Das Holz des Rußbaumes wird vielfach zu Zierwerk verwandt. Auch liefert es eine vorzügliche seine Kohle, die zum Zeichnen gebraucht werden kann oder auch wohl bei der Schießpulverbereitung Anwendung findet.

Die Haselnuß war von jeher ein volkstümlicher Strauch und seine Frucht — das Symbol des Festen, Harten — gab Anlaß zu mancherlei Sprichwörtern, deren Ursprung so alt, daß man den Vater derselben nicht mehr kennt und seinen Namen auch wohl nie kennen lernen wird. So z. B.: „Einem eine Nuß zu knaden geben“, oder die Redensart: „Das war eine harte Nuß!“ oder auch: „Eine Kopsnuß ertheilen“, deren praktische, die Erziehung fordernde Bedeutung wohl Jedem aus der Schulzeit, seligen Angedenkens, bekannt sein dürfte.

Zum Schluß sei es mir vergönnt, noch einige Worte über die käpchentragenden Pflanzen anzufügen, zu denen ja, wie schon erwähnt, Rußbaum und Erle gehören.

Diese große Erbnung von Gemäächsen, deren Vaterland die gemäßigte Zone ist, liefert uns den größten Theil unserer herrlichen Walddäume. Eiche, Buche, Birke, Weide, Pappel, Fichte, Tanne, Ulme u. s. w., alle gehören sie seiner wichtigsten Gruppe an. Ihr verdanken wir die wechselförmige Färbung unserer Wälder, vom tiefsten Blaugrün der Tannenwälder, bis zum hellen Grün der Birken oder dem weissen der Weiden und der Silberpappel.

Der dichte, farbenprächige und flanenddurchschlungene Tropenwald mag wohl herrlich sein und den Blick blen-

den, aber das an die Wäldungen der gemäßigten Zone gewöhnte Auge vermisst in diesem Blüthenbüschel schmerzlich die Laubböden seiner Heimat. Das breitaastige Blätterdach der Buchen, die energische Eiche und ihr herrliches Blatt, der Tannen schlank geflossene Gestalten, die hängenden Zweige der Birke und die mannigfaltigen Gesträuche und Dorngebüsche des Unterholzes — Alles das verleiht unsern vaterländischen Wald eine Abwechslung der Formen, die das Auge zwar nicht blenden aber auch nie ermüden wird.

## Die nassauische Dillgegend.

Von Karl Aud.

Die Aemter Herborn und Dillenburg — Bestandtheile des früheren Fürstenthums Nassau-Drank — bilden die nördlichste Ausdehnung des Herzogthums Nassau. Dieser Landestheil wird von N. nach S. von der Dill, einem Nebenflusse der Lahn, durchflossen. Die Dill hat ihre Quelle in dem Hochwald der alten Dill, im Dillborn der Gemarkung Hildes, nur zwei Stunden von der Eisenbahn entfernt. Dort steht sich der Rasternwald an das Saartäländische Gebirge an. Die Landschaft auf dem linken Ufer gehört diesem und die auf dem rechten jenem an. Das Dillthal hat auf der ganzen, 11 Stunden langen Strecke meist eine angenehme und freundliche Gestalt. Den Thalboden bilden größtentheils Wiesengründe, welche von Bergen mit Acker und Wäldern eingeschlossen sind. Unterhalb des Dorfes Erbschreien wird es jedoch weit lieblicher, milder und freundlicher. Der Fluß durchzieht das Amt Dillenburg erst von Norden nach Süden. Von Haiger macht es die Wendung von N. nach S. Von der Quelle bis zu diesem Städtchen herrscht die Waldregion vor. Wehr im oberen Theile des Thales steht die Heubergswirtschaft im rühmlichsten Betriebe, da der Ackerboden nur spärlich die notwendigen Erzeugnisse liefert.

Die Heuberge sind eine mit Eichen beplante Niederwaldung. Ihr Ausfloß erzeugt nur Stangenholz. Da diese Niederwaldung in 18 Districte eingetheilt und der Bestand nur ein achtzehnjähriger ist, so wird alle Jahre ein Theil gefällt. Zwei Jahre wird dann der Boden als Ackerboden benutzt. Mangel an Dünger und erschwerte Befuhr desselben auf die Höhen hindert eine andere Bewirtschaftung. Die Kinder der jungen Eichen wandern als Lehe in die Gerbereien Haigers, Dillenburgs und Herborns; die Stämme werden verkauft und speisen die zahlreichen Eisenswerke; ein Kleintheil des Holzes deckt nebst andern den Bedarf. Die Heuberge sind freilich ein Erzeugniß der Noth, rentiren sich aber auf die beschriebene Art sehr gut. Bei Haiger läuft das Thal in eine kleine Ebene aus, die dem Ackerbau bedeutendes Terrain zuweist. Durch die mehrmals kurz hintereinander stattengehabten Brände hat diese Stadt mit ihren größtentheils stattlichen Gebäuden eine freundliche, weite Bauart erhalten. Geräumig ist besonders der von dem Rathhaus und der Kirche eingeschlossene Marktplatz. Hier stehen schon seit Jahrhunderten bedeutende Gerbereien in gutem Betriebe und haben den Wohlstand der meisten und den enormen Reichtum einiger Bewohner wohl zum größten Theil gegründet. Gleichwohl hat dieser Wohlstand Wohllichte und Luxus fern gehalten und die einfachen Sitten des biedernden Menschenstamms nicht verändert. Im weiter-

ren Laufe berührt die Dill die Stadt Dillenburg. Noch sind hier auf dem Schloßberge die großartigen Ruinen des im J. 1760 von den Franzosen zerstörten Schlosses bemerkbar. Es war die Wiege des Nassau-Drankischen Fürstenhauses, das jetzt die Niederlande beherrscht. Auf demselben Berge steht noch jene uralt Eiche, unter welcher der große Drankier die niederländischen Abgesandten empfing. Bis zum J. 1715 war Dillenburg die Hauptstadt der vereinigten vier oranischen Fürstenthümer Dillenburg, Siegen, Hadamar und Dief. Gegenwärtig ist es der Sitz eines Kreis- und Criminalgerichtes. Schon früher im Besitz eines Pädagogiums, ist in neuerer Zeit eine Bergschule errichtet worden. Außerdem blühen hier namhafte Tabakfabriken. Eine Stunde abwärts, an den Dörfern Niedersfeld und Burg vorbei, finden wir die freundliche, beliebte Stadt Herborn. Sie liegt am Fuße schroffer, kahler Berge von ziemlich bedeutender Höhe, umgeben von Obstdäumen und freundlichen Gärten. Die Kirche, einige stattliche Häuser und das Schloß auf einem Berge verleihen ihr ein amphitheatralisches Aussehen. Bis in die neuere Zeit bestanden hier viele Tuch- und Strumpfwirkerelen; zahlreiche Gerbereien und der Kleinhandel stehen in Blüthe. Die Bewohner sind ein rühmliches Volkchen, das es versteht, wenn eine Nahrungsquelle zu versiegen droht, andere desto ergiebiger zu machen. Sie erstreben sich wegen ihres Fleißes und ihrer Nettigkeit eines bedeutenden Wohlstandes. Graf Johann der Ältere von Nassau-Dillenburg errichtete hier im J. 1584 die hohe Schule, welche bis 1817 bestand. Im J. 1818 wurde an ihrer Stelle ein evangelisch-theologisches Prediger-Seminar mit zwei Professoren errichtet. Nach einem rühmlichen Lauf berührt die Dill das Gebiet des Kreises Wehlar. Der schönste Theil, die Perle des Thales, ist die Strecke von Dillenburg bis an die preussische Grenze. Hier ist das Thal ein breites, anmuthiges Wiesenthal und bildet herrliche Panoramen. Solche bilden die Strecke von Dillenburg bis Niedersfeld, von hier nach Burg, von da bis Herborn und dann hinunter bis nach Wehlar. Es gibt wenige Gegenden des vormaligen Herzogthums, welche das Anmuthige mit dem mitunter wild Romantischen verbinden, als gerade dieser Theil des Thales. Die liebhaft grüne Thalsohle, das theils sanft, theils rauschend dahin wogende Flüsschen, üppig bewaldete Höhen, kahle Berge und hervorpringende pittoreske Felsen, blühende Auen und freundliche Dörfer, hämmende und malende, poehende und rauchende Hüttenwerke, eine breite, mit jungen Pappeln eingefasste, mit Menschen und Fuhrwerken bedeckte, durch das Thal laufende Landstraße, — dies Alles macht jedes der Panoramen zu einem unvergleichlich schö-

nen Landschaftsgemälde, das zu betrachten der Einzelne nicht müde wird und den Fremden ergötzt. Ja, das Dillthal kann jedem anderen im früheren Herzogthum kühn zur Seite treten. Auch in anderer Hinsicht sieht es nicht nach. Die Leipziger Straße durchschneidet es von SW. nach NW. und führt durch das Aethal in das heffen-darmstädtische Gebiet. Die Wetterauer Straße zieht längs des Thales hin. Inne fast die Gegend landeinswärts mit den inländischen Städten Hadamar, Limburg, Diez, Hachenburg und Weilsdorf und der Rheingegend, sowie durch die auslaufenden Straßen fast mit ganz Nassau und landauwärts mit Hissen, Darmstadt und Kurheffen in Verbindung, vermittelt den Verkehr einerseits mit Westphalen, andererseits mit Weplar, Gießen, Frankfurt. Schwere Frachtwagen führen Kohz- und Kunsprockte aus und ein und verleihen dem geschäftlichen Leben einen recht betriebelamen Charakter. In einer Hinsicht überträgt es alles; denn hier blüht die Eisenindustrie des Landes in hohem Grade. Von der Dill werden auf einer Strecke von 2 Stunden vier bedeutende Eisenhütten mit Puddelwerken, Gießereien und Wiedwalzen betriebten. Die Berge gehören dem sauerländischen Gebirge an und werden von vielen Thälern durchschnitten, von denen das Diezholz- und Aethal die größten sind. In jedem dieser Thäler liegen Dörfer, in einigen Hüttenwerke. Die ganze Gegend des linken Dillflusses hat wenig Annehmlichkeit. Den vorzüglichsten Erwerbszweig bilden die Berg-, Hütten- und Hammerwerke. Auch Bergbau auf Blei, Silber und Kupfer ist seit Jahrhunderten im Gange. Besonders mild und freundlich ist das Aethal. Der Ackerbau ist schwer, lehmig und lohnt sich guter Düngung reichlicher des Landmanns Arbeit. Hier gezeihen alle Getreidearten und Futterkräuter; einige Bemerkungen zeichnen sich durch gutes Obst aus. Großen Reichthum liefert die Gegend ihren Bewohnern nicht; aber ebensovornig ist hier selbst verschuldete Armut zu bemerken. Die Leute sind mäßig und einfach und halten streng an den Sitten der Vorfahren fest. Besonders gilt dies von den Bewohnern des Eiseneröder Grundes. Seit Jahrhunderten wandern die fleißigen Jünglinge und Männer am St. Gallustage nach den in der Lahngegend gelegenen Dörfern Dauborn und Esingen aus, um den bafigen Gutsherrn die vollen Scheunen auszufüllen und auf Weizen machen mit geldgefüllten Taschen an den heimathlichen Heerd zurückzukehren. Jeder hat dann neben seinem Bindel und Dreschflegel einen Krug mit echtem Kornbrandwein, der in jenen Dörfern so ausgezeichnet gebrannt wird, an der Seite hängen, um ihn dadeim im häuslichen Kreise als Brannweinluppe mit eingebrotem Lebkuchen an den Abenden der Feiertage zu verzehren. Den Hut eines Jeden schmücken Gänsefügel. Seitdem aber die Dreschmaschine in jenen fruchtreichen Dörfern braut, hören für jene fleißigen Eiseneröder diese Wanderungen auf. Die Gegend des rechten Dillflusses bietet einen andern Charakter bar. Auch sie wird von vielen, recht anmuthigen Thälern durchbrochen. Sie gehört den Abhängen des Westerwaldes an, steht aber durch ihre warmen Thälchen und die fruchtbaren, die beinahe auf die Gipfel reichenden Ackerfelder sehr freundlich von jenen ab. Die Thalhöhe ist breit und mit saftigen Wiesen bedekt. In der neuesten

Zeit sind hier mächtige Eisensteinlager entdeckt worden. Bei dem Dorfe Donsbach steht schon lange ein Kupferbergwerk in rührigem Betriebe. Noch bei hier einer Naturmerkwürdigkeit erwähnt. Auf einer kleinen Fläche vor dem Dorfe Breitelscheid finden sich mehr als zwanzig trichterförmige Vertiefungen. Manche haben einen Durchmesser von mehr als 30 und eine Tiefe von mehr als 60 Fuß. Vor beinahe 40 Jahren entstand ein solcher Erdfall mitten im Dorfe. In diese Erbfälle stürzt sich die kleine Bach, der durch Breitelscheid fließt. Nachdem er eine halbe Stunde in verborgener Tiefe unter dem Berge geflossen, kommt er an dessen Fuß unten im Thale wieder ersichtlich hell zum Vorschein und treibt eine Mühle von zwei Gängen. Dieser Berg heißt in der Umgegend die große Brücke und der Bach selbst der Erdbach. Es fehlt ihm niemals an Wasser, und er friert auch bei der allerstrengsten Kälte nicht zu. Ganz in der Nähe des Wiedererfcheinens dieses Baches bei dem Dorfe Erdbach finden sich die größten Felsenhöhlen unter dem Namen der Steinkammern. Beider gibt davon folgende Beschreibung. „Ungefähr in 1/2 Höhe des Berges, der zwischen 25 und 30° ansteigt, sind die Höhlen. Der Eingang der einen gleicht einer Dachshöhle. Man muß hinein kriechen. Nach acht Schuh erweitert sie sich aber und wird so hoch, daß ausrecht gegangen werden kann. Nach zurückgelegten 50 F. wird der Tag wieder erblickt, und man gelangt zu einer eben so engen Öffnung und durch diese in eine Grotte welche 12 Fuß breit, in der Mitte 7 Fuß hoch und 30 Fuß lang ist, deren Ausgang das Ende der Höhle ist. In dieser Grotte liegen große, von der Decke herabgefallene Kalksteine. Auf der rechten Seite geht noch eine besondere Höhle hinein, die ich 35 F. der Länge nach unterfucht habe. Abgerissene Kalksteinblöcke lagen mir vor den Füßen, und mehrere bingen, Sturz drohend, über meinem Haupte. Das Innere beider Höhlen ist mit zackigem Tropfstein geziert, und sie werden die kleinen Steinkammern genannt. Etwäg Fuß davon sind die großen Steinkammern in einem Kalksteinsfelsen, der mit Eichen wie mit Blumenketten umwunden ist. Der Weg dahin trägt über schroffe Kalksteinsfelsen, auf welchen ein Fall sehr gefährlich werden würde. Die Grotte vor denselben oder im Vorgehänge ist 28 Fuß lang und 15 Fuß breit. Hoch über ihr erobert läßt der Felsenbaum seine flebrigen Blätter hängen und beschattet sie damit. Gerade über ihr hängt eine große, auf beiden Seiten schon losgetrennte Last Kalkstein, die oben nur noch wie eingeklinkt ist, just so, als ob sie den Eingang vernechten oder ihn doch wenigstens schauerlicher machen wollte. Auf der rechten Seite ist der Fels wellenförmig geprüngt, wodurch Klüfte entstanden, die im Felsad in ihn hineingehen. Anzwanzig Fuß lang sah ich eine in ihrer wilden Schönheit. Weiter konnte ich nicht kommen, da sie zu eng wird.“ Ich bemerkte, daß sie ungefähr 12 oder einige Fuß mehr hoch, mit Tropfstein überdeckt ist, wodurch hin und wieder kleine Figuren entstanden sind.“

Seit Anfang des Jahres 1862 durchfährt das Dampf- und dießes gelegene Thal. Die Dillbahn verbindet die Main-Weßer-Bahn mit der Druß-Köln-Bahn. Mächtiger werden die Geschäftspulse des Thales schlagen und erhöhtes Leben und blühender Wohlstand befördern.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Sgr. (1 R. 25 Kr.) Alle Buchhandlungen und Buchhändler nehmen Bestellungen an.



# Die Natur

Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

N<sup>o</sup> 40.

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

6. October 1869.

Inhalt: Eine wunderliche Herbstflor, von Paul Kummer. Erster Artikel. — Vom Montefors zum Montblanc, von Otto Me. 6. Das Thal von Val-Tournaise. — Die Pflanze am Rostpool, von Karl Müller. 7. Die Rees- und Flechtenflur.

## Eine wunderliche Herbstflor.

Von Paul Kummer.

Erster Artikel.

Der Leser sei freundlichst ersucht, mich in einen sonnig-frohen Herbstwald zu begleiten, gleichviel ob in Laubholz oder Nadelholz. Wir können da einige ganz besondere Naturschönheiten in Augenschein nehmen.

Man entgegne nicht: Was kann vom Herbstes Schönes kommen, als die von jedem Dichter schon besungene Laubpracht der Wälder voll Gold- und Purpurwechsel und als die Spannung eines klareren Himmels, wie sonst nur auf Bergeshöhen! Ist er doch die Jahreszeit, wo alles Schöne, was das Jahr vom Frühling an geboren hatte, leise zu Grabe geht!

Und dennoch! Wir müssen nur nicht, wie es uns die Sehnsucht im Frühling heisst, über uns und in die Wälder schauen, sondern den fallenden Blättern nach unsern Blick zur Erde wenden.

Als ob es da nicht etwas Herrliches wäre um die violetten Amethystpilze, die aus dem moosigen Waldgrunde wie Beilchen des Herbstes hervorleuchten, um die filzigen Schwämme, die in tüdlicher Pracht gegen die gleisenden Birkenstämme sich abheben, um die gazellenartig schlanken Glasgalerien, die weißgrau oder rothbläulich an alten Baumstämmen büschelig hervorblicken, wie selbst um die graubraunen, zerfließlichen Coprinen, die wie eine Bettler- oder Zigeunerbande um den Chausseestein der Landstraße gelagert hocken! Der muß den Wald nie richtig kreuz und quer durchstreift haben, der nach warmen Herbstregen die herrlichen Gruppen nicht hier und da und überall zu seiner Freude umhersehen sah, bald würdig und ernst wie die hochstrunkigen Amaniten und Hallimasche mit zierlicher Manschette am Stiel und pantherfledigen Hüten, bald



komisch und buchst wie die rothen, weissen, gelben, kurzstrunkigen, oft schiefhütigen Erdkriecher, bald plump und colossal, wie die fleischig-massigen Steinpilze mit porösem Fruchtlager unter dem Hute, bald mädchenhaft schüchtern, bald koket, bald flüchtig, bald wieder einzeln, bald in Gruppen, bald wie eine zerstreut lrende Heerde. — Alles, wenn wir der Wirklichkeit uns entschlagen, ein herblicher Fächingaufzug von lauter festem verkörperten Erdgeistern. Wahrhaftig, ich wüßte keinen Charakterzug, dessen Typus sich nicht unter ihnen vorfände: Prunk und Einfachheit, Prahlerei und Bescheidenheit, Leichtsinns und Sinnigkeit, Freimuth und Devotion, Melancholie und Phlegma, die Temperamente alle vier und in buntester Mischung — Alles ist vertreten. Und wie der vogelsprachkundige heilige Franziskus von Affisi mit den Blumen und Sängern des Waldes sich verständnissinnig unterbleibt, so läßt sich bei einiger Begabung an den Pilzphänomenen die Taufendgestaltigkeit menschlicher und thierischer Charaktere studiren.

Ein Zug aber geht durch fast alle hindurch, der tragische Zug epheemer Daseins. „Heute roth, morgen todt“, vielleicht schon in wenigen Stunden ein Fraß der gierigen Maden und Larven, die in ihnen nach Nahrung wühlen! Besonders ganze Familien von Pilzen sind es, namentlich die reichliche Familie der sogenannten Schwammstiegen, welche, wie der Adler das Aas, so die Pilze von weit her zu finden wissen. Sie legen ihre Eier dahin ab, deren auskommende Maden nun in tausend Kanälen ihre Geburtsstätte durchwinden und verzehren. Aber der Grund der raschen Vergänglichkeits liegt nicht minder in ihnen selber. Denn aus lose gebundenen Stoffen schließt ihr Leib rasch an in einer einzigen warmen Nacht, besonders aus Stickstoffverbindungen der Waldbatmosphäre. Aber Stickstoffverbindungen sind die todseligen Alkale, wie denn auch alle uns dienenden Explosivstoffe darauf sich gründen. Sie weichen darum die organischen Gebilde, denen sie eingegeben sind, dem baldigen Untergange.

Wie rasch das Werden und Vergehen ist, wurde mir an einem Sommermorgen klar, als ich früh um 4 Uhr über einen Acker ging und überall den Zintenpilz (*Coprinus ephemerus*) erst kaum aus der Erde hervorstiegen sah. Auf meinem Rückwege um 6 Uhr fanden die gefeierten Hüte, schirmförmig entfalteter, auf einige Zoll hohen, dünnen, glasartigen Stielen; einige aber waren schon wieder dem Vergehen nahe. Als ich um 8 Uhr an dieselbe Stelle kam, hingen die Hüte schlaff herab, triefend von tintenartiger Jauche, in die sie zerfielen. So läßt sich binnen einigen Stunden von ihrem Entstehen an ihr Wachsthum bis zum Vergehen beobachten.

Nach interessanter ist die biographische Betrachtung an den pittoresk aufgerupften Pilzen, indem deren felsamer Aufbau dadurch sich auf einfachste Weise als ganz natür-

lich erklärt. Welch ein Ausbund von tierischer Glattheit, vor der wir bewundernd und fragend stehen bleiben, ist etwa der rotthe Flegenschwamm. Aus einem weissen Fleck erhebt sich der Strunk, und um seine Mitte hängt eine zierliche Mantelkette; den Rand des Hutes säumen weisse Fingern, und dessen hochrothe Oberfläche ist mit schneeweissen Flecken bestreut. Wer kennt das nicht! Aber all der Zierath erklärt sich, wenn wir den Pilz der feinsten Wachsen in's Auge fassen. Wie ist es da? Aus einem sogenannten Myceliumgewebe, das schimmelartig am Boden leicht, sproßt als erster Anfang des Pilzes ein nutzloser eisförmiger Knollen, von einer abtödtlichen Haut umgeben; diese plagt oben auf, und indem sie selbst als Kelch halb in der Erde stehen bleibt, steigt der Knollen als flüchtig ausgezogener Kugel daraus in die Höhe. Diese Kugel erweist sich bei ihrem Durchschnitte als ein eingestülpter Schirm, der unten schon die strahligen Samendblätter trägt. Er ist noch durch eine weisse Hautblase umhüllt. Beim schirmartigen Ausbreiten der Kugel selbst aber diese Hautblase rings herum, so daß die untere Hälfte der Mantelkette am Stamme hängen bleibt; dagegen bleibt die obere Hälfte auf der Hutobersfläche liegen, wie bei deren schirmartiger Streckung in Fäden zerfallen und läßt das Schärh der Hutobersfläche zwischen sich durchbilden. Der Hut streckt sich immer mehr, und jene weissen Fäden liegen ihm zuletzt nur noch als flüchtige oder warzige weisse Flecke auf. — Bei andern Pilzen fehlt die äußere Knollenblase und demnach dem ausgetriebenen Pilze die Kelchschleim am Grunde; bei andern Arten ist die den eingestülpten Hut umgebende Blase nicht häutig, sondern spinwebartig oder flockig oder auch so gut wie gar nicht vorhanden. Je nachdem ist auch der Zierath des ausgewachsenen Pilzes beschaffen oder auch gar nicht vorhanden.

Die Zierathen feilich, jene reguläre, unten fleckblättrige Kleeform, die sich als Schirm auf stämmigem Strunk erhebt und uns in ihrer Abnormität an veddepete Waldteufel und Esquemen erinnern möchte, fordert vergeblich eine rationale Erklärung von uns. Wir können nur sagen: es ist so! Aber daß es so ist, ist in der Natur ja nicht einzig in seiner Art. Der Apfel und die Kirsche, ja die meisten Früchte sind im Prinzip gar nicht anders gebildet, — und es sieht nicht nur so aus; es ist das, was unsere christliche Hausfrau als Pilz lechzt, in der That nichts Anderes als eine Frucht. Die Saamen derselben sind mikroskopisch und sitzen zu Vorriaden an den das Fruchtlager bildenden blätterigen Strahlen zu je vier auf mikroskopisch kleinen, vierarmigen Stielen. Darum ist aber der Pilz nicht eine Frucht, die unermittelt aus der Erde wächst! So ohne alle Umstände zeltet die Natur keine Früchte. Das was wir Wurzel, Stamm und Blätter nennen möchten, ist aber sehr schlicht und einfach. Nach treifigen botanischen Grundsätzen ist nämlich Alles in Allem das schimmelige Mycelium

dafür anzusehen, das spinnwebartig über oder unter der Erde sich muerend hinzieht, und woraus die Pilze als die freilich seltsamen Früchte anschießen.

Somit ist die Vielen unheimliche Gestalt des Pilzes wirklich nicht im Entferntesten unheimlich; sie ist eine Form so schön wie die des Apfels und läßt in Farbenpracht und jerräthlichem Behange keinen noch so phantastischen Wunsch unerfüllt. Man muß das freundliche Waldeskind nur einmal ansehen und ernstlich seiner sich freuen wollen. Man wird von Verwunderung erfüllt werden und sich nicht satt sehen können an den einfach edlen Formen und der jungfräulichen Zartheit aller Theile. Es bedarf dabei noch gar keiner Appellation des Biscuites der aufgebrochenen Stücke an unsere Geschmacksnerven.

Und doch trotz alledem, vor mag sich aus reiner Naturfreude mit den Pilzen befassen, diesen algerischen Eitzen, die, wenn sie denn wirklich zu dem lebenswichtigen Pflanzenreiche gehören, doch dessen gepurte Varias bilden und gegen die freundlichen Blumen genommen das sind, was im Thierreiche die Reptile und Spinnen gegen das bunte, singende Vögelheer! Ein horror naturalis, so scheint es, ist davor dem Menschen eingebohren, ganz wie vor den Schlangen und Spinnen, vor denen die Natur durch einen inneren Widerwillen und warnen wollte. — Ja, aber nur nicht eingebohren ist der Widerwille, sondern eingeblendet und anezogen, und nicht den Reptilien und Spinnen entsprechen sie. Das wäre nicht sowohl zu häßlich als auch zu hoch gegriffen! Wenn sie einer Stufe des Thierreichs entsprechen sollen, so stehen sie im Pflanzenreiche etwa auf gleicher Stufenstufe mit den prächtigen Corallenstöcken, Medusen und Quallen und sonstigen Weichthieren der blauen Meeresküste. Man muß die Meeresquallen nur mit eigenen Augen beobachtet haben, um sie für lebendige Pilze und die Pilze für pflanzlich gewordene Quallen zu halten. Die Schwammwurzel entspricht dem Quallenmunde, der Strunk dem Schlund und der Hut dem Magen und die Fruchtamellen den Darrien der Quallen. Auf diese Thiere möchten sie auch ihrem ästhetischen Werthe nach weisen und mehr noch ihrem naturonomischen Werthe nach, indem sie als antiseptische Wesen die Erholationen der Pflanzenvelt in sich aufnehmen. Man hat bei den Aquarien die Erfahrung gemacht, daß dieselben ohne Schnecken nicht bestehen können, und hat den Grund darin gefunden, daß faulige Pflanzentheile von ihnen aufgenommen werden. Ganz denselben Dienst versehen die rasch und colossal aufschleibenden Schwämme, die darum auch auf verwestem Dünger und an multigen Stellen am häufigsten vorkommen, im Herbst vor Allem, wo eine Zerkleinerung der pflanzlichen Gebilde vor sich geht. Aber die Erholationen der Pflanzen sind verschiedene, und so haben denn auch die verschiedenen Bäume ihre bestimmten Schwämme; der Rärchen schwamm kommt nur an den

Rärchenbäumen vor, der Nadelwaldboden hat seine eigene Pilzflora und ebenso der Buchen-, Eichen- und Birkenwald mehr oder minder. Die Praxis hat es völlig erwiesen, daß die Trüffel nur in der Nähe von Eichenwurzeln gedeiht, und daß der Champignon in unumgänglicher Abhängigkeit vom Pferdeböcker steht. Was die höher organisierte Pflanzenwelt anseht, das nehmen die Pilze auf und weben ihre niedrigen organisierten Gebilde daraus. Gewiss, es sind nicht verächtliche Wesen, wenn auch einzelne und gerade recht hochfarbig dem Magen der warmblütigen Thiere — für den sie ja nicht bestimmt zu sein brauchen — schädlich sein können. So schlimm ist es übrigens nicht! Ein Gistauell, vor dem Alles Lebendige flieht, sind sie vor Allem nicht; selbst den giftigsten Sattanspilz (*Boletus satanas*) habe ich von Insektenmaden ganz durchwühlt gefunden, und der Giegenpilz, wie die Reizter sind oft kaum halb aufgeschlübt, so scharen sich die Insekten, Liegen, Käfer und Halbfügler schon herum. Das Weidvieh liebt ganz besonders die Pilze, und ich habe Liegen und Schafe, ohne daß es ihnen geschadet hätte, ganze Portionen und verdächtiger Schwämme mit bestem Appetite vergehen sehen.

Thiere sind freilich keine Menschen! Von dem Allesgeschwamm aber ist es bekannt, daß er von nördlichen Völkern verpestet wird, ja, daß sie ein berauschendes Getränk daraus bereiten. Geringe Bissen schaden überhaupt so leicht nicht. Da viele Arten nur mit Selbsthülfe des Geschmacks vom Botaniker richtig bestimmt werden können und außerdem zur vollen Charakterisierung einer Pilzart auch die richtige Angabe des Geschmacks gehört, so wüßte ich keinen giftigen Pilz, von dem ich nicht zu dem Zwecke geringe Proben gegessen hätte. Von todtlich als giftig bekannten Arten habe ich gerade größere Stücke gegessen und doch selbst davon nie etwas Anderes, als eine bald vorübergehende Uebelkeit empfunden. Nur ein einziger Fall ist mir vorgekommen, daß die bloße Ausdünstung betäubend wirkte. Eine mir bis dahin unbekannte große Reizterart mit rothem Hute und gelben Lamellen, die ich auch in keinem der mir zu Gebote stehenden Werke angegeben fand, hatte ich mit nach Hause genommen, um eine genaue Diagnose vorzunehmen und ihn vor Allem genau abzuzeichnen. Er lag einfach vor mir, aber nach etwa einer Viertelstunde Beschäftigung damit wurde ich von Uebelkeit und Betäubung befallen, die mehrere Stunden währte, und von der ich erst einen Tag nachher völlig frei wurde.

Auch in dem lebenswürdigen Blumenreiche gibt es ja giftige Mitglieder genug, und doch bringt dieses Attribut den Dandern und Goldregen, die Kamaneiten und Anemonen, das Schneeglöckchen und die Narzisse nicht im Entferntesten um ihre Lebenswürdigkeit. Freilich ath's „Der Blumen Rache“ malt in poetischer Weise die zwei

fellese Thatsache, daß der Athem des Blumenbustes selbst der harmlosesten ihres Geschlechtes betäubend und tödtend

wirken könne, und dennoch sind sie unseres zärtlichsten Schutzes verdienst.

## Vom Monterosa zum Montblanc.

Von O. H. U. C.

### 6. Das Thal von Val-Tournanche.

Ungern scheidet man aus der großartigen Einöde des Matterjochs und aus der gastlichen Hütte, die Schutz gegen Sturm und Kälte und Erquickung nach anstrengender Wanderung bot. Denn neben dem Observatorium erhebt sich noch eine zweite Hütte, von gleich gewaltigen Felsmauern geschützt, die dem Wanderer sich gastlich öffnet und selbst ein Nachtlager bereit hat. Sonst war hier nur — und auch das erst seit dem Jahre 1852 — eine kleine gebrechliche Hütte zu finden, die keinen ausreichenden Schutz gewährte, und in der nur etwas Brod und Wein zu haben war. Dollfuß hat an dieser höchsten Stätte der Wissenschaft auch für den Freund einer großartigen Natur eine Zufluchtsstätte errichtet.

Endlich mußte doch geschieden werden, und wieder ging es die Felsentreppe hinab zum Gletscher, dessen südlicher Abhang verfolgt werden mußte. Hier pflegen sonst zahlreiche Spalten Vorsicht zu gebieten; ich fand den Gletscher so mesam wie möglich. Der Schnee lag freilich ziemlich hoch und war dabei völlig durchweicht. Aber wenn ich auch manchmal fast bis zum Knie einsank, so war dies doch beim Herabsteigen wenig beschwerlich. Sehr bald war das Ende des Gletschers und die steile, sumpfige Moräne erreicht, über deren lose Blöcke mühsam hinabgesteuert werden mußte. Endlich stand ich wieder auf festem Boden, und rüstig ging es nun über Felsen und Alpenmatten an pfeifenden Murmelbieren vorüber, die scheu in ihre Löcher flohen, zum düstern und einsamen Felsenkeßel von Breuil hinab, dem Anfang des schönen Thales von Val-Tournanche, eines der romantischsten aller Alpenhöher, das selber von deutschen Touristen noch viel zu wenig besucht wird.

Eine düsterere, unheimlichere Einöde habe ich kaum jemals auf meinen Gebirgswanderungen getroffen, als den Keßel von Breuil. Selbst in den einsamen Schneewüsten des Hochgebirges, umringt von Firnmeeren, Gletschern und schwarzen Klippen vermag doch der Eindruck der Großartigkeit der Natur das Gefühl der Leere und Debe nicht aufkommen zu lassen; man athmet freier als gegenwärtig inmitten der starren Gebilde. Hier überwiegt der Eindruck des Raubens und Raktes alle andern; hier sieht man nichts als Verwüstung und Zerstörung, als ob hier die Welt erst aus dem Chaos hervorgegangen wäre, ähnlich etwa, wie man sich eine Landschaft im Innern eines Ringgebirges des Mondes vorstellen möchte. Selbst das so freundlich eingerichtete neue Gasthaus auf der Höhe des Gloms

main, eine halbe Stunde über den elenden Steinhöuten von Breuil, vermag nicht das Gefühl der Bedrücktheit zu erwecken. Größtenteils blickt man auf den trümmerbedeckten Grund des welken Felsenfells hinab, den zahlreiche trübe Bäche durchfurchen, von den Gletschern und Schneefeldern des Mont Cervin genährt. Ringsum erheben sich graue, von keiner Vegetation bekleidete, steil anstehende Felswände. Hoch oben schauen drohend die Gletscher herab, und über ihnen thront gespenstergleich die scharfschnittene Pyramide des Mont Cervin. Hern verläßt man diese Einöde, in welcher selbst die Wohnungen der Menschheit nur wie Steinhausen erscheinen, unfähig den Eindruck freudigen Lebens zu wecken. Hat man diese Höuten hinter sich, so ändert sich bald der Charakter der Landschaft. Vegetation schmückt die Felsen; eine grüne Rasenfläche nimmt den Wanderer auf, von einem rauschenden Bache durchflossen, zu welchem sich die tausend Kinnale vereinigt haben. Rechts erheben sich die gewaltigen Felsmassen der Dent blanche und des Mont Tabel, vom dem ein ungeheurer Gletscher herabsteigt, drohend, sich über die an seinem Fuße zerstreuten Hütten von Vuol zu stürzen. Links zeigen sich zahlreiche Pies von wunderlichen Formen. Im Hintergrunde schaut über blendenden Schneeflächen der Mont Cervin herab, hier sich in seiner ganzen imposanten Größe darbietend, schimmernd von Eis. Schnee und Gletscher dort oben, Wiesen und Wälder hier unten, Alles in einem Bilde umfaßt, das sind die Elemente einer Romantik der Natur, wie sie sich nun mit jedem Schritte in wachsender Fülle dem staunenden Wanderer erschließt.

Folgt man dem in Sprüngen längs einer alten Moräne hinabstürzenden Bach des Monte-Cervin, den die Thalbewohner den Marmorbach nennen, so scheint das Thal sich bald zu schließen. Die Felswände treten von beiden Seiten zusammen, nur eine schmale, vielfach gewundene Kluft zwischen sich lassend, in deren Tiefe, tief unter den Füßen des Wanderers und oft seinen Widen verborgen, der Bach rauscht. Ueberall beugen Streifen und Schiffsflächen an den Felsen, daß hier in der Vorzeit ein Gletscher seine gewaltigen Wirkungen übte. Es ist der Engpaß der Bufferrailles, den man betritt, das Thor zu einem der schönsten und malerischsten Flecke der Erde. Eine unbeschreibliche Ueberraschung gewährt es, wenn man aus dieser düsteren Enge hervortritt und sich nun plötzlich in einem wunderbar lieblichen, fast kreisrunden Boden erblickt, das die zurücktretenden Felswände

umschließen. Die Thalbewohner nennen es Plan de Pessonthé oder Ebene des stürzenden Wassers.

Einem stürzenden Wasser gleicht freilich der Bach in diesem kleinen Thalleseel nicht. Er ist nicht mehr der wildtobende Bergstrom, wie wir ihn noch so eben in der Felsenenge kennen lernten; einem friedlichen Wiesebache unserer Ebenen gleich, fließt er sanft und still durch die grüne Fläche hin. Stolz Lärchenbäume breiten ihre Zweige über die hier und da zerstreuten Hütten aus, und von Moos und bunten Flechten bedeckte Felsblöcke erheben sich überall zwischen den schattigen Bäumen. Eine kleine Kapelle grüßt uns seltsamts am Wege in halber Höhe des Abanges. Vor uns scheint die Felswand geschlossen bis auf einen tiefen, klaffenden Spalt, in den unser Weg hineinführt, und in dessen Tiefe der Bach sich verliert. Hier erst verbietet er den Namen des stürzenden Wassers. Von unten herauf vernehmen wir sein mildes Tosen; dem Auge ist er verborgen. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Felsenenge, den unteren Bufferrallées. Sie ist enger als die erste, und die Serpentinfelsen treten so nahe aneinander, daß sie sich mehrfach über unsere Köpfe zu einer Galerie zusammenschließen. Lange Zeit hindurch war diese Enge nur ein Gegenstand des Schreckens und Grauens. Der Wanderer hörte den tobenden Sturz des Wassers in die Tiefe; aber sein Auge vermochte nicht in den Abgrund zu bringen; nur der Regenbogen, der sich zuweilen in dem aufwirbelnden Wasserlauf bildete, erzählte ihm von den Wundern, die dort unten verborgen ruhten. Erst im November 1863 gelang es einigen mutigen Jüdren aus Val-Tournanche in den geheimnißvollen Schlund einzudringen, und seitdem ist auch diese Tiefe gangbar gemacht. Auf Treppen steigt man hinab, um zu einer Reihe wunderbarer Galerien und Grotten zu gelangen, in die von oben her hin und wieder durch einen Spalt ein mattes Tageslicht einfällt. Besonders eine dieser Grotten, die man die Niesengrotte nennt, gewährt einen Anblick von unvergleichlicher Schönheit und Erhabenheit. Sie ist fast kreisrund und mißt bei einem Durchmesser von 20 bis 28 Fuß ziemlich 14 Fuß in der Höhe. Ihre Wände sind prächtig polirt ohne jene Streifen, wie sie Gletscher hervorzubringen pflegen, da in diese Tiefen niemals ein Gletscher eindrang, wohl aber das Wasser, vielleicht eines Gletscherbaches, der auf einem hoch darüber binziehenden Gletscher hier in eine sogenannte Mühle stürzte und einen Riesentopf im Großen auswusch. Durch diese Grotte schäumt tief unten der Bach dahin und von einer kleinen Brücke, die darüber gelegt ist, schaut man in die herrliche über 50 Fuß hohe Cascade hinein, die hier durch die enge Öffnung des Schlundes in den Abgrund hinabstürzt. Man wird überwältigt von allen Eindrücken, die auf die Sinne einströmen; das Brausen der Wasserfälle, der Regenbogen, der oben über der Öffnung des Schlundes schwebt, die Grotten und

Galerien und hangenden Brücken über dem graufigen Abgrund, der felsame Wiederhall jedes Tretes, jedes Wortes, Alles was man hört und sieht, ergreift so gewaltig die Einbildungskraft, daß man Mühe hat, seine Gedanken und Empfindungen zusammenzuhalten.

Wie aus den Höhlen der Cyclopen, in denen diese furchtbaren Söhne des Neptun und der Amphitrite die Blitze des Jupiter schmedeten, steigt man aus diesen Schlünden zum Tageslicht empor, frisch aufatmend in der immer wunderbarer sich entfaltenden Natur dieses unvergleichlichen Thales. Die Felswände treten nun wieder zurück; herrliche Wälder bekleiden die Abhänge; freundliche Dörfer liegen rings zerstreut auf den bunten Hügeln, und darüber schaut noch immer aus dem Hintergrunde des Thales der majestätische Mont Cervin herab. Bald ist Val-Tournanche erreicht, der Hauptort des Thales, auf hoher Terasse gelegen, von der sein stattlicher Thurm weit in das Thal hinableuchtet. Doch der Bach schäumt weiter thalabwärts, und wir folgen ihm. Immer neue Reize entfalten sich. Bald verengt, bald erweitert sich die Scene; bald fließt der Bach friedlich durch stille Wiesen, bald braust er wild über Felsblöcke in dunkler Tiefe. Schäumende Bäche stürzen von den Abhängen der Thälwände nieder, um in rauschenden Cascaden sich mit dem Hauptbach zu vereinigen. Zahlreiche Grotten schmücken die grünen Hänge. Aber nichts überlastet auf dieser Wanderung mehr als der rasche Wechsel der Vegetation. Vor 4 oder 5 Stunden noch umgab uns eine Ebene, in der nur dürre Flechten die grauen Felsen bedeckten; dann folgten in raschem Sprunge Alpenrosengebüsch, Flechten und Lärchen; jetzt kaum 2 Stunden unterhalb Val-Tournanche begrüßen uns mächtige Walnußbäume, und wieder eine Stunde später treten wir in den dichten Schatten eines Kastanienwaldes ein. Entlich lichtet sich auch dieser und vor uns öffnet sich eine paradiesische Landschaft. Das Auge blickt auf ein Meer von Grün hernieder, das wunderbar gegen den nackten Gebirgskamm zur Rechten und die scharfen Zinnen des Mont Mars zur Linken absteht. Vor uns liegt, von Kastanienwäldern umgeben, Chatillon mit seinem schönen Schloß, und darüber schauen aus folger Höhe die Ruinen des Schlosses Uffel herab. Pfirsich- und Weingelände begrüßen zur Seite des Weges bald den Wanderer, der vor wenigen Stunden erst der Schneee- und Eiseiternis entrann. Rauschend wälzt sich unter mächtigen Steinbrücken hinweg der Bach des Mont Cervin dem Hauptthale zu, seine Gewässer mit denen der Doire, der Dora bilden der Alten, zu vermischen. Die Ruinen einer Wasserleitung, die hoch oben an den Gehängen des Gebirges aus millenweiter Ferne her einst die Gewässer des Marmorbaches den Felsern von Chatillon zuführte, mahnen uns, daß wir hier auf klassischem Boden stehen. Es ist das Thal von Aosta, das wir betreten, in das alle die schönen Seitenthäler der

Walliser Alpen vom St. Bernhard bis zum Monte Rosa münden, ein Thal, das nicht allein die Natur mit verschwenderischen Reizen zierte, mit Gletschern und ewigem Schnee, mit schäumenden Bergströmen und dunklen Wäldungen, mit lachenden Wiesen und üppigen Feldern, sondern das auch die Geschichte mit reichen Erinnerungen geschmückt hat, dem die Römer die unergänzlichen Spu-

ren ihrer Herrschaft hinterließen, das Hannibal und Napoleon mit ihren siegreichen Armeen durchzogen, das Karl der Große erobernd betrat, dem noch das feudale Mittelalter in seinen Burgen und Thürmen den Schmuck der Romantik verlieh. Durch dieses Thal führt der Weg abwärts zu den herrlichen Gefilden Italiens; mich führte es aufwärts zu den erhabenen Wundern des Montblanc.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 7. Die Moos- und Flechtensteppe.

Gänzlich verschieden von dem polaren Gras- und Kräuterlande ist die Tundra der Samojeiden, Tuntur der Finnen. Wenn jenes sich zusammenhängend durch die weiten Barren-Gründe oder die unfruchtbare Polarebene hin durchzieht, bildet sie die einzige Vegetation von Zusammenhang, welche noch weite Strecken zu bekleiden vermag. Einmal stellt sie sich als Moossteppe dar, wenn der Boden feucht genug ist, das andere Mal als Flechtensteppe, wo er trocken und locker bleibt. Doch scheidet sich die Tundra nicht überall streng in diese beiden Theile. So z. B. da nicht, wo, wie im nördlichsten Lappland, die harte Rasendecke der Hochlandsebene an den Meeresstrand herabsinkt, um sich hier mit der Meerstrandflora zu mischen. Auf der Insel Wardö, traurig berühmt als die nördlichste Festung Europa's (Wardöhus), kaum 100 Fuß sich über den Strand erhebend und von sibirischen Stürmen heimgesucht, fand Lund nur ausgedehnte Moosfelder und magere Wiesenebenen über die Insel ausgebreitet. Moos- und Flechten herrschen, die Kräuter treten in den Hintergrund, jeder Baummuchs ist verschwunden. In felsigem Vereine wachsen die höchsten Gebirgspflanzen (*Juncus trifidus*, *Luzula hyperborea*) mit ausgeprägten Strandpflanzen (*Cochlearia officinalis*, *Ligusticum Scoticum*), acht arktische (*Koenigia Islandica*, *Primula Sibirica*, *Gentiana serrata*, *involucrata*, *Ranunculus hyperboreus*) und alpine (*Pinguicula alpina*, *Arabis alpina*, *Saxifraga oppositifolia*) oder auch montane (*Saxifraga cespitosa*, *Dianthus superbus*) mit Strandpflanzen, welche in der breiten Zone des Strandes in der feuchten und salzgesättigten Luft ein höchst saftiges Wachsthum annehmen (*Cochlearia officinalis*, *Anglica*, *Ligusticum Scoticum*, *Hippoglossum* oder *Pulmonaria maritima*). Auch östlicher wiederholt sich auf der Tundra von Trolstrem (67° N.), dem östlichsten Vorgebirge von Rußisch-Lappland, wo bereits ein sibirischer Charakter auf die Flor übergeht, dasselbe Bild. Ein Gemisch von Moosen und Flechten, aber auch von Diapensen und Zwergsträuchern (Bärentraube, Aale, Ardenbeere, Zwergweiden) bringen hier ein unbestimmtes Bild der Tundra hervor, in die sich ebenfalls eine Menge von Kräutern einfindet (*Ligularia Sibirica*, *Castilleja pallida*, *Pyrrolinum hippinatum*, *Chrysanthemum arcticum*, *Pedicularis verticillata*, *Poa sulva*, *Ranunculus Pallasii*, *Eriophorum russeolum*, nach R. Landberg).

Anfänge zu wirklicher Tundrabildung trifft man auch in Deutschland unter verschiedenen Bedingungen. Auf unsern Bruchländern, sei es in der Ebene oder auf den Tafelländern, überzieht sich der Boden gern mit einer dichten

Decke von Torfmoosen, wo das Wasser stagnirt, und diese gibt der Landschaft oft auf weite Strecken ihren Charakter. Solches geschieht ebenfalls in den Polarländern. Giebt der Boden in Moorland über, dessen Torfbildung schließlich einen neuen Boden von organischer Zusammensetzung auf dem mineralischen bildet, da verschwindet das Torfmoos, und Widertüthenmoose (*Polytrichum*) nehmen den Boden ein. Sie kleben ihn in ein dichtes, grünbraunes Plüschkleid, während die Torfmoose eine weißliche, röthliche oder braune Decke über ihn ausbreiten. Auch dies ereignet sich im Polarlande, und beide Moosformationen stellen die Moossteppe dar. Sie ist mithin die Vegetation des Sumpflandes. — Aber auch die Flechtensteppe hat bei uns ihr Seitenstück, wenn gewisse Flechten, meist *Ciadiosmen*, den lockern, trocknen Boden überziehen und ihn, wie das häufig auf unsern sanftigen Halbeländern geschieht, in eine dicke Decke hüllen. Das Gleiche wiederholt sich in großem Maßstabe im Polarlande, wie wir schon bei unsrer Wanderung durch das Hochland von Lappland fanden. Die Flechtensteppe ist mithin die Vegetation des polaren Halbelandes. Wie aber beide Steppen auch bei uns ihre besondern Eigenthümlichkeiten haben, so zeigen sie es ebenfalls, und fast in analoger Weise, im Polarlande. Jede hat ihren besondern Einschlag von Kräutern und Holzpflanzen, jede ihre besondern Areale, die sich natürlich ganz nach der Bodenfläche und ihrer Unterlage richten. Nur, wenn das Circumpolarland eine einzige zusammenhängende gemelte Ebene bildete, würde die Moostundra oder die Flechtentundra allein herrschen; um so mehr, als die Ebene der Wärmeabstrahlung am meisten unterworfen und folglich die kälteste Region ist, obgleich auf der andern Seite, gerade weil sie Ebene ist, alljährlich ihre Schneedecke aufbaut.

Die Moostundra erlangt offenbar das Uebergewicht, wo das ewige Boden eis aufbaut und stagnirend den Boden auf einer sehr geringen Temperatur, d. h. bei 0° erhält. Dabei können nur die einfachsten Zellpflanzen oder die genügsamsten Gefäßpflanzen wachsen. Darum erfüllt die Polartundra in Sibirien den weiten Raum der Polarebene, weil diese eben eine Fläche in dem vorhin geschilderten Sinne darstellt. Im Färrerlande herrscht sie als trockne Hochebene zwischen ebenso trocknen Höhenzügen vor der Sphagnum-Tundra, die sich nur stellenweise in sie einschleibt, weil der Boden im Allgemeinen trockner, folglich den Polartüthenmoosen günstiger ist. Sich auf das Engste verzweigend, schließen sie mehr, wie die Sphagnaceen, andere Pflanzen von ihrem Verbände aus und stellen mithin die einförmigste Pflanz-

zendecke her. Die Torfmoose dagegen durchlaufen nicht allein schon unter sich eine stattliche Reihe von Formen, sondern mischen sich auch gern mit andern Moosen, die, wie die grünen Autacemlien, weder für sich säßig sind, große Strecken einzunehmen. Da, wo überhaupt diese Moose eine Einschlag gestatten, wehen sich zahlreiche andere Moosarten ein, die, so armlich auch sonst die Vegetation erscheint, doch noch von einer nicht unbedeutenden Gestaltungskraft der Polarzone sprechen. Wie auf den höchsten Gebirgen die Moose in ihrer schönsten Pracht aufzutreten pflegen, ebenso reich gestalten sie sich in horizontaler Verbreitung im Polarlande. Hier ist die eigentliche Heimat der Moose, weil sie fast unbeschränkt herrschen; hierher muß sich das Auge des Beobachters lenken, welcher noch die letzten Charaktereigenschaften des Polarlandes erforschen will. Von 60°—70° n. Br., gerade da, wo die Polarhitze, besonders das Ren, von den letzten Spenden der Natur ihr genügsames Leben festsetzt und den Boden dünnen, erscheinen die Fleischen- und Schirmmoose (Splachnaceen) in ihrer Pracht, wie sie die Erde nicht zum zweiten Male kennt. Die Schirmmoose besonders erfüllen das Auge des Beobachters mit Entzücken und gestalten selbst die sonst so traurige Moossteppe zu einer Dase um. Goldgelbe oder purpurothe Schirme, welche den Hals der Moosfrucht umringen, stellen sich auf hohe, rötliche Stiele, die ihrerseits massenhaft gleich minutösen Pollenfüßen aus den freudiggrünen Moosrasen emporwachsen, und fesseln selbst das Auge des Laien. Es sind Splachnum rubrum und luteum; jenes mit einem Schirmchen, das in seiner Klippform vollständig einem Sonnenschirmchen legend einer Polararnie gleicht und durch seinen prachtvollen Purpur überzogen, dieses mit einem Schirmchen, das als goldige Scheibe die Spitze des Fruchtstiels krönt. Selbst die weniger stolzen Fleischenmoose, ihre nächsten Verwandten, entfalten in ihren fleischförmigen Früchten noch eine Gestaltungskraft und einen Farbenreiz in rothen Tönen, den man am Pol nicht mehr erwartet (Splachnum muicoides, ureceolatum, vuculosum), obgleich er auch den Alpen nicht unbekannt ist. Namentlich macht er sich in den Sphagnum-Cümpfen bemerklich. Witten in ihren Rassen wuchern, namentlich im Süden des Polarzirkels, nicht nur wie bei uns die zierlichen Räschen des silbigen Sonnenhaub's (Drosera), sondern auch der schönen Pinguicula villosa Lapplands. Mitunter, wenn auch mehr in der lapplischen Wäldzone, gesellt sich zu den prächtigen Schirmmoosen, ein würdiges Seitenstück zu ihnen, die herrliche maillumen-duffige Calypso borealis, die schönste der wenigen Erbliden, welche der hohe Norden zeugt. Aus fruchtem Moose (Hypnum splendens) erhebt sich ihre nickende Blume von tropischer Formenbildung und Gartenpracht, deren Linten aus Rosenroth und Hellrothbraun man hier nicht mehr erwartet. Zwergbirken, Muldebeere und goldgelbe Vellschen (Viola discolor) leisten ihr Gesellschaft. Doch immer kehrt das Auge zu der Mooswelt wieder. Wie im Gletscherwasser der Alpen noch der Schneefleisch (Desoria) seinen munteren Reizen hält, also auch reich die unbedeutende Wärme des eben aufstauenden Bodeneises reichlich hin, in der Mooswelt das zarteste und bunteste Leben hervor-zureufen. Ohne sie genauer zu studiren, bleibt also Pflanzenforschung im Polarlande nur Stückwerk. Denn überall breitet sich hier, wo sie es kann, die Moosundra aus; nicht allein in Sibirien, obgleich sie hier am vollständigsten

austritt, sondern auch in Samojedien, weniger herrschend in Lappland und Epibergen, in Grönland, Labrador und Hudsonien, überhaupt da weniger, wo ein coupirtes Terrain ist.

Mit der Politrichum-Steppe haben nur wenige Gefäßpflanzen zu schaffen. Im Zambrellande wehen sich zwei unfer Wollgräser (Eriophorum vaginatum und Schenck-zeri) und ein Mabelgras (Luzula hyperborea) in sie hinein, so aber, daß sie ziemlich die Hälfte der Bodendeckung ausmachen. Trotzdem verschönern sie die schmutzig gelbbraune Moosdecke nicht. Ihre gelben Graspitzen stehen nur wenig von derselben ab; unteine, wie durch einen Flor, wie sich v. Willdenow's ausdrückt, schimmert der grüne sprossende Theil des Rasens hervor. Da allein, wo der Boden sich etwas senkt, das Wasser des Frühlings reichlicher hinzufließt und hierdurch eine größere Temperatur dem Boden bringt, da nur thaut das Bodeneis früher und tiefer auf, da sproßt ein tieferes Grün, dichter und länger werden die Halme, es erzeugt sich ein Rasen von 3 bis 4 Zoll Höhe, der das Moos verdrängt und es auf die zwischenliegenden Gänge einengt. Hier und da erscheinen nun kleine Flecken, Blumenrasen von einigen wenigen Arten, die etwa  $\frac{1}{10}$  der Bodendeckung einnehmen: Dryas octopetala oder Cassiope tetragona, noch seltener, von wenigen Rentkiesflechten beleitet, verküppelte Pflänzchen von Clrysosplenium alternifolium, Ranunculus pygmaeus, Draba-Arten u. dgl. Auf der Zundra Samojediens streichen sich ähnliche Kräuter ein, wo das Wollgras (E. vaginatum) nicht Alles überwuchert und mit seinen atlasglänzenden, leicht erglühenden Wollköpfen eine große Beweglichkeit in die Landschaft bringt: Eutrema Edwardsii, Ranunculus Pallasi, Geranium albidum, Oxypetala borealis, Gymnandra Pallasi, Valeriana capitata u. A. Ohne das Frühjahrs-wasser müßten aber selbst diese wenigen Spenden der Flora aus der Wärme strahlenden und darum kälteren Ebene verschwinden, müßten sie sich allein, wenn sie vorhanden wären, an die Gehänge der Bergkuppen flüchten, wo das Schneewasser nur vorübergehend oder gar nicht herabtränkt, wie es v. Baer auf Nömjaja Semlja fand. Umgekehrt wäre es, wenn das Schneewasser immer bliebe. Dann würde es die Temperatur immer auf 0° erhalten und jene Kräuter schwerlich am Leben erhalten. Das ist auch der Grund, weshalb innerhalb der offenen Flächen des Polarlandes keine phanerogamischen Wasserpflanzen mehr angetroffen werden, die schwimmend einen grünen Ton in die fliehenden Gewässer bringen könnten. Aus demselben Grunde gehören die weitauagebreiteten Tundren des borealen Dis-sibitrens oder der Provinz Jakutsk zu den traurigsten der Polarwüste, weil sie nicht allein kalte, morastige Moosflächen sind, sondern weil sie zugleich auf einem Boden liegen, der seit Jahrtausenden nicht mehr oder nur höchst oberflächlich aufthaut, weil sie den größten Kältegrad (—40° K.) zu ertragen haben, der wesentlich durch die furchtbaren Eistberge (Toroffen) der naben Küste verästelt wird. Hier, wo Erd. v. Wrangel die Küste des Eismerees 25 geogr. Meilen breit von einer Eisdede gepan-zert fand, wo das Eis nur aufstaut, um seine Schollen zu jenen Toroffen emporzutürmen, die sich reihenweise gleich Eisgebirgen über 100 Fuß hoch längs der flachen Küste schleichen: da flüchtet die ärmliche Vegetation selbst von den Tundren hinweg und begibt sich unter den Schutz der süblicheren Bergzüge. Die Umgegend von Nömjaja

temel (69° n. Br.) ist die traurigste Sumpfniederung, welche die Erde trägt. Wenn nicht unaufhörliche Nebel und Niederschläge die Wärme gleichmäßig über den Erdboden verbreiteten, so würde die Schwankung der Temperaturen so groß sein, daß schwerlich auch nur eine Gefäßpflanze in diesem eisigen Klima ausharren könnte. Mit Wohlgefallen ruht deshalb das Auge des Reisenden auf der kleinsten Fläche von grünem Moos, der sich an einem feuchten Orte zeigt.

Im Allgemeinen, so scheint es, fällt die Moossteppe mehr auf die östliche Halbkugel, die Flechtensteppe mehr auf die westliche. Wir haben letztere früher schon vielfach in Lappland gefunden und als das Kleid der trockenen, von eisigen Winden nur zu vielfach heimgesuchten Hochflächen kennen gelernt. Auch in der arktischen Tiefseehöhe Russlands findet sie sich auf die Höhen und Kuppen des Berglandes (Pai) beschränkt. Sie legt sich aus den verschiedensten Flechten zusammen: aus Renthierflechten (*Cladonia rangiferina*), isländischem „Moos“ (*Cetraria islandica*, *cucullata*, *nivalis*), *Cornicularia* (*Cornicularia tristis*, *divergens*, *ochroleuca*, *pubescens* u. A.), *Stereocaulon paschale* und andern einzelfrüchten Formen. Alle diese Flechten vertreten gleichsam die Baumform unter ihrer Familie, weil sie ihr Laub entweder gleich mitnutzen, wenn oft auch mehrere Zoll lang, Stengeln emporstehen und es vielfach in Ästchen theilen, oder weil sie dieses Laub doch außerordentlich zerstückeln und eine Fülle von Spizen erzeugen. Aus diesem Grunde muß eine Flechtensteppe von dichtem Zusammenhange die empfangene Wärme ganz außerordentlich zurückstrahlen, da jede Zweispitze daran theil nimmt. So ist es auch in Wirklichkeit, und zwar um so mehr, als die grauweiße oder doch blasser gelbe Flechten und die erdrückende sommerliche Lichtfülle des Polarlandes dazu wesentlich beiträgt. Daher kommt es auch, daß Reisende in Lapplands Hochlande oft schon von einer arktischen Höhe überrascht worden sind, von einer Höhe freilich, die innerhalb 12 Stunden zwischen +20° R. und +5° R. hin und her schwankt, mit Sturm, Regen und Schnee wechselt. Wenn unter solchen Umständen die Flechten nicht Alles überwucherten, so müßte die Flechtensteppe die kälteste, reichste sein. Sie ist es aber nicht, und was sich in sie hineinmügt, wo der Boden feuchter ist, ragt kaum über die Flechtenhöhe empor: Steinbreche, Primeln, Kieferkräuter u. A. Im Taimorlande fand W. Lindbörger den mittleren Blumendurchmesser mehr als 5, bei manchen Arten sogar zwischen 12—18 Linien, während die mittlere Wuchshöhe etwa 5 Zoll betrug, obschon 31 Arten zwischen 6 bis 14 Zoll schwankten. Da jedoch an andern Stellen die Kräuter auch unter der Polarsonne ein üppiges Wachstum anzunehmen vermögen, so folgt daraus, daß der Flechtenboden der magerste sein muß; und er ist es jedenfalls um so mehr, da Flechten als äußerst langlebige Pflanzen kaum so viel Humus erzeugen, wie zu einem normalen Wachstum der Kräuter nöthig ist. Mit Recht nennt darum das Volk in einigen Gegenden Deutschlands die Renthierflechte „Hungermoos“. Selbst die Strauchformen, welche doch diesen Boden am meisten

lieben, so weit sie zu den die Halbe liebenden Formen gehören, bleiben niedrig und drängen sich nur da ein, wo die Flechten einen Raum gelassen haben, wo der Boden feuchter ist. Und doch ist noch die äußerste Grenze des Menschen an diese Flechtensteppe gebunden. Wo sie in Sibiren nicht mehr vorkommt, im Taimorlande, auf der Halbinsel Jatalm und auf Nónaja Semlja, da fehlt auch das Ken und mit ihm der Mensch.

Schließlich löst sich auch die Flechtensteppe in einzelne Arten auf, die nicht mehr in dichtem Zusammenhange, sondern einzeln die kältesten, windigsten Orte, besonders die Felsen bewohnen. Diese letzte Vegetation der Erde, die Polarformation, trägt wie die Moossteppe ihre Schönheit in sich selbst. Moose und Flechten sind die eigentlichen Kennzeichen der Polarzone, Kropfegamen überhaupt ihr eigentlicher Reichthum. Mit Recht erkauften die Botaniker, als Wahlberg im J. 1802 von den Geshaden des nördlichsten Europa, vom Nordcap und Altnsford zurückkehrte und von da eine Fülle neuer, theilweise prachtvoller Flechten brachte, welche dort bald die Küstenseiten, bald die vom Schneemasse überflossenen, die trockenen, sowie die von eisigen Winden agestlichten Gesteine bewohnen. Hier, wo zuletzt kein Kraut mehr gedeiht, hauchen gerade Flechten den sonst so wilden, traurigen Felsmassen noch ein Leben ein, das uns an weit mildere Zonen erinnert. In Grau, Weiß und Gelb, im feurigen Gold (*Parmelia chlorophana*), in Braun, Roth und Smaragdgrün, aber auch im dunkelsten Schwarz überziehen sie das starre Gestein mit einer lebendigen Kruste, jede Art sorgsam ihren Wohnort wählend. Selbst die öden Moorfelder erhalten noch durch Flechten ein fruchtbares Ansehen. So fand W. Lindbörger im Kirchspiel Kusamo (Russ. Lappland, 66° N.) eine Art (*Bistorta isomacrophila*) in 1/2 Elle großen Exemplaren Moos, Stöcke und Stelne überlegend und damit den einzig tröstlichen Anblick bietend. Aber nicht nur in Krustsen, sondern auch in großen, dicken, lederartigen Lappen erheben sie sich mit einem Laube, welches die canadischen Pelzjäger trip de roche (Felseneingeweibe) genannt haben. Es sind Gyrophoren oder Umbilicaren (*Gyrophora Mühlenbergii* Spr.), wie auf den höchsten Alpen die letzten kältlichen Bürger des Gewächseriches. Gleich dem isländischen Moos, welches auf Islands Fjuren als Fjalla-Gras für die dortigen Bewohner eine so hohe Bedeutung erlangt hat, bereiten sie noch an dem äußersten Pole des Lebens ein Flechtenstärkmehl, das zwar nicht mehr für das Wohlleben geschaffen ist, das aber doch ausreicht, einen schwachen Lebenssaft zu erhalten. Man spricht mit Recht von einer Polarwüste. In den östlichen Wüsten Sibiriens und Nordafrikas nudert noch eine Flechte, die kaltlos auf dem ausgeborstten Boden hin und her geweht und doch noch von den Bewohnern genossen wird, der alte Lichen Jussulii; das Aehnliche zeigt auch das äußerste Polarland. Unter der glühenden Sonne, wie unter der erstarrendsten Kälte dieselben Wirkungen im Pflanzenreiche zu sehen, ist Dasselbe, wie wenn Feuer und Kälte als die äußersten Gegenätze den thierischen Organismus auf gleiche Weise zerstören.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

N 41.

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

13. October 1869.

Inhalt: Die Klugheit der Thiere, von Karl Schmeling. Erster Artikel. — Vom Montecosa zum Montblanc, von Otto Me. 7. Das Hospital. — Eine wunderliche Herbstfester, von Paul Kummer. Zweiter Artikel. —

## Die Klugheit der Thiere.

Von Karl Schmeling.

Erster Artikel.

Das Thier hat auch Verstand, das wissen wir,  
die wir die Gensien jagen u. s. w.

Schiller, Wilhelm Zen.

Der Verstand der Thiere ist ein Thema, welches bereits von vielen Gelehrten wie Ungelehrten, von berechtigten und nicht berechtigten Autoren, von Menschen, die selbst Thiere beobachteten, und von andern, die nur nach „Hörnsagen“ schreiben, behandelt worden ist, ohne daß es bisher als erschöpft zu betrachten, ja, auch wohl je so weit erschöpft werden dürfte, daß der Satz: „Das Thier hat auch Verstand!“ als unbestreitbar feststehend gelten könnte.

Dies kommt mit daher, daß die Mehrzahl der Menschen, welche Gelegenheit haben, fortgesetzt Thiere zu beobachten, in Gemohnheitschleiden verfallen, sich gar nicht

die Mühe geben, auf das Hervortreten besonderer Züge des Thierlebens zu achten, daß von den Wenigen, welche solches thun, noch viel Weniger dabel die Wichtigkeit dieser Erscheinungen in's Auge fassen, daß wiederum von diesen nur eine geringe Zahl die Gabe hat, über die gemachten Beobachtungen zu berichten, und daß endlich von diesem für die Sache lebendig in Betracht zu ziehenden Minimum nur Einzelne so berichtigt und schreiblustig sind, ihre Bemerkungen wirklich zu Papier zu bringen.

Durch die Versetzung aus dem natürlieheren Landleben in die Steinhausen, welche wir Städte nennen, wird der engere Zusammenhang des Menschen mit dem allgemeinen Thierleben überhaupt zerrissen, er mag sich dagegen sträuben oder nicht. Ich habe dies an mir selbst erfahren; denn während ich in einer großen Residenz wohnend,



lange Jahre hindurch mich noch immer mit allerlei Ge-  
stirle zum Aerger vieler andern Leute umgab, bin ich doch  
endlich so weit gekommen, daß ich seit Jahr und Tag  
nicht einmal mehr einen Kanarienvogel besitze.

Von dieser Residenz ein Wort zu sprechen, so hat  
sie allerdings einen Thierschutz-Verein oder Vereine, thut  
aber dabei dem klüglichen und namentlich dem Menschen  
verweisten Thiere, dem Hunde, wenn er nicht Steuermarkt  
und Kemaufkorb ist, die Schmach an, ihn durch Abbeder-  
knechte aufzuseilen zu lassen, die ihn schließlich zum Tode  
verdammen, wenn der Herr oder Besitzer des Thieres nicht  
einen Auslöschungsbahler weit vor die Stadt hinaus trägt,  
welcher Thaler dann häufig Veranlassung wird, daß der  
Mensch sich weniger anhänglich und treu als das Thier  
zeigt.

Diese Steuermarkt, Mautkord, Aufzeseilungs- und  
Auslöschungs-Angelegenheit ist ein so vielseitiger Gegen-  
stand, daß er nicht allein vom naturhistorischen, sondern  
auch vom staatswirthschaftlichen, kommunal-politischen,  
steueramtlichen, moralischen und noch viel andern Stand-  
punkten eine eingehende Beleuchtung verdient, während  
ich mich nur an den ersten halten kann und will.

Die Hunde kennen nämlich ihre Verfolger mit dem  
Bischofste von dem Kopfe ziemlich gut, und man kann  
sich täglich sehen, wie größere Thiere, wenn sie vor ihnen  
stehend, glücklich das Portal des Hauses, dem sie ange-  
hören, erreicht haben, sich umwenden und ihnen das Ge-  
dächtniß mit obligatem Knurren zeigen, wogegen sie sich um  
andere, neben ihnen vorbeipassende Personen gar nicht  
kümern. Auf der Straße gefast, sehen sie sich nur sel-  
ten zur Wehr, sträuben sich nicht einmal mitzugeben, woran  
freilich wohl die verhängnisvolle Drahtschlinge, mit wel-  
cher sie gefangen werden, schuld sein mag, und in den  
Aufbewahrungsraum der Scharfkeulen gespart, zeigen  
alle ohne Ausnahme eine Angst, welche nur durch em-  
pfundene Todesfurcht zu erklären ist. Ich weiß es nicht,  
vermüthe aber, daß die Exekution der Verlassenen oder  
Aufgegebenen in Gegenwart der Uebrigen vorgenommen  
wird, und der ältere Stamm den Neuantkommenen über  
das Schicksal so vieler Leibesgefährten Mittheilung macht;  
denn die Mittheilungsgabe der Thiere ist wenigstens un-  
bestreitbar. Aber auch ihre Fähigkeit, die Zeit zu berech-  
nen, geht aus Folgendem deutlich hervor.

In der kleinen Stadt, deren Schule ich in jüngern  
Jahren besuchte, wohnte eine verwitwete Greisin, welche  
mit ihrer Schwester, einer alten Jungfrau, an einem be-  
stimmten Tage der Woche zu dem vor der Stadt belegenen  
Friedhofe hinausfuhr, um 1 Stunde am Grabe oder im  
Gewölbe des verstorbenen Grafen zuzubringen. Ich glaube,  
es war die Schwester, welche als große Hundefreundin  
auf dem Rückwege den Rest zu dieser malinée a la four-  
chette versammelten allerhöchsten Köten der Stadt einige  
recht hübsche Kalbs-, Kinder- und Hammelbraten miede-

stens seit einem Vierteljahrhundert zuküßen ließ. Ich  
konnte aus dem Giebel Fenster meines Stübchens den er-  
was wußten Episselolen vollkommen übersehen, habe aber  
an andern als den Festtagen nie auch nur einen Hund  
dort umhergeschweifelt sehen, woraus wenigstens hervor-  
zugehen scheint, daß die thierischen Gasse des alten  
Gräuelins, von denen sich Thiere schon am bestimmten  
Tage vor Sonnenaufgang einsanden, bis 7 zählen konn-  
ten, was genau um zwei Zahlen mehr ist, als die Rech-  
nenkunft der Neuseeländer reicht.

Daß manche Hunde den Gegenstand kennen, über  
welchen ihr Herr mit Jemandem spricht, und fast Alles  
verstehen, was über denselben gesagt wird, kann man an  
Doggen, Neufundländern, Jagdhunden und Schäfer-  
spitzen sehr leicht beobachten, indem sie häufig dasjenige  
ohne directe Anweisung ausführen, worauf im Gespräche  
hingedeutet wird. In dem folgenden Falle scheint jedoch  
auch dies Verständniß mit Nachdenken verbunden gewesen  
zu sein.

Mein Vater besaß als Kledinghund längere Zeit eine  
alte Dachshündin der größten Race, die ihre Bevor-  
zugung theils wegen großer Wachsamkeit, theils wegen  
ihres Muthes, besonders aber noch deswegen verdiente,  
weil sie nie ohne wirklich vorhandene Noth laut ward.  
Gewaltige Narben und ein selbendes Auge waren hin-  
längliche Beweise harter Kämpfe mit dem Thiere, dessen  
Gegnerschaft die Race den Namen verdankt. Diese alte,  
muthige, einäugige Dame ging noch sehr spät eine zärt-  
liche Liaison mit einem galanten Jüngling von der klei-  
neren Doggenrace ein, welche nicht ohne Folgen dleb.  
Wie häufig im Leben küßte die Dame den für ihr Alter  
leichtfertigen Streich mit dem Tode, indem sie nicht wie-  
der zu Kräften kam und bald an Schwäche starb, die  
drei Sprößlinge ihres Wurfs dem trauernden Herrn über-  
lassend. Zwei derselben bekamen meine Onkel, beide Forst-  
beamte, den dritten behielt mein Vater und taufte ihn  
Wante. Jene ersten nahmen, noch ehe sie über die  
Jugend hinauskamen, durch Ueberfahren und einen un-  
vorsichtigen Schuß ein trauriges Ende, doch Wante ge-  
died als neuer Günstling des Hausherrn zu einem präch-  
tigen Bastardexemplar. Von beiden Eltern hatte er den  
gebrungenen Bau und die muskulösen Beine, von der  
Dogge die Farbe, von Dachshunde den langen, spitzen  
Kopf, weiten Rücken, das gewaltige Gebiß, den Behang  
und den fest geträufelten Schwanz. Sein Naturell zeigte  
sich schon früh als ruhig, seine Anlagen waren viel ver-  
sprechend, und die Mitleidlichkeit seiner Gesinnungen ging  
daraus hervor, daß er mich schützte, wenn ich von größe-  
ren Jungen geprügelt ward, oder auch mir zu Leibe ging,  
wenn ich es mit kleineren so machte, wovon ich noch  
heute Narben am linken Auge trage. Vorläufig errang  
er sich den Ruf eines Helden dadurch, daß er, ausgemach-  
ten, die stärksten Hunde des Gutes durch seine Ausdauer

bezwang und namentlich dem großen Kettenhunde beide Vorderläufe so zerriß, daß die Rede davon war, denselben todzuschießen, weil man seine Herstellung bezweifelte. Zu diesem Kusse gesellte sich später der eines klugen Thieres, welches seinem Herrn alle Wünsche an den Augen ablas und sich von Niemandem, als nur von ihm anlassen ließ, was ich sehr oft zu meinem größten Nachtheil erfahren mußte. Als ihn aber einst einer meiner Onkel zur Dachschußjagd benutzte, ward plötzlich der ganze Umfang seiner Vortrefflichkeit klar, da er mit wahrer Wuth in die Waue ging und die stärksten Dackel- und Fuchse hervorholte, einft sogar ein Fuchspaar erwürgte und ein Thier nach dem andern zu Tage schleppte. Mante kam jetzt wenig vom Kelsfeld, da ihn alle Jagdliebhaber und Jäger der Umgegend gelegentlich lieben und ihn unschätzbar zur Verfügung erhielten, wenn sie es verstanden, den Vater durch einige Schmeldelein für den Hund zu gewinnen. Doch als er einst im Baue geblieben und ausgegraben werden mußte, hörte das Jagdvergnügen — mein Vater selbst war kein Freund desselben — gänzlich auf, weil es den Verlust des Lieblings drohte.

Im J. 1829 oder 1830 grassirte — wie früher schon öfter — die Tollwuth der Hunde in der Gegend, und die Behörde hatte bestimmt, daß alle Hunde der Gegend, in der ein Thier toll geworden oder sich ein toller Hund gezeigt, getödtet werden sollten. Dieser Umstand trat denn auch bei uns ein, und die Hundeverwaltungskommission war jeden Tag zu erwarten, weshalb Mante zu einem der Onkel gebracht und diesem, der längst seinetwegen vergebliche Bitten verschwendet und bedeutendes Geld geboten, zum Geschenk gemacht ward. Der Wohnort dieses Onkels war drei starke Meilen von dem unsern entfernt.

Nach Ablauf von zwei Jahren passirte dieselbe Geschichte auf der Oberförsterei. Die Kommission erschien, ihre Pflicht zu thun oder thun zu lassen, doch der Onkel weigerte sich, alle seine werthvollen Hunde dem Tode zu überantworten. Es gab heftige Debatten, und da das Jagdpersonal des Onkels noch weniger als er selbst geneigt war, sich die Hunde nehmen zu lassen, so mußte die Kommission vorläufig abziehen, ohne auch nur einen Hund ihren grausamen Absichten geopfert zu haben. Mante war als Stubenköter Zeuge der ganzen Verhandlungen gewesen, und was that das kluge Thier? — es macht sich auf den Weg zu uns und springt eines schönen Morgens freudig in das geöffnete Zimmer des Vaters. Nie zuvor war er sonst allein gekommen und stets ohne Weigerung wieder mit dem Onkel davongegangen. Um aber vollständig zu beweisen, daß Ueberlegung und Nachdenken im Spiele sein mußte, versteckte er sich, als der Onkel später erschien, ihn zurückzuholen, und wiederholte dies stets, so oft jener oder irgend Jemand von der Oberförsterei den Hof betrat. Das Thier war dort nicht allein gut behandelt worden, sondern hatte stets dem Onkel und besonders dessen

Töchtern große Anhänglichkeit bewiesen, so daß kein anderer Grund zu seiner Entfernung als die drohende Gefahr erkennbar wurde; ein Schritt, der nicht mehr dem Instinkt allein zuschreiben ist. Mante blieb natürlich wieder bei uns; wenn aber der Vater, von ihm begleitet, den Weg zum Forsthaufe einschlug, machte er stets Kehrt und trabte mit hängendem Schwanze heimwärts. Das Thier hatte meiner Meinung nach auch Verstand.

In der Granitz, einem zur Herrschaft Putbus gehörigen, auf der Halbinsel Mönchgut der Rügenischen Inselgruppe liegenden großen, wildreichen Forste, wohnte ein Köstlich oder Büdner, welcher zwei mittelgroße, schwarz und weiß gefleckte Hunde hatte, die von demselben Wurfe, wahrscheinlich Basstare vom Jagdbund und Spitz waren, zwei hervorragenden klugen Hunderacen. Dies eine Bruderpaar liebte und übte die Jagd leidenschaftlich, jedoch nicht, wie sonst der einzeln suchende Hund oder die jagende Meute, durch reines Aufnehmen und Verfolgen der Spur. Vielmehr jagten sie in der Manier der Wölfe, indem der Eine das Wild dem Andern zutrieb, der demselben an die Kette sprang, sobald es ihm nahe gekommen. Lange hatten sie dies Wildern geübt und ihr Herr häufig den Vortheil davon genossen. Den fürstlichen Forstbeamten war die Verringerung des Wildstandes unerwünscht, und man dachte sogar beim Auffinden einzelner leiberrigterten Stücke Wild daran, daß sich ein größeres reichendes Thier in der Gegend heimlich gemacht haben müsse. Da schoß eines Tages ein Jäger, vielleicht mehr aus Uebermuth als aus einem andern Grunde, einen der Hunde, als er sie im Walde traf, nieder, und die Sache hatte ein Ende, ward auch jetzt in ihrem ganzen Umfange bekannt. Der überlebende Hund jagte nun nicht mehr und war, nach der Versicherung des Besitzers, nie wieder in den Wald zu bringen. Ja, dieser Hund, der öfter Zeuge gewesen, daß andere Thiere durch einen Schuß getödtet worden, winselt und krümmt sich ängstlich, sobald man ein Gewehr auf ihn anschlügt; das ist ebenfalls mehr als Instinkt, es zeigt Beobachtungsgabe, Gedächtniß, Beurtheilung, Einsicht, Ueberlegung, mit einem Worte — Verstand an.

Auf die Klugheit der Pudel, der Wasserhunde überhaupt will ich nun hinweisen, und was den Pommer oder Schifferspitz betrifft, so mache man sich, wenn es angeht, einmal das Vergnügen, ihn einen Tag lang eine Herde hüten zu sehen, und wenn er dabei nicht verständiger als sehr viele Menschen erscheint, der zählt vermuthlich zu den Letztern.

Ja, das ist aber auch der Hund! könnte man sagen, und seine Klugheit eine feststehende Sache. Indessen gibt es noch eine Menge anderer Thiere, denen nur Sprache und Hände zu fehlen scheinen, um dem roheren Menschen wenigstens an Intelligenz gleich zu stehen, und zu ihnen zählt von den domesticirten Thieren bei uns noch das Pferd.

## Vom Monterosa zum Montblanc.

Von O. H. U. L.

### 7. Das Aosthal.

Im Süden der Walliser Alpen, zwischen diesen und den piemontesischen Alpen, erstreckt sich vom Süßfuß des Montblanc bis zum Süßfuß des Monte Rosa ein herrliches Längsthal, das von seiner Hauptstadt den Namen des Aosthales führt. Die Doire, Dora balnea der Römer, durchfließt dieses Thal. Sie wird von vier Quellen gebildet, von denen die beiden nördlichen an den Abhängen des Montblanc ihre Ursprung nehmen. Der eine von diesen geht aus den Gletschern der Allée Blanche hervor und durchfließt den See von Comballes, der andere entspringt in dem Haisenthal von Jertex an der Grenze des Wallis und vereinigt sich mit jenem unweit der Bäder von la Caze, um sich bald darauf mit dem aus den beiden südlichen Quellen hervorgegangenen Bache zu verbinden. Von diesen südlichen Quellen liegt die eine in einem kleinen Thale am Nordabhang des kleinen St. Bernhard, die andere in einem See des schönen Rutorgebirges, das sich im Süden der Stadt La Thuille erhebt. Die Wasser der ersteren stürzen sich durch den engen Schlund von Pont Serran und vereinigen sich bei La Thuille mit denen der andern, um endlich bei dem Fleden Pré-Saint-Dibier dem aus dem Thale von Courmayeur herkommenden nördlichen Fluße zu begegnen. Den Namen der Doire nimmt aber der Fluß erst dann an, wenn er sich unmittelbar unterhalb Aosta mit dem Verbier, einem wilden, wasserreichen Bergstrom, der in ungehütem Sturze vom großen St. Bernhard herabkommt, vereinigt hat. Aber auch auf seinem weiteren Laufe durch das Thal empfängt er noch von allen den zahlreichen Seitenthälern, die von Norden und Süden her in das Hauptthal münden, neue reichliche Zuflüsse, so daß seine Wassermasse zuletzt eine ganz ansehnliche wird. Die bedeutendsten dieser Seitenthäler sind von Norden her die von Courmayeur, von Valpelline, von Val-Touranche und von Chaballan, endlich im Nordosten das Thal von Gressoney, von Süden her die Thäler von Valgrisenche, von Rhêmes, von Balsavarande, von Cogne, von Jéniß und von Champey. Die nördlichen Thäler sind meist kurz, durch weniger hohe, aber schroff abfallende Gebirgskämme geschieden, deren Wände von Tannen- und Lärchenwäldern bedeckt sind, so weit nicht der zunehmende Bergbau sie ihres grünen Gewandes bereits entkleidet hat. In ihrem Hintergrunde lauern überall Gletscher und ewige Schneewüsten. Auch von Süden her schauen vielfach Eis und Schnee in das schöne Thal nieder. An großartigen Berggestalten wandelt man vorüber, wenn man von Ivrea her das fast 30 Stunden lange Thal durchzieht. Da grüßen von Norden her die Riesen der Alpen, der Monte Rosa, der Mont Cervin, der Mont Combin und Mont

Bélan, endlich der stolze Montblanc, während von Süden her der enge Thalspalt gegenüber, die zum großen St. Bernhard hinaufführt, sich die schönen Gipfel des Bec de Nône und des Mont-Emilius erheben, zwei der lohnendsten Aussichtspunkte in der Alpenwelt überhaupt, dann der Pic de la Grivola mit seiner scharfen Spitze und seinem von wundervollen Elenabeln starrten Gletscher, endlich am kleinen St. Bernhard der Autor mit seinen ausgedehnten Eis- und Schneefeldern den Blicken des Wanderers sich darbieten.

Romantisch wie das ganze Thal, wechselnd zwischen erschreckender Wildheit und lieblicher Anmuth ist auch der Fluß, der es durchströmt. Bald ein wilder, zügelloser Bergstrom, schäumt er über gewaltige Felsblöcke oder stürzt sich in rauschenden Cascaden in abgrundtübliche Tiefen, bald wieder ein ernster, stiller Strom, wälzt er seine friedlichen Gewässer durch grüne Wiesen. Der vielfache Terrainwechsel des Thales, das sich bald in schmale Felsenengen zusammenzieht, bald wieder zu grünen, üppigen Ebenen erweitert, bedingt auch den Charakter des Flusses. Aber ebenso schließt sich diesen Wechsellagen auch die schöne Landstraße an, die das ganze Thal von Ivrea bis Pré-Saint-Dibier durchzieht, immer dem Laufe der Doire folgend. Es ist die alte Römerstraße, die einst von Valais nach Wienna in Gallien (Wienne del Leon) führte, und noch erblickt man an mehreren Stellen die Ueberreste der alten Straße und betritt sogar bei Donnas und Bard dasselbe Pflaster, auf dem einst die römischen Heere und die römischen Handelsleute hinarbeiteten.

Wenn auch die Bewohner der Aosthales erst gegen Ivrea hin in italienischer Zunge reden, während in dem ganzen obren Thale die französische Sprache gemischt mit dem piemontesischen Idiom herrscht, ist es doch bereits italische Luft, die man hier athmet, italische Sitte und italische Leben, von dem man amgerweht wird. Allerdings ist die Luft nur in dem ebenen und tieferen Theile des Thales weich und mild zu nennen, in dem oberen ist sie frisch, rein und ungemün kräftig. Auch die Winter sind lang und hart, ohne doch der Ueppigkeit der Bodenerzeugnisse Eintrag zu thun. So köstliche Wiesen, so reiche Fruchtfelder erblickt man im Norden der Alpen nicht, und die Erzeugnisse der Weingärten können sich mit den besten Weinen Südranckreichs messen. An Pflirschen und Feigen herrscht Ueberfluß, und die Nuß- und Kastanienbäume erreichen riesige Dimensionen. Die Verschiedenheiten des Klima's, die in dem langen Laufe des Thales hervortreten, äußern ihren Einfluß auch auf die Bewohner. In den höheren Seitenthälern, wie im oberen Aosthale selbst, sind die Menschen kräftig, hochge-

wachsen, intelligent, von einem gewissen abenteuerlichen Geiste, der sie treibt, ihr Geburtsland zu verlassen, um in der Ferne ihr Glück zu suchen. In den niederen und ebeneren Theilen des Thales sind sie kleiner, und ihr Ehrgeiz beschränkt sich darauf, in angenehmer Ruhe unter dem väterlichen Dache zu leben. Hier wird dem Reisenden leiter nur zu häufig der Anblick der trauerigsten Armuth, verbunden mit dem entsetzlichsten Schmutz. Auf

dem ganzen Wege von Chatillon bis Aosta konnte ich mich nicht überwinden, in eines der schmutzigen Häuser einzutreten, so sehr mich bei der ermüdenden Wanderung auf sonniger Chaussee nach einer Erfrischung verlangte. Nur den köstlichen Pfirsichen und Pflaumen, die vor der Thür einer Hütte zum Verkauf ausgestellt waren, konnte ich nicht widerstehen. Mit der Armuth und der Unreinlichkeit verbindet sich, wie im Wallis, auch hier die entsetzliche Krankheit des Crezinkemus, obgleich das Uebel bei Weitem nicht so schlimm und so verbreitet ist, wie es frühere Reisende darstellten, und wie es vielleicht auch einmal gewesen sein mag.


So unendlich reich das Interesse bietet dieses Thal in seiner Geschichte und seinen Alterthümern, wie in seiner Natur, daß man sich bei seiner Schilderung auf das Nothwendigste beschränken muß. Seine Geschichte allein verdiente Gegenstand einer besonderen Abhandlung zu sein. Welche Wechsel haben dieses Thal betroffen! Hier lebte einst ein thatiges, mannhaftes Volk, das länger als ein Jahrhundert der römischen Weltmacht trogte, bis es von den Heeren des Augustus besiegte, nach der abscheulichen Sitte römischer Politik, mit Weibern und Kindern von seinem Boden gerissen und, zur Sklaverei verdammt, weit hin über das römische Reich zerstreut wurde. Hier liegen

sich später die Longobarden nieder, bis Karl der Große ihr Reich zerstörte. Hier entfaltete das Mittelalter seine Romantik mit all ihrer Herrlichkeit und all ihren Gräueln.

Die Geschichte des Bodens und seiner mannigfaltigen Gesteine, seiner verschiedenen Gebungsperioden, seiner reichen Mineralschätze, die schon im Alterthum bekannt waren und ausgedeutet wurden, wäre ebenso in höherem Grade geeignet, Gegenstand eingehender Untersuchungen zu werden. Ich be-

schränkte mich auch hier nur auf eine Thatsache, die dem aufmerksamen Wanderer nicht entgehen kann, und die zu den interessantesten der Geschichte unseres Erdbodens überhaupt gehört. Dieses Thal von Aosta, jetzt prangend im Schmucke einer südlichen Vegetation, eine lebende Stätte menschlichen Betriebs, es war einst, in jener Epoche, die man die Eiszeit unserer Erde nennt, und die, wie man annimmt, unmittelbar dem Auftreten des Menschengeschlechtes voranging, von einem gewaltigen Gletscher bedeckt, der sich vom Montblanc bis gegen Jurea über einen Raum von fast 30 Stunden Länge und 4 Stunden Breite erstreckte und sich mit den Gletschern des Monte Rosa ver-

einigte. Welcher andern Wirkung sollte man sonst die mächtigen Granitblöcke zuschreiben, die sich über das ganze Thal in den verschiedensten Höhen und bis zu außerordentlichen Entfernungen von dem einzigen Punkte vorfinden, an dem gerade diese Art des Gesteins in ursprünglicher Lage vorkommt, dem Montblanc? Aus welcher andern Wirkung sollte man sonst die geglätteten Flächen, die Klippen und Streifen der sogenannten Rundhöcker erklären, die sich an den Gehängen des Thales bis zu einer Höhe von mehr als 600 Fuß über dem Spiegel der Dolz-



Der Wasserfall der Dolz bei St.-Benoit-Thier.

vorfinden? Welche andere Gewalt sollte den mächtigen Trümmervall geschaffen haben, der in einer Höhe von 600 bis 1000 Fuß und in ansehnlicher Breite am Ausgang des Kofstathales die Ebene von Joreca umschleift, und der durch seine Gestalt wie durch seine Zusammenfügung aus großen eckigen Blöden, die von kleinerem Gerölge umhüllt sind, so auffallend an die Endmoränen der heutigen Gletscher erinnert? Allerdings sind die Geologen noch nicht ganz einig in der Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinungen, da es wenigstens noch immer Einzelne gibt, die sie aus der Wirkung von Schlammschloten ableiten wollen, die der Gletscherperiode folgten.

## Eine wunderliche Herbstflor.

Von Paul Sumner.

Zweiter Artikel.

So ganz von Abneigung und Furcht gegen die Pilze ist aber doch das Volk nicht erfüllt. Nicht nur, daß fast jedes Walddorf seine kundige Pilzfammetin hat, welche, den Korb in der Hand, die Gebüsche durchkriecht und die benachbarte Landstadt versorgt, — auch der Humor ist im deutschen Volke gegen dies wunderliche Pflanzenreich losgelassen. Der *Agaricus procerus* mit seiner altfäustlich würdigen Physiognomie, durch seine Größe alle andern überragend, ist in deutscher Sprache der „Schulmeisterpilz“; der Steinpilz wird um seiner Güte willen vieler Orten als der „Herrcpilz“ ausgezeichnet. „Eemelpilz“ und „Schafeuter“ und „Phallus“ sind schelmisch der Form abgelaufene Namen; den „Brätling“ und „Schmerling“ läßt der humoristische Name schon in der Pfanne braten und schmoren; das „Teufelskei“ (*Phallus impudicus*), der „Satanpilz“ (*Boletus Satanas*) und der „Speiteusel“ (*Russula emetica*) findet mit liebenswürdigem Spott dem schwarzen Rost der Lüge gewidmet. Die uralten Namen „Geißfuß“, „Eichhase“, „Judasoohr“, „Tobientrompete“, „Kutumlük“ (*Champignon*) zeigen das sinnige Einverständnis des Volksgedächtnisses von Alters her mit den seltsamen Formen. Von ähnlichem Humor zeugen für den Sprachkundigen auch schon die alten griechischen und lateinischen Namen (*Lycoperdon*, *Lycogala*, *Suillus*, *Vulvaria* bis zur Barba Jovis hinauf).

Nicht anders als kindlich läßt es sich bezeichnen, wenn ein sonst ganz verdienstlicher Mann schreibt: „Wer sich zum Lobredner der Pilze aufwerfen wollte, hätte in der That einen schweren Stand. Bedenken wir einige wenige Gattungen ab, welche in der Haushaltung Verwendung finden, wie die Trüffeln, Champignons, Morcheln u. s. w., so kann man von einem Nutzen der ganzen Klasse füglich nicht reden. Bei Weitem die meisten (!) größeren Arten sind schädlich, selbst tödtlich. Die glän-

Aber diese Ansicht dürfte kaum noch zu halten sein. Entweder müßten ja jene Schlammschloten hinreichende Dichtigkeit und Zähigkeit besitzen haben, um die erratischen Blöcke auf ihrer Oberfläche zu tragen, und dann würde ihr Vordringen kaum zu erklären sein. Oder sie müßten flüssig gewesen sein und würden dann die Blöcke gerollt haben, statt sie zu tragen, und diese Blöcke würden dann abgerundet erscheinen, statt jene scharfen Kanten und Ecken zu zeigen, wie wir sie jetzt sehen, und wie sie nur bei der Fortbewegung auf dem Rücken der Gletscher beobachtet werden.

genden Farben einiger Gattungen flößen uns Mißtrauen ein, weil sie nur bestimmt (!) scheinen, Unersabene anzulocken und zum gefährlichen Genuß zu reizen, und selbst die Orte, an denen sie wachsen, erregen Grauen und Mißwillen.“

Der Mann muß, obgleich er über Pilze geschrieben, doch niemals welche gefunden noch beobachtet haben.

Wer aber an der Freude mit Auge und Gemüth nicht genug hat, sondern die Pilze für Küche und Tafel sammeln will, — nun, der muß sie einfach kennen lernen, um keinen Mißgriff zu thun. Wunderliche Frage: welche sind giftig, welche aber nicht? Weg mit aller allgemeinen Regel! Oder wer will eine allgemeine Regel aufstellen, woran die giftigen Fliegen und Schlangen zu erkennen sind, oder wodurch wir die narcotischen Blumen als solche unterscheiden? Farbe, Consistenz, Gestalt, Fundort, Geruch, das Alles gibt keinen allgemeinen Stempel, den die Natur zu der Menschen Ruz und Frommen ihnen aufgedrückt hätte. Selbst der silberne Köffel, der beim Kochen durch sie schwarz werde, ist nur ein gefährlicher kulinarischer Irrthum. — Aber es gibt ein schönes, manche Freude bereitendes Mittel, die guten und bösen wie Böcke und Schafe von einander scheiden zu lernen. Wir müssen sie in Wald und Feld aufsuchen und genau betrachten, nach ihren Unterscheidungszeichen, nach ihrem ganzen specifischen Habitus kennen lernen, wie wir die Rosen und Lilien und Weiden kennen und nie wieder verwechseln. Das lieblichste Buch darüber gibt uns dann an die Hand, welche Eigenschaften bei den einzelnen Arten die Erfahrung nachgewiesen hat. Viele werden wir dabei kennen lernen, die nicht eßbar und nicht schädlich sind; aber es ist eine echte Menschenfreude, nebenher neue, verkannte Schönheiten dieser Welt zu entdecken, mit den lieblichen Geblüden der Pilze bekannt zu werden, die verdammt unser Fuß achtlos zertrat.

Aber es gibt auch rein praktische Naturen, die mit sich darüber lassen, daß es genug sei, die Dinge der Welt nur bei ihrer Nützlichkeitseite zu fassen. Ein einziger herblicher Streifzug durch Kiefernhaide und Laubwald nach einem warmen Regentage kann diese aber für ihre culinarischen Zwecke urtheilssähig machen, wenn sie, diese Nummer unsrer Zeitschrift in der Hand, folgende völlig hinreichenden Angaben beherzigen.

Aus der Reihe der Hutpilze ist die Zahl der essbaren, die auf keine Weise verworfen werden können, eben nur gering. Der Champignon (*Agaricus campestris* und *arvensis*) mit weißem oder gelblichem Hute ist unverkennbar durch seine Manschette und die in der Jugend rosafarbigen Lamellen; auch wenn diese im Alter violettbraun oder schwarzbraun werden und die Manschette verschwindet, läßt er wegen der Lamellenfarbe keine Verwechselung mit unschädlichen Zintenzpilzen zu, die aber einen sinkenden Geruch haben. Die sämmtlich essbaren weißen Maisschwämme (darunter vor Allem der weich wie Handkühler sich anfühlende köstliche Pfäulmispilz (*Clitopilus Prunulus*) mit herablaufenden Lamellen) sind fleischig und ohne Manschette, haben anfangs weiße, dann rosa werdende Lamellen und sind von zartem, angenehmem Geruche. Die durchweg dottergelben Gährlinge (*Cantharellus cibarius*) mit biden, herablaufenden Lamellen und pfefferigem Geschmache munden Jedem und sind kaum mit dem dünnen, ganz weichen, roth angehauchten *Cantharellus aurantiacus* zu verwechseln, welcher verdächtig ist. Die glänzenden Halbmosskronen (*Collybia surodonia*) mit pfenniggroßem, weißlichem bis fuchrothem Hute und frappantem Knoblauchgeschmache sind durch den Geschmack wie durch den hornartigen, dünnen, roth- oder schwarzbraunen Stiel mit keinem schädlichen zu verwechseln; und die wahrhaft wohlschmeckenden (etwa wie Mandeln) Kröcklinge (*Collybia esculenta* und *orcadus*) mit oberhartigem, bis thaler großem Hute, die auf allen Ängern, Wiesen, an Landstraßen truppenweise stehen, sind dadurch keinem schädlichen auch nur von ferne ähnlich. Der glantzweiße, bis zwei Fuß hohe graubraune Parasolpilz (*Agaricus procerus*) mit dürrschuppigem, tellergroßem Hute und derber beweglicher Manschette, hat ein zu wässriges und geringes Fleisch, um schmackhaft zu sein. Die Ritterschwämme (*Tricholoma equestre* und andere *Tricholoma*-Arten), die vor Allem in Kiefernhaide zahllos vorkommen, mit gelbem, braunem oder rothbraunem Hute, mildschmeckendem, derbem Fleische, citronengelbem (nicht orangebleich) niemals adert verbundenen Lamellen, oft verborgenem, innen vollem und oft innen gelblichem Strunke, ohne Manschette und ohne Kiechschilde am Grunde, können mit keinem giftigen verwechselt werden. Ähnlich find die auch essbaren Stiefelschwämme (*Tricholoma supponacea*), aber mit weißen Lamellen und Stielen und derben, grauen, glatten Hüten. Von allen andern, vor Allem von den

rothen, gelben, Kirschenrothen, weißen Keulern (*Russulae*) (mit pergamentdicken, gelben oder weißen Lamellen und sehr mürbem Fleische) und Milchnern (*Lactarii*), die beim Bruche tropfig milchigen, und unter denen es köstlich essbare, aber auch die giftigsten Arten gibt, laßt Jeder die Hände beim Sammeln, der sie nicht als Botaniker nach ihren feinen Unterscheidungszeichen kennt; gerade durch ihren Genuß sind die meisten Vergiftungsfälle bisher vorgekommen. Unter den Boleten (Steinpilzen, Butterpilzen, Schmetterlingen, Schaflauten) mit porösem Fruchtlager unter dem Hute sind die giftigen durchaus unverkennbar durch den mennigrothen oder hochrothen oder heilrosa Anhauch der Poren des Fruchtlagers. Eine höchstens verdächtige, aber seltene Art hat große braune Poren und einen stechenden Pfeffergeschmack; eine schwarzbläuliche Färbung des Fleisches beim Bruche und des Fruchtlagers schon bei der Berührung hat nichts zu besagen. Diese massigen Individuen, die vor Allem in Kiefernhaiden wachsen, geben die reichlichsten Mahlzeiten. Die Hedreen, deren Fruchtlager unten aus weichen Stacheln besteht, besonders eine massenhafte in Nadelgehölz vorkommende Art mit schwarzbraunem, großschuppigem Hute (Kirschk-, Habichtschwamm (*Hydnum imbricatum*), dessen flachelige Unterseite rebhellerartig ausseht und so auch sich anfaßt, sind sämmtlich essbar.

Unter den „Keulenpilzen“ (*Clavariaceae*) sind die kienemartigen Morcheln mit eis- oder kegelförmigem Hute und desgleichen die Helvetten mit saltig gewundener brauner Mütze die ausserordentlich und unverkennbaren Lieblinge der Gutmacher. Die einzige verdächtige *Helvella suspecta* mit triekeligem, wässrigem Hute ist sehr selten und durch den süßlich reibigen Geschmack unverkennbar. Die eigentlichen Keulenpilze (*Clavaria*) [Ziegenbart, Bärenzage] sind ohne allen Hut und haben eine aß- oder armbartige oder laubblätterige Form und sind von verschiedenster Größe; alle irgendwie so geformten Pilze sind ausnahmslos essbar. — Dieser Ausnahmslosigkeit gilt von den schneeweissen, kugeln- oder birnenförmigen Staupilzen (*Bovista* und *Lycoperdon*) vom Volke Boviste oder Kageneler genannt. So groß oder so klein sie sein mögen, nacht oder mit Flecken und Stacheln bestreut, geben sie, so lange sie jugendliches, weißes Fleisch haben, ein schmackhaftes Gericht; selbst roh, mit Pfeffer und Salz genossen, sind sie nicht zu verachten. In vielen Gegenden wiederum fällt es keiner Menschenferse ein, sie für essbar zu halten, anderwärts sind sie dagegen ein Lieblingegericht. Die Italiener verspeisen sie unter dem Namen „Pettino“; mir selbst haben sie in jeder Gegend in und außer Deutschland gemundet, und vieler Orten hat man durch meine Mahnung den verdachteten Staupilz als des menschlichen Gaumens und Magens gar nicht unwerth schätzen gelernt. Es ist eine respectable Kost. Zumal der Kiefernbovist vermag durch ein

einziges Exemplar einer Familie mit Weib, Kind und Kegel zu sättigen. Bekannter und gesuchter, aber auch seltener, bekanntlich fast nur durch besondere Spürkraft darauf abgerichteter Hunde aufzufinden sind dessen nächste Anverwandten, die Trüffeln, die ihrem Innern und äußeren Baue nach nichts mehr und nichts weniger als Staubpilze sind, nur härter und noch wohlschmeckender. Verzehrt werden aber gerade sie oft leicht und von Betrugern absichtlich mit dem verdächtigen, innen schwarz-blau werdenden Hartbovis (Scleroderma vulgare), der in Scheiden geschnitten, fast unkenntlich ist und verkauft wird. Er kommt massenweise in allen fadigen Gegenden in Wäldern und an Wegen vor, ist aber in der That mit der viel tiefer liegenden Trüffel nicht zu verwechseln, zumal wenn man darauf achtet, daß diese beim Durchschneiden ein blaßes, zart marmorirtes Fleisch hat, während der Hartbovis in allen seinen Arten immer gedrehtig schwarzblau ist.

Nach allen diesen Andeutungen möchte es unmöglich sein, Nachgriffe beim Sammeln zu thun; es ist aber durch dieselben auch an die Hand gegeben, diejenigen Pilze mit voller Sicherheit zu erkennen, welche durch ihren Wohlgeschmack und ihr reichliches Vorkommen allerorten werth sind, nicht übersehen zu werden. Ueber den gastronomischen Werth nun ließe sich freilich streiten; denn wenn sie auch von Geurmands allseitig eifrig gelehrt worden sind, und wenn auch daraus etwas, daß im Süden Deutschlands und anderwärts in den Städten bestimmte Marktplätze für den Pilzverkauf vorhanden sind, die Popularität des Genusses sich abnehmen läßt, so sind doch immerhin die Geschmäcke verschieden, und bei manchen Pilzarten muß die künstliche Zubat sicherlich die Hauptsache thun. Aber der Ernährungswerth läßt sich weniger antauchen. Die verschiedenen nährenden Stoffarten sind darin durch chemische Analyse nachzulesen. Besonders durch die stickstoffhaltigen Stoffe stehen sie mit der Fleischart auf fast gleicher Stufe, wenn auch der Magen ganz andere Nahrung hat, jene Stoffe zu bewältigen. So sind sie denn wenigstens keine verdächtige Speise, zumal sie ohne die Arbeit des Pflügens und ohne die Mühe des Säemanns als eine freie Himmelsgabe die Waldgründe erfüllen, auf stercksten Angereiteten und hebschlichen Wiesen auf den Fuß einer einzigen Nacht hervorschießen, und das zu Zeiten in einer Menge, daß die ganze Dorfbewohnerschaft davon ausschließend sich sättigen könnte. Ob aber die freie Himmelsgabe sich nicht auch in die Fesseln der Kultur bringen läßt? Nichtig gehandhabt, muß es gelingen; aber wirkliche Ausdehnung hat doch nur erst die Kultur des Champignons und der Trüffel gewonnen. In Frankreich, besonders in der Umgebung von Paris, ebenso in mehreren Provinzen Rußlands und auch in Deutschland wird der Champignonbau mit großem Vortheil betrieben. Einträglich ist das Geschäft. Ich weiß von einem Gärtner, der die Champignons den Winter über im Keller gezüchtet hatte und einen Reingewinn von 40 Thln. daraus erzielte. Aber noch einträglichler wäre es, wenn die Kultur der Stein-

pilze und Liegenbärte auf dieselbe leichte Weise sich machte, dieser Pilze, von denen manche zu mehreren Pfund, ja bis über 18 Pfund rasch ansiehnen. Die Sache hat ihre Schwierigkeit. Aber, wenn wir bestimmte Pilze auf bestimmte Waldreviere angewiesen sehen, so hat damit die Natur selbst die Orte angedeutet, wo der Anbau ökonomisch zu betreiben wäre. Ist ein Pilz aber einmal erst reichlich vorhanden, so kehrt er immer wieder und ist nach meiner vielfachen Erfahrung schwerer auszurotten als das schlimmste Unkraut im Garten. Er ist aber auch leicht zu verpflanzen. So habe ich den Steinpilz und mehrere Stachelpilze an Waldstellen gesetzt, wo sie früher nie sich fanden, und ich habe sie jedes Jahr an dieser Stelle in Unmenge wachsend wiedergefunden. Die Wissenschaft hat schon genug darauf hingewiesen, dadurch den unheugbaren Waldboden zu einem ergiebigen neuen Nahrungsquell zu machen; aber sowohl die Unkenntnis der Pilze und ihrer Lebensbedingungen selbst der Forstleute und die Verknennung des zu erzielenden Nutzens haben bisher diese Hinweise in den Wind geerdet sein lassen.

Die Zahl der eßbaren und zugleich schmackhaften Pilze ist aber durch die vorhin angegebenen, wie schon angedeutet, noch lange nicht erschöpft. Dem speciellen Kenner ist es ein Leichtes, von den angeführten ganz abzusehen und doch ganze Herde mit anderen zu füllen. Daneben allerdings gibt es noch unzahlige, die nicht schädlich noch verdächtig, aber doch nicht eßbar sind. Wenig gelästete nach den schwarzjauchig zerfließenden Intenpenigen und braunsamelligen Fleislingen! Der schamlose Eidechelpilz (Sichtmordei), dessen weißschillerndes Stiel mit grünlichkeimigem Hute aus einem blaffen, faulartigen Galleit. Ei (dem sogenannten Trufel) hervormacht, verleidet schon durch seinen süßlichen Leichengeruch allen Appetit. Manche dem Nitterschwamm ähnliche Trichelomen halten durch ihren gelblicheren oder fleckigen scharfen Geschmack ab. Die blaßgelbe färbten oder schön rosa- und blaufarbigen Heimpilze in harter Schlantheit, wie die staubviolettblütigen Braunsamelligen und Rosalamellen und die saftschimmernden Hyazinthbeeren würden, abgesehen von ihrer Kleinheit, durch die wässrige oder schlüpfrige Consistenz und wenig bezaugen. Andere, wie die Habelpilze mit keichförmig aufgeblasenem Hute oder die eberlamelligen, gelben und rothbraunen Flammepilze und Dermoceren, haben ein zu zähes Fleisch und gleich den verborstenen, violettblauen Fätersampligen den allerfädesten Geschmack.

Alle diese Hunderte von schönfarbigen und gestaltreichen Pilzen wollen aber auch im Grunde nichts weiter, als daß wir ihrer uns freuen, etwa wie die Waldblumen uns freundlich anmuthen, die außer ihrer Lebensüberdichtigkeit ja auch keine weiteren Vorzüge haben. Gleich ihnen gehören sie auch vor Allem zum Walde, insbesondere aber zum herblichsten Walde, aus dessen Grunde sie zwischen den verwelkten Blumen und fallenden Blättern, deren Stelle sie nun einnehmen, als felsame Flora des Herbstes, als ein ganz absonderliches Völkchen hervortreten.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Sgr. (1 R. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Verkäufer nehmen Bestellungen an.

Verleger: Schönbach'sche Buchhandlung in Gießen.



## Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

N<sup>o</sup> 42.

[Vierzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

20. October 1869.

**Inhalt:** Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 8. Das Erlöschen des Pflanzenlebens in senkrechter Richtung. — Die Abgabelung der Thiere, von Karl Schwenning. Zweiter Artikel. — Silber aus Griechenland, von D. Rind. Die Insel Mitlene. — Literarische Anzeige.

### Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

#### 8. Das Erlöschen des Pflanzenlebens in senkrechter Richtung.

Je näher dem Pol, um so mehr darf man wirklich von einem Erlöschen des Pflanzenlebens sprechen. Nichtsdestoweniger steigt aber wahrscheinlich nirgend die Schneegrenze bis auf die Ebene herab, außer, wo Gletscher durch ihr allmähiges Vorrücken in die Thäler oder auf das Meer herabströmen. Es erlischt folglich das Pflanzenleben innerhalb des Polarkreises nicht nur in horizontaler, sondern auch in senkrechter Richtung; aber die einzelnen Theile des Polarlandes sind weit davon entfernt, dies in gleicher Weise auszuführen.

Auf Island unterscheidet man drei deutliche Regionen. Die erste zeichnet sich durch hohe Grasbildung und den Reichthum ihrer Kräuter aus; sie reicht bis 1500 F. Bis 2500 F. liegt ihre obere Region mit kurzem Graswuchs und Zwergbirken, unter die sich weite Strecken von

Halbgetraut und Heidebeergebüsch ziehen. Es ist die Region der Fraunen (Halben), zugleich die Region des isländischen Mooses (*Cetraria islandica*), das hier in erstaunlicher Menge die vulkanischen felsigen Halben überzieht. Schon hier reichten sich eine Menge Alpenpflanzen ein. Ihre eigentliche Region liegt jedoch zwischen 2500 Fuß und der Schneegrenze, welche bei 2700 bis 3000 F. auftritt. Hier stellen sich auch die niederliegenden Zwergsträucher ein, welche in Lappland die nivalen Abtheilung der Alpenregion verkünden. Darüber hinaus reichen die weiten Gletscherfelder (Fjeller), die, sowie sie in die Thäler herabströmen, als Skrid-Fjeller (Schreit-Gletscher) bekannt sind.

Auch in Lappland unterscheidet man am natürlichsten mit Andersson drei solcher Regionen; allein sie fallen



nicht mit denen Islands zusammen. Diese Insel beginnt bereits in ihrer unteren Region mit derjenigen, die in Lappland über der ersten liegt, nämlich mit der Birkenregion. Nicht, daß Island kälter als Lappland wäre, hat es eben ein Inseleklima, welches die Kälte des Winters zwar mildert, aber die Wärme des Sommers nicht steigert. Unbeschränkt und kalt, verbündet er das Wachsthum der Bäume und läßt außer der Birke keinen Waldbaum zu. Dagegen ist in Lappland das Klima weit strenger, und doch hat es ausgedehnte Wälder, weil es theilweise ein Continentaliklima besitzt, das sich bereits über die Polarzone hinaus schiebt, wo zwar die Sommer kürzer, aber die Tage länger werden. Es gibt darum noch eine Waldregion im Sinne gemäßigterer Zonen, mit Kiefern und Fichten gekleidet; erst über ihr erhebt sich die subalpine Region, von Birken charakterisirt; diese endlich geht in die alpine über, die keine Wälder mehr kennt. Andersson gliedert diese Regionen in Unterabtheilungen und erhält für die erste eine untere, in welcher Kiefern und Fichten vereint die Waldung bilden; eine obere, in der die Fichte den größten Theil für die Wälder abgibt, die Landschaft aber mehr feld- und hügelartig erscheint; eine dritte, in welcher fast nur die Kiefer herrscht, die tiefsten Thäler oder den Strand bedeckend. Die subalpine Birkenregion zerfällt in eine untere, weil stämmige Birken, namentlich an den felsigen Abhängen, die Waldung zusammenfügen, und eine obere, wo die Zwergbirke herrscht. Die alpine Region, baumlos und selbständig ausgedehnt, läßt sich in eine dreifache zerlegen: eine schneelose, die nur noch durch Weidengestrüpp an die Baumregionen erinnert, eine theilweise von Schnee bedeckte, welche nur noch zwergige Sträucher besitzt, und eine von Schnee oder Eis bedeckte auf den Fjällen oder den Alpenjochen und ihren Epiken. Viel zu wenig ist in dieser Eintheilung Rücksicht genommen auf die Region des Meeresstrandes. Sie macht sich an den lapplischen Küsten besonders geltend und drückt ihrer Flur einen höchst eigenthümlichen Charakter auf. Hier mischen sich viele unferne Meerstrandpflanzen mit arktischen zu einem seltsamen Bunde; oben: die blauberstete *Pulmonaria maritima*, die nun schon so viele Namen empfangen, *Oenitans* (*G. serrata*, *involuta*), *Primele* (*Pr. Finmarctica*), *Dolden* (*Halosasis Scoticum*), *Silene* (*S. maritima*), *Strelitien* (*St. crassifolia*, *humifusa*), *Arenarien* (*A. norvegica*, *ciliata*), *Kauch* (*Allium Sibiricum*), zahlreiche Kleeblätter, Schilfgräser (*Calamagrostis strigosa*) u. A. Diese Strandregion, besonders ausgezeichnet durch die Koffelkräuter, reicht modificirt bis zum höchsten Norden. — *Wahlberg* nahm in seiner Flora Lapplands statt 8 nur 6 Regionen an: 1. eine untere Waldregion vom Strande bis zu 500 F. Erhebung, von Kiefern und Fichten gebildet; 2. eine obere Waldregion von 500 bis 800 Fuß mit vorherrschender Fichtenwaldung; 3. eine subalpinische

Region von 800 bis 1200 Fuß, in welcher nur Kiefern erscheinen; 4. eine subalpine von 1200 bis 1800 Fuß mit Birkenwäldern; 5. eine untere alpine von 1800 bis 2500 Fuß mit Zwergkiefern; 6. eine obere alpine von 2500 bis 5900 Fuß oder die baumlose Region. Eine siebente inferalpinische Region bildete ihm außerdem die warme, durch den Golfstrom geheizte, norwegische Seite. Beide Eintheilungen haben ihre Vorzüge: die Andersson'sche, weil sie abstract zusammenfaßt, was doch als Variation zu Einem Thema gehört, die Wahlberg'sche, weil sie in leichter Uebersicht die Pflanzenareale gibt, wie sie sich dem Auge unmittelbar aufdrängen.

Wer der Schilderung von Lapplands Hochflächen aufmerksam folgte, begreift sogleich, daß dies das allein Erzelzbare, alles Andere nur schematisch ist. Die Höhen Grenzen der Pflanzung sind zwar festbestimmte, weil Alles zwischen einem Maximum und Minimum seiner Existenzbedingungen lebt; allein diese binden sich an bestimmte Höhen nur unter den lokalen Verhältnissen, oder man könnte nicht mehr verstehen, daß an den nördlichsten Küsten Lapplands die harten *Lapensia*-Weiden, welche doch das charakteristische Merkmal des lapplischen Hochlandes, und zwar des mittleren Theiles der alpinen Region (im Sinne von Andersson) sind, von ihren Hochsitzen auf die Meeresebene herabsteigen. Hier, im äußersten Norden, wo das Eismeer und furchtbare Stürme ihren Einfluß geltend machen, liegen eben die Darsineebingungen (die Wollentregion) fast in der Zone des Strandes, während sie in dem continentalen Binnenlande um so viel höher gerückt sind. Gerade Lappland aber zeigt einen so großen Wechsel dieser Lebensbedingungen, daß es im Kleinen gleichsam Alles enthält, was sich in den übrigen Ländern der Erde im Großen wiederholt. Einmal ist es eine Halbinsel mit drei sehr verschiedenen Küstentypen: einem westlichen, das auf den warmen Golfstrom fußt (norwegisches Lappland); einem östlichen, das, an den Borealschen Meerbusen grenzend, halb continental, halb insular ist (schwedisches Lappland); einem nördlichen, das sich von den Jällebbfjellern (gemeinschaftlichen Districten, halb zu Norwegen, halb zu Rußland neigend) am Baranger Fjord dem Eismeere und Weißen Meere zuwendet (russisches Lappland), von diesen seinen Impuls empfängt, obgleich auch an den nördlichen Küsten das Meer so wenig gefriert, als an der Westküste. Das andere Mal nimmt es Theil an dem continentalen Klima, welches ihm das Innere von Schweden und Norwegen, mehr aber Finnland vermittelt. Folglich müssen die Lebensbedingungen im Innern des Landes völlig andere werden, als in den drei Küstentypen; um so mehr, da ein mächtig ausgedehntes Tafelland ihrer Fülle bildet. Zum Dritten erheben sich auf dem Hochlande des Innern die Bergspitzen zu sehr ungleichen Höhen, wodurch die Strahlung der Hochrunden sehr verschiedene Wirkungen auf die Schneelinie ausüben

muß. An den Küsten schneiden sich ferner tiefe Fjorde ein und rufen damit eine höchst variable Zusammensetzung der Lebensbedingungen hervor, je nachdem die Fjorde nach Westen, Norden oder Osten geöffnet sind, oder je nachdem sie tiefer in das Land eindringen. Weiter über der Boden auch hier sein Recht im größten Maßstabe: die Uebergangsgebirge, wenig zerfurcht, stehen den leicht verwitternden granitischen oder porphyrischen Ueberringen entschieden nach und unterfügen die allgemeine Kauhheit des Klima's. Was der ewig gefrorene Boden, wo er vorhanden ist, zudem für Wirkungen ausüben muß, zeigt Samojeiden und Sibirien am besten. Aber auch die ungleiche Länge der Sommertage, die erst nach dem Pole hin wachsen und ihren röthlichen Schein von der Mittlernachts-sonne empfangen, das in einem Lande nicht unberachtet dastehen, das schon am  $64^{\circ}$  n. Br. beginnt und bei  $71^{\circ}$  endet. So viele und so große Lebensbedingungen, die selbst wieder unter sich eine große Reihe von Uebersetzungen erlangen, zeigen auf den ersten Blick, wie mannigfaltig die Höhenregionen der einzelnen Pflanzen sein müssen. Sie zeigen aber auch, daß ein Höhenvergleich mit unsern mittlereuropäischen Alpen gänzlich unstatthaft ist, weil diese sammt und sonders unter ganz andere Lebensbedingungen gestellt sind, daß endlich selbst die Lage innerhalb des Polarkreises dem überall auf der Erde deutlich ausgeprochenen Gesetze eines in senkrechter Richtung erfolgenden Pflanzenrücktritts nichts von seiner Schärfe raubt.

Nach allen diesen Vorbemerkungen erklärt es sich leicht, warum wir früher, als wir Lappland an der Hand eines Martins von Norden nach Süden durchkreisen, die Baumgrenzen so äußerst ungleich fanden. Aber wie viel höher sind sie doch, wenn man sie mit denen vergleicht, welche außerhalb des continentalen oder des Golfstromklima's an den Küsten Dänemarks liegen! Für dieses Land hat Lund in den Fällebildrictern eine Menge von Wirkengrenzen verzeichnet, welche zwischen 368 bis 1011 Fuß liegen. Welche Unterschiede, wenn man sich in das Gedächtniß zurückruft, daß Martins eine Menge von Wirkengrenzen im Innern des Hochlandes zwischen 945 bis 1644 Fuß beobachtete! Wenn er ferner die Grenze der Strauchartigen Weiden bei 1878 Fuß im Innern fand, läßt sie Lund für Dänemark zwischen 470 bis 1085 Fuß schwanken. Ebenso die Fichte. Martins verfolgte sie noch bis 770 Fuß, Lund bis 275 Fuß und 368 Fuß. Doch ist ihre Grenze, wie Eriksner versichert, viel schwerer zu bestimmen, als die der Birke, welche im Allgemeinen zwischen 1331 bis 1631 Fuß schwankt; denn während diese an den Gehängen eine deutliche Linie einhält, lösen sich die Fichten in einzelne Individuen auf und schieben sie, wie die Kiefern, oft zu bedeutenden Höhen. Was als das eine der letzten am nördlichsten Abhänge des Etorvandsfelds in einer Höhe

von 1550 Fuß, während Martins ihre Grenze zwischen 766 bis 1447 Fuß schwankend beobachtete. Ist es doch, als ob der Wald kämpfe, die verschiedensten Höhen zu erklettern, bis er gewaltsam zurückgewichen, plötzlich oder allmählig auch in senkrechter Richtung erlischt. Und doch, wie wenig erreicht er gegen den Pol hin, wenn man erwägt, daß im Oberragabin die Baumgrenze, freilich die höchsten in Europa, noch bis 6500 oder gar bis 7000 Fuß hinaufgerückt wird! In den Salzburger Alpen liegt die Schneegrenze bei 7000 W. F., am Glogner in Kärnten zwischen 8300 bis 8400 P. F., in der Schweiz zwischen 8500 bis 10,000 P. F.; in Lappland dagegen beträgt sie sich, je nach dessen verschiedenen Theilen, zwischen 3100 bis 4000 Fuß und beginnt auf seinem höchsten Alpenfusse, dem Suliteima (5600 P. F.), bei einer Höhe, welche jener der Brocken Spitze gleichkommt, nämlich bei 3565 P. F. Was für ein Abfall! Kein Wunder, daß, besonders auf der norwegischen Seite, welche die Gletscher vom Atlantischen Meere aus mehr speist, als das auf der östlichen Seite vom Bottanischen Meerbusen her geschehen kann, zahlreiche Schneefelder und Eisfelder (Gletscher) von den Klöden auf die Hochebene oder in die tiefsten Thäler herabiedersteigen, die statt der Moränen unserer Alpen den schwarzen Humus der Thäler vor sich herziehen, diesen durch ihr Schneewasser zum Aufquellen bringen und damit Gelegenheit zur Anheftung der letzten Käluter (*Ranunculus glacialis*, *Snixifraga cernua*, *rivularis* u. A.) geben. Nur Flechten (*Umbilicarien*) bedecken noch die bognelichen gemengten Felsenklüften.

Man bemerkt das auffallende Abnehmen der Höhenregionen leichter durch einen Vergleich mit den südlichen Theilen Skandinavien's (Norwegen) als mit fremden Ländern. So reicht nach Fr. Ege. Schübeler die Fichte auf dem Gauska bei etwa  $60^{\circ}$  noch bis 2900 Fuß ü. M., in Uthalen bei etwa  $62^{\circ}$  bis 2500 Fuß, in Finlien bei etwa  $64^{\circ}$  bis 1777 F., in Norrland aber nur bis zu 800 Fuß. — Die Kiefer geht 200 bis 300 Fuß höher; in Älten ( $70^{\circ}$ ) dagegen sinkt sie auf 700 F. ü. M. — Die Birke, deren Grenze für das südliche Norwegen gegen 700 F. höher liegt, als die der Kiefer, reicht in Älten nur noch bis 1483 Fuß. — Der Haselstrauch, bei  $63^{\circ}$  bis gegen 1000 Fuß hoch in Norwegen gehend, bleibt bei Älten unter  $66^{\circ}$ , wo er noch elste Flüsse trägt, auf der Ebene zurück. Ebenso die Schneegrenze. Nach Hagelstam liegt sie in Norwegen von  $59^{\circ}$  bis  $60^{\circ}$  auf der Gebirgskette bei 5800 Fuß, auf dem Folgefanden bei 5000 Fuß; unter  $61^{\circ}$  sinkt sie auf dem Füllfeld auf 5600 Fuß; unter  $62^{\circ}$  auf dem Langfeld erscheint sie bei 5410 Fuß; unter  $63^{\circ}$  auf dem Dovrefeld bei 5300 Fuß, unter  $64^{\circ}$  westlich im Jäälrag bei 4800 Fuß, unter  $67^{\circ}$  bis  $68^{\circ}$  bei 3300 Fuß über der Küste; am Nordkap, bei mehr als  $70^{\circ}$ , fällt sie auf 2400 Fuß, so daß nördlich von Drontheim bei  $67^{\circ}$  N. 500 Fuß senkrechter Höhe

250 bis 260 Meilen horizontaler Entfernung nordwärts gleich kommen. Daher fallen im äußersten Norden von Lappland beide Klimate (senkrecht und waagrecht) fast in Eins zusammen, wie wir schon früher an den Diapensia-Weiden fanden.

Leider sind wir über die Höhenverhältnisse außerhalb Lappland nur wenig unterrichtet. Daß jedoch auch in den eigentlichen Polarländern ähnliche Erscheinungen wiederkehren, dürfte wenigstens außer allem Zweifel stehen; ein Grund, weshalb ich mich über die Lebensbedingungen der lappischen Flora so weitläufig verbreitete. Daß sich die Schneergrenze im Norden des 78° n. Br. nicht bis zur Meeresfläche herabsenke, hat Malmgren für Spitzbergen unwiderleglich dargethan. An den felsigen Bergen der Nordküste (79¼°—80¼°) fand er wenigstens 29 Arten, welche bis 600 oder 1000 F. ü. M. aufsteigen, bis ihnen Schnee und Eis ihre Grenze setzen: *Ranunculus sulcarens*, *pygmaeus*, \**Papaver nudicaule*, \**Cardamine bellidifolia*, *Draba alpina*, \**glacialis*, *pauciflora*, *nivalis*, *Wahlenbergii*, \**Cochlearia fenestrata* var. *prostrata*, *Alsine rubella*, \**Arenaria Rossii*, *Stellaria Edwardsii*, \**Cerastium alpinum*, *Potentilla emarginata*, *Saxifraga oppositifolia*, \**cespitosa*, \**revularis* var. *hyperborea*, \**cernua*, \**nivalis*, \**flagellaris*, \**Oxyria digyna*, \**Salix polaris*, \**Juncus biglumis*, *Luzula hyperborea*, *arctica*, \**Carex misandra*, *Poa cenisia*, *stricta*. Die mit einem \* bezeichneten Arten reichen bis zur Schneergrenze und sind dieselben, welche auch in Lappland zu den letzten Bürgern des Gewächreiches zählen, oder weit nach Norden vordringen. An der Magdalenental (79¼°) beobachtete Blomstrand noch bei 2000 Fuß ü. M., und an der Brannntweindal (80°24') noch bei 1000 Fuß ü. M. eine kräftige Vegetation. Aus dem Allem schließt Malmgren, daß jenseits des 80° n. Br. die Schneergrenze noch bei 800 Fuß, wenn nicht bei 1000 Fuß liege.

Selbstverständlich wird dieselbe um so höher liegen müssen, je höher das Bergland sich erhebt, weil die Strahlung der Felsflächen, auf welche die Alpen aufgesetzt sind, die Schneergrenze höher rücken muß, wie wir das z. B. im Oberengadin sehen, wo die Thalsöle an sich schon zwischen 5 bis 6000 Fuß schwankt. Darum kann es uns nicht überraschen, daß Rink die sommerliche Schneergrenze Westgrönlands, dessen Gletsche sich von 60° bis 72° n. Br. bis 6000 Fuß erheben, bei 2000 Fuß, lokal auf der Naarfok-Halbinsel (zwischen Walgatstraße und Dme-nakfford) selbst bei 4500 Fuß fand. Wir dahin reicht auch die Vegetation, aber so eigenthümlich, daß uns Kräuter schon bei geringen Höhen verlassen, die in den Alpen bei etwa 8000 Fuß enden würden. So *Ranunculus frigidus* oder *sulfureus* bei 100 Fuß, genau auf derselben Höhe, auf welcher er auf der Gornmatsinsel endet; ebenso *R. pygmaeus*, *Saxifraga aizoides*, *Menziesia*

*coerulea*. Bei 200 Fuß enden: *Arenaria Groenlandica*, *Saxifraga nivalis*, *Hieracium prenanthoides*. Bei 3 bis 400 Fuß treten andere hervor: *Oxyria digyna* als verküppelte Pflanze und *Polygonum viviparum*. Bei 500 Fuß endet *Corylus alpinis*; bei 600 Fuß: *Sedum annuum*; bei 1000 Fuß: *Cerastium alpinum*, *Montia rivalaris*, *Gnaphalium supinum* *ß. subcaule*, *Arnica alpina*, *Vaccinium uliginosum*, *Rhododendron Lapponicum*, *Gentiana nivalis*; bei 1500 Fuß: *Dryas integrifolia*, *Erigeron alpinus*, *Ledum palustre* *ß. procumbens*; bei 2000 Fuß: *Draba rupestris*, *Stellaria cerastoides*, *Gnaphalium alpinum*, \**Campanula Scheuchzeri*, *Vaccinium Vitis Idaea*, *Azalea procumbens*, *Pyrola rotundifolia* *ß. grandiflora*, *Diapensia Lapponica*; bei 2050 Fuß: *Alsine biflora*; bei 2500 Fuß: *Saxifraga cernua*, *rivalaris*, *tricuspidata*, *Artemisia borealis*; bei 2600 Fuß: *Andromeda hypnoides*. Erst in einer Höhe von 2 bis 3000 Fuß löst sich der dicke Kräuterteppich, welcher uns bis dahin begleitete, in eine dünnere Decke auf. Gleichzeitig endet bei 3500 Fuß die Weide (*Salix glauca*), wie sich dieser Verband von Gräsern, Gegergräsern und Flechten lockert; Moose nehmen seine Stelle ein und bilden bei 3000 Fuß kleine, sumpfige Flecken, in die sich zahlreiche Blumen des *Ranunculus nivalis* erheben. Endlich schwindet bei 3800 Fuß der zusammenhängende Teppich gänzlich, nur vereinzel bewohnen noch Kräuter (*Draba alpina*) das lose Geröll, vorsichtig die Sümpfe meidend, die ihnen nicht mehr die nöthige Wärme bieten. Kaum aber verschwunden ist die *Draba alpina*, so stellen sich bald einzelne Schneehäufen, die Vorläufer der Schneeregion ein, mit deren Eintreffen die *Potentilla nivea* ihr Vordringen bei 4400 aufgibt. Bei 4500 Fuß macht das höhere Pflanzenleben seinen Schluß; auf dieser Höhe deckt ewiges Eis sämtliche Berggipfel; wie eine Schale liegt es über der Oberfläche, „jeber Hebung und Senkung wie ein Ueberzug“ folgend, nach dem Innern des Landes sich ausbreitend, als ob dasselbe nur einen einzigen Gletscherpanzer trage. An dem Rand dieses Panzers allein wagen es noch einige Pflanzen, ihre Blumen zu treiben (*Saxifraga oppositifolia*, *tricuspidata*, *cespitosa*, *Draba arctica*, *Papaver nudicaule*, *Silene acaulis*, *Potentilla Vahlana*, *Arenaria rubella*). Vermischt mit ein Paar grasartigen Pflanzen (*Carex nardina*, *Festuca brevifolia*), ächten Kindern der Pann-Inseln, und einigen Flechten, bilden sie den letzten schönen Accord in der Harmonie des Pflanzenlebens. Was darüber hinaus liegt, könnte nicht einmal eine Flechte mehr sein, könnte nur noch jene eisthame einseitige Alge (*Chlamydococcus nivalis*) sein, welche man als den „rothen Schnee“ kennt und welche zuerst von Captain Parry auf dem Eise an der Baffinsbai gefunden wurde.

Wir befinden uns eben in dem eissigen Alter Polar- und Alpenländer der nördlichen Halbkugel, in einem Lande,

das wahrscheinlich nur an seinen Küsten das Leben athmet, das uns fordern an seinen senkrechten Pol führte. Zwar sollen noch Renthiere im Innern weiden; doch entfremdet sich kein Eskimo von der Küste, die ihn hinlänglich ernährt, das innere Grönland ist und bleibt vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln. Weder im übrigen polaren Amerika, noch im polaren Asien erzeugen sich dergleichen Gletscher; denn nirgend erhebt sich dort die Erdoberfläche zu solchen Höhen, welche eine Gletscherbildung veranlassen. Darum kann man nach den neuesten Vorstellungen auch hier nicht von einer Schneegrenze reden, die mit der Ebene zusammenfiel. Außer Grönland leidet kein Land wieder, das, soweit wir das Nordpolariand kennen, seine Berg-

spitzen bis zur Schneegrenze erhöhe. Nicht einmal der Parac-Archipel mit seinen imposanten Berginseln, zwischen 74° bis 75° N. kann sich der Gletscher rühmen, während dieselben in Grönland doch schon von 60° N. an dessen Südspitze beginnen. Und das ist gut. Wenn rings um den Nordpol ein Alpenland läge, dessen Spitzen überall in die Schneeregion hinein ragten, so müßte das ganze Nordpoland längst vergletschert sein und es würde in diesem Zustande einen Einfluß auf die südlicheren Zonen üben, der bei dem Austausch der kalten und warmen Luft zwischen Pol und Aequator die kalte Zone viel weiter nach letzterem vorschieben müßte, als es heute geschieht.

## Die Klugheit der Thiere.

Von Carl Schelling.

Zweiter Artikel.

Da wir im Allgemeinen nur Kraft und Schnelligkeit des Pferdes benutzen, so lassen wir seine übrigen Anlagen unbeachtet und unausgelebt; doch ein einziger Blick auf die Reitbahn der Kunstreiter genügt, uns zu überzeugen, wie noch viel Anderes als ein Reit- und Zugthier aus dem Pferde gezogen werden kann. Lange Zeit wendete man bei der Dressur des Pferdes, wie bei der des Hundes, vielfache Gewaltmittel und harte, einschüchternde Strafen an, und ich selbst bin zur Zeit, als ich mich mit der ersten beschäftigte, häufig in diesen Fehler verfallen. Das ist indessen, wie bereits gesagt, ein Fehler und ein Mißgriff, wenn man glaubt, dadurch schneller zum Ziele zu kommen. Nur Güte ruft Vertrauen hervor, das Vertrauen Verständniß und dieses die Folgsamkeit, durch welche allein man sich dem erstrebten Ziele bald und vollkommen nähern kann. Das Eigenthum macht das Thier ängstlich, scheu, fremd, in vielen Fällen unselbstsam, störrisch und sogar boshaft. Wie der Hund, läßt sich das Pferd von seinem Herrn und dem Wäcker viel gefallen und vergißt leicht unangemessene Behandlung und ungerechtfertigte Strafen. Doch kommen beim Pferde schon eher Weisspiele von Nachlässigkeit und Nachsicht vor, wovon mein Vater einst unangenehme Erfahrung machen sollte. Derselbe hatte zwei Hengste edler Race von einem hohen Herrn in Pflege genommen, von denen der minder gute lammfromm, der schönere jedoch schwer zu reiten und bissig war. Letzterer ließ er nie an dem Vater, der ihm häufig selbst Futter reichte, ihn selbst fütterte und zu Zeiten auch wohl pугte, aus, sondern nur gegen den Wäcker, der allein von allen Ansehens mit ihm leiblich fertig zu werden verstand. Als er diesen einst gebissen, erhielt das boshafte Thier vom Vater einige Peitschenhiebe. Seit dieser Zeit spielte beim Nashen desselben stets ein tödtlicher Schimmer im Auge des

Pferdes, welcher dessen Bosheit verrieth. Doch der Vater sah sich vor, bis er es nach Verlauf von etwa 8 Tagen doch versäumte, und siehe da, das Thier packte ihn beim Genick. Nur daß er so viel Geistesgegenwart behielt, dem boshaften Vieh in die Augen zu greifen, bewahrte ihn vielleicht vor arger Beschädigung.

Schlimmer lief ein zweiter Ausbruch der Bosheit des Thieres ab. Die beiden Hengste standen in abgesonderten Räumen zu beiden Seiten einer Schlafkammer, in der ihr Wäcker wohnte, weshalb sie sich nur sahen und nahe kamen, wenn sie zugleich geritten oder ausgeführt wurden. Bei einer solchen Gelegenheit hatte der fromme Hengst den andern erblich gebissen. Seit dieser Zeit war ein halbes Jahr verflossen, als einst der Eigenthümer zu uns heraus kam, die beiden Hengste gestallt wurden und jener mit dem Vater zusammen austritt. Das bessere Thier, vom Vater geritten, schnappte mehrmals nach dem andern, was den Herrn veranlaßte, ihm einen Schlag mit der Reitpeitsche über die Nase zu versetzen.

Man ritt nach einem benachbarten Gute, blieb dort mehrere Stunden und kehrte dann, in ein Gespräch über kriegerische Erinnerungen aus den Feldzügen von 1813 bis 1815, welche beide Herren mitgemacht, vertieft, zurück. Als eine Brücke passirt und also nahe zusammengegritten werden mußte, packt die boshafte Bestie zu, ergreift das linke Bein des Herrn über dem Knie und reißt ihn, aufbäumend und mit den Vorderfüßen nach ihm schlagend, aus dem Sattel. Alle Hiebe nützen nichts zur Befreiung des gepackten Beins, und endlich springt das Vieh gegen mit beiden Männern über die Leihne der Brücke in den zum Glück nicht tiefen Fluß. Auch hier sind noch erst furchtbare Schläge auf den Kopf nöthig, ihm seine ohnmächtig gewordene Beute zu entreißen, wonach das Thier dem andern davongelaufenen folgt. Das

Wein des Herrn war gedrohen, und mein Papa hatte das Verhängnis, ihn auf dem Rücken bis zu unserm nicht fernen Hofe und Hause zu tragen, wo der Verletzte zu unser größten Last ein schwerwächtliches Krankentager hielt. Im ersten Zorn gab er den Befehl, das schändliche Vieh zu erschleßen, der jedoch nicht befolgt ward; indessen hatte mein etwas jähzorniger Vater den Strafbaran fast todtbarbar lassen. Als Regel für Hundes- und Pferdebesitzer möge noch dienen, daß es besser ist, wenn Züchtigung der Thiere nöthig geworden, diese nicht selbst zu verrichten, sondern durch einen Fremden vornehmen zu lassen.

In der Nacht dieses Hengstes kann man nun aber nicht mehr allein bissiges Naturell oder lediglich Instinkt finden, sondern muß in derselben vortreffliches Gedächtniß, gefühlte Kränkung, für die Dauer gefassten Vorsatz — kurz, Verstand erkennen.

Es will nicht viel bedeuten, daß ein Pferd, welchem ich einst vor dem Hause eines Bäckers etwas Brod gegeben, so oft es loskommen konnte, dorthin lief und zurückkehrte, wenn ihm eine Gabe gerichtet worden, um die es wiedernd und kopfwerfend bat. Bemerkenswerth ist jedoch folgender Fall.

Im J. 1848, mit einem Kommando als Schutzwache auf einem Herrenfise stationirt, dessen Besitzer abwesend war, benutzte ich meine viele freie Zeit zur Ausübung der Jagd und zwar zu Pferde. Ich hatte viel und in allen Ganganen von diesem Thiere namentlich mit dem Pistol geschossen, und es war in jeder Hinsicht schußfest zu nennen. Bald bemerkte ich, daß es auch mit Lust an der Jagd theilnahm und namentlich wie angewurzelt, gleichsam athemlos dastand, so lange ich zielte, dann aber leidenschaftlich heftig nach dem geschossenen Gegenstande drängte und elste. Ich glaubte erst mich zu täuschen und ritt daher wiederholt in flärkster Ganchung bis zu einem Punkte, parirte und legte an; doch es blieb dasselbe, mein Pferd bewegte keine seiner gesphten Ohren, vielleicht nicht ein Mal das Auge im Kopfe.

Was hatte nun diesem Thiere, von dem in der Bewegung wie im Halten geschossen worden, den Unterschied zwischen Halten und Bewegung für den Schüßen beigebracht? — offenbar eigene Beobachtung, und wodurch kam es jetzt dazu, als ihm Freiheit in der Wahl gelassen war, das Rechte zu finden und mit Beherrschung seiner Neigung zu üben? — doch gewiß nur durch Ueberzeugung, also Verstand.

Ich bin ein Mal mit diesem auch sonst sehr tüchtigen Pferde in einen Sumpf gerathen; es warf sich bei dieser Gelegenheit auf die Seite und unterstützte, mit den befreiten Füßen rudernd, meine Bemühungen, es herauszuziehen; mag das Instinkt gewesen sein und genannt werden, ich will nichts dagegen haben.

Während der polnischen Unruhen in den vierzig

Jahren gehörte ich einem Husarenregimente an, welches gegen die Polen thätig war. Das von mir gerittene Pferd war eine junge, heftige Stute, welche selten Schritt ging, gern trabte, scheu und ängstlich war und an beiden Vorderhufen durchgehende Hornspalte hatte. Vermuthlich litt das Thier häufig daran, — wer kann es wissen! — und viele seiner Untugenden entsprangen gewiß dem Schmerze, obgleich es vortrefflich lief und fast unübertrefflich sprang. Gemüthlich, einen fordrten Marsch allein und theilweise bei Nacht zu machen, überfiel uns starkes Glatteis und im Walde vermöge desselben Baumbbruch; die schneefreie, moorige Straße war hart und helperig gefroren, die Eisen meines Pferdes aber nicht geschärft. Wer diese Sachen kennt, wird sich ungefahr einen Begriff machen können, wie angenehm dieser Marsch war, besonders noch dadurch, daß ich über dem linken Anie einen noch nicht ganz vernarbenen Säbelhieb trug. Das Thier that keinen Tritt im Schritt und doch kamen wir kaum von der Stelle, dazu ewiges Ausgleiten, Sprünge, durch die fallenden Zweige und Eisapfen hervorgerufen u. s. w.; ich saß ab und versuchte zu gehen, konnte dies jedoch nicht lange gut machen und stieg wieder in den Sattel. Mit der Dämmerung fand sich denn auch Wollgeleite neben dem Wege ein; jetzt hatte ich Mühe, mich im Sattel zu balanciren und wunderte mich noch heute, daß wir in der nächsten halben Stunde nicht zehn Mal hingefallen sind. In Zorn war ich längst gerathen und hatte ihn auch an dem mit Schaum bedeckten Pferde ausgelassen. Jetzt boten sich die Fegirimm als Ableiter desselben dar und als einer dreist genug war, mir in der Dämmerung schußrecht zu kommen, sandte ich ihm die Karabinerladung zu. Der Schuß traf nicht — doch von der Sekunde ab, wo er gefallen, war mein Pferd ruhig, ging Schritt und machte mich durch seine Kopfbewegungen aufmerksam, von wo die Bestien naheten, so daß ich zwei vermunden konnte. Aber auch fortan war das Thier nie umgewandelt; es legte alle Untugenden wie mit einem Schlage ab und zeigte sich namentlich dadurch juthunlich, daß es mir Hände und Gesicht leckte, woran früher nicht zu denken war. Sollte hierin nicht die Erkenntniß des gewaltigen Uebergewichts des Menschen, verbunden mit einem einsichtigen Dankgefühl für Schutz gegen den gefürchteten Feind, also Verstand und Gefühl zusammen gefunden werden dürfen?

Für Feser, die zu Pferde oder zu Wagen in die Lage kommen könnten, Wölfe, die erst mit dauernd liegenden Schnee gefährlich werden, zu begegnen, sage ich den Rath, ruhig Schritt zu reiten und zu fahren, so lange nicht unmittelbare Angriffe erfolgen. Erst die Flucht macht die Bestien dreister, die Bewegung erbt sie, und die Hße läßt sie wirklich mutbig werden oder wenigstens die allen wilden Thieren dem Menschen gegenüber eigene Scheu vergeffen. Dem Fußgänger dürfte jedoch zur Abwehr

und Nachtzeit eine gute Baumkrone den besten Schutz bieten.

Erinnern will ich nur noch in Betreff des Pferdes an die heiteren Szenen, welche oft ehemalige Kavalleriepfeder veranlassen, wenn sie pöpslich die Signale hören. Mit einem Sonntagseiter im Sattel oder einem Milchkarren hinter sich, bieten sie durchgehend Schaustellungen dar, die zum Kranfluchen geeignet sind.

Das Pferd den erschossenen oder verunglückten Herrn nicht verlassen und den trunkenen Reiter vorsichtig tragen und auf sich zu erhalten wissen, ebenso den schlaftrunkenen, ist durch unzählige Fälle bewiesen; ist das etwa auch Instinkt und anbesessene Eigenschaft? Ich sage nein, denn der Instinkt müßte zum Gegehbelt treiben; es ist also Ueberlegung — Verstand!

## Bilder aus Griechenland.

Von D. Lind.

### Die Insel Mitelene.

Eine der schönsten Inseln des griechischen Archipels war früher Lesbos, und sie ist es auch noch heutzutage. Sie führt jetzt den Namen Mitelene, in dem der alten Hauptstadt auf die Insel selbst übertragen worden ist. Schon aus der Ferne gewährt sie dem, der von Smerna her der Insel sich nähert, einen entzückenden Anblick. Es ist hier anders, als der Reisende es auf den Geladen zu sehen gewohnt gewesen. Wer an die dicken, bestanden Küsten unserer nordischen Meere oder an das bis zur Seefläche herabreichende Urmaldbild tropischer Inseln gewöhnt ist, — sagt Karl von Cerech in seinem Vortrag über „den Vulkan von Santorin“ (Berlin, 1867) S. 5 — dem werden die Geladen auf den ersten Blick wohl etwas öde erscheinen. Kahl erheben sich die nackten Felsen aus der Gluth, kaum kann man hier und da in einer Thalschlucht um ein paar weiß hervorleuchtende Steinhäuser eine kleine Olivenpflanzung, ein paar Cypressen oder an den Bergabhängen einen vereinzelten Feigenbaum entdecken. Und doch erkennt das (an der Klarheit der griechischen Luft und des griechischen Himmels) sich schärfende Auge allmählig gerade in dieser Kahlheit die Quelle der Schönheit, die wir in italienischen und griechischen Landschaften so bewundern. Denn da hier kein Laubbach den Boden vor der nagenen Einwirkung der Atmosphären schützt, so sind die Inseln ganz überzogen von kleinen Wasserfällen, von Thalern und Hügeln. Nirgends sehen wir lange, eintönige Flächen, Alles ist Leben und Bewegung. Dabei gibt der Felsboden überall scharfe, klare Umrisse, und die kümmerliche Kunde dunkler Flechten, welche die Felsen überzieht, bedingt jene warme, violettbraune Färbung, die an dem Boden des Mittelmeeres das Auge des Künstlers bezaubert. — Anders ist es in dieser Hinsicht mit der Insel Mitelene. Aus dem Meere erheben sich hohe, pyramidenförmige Felsen, umgeben von parfümierten Laubbölgwäldern, in deren Schoße Gruppen von weißen oder farbigen Häusern und wohngebaute Dörferchen, die sich terrassenartig von den Höhen herab erstrecken, nach dem Meere zu liegen. Zwischen zwei solchen grün betriebligten Anhöhen

zeigt sich auch, ein wenig im Hintergrunde halb versteckt, halb hervortretend, die Stadt Mitelene, in hellen Farben schimmernd. Neutere Reisende schildern die Insel als ein irdisches Paradies an Schönheit und Fruchtbarkeit, wozu besonders auch der große Reichtum an Quellen viel beiträgt. Frederike Bremer (in ihrem „Reisebuch während eines 4jährigen Aufenthaltes im Süden und im Orient“) wundert sich, daß die Insel von Liebhabern des Schönen und Erhabenen in der Natur, des Friedlichen und Zarten im Leben, des Gesunden in der Luft, im Wasser und überall nicht häufiger besucht wird. Es ist ihr, der weitgereisten Kennerin des Nordens, Westens und Südens, ein Räthsel, warum sich wohlhabende Bewohner der nahen Küstestädte Europa's und Asiens nicht hier Laubbäuser bauen; es ist ihr unerklärlich, warum nicht die nach Schönheit jagenden Touristen hierher kommen und sich auf Wochen oder Monate hier niederlassen, um diese Schönheit von Himmel, Land und Meer zu bewundern und zu genießen, diese reine Luft zu athmen, in den warmen Kissenquellen oder in den stärkenden Wellen des Meeres zu baden, im Schatten der Oliven- und Feigenbäume, an den Oleander- und Agnuscatheden, an murmelnden Bächen zu wandeln und zu ruhen.

Als Topus für die eigenthümliche Schönheit der Insel kann Porto Oliveto, einige Stunden Weges von der Stadt Mitelene entfernt, gelten. Der Weg dahin führt zwischen Anhöhen, die mit Selbstaumalungen bedeckt sind, an Oleander- und Agnuscatheden und anmuthigen Bächen 1½ Stunden lang ununterbrochen aufwärts, bis zu einer Anhöhe, von welcher man dunkle, bewaldete Berge sich jenseits einer nebelhaften Luftwölbung mit jenem bläulichen Dunstschimmer erheben sieht, welcher andeutet, daß sich zwischen den fernern Bergen und dem Wanderer ein Gewässer befindet. Und bald entdeckt auch das Auge einen herrlichen blauen Wasserspiegel, der ringsum von höheren und niederen bewaldeten Höhen umgeben ist. Allein es ist kein See, sondern eine tief einschneidende Bucht des Meeres, welches durch Felsen in eine enge und tiefe Schlucht einbringt und sich dann zu einem

großen Bassin von mehreren Meilen im Schooße der Insel erweitert. Das ist Porto Diveto. Olivenbäume und Oleanderbüsche bekrönen die Ufer, und große Olivenwälder bedecken die Höhen. Hier sind auch die warmen Quellen, die in der Nähe aus der Erde hervorspringen, und die kristallhellen, lieblich warmen Thermen mit Warmbassins. Aber so reizend und schön auch die Gegend ist, so einsam ist sie auch, theils in Folge der Regierung der Türken, theils der Malaria. Nur der Olivenwald läßt Spuren von Sorgfalt erkennen, die man an den Steinterrassen und Erdwällen wahrnimmt, welche den an den steileren Abhängen stehenden Bäume Festigkeit und Schutz gewähren. Die Olive ist die hauptsächlichste Einnahmequelle für die Insel, und jedenfalls hat auch Porto Diveto davon seinen Namen.

Die Insel Mitelene zählt ungefähr 60 Dörferchen mit etwa 10,000 Einwohnern, theils Griechen, theils Türken; aber auch hier soll die griechische Bevölkerung seit einiger Zeit wieder an Anzahl besonders zunehmen. Nach andern Angaben soll sich die Zahl ihrer Einwohner, die vor der Zeit der griechischen Erhebung 60,000 betragen habe, gegenwärtig auf 30,000 belaufen, und ebenso soll die Zahl ihrer Dörfer 120 betragen. Manche der dortigen Dörfer sind groß und reich, und namentlich gibt es auf Mitelene viel wohlhabende Türken, die sich in der Umgebung schattiger Thäler, Hügel und Gärten angebau haben, voll Rosenlorbeer und andern küsthenreichen Büschen und schönen Bäumen. Die schönsten Gegenden der Insel sind an ihren südlichen Bergen, wo Wasserströme unter schattigen Platanen rauschen und Bäume aller Art an den Ufern klarer Bäche wachsen und gedeihen. Die dortigen Weinreben geben einen Wein, der besser ist, als der von der Insel Cyprien, und ebenso sind Oliven und Feigen hier ausgezeichnet. Auch das Thierreich ist daselbst stark vertreten. Man findet auf Mitelene Reb- und Hirsche, sowie Feldhühner und Tauben in großer Menge. Die Bevölkerung ist betriebfam und thätig, und auch in den armen griechischen Wohnungen findet man Reinlichkeit und Ordnung. Die jungen Mädchen sticken Taschentücher und Handtücher für die türkischen Familien auf der Insel, mit Goldfäden und kunstvollem Saum.

Seit alten Zeiten herrscht hier bei den Griechen eine eigenthümliche Sitte, die von eben so viel Güte als Weisheit zeugt. Sie betrifft die Frauen und sucht, ganz im Gegensatz zur herrschenden Sitte des Morgenlandes, die das Weib von seiner Geburt an unselbstständig und unfrei macht, demselben vielmehr eine gewisse Selbstständigkeit zu sichern und sie vor Willkür und Noth zu bewahren. Nach dieser Sitte ist nämlich jeder griechische Vater

verpflichtet, seiner Tochter, und zwar einer jeden Tochter, die er hat, ein Haus oder doch mindestens ein halbes Haus zur Mitgift zu geben oder als Eigenthum zu hinterlassen. Ohne ihre Zustimmung darf dasselbe nicht veräußert werden, und sie braucht daher nicht zu fürchten, daß sie in ihrem Alter, unverheirathet oder verwitwet, ohne Wohnung und Herberge sei. Sie hat dabei auch stets ihr kleines Gärtchen — denn jedes Haus hat dort in der Regel einen Gartenplatz und einige Bäume, — sie kann im Hause vermieten oder eine Beschäftigung darin treiben, die sie ernährt. Noch heutzutage versorgt ein Vater auf Mitelene seine Töchter vorzugsweise vor seinen Söhnen. „Die Anaken“, heißt es, „müssen selbst für sich sorgen. Sie können hinaus in die Welt gehen, aber die Mädchen müssen in der Heimat bleiben.“ Die Sorge der Väter für ihre Töchter soll dort alle Grenzen übersteigen. Um seinen Töchtern eine gute Ausstattung zu verschaffen, — was hier als Ehrensache angesehen wird — veräußert sich ein Vater alle Vergnügungen und nicht selten sogar das Nothwendige an Kleidung und Unterhalt. Eine natürliche, aber weniger löbliche Folge dieses Verhältnisses besteht darin, daß die Eltern sich fürchten, Töchter zu bekommen; daß man sie als eine Last betrachtet, und daß Brüder ihrer Schwestern geradezu als „Räuberinnen“ bezeichnen; allein eine weit traurigere Folge davon ist, daß man glaubt, Alles, was für Mädchen nöthig ist, gethan zu haben, wenn man ihnen ein Haus schafft.

Bekanntlich ist die Insel Mitelene im J. 1867 von einem Erdbeben arg heimgesucht worden, wobei auch die Hauptstadt viel gelitten haben soll.

### Literarische Anzeige.

In dem unterzeichneten Verlage sind folgende Schriften erschienen:

**Dove (H. W.), Gedächtnisrede auf Alexander von Humboldt**, gehalten in der öffentlichen Sitzung der königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 1. Juli, dem Leibniztage des Jahres 1869. Velinpapier. gr. 8. geh. 7/4 Sgr.

**De Bols-Reymond (Emil), Voltaire in seiner Beziehung zur Naturwissenschaft**. Festsrede. 1868. Velinpapier. gr. 8. geh. 5 Sgr.

**Buff (O. S.), Ueber das Studium der Chemie**. 1868. 8. 5 Sgr.

**Wichelhaus, (O.), Ueber die Lebensbedingungen der Pflanze**. Vorträge, gehalten im wissenschaftlichen Verein zu Berlin. 1868. Velinpapier. 8. 5 Sgr.

Berlin. **Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.**  
(Darrwitz und Gehmann.)

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 21 Sgr. (1 R. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

N<sup>o</sup> 43.

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, C. Schwetschke'scher Verlag.

27. October 1869.

Inhalt: Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 9. Die Characteränderungen im Pflanzenleben. Erster Artikel. — Vom Monterosa zum Montblanc, von Otto Me. — 8. Von Chatillon zum Fuß des Montblanc. — Die Klugheit der Thiere, von Karl Schwelling. Dritter Artikel. — Literarische Anzeigen.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 9. Die Characteränderungen im Pflanzenleben.

Erster Artikel.

Mit dem allmählichen Erlöschen des Pflanzenlebens in wagrechter und senkrechter Richtung geht eine merkwürdige Veränderung im Leben der Pflanzenarten und deren Gruppierung vor sich. Zwar habe ich darüber schon Manches in die früheren Schilderungen eingeflochten, doch ist noch so viel übrig geblieben, daß es ein besonderes Interesse hat, diesen Punkt schärfer in's Auge zu fassen.

Es ist selbstverständlich, und gerade hierüber ist schon Vieles von mir beigebracht worden, daß gegen den Pol hin die Größe der Bäume allmählich abnimmt. Allein, wie die Höhengrenzen nicht in gleichmäßigem Schritte abnehmen, ebenso wenig richtet sich die allmähliche Abnahme der Bäume nur nach dem Breitengrade. Es ist richtig, daß in Ätten unter 70° N. die Kiefer bedeutend niedriger

wächst, als im südlicheren Norwegen, aber diese Größe entspricht nicht der nördlichen Breite. Hier fand sie Capell Brode noch 70 bis 80 engl. F. hoch und darüber; ja, Schübeler in Christiania sagt geradezu, daß es um Ätten nicht ungewöhnlich sei, Kiefernstämme von 6 bis 9, in Ausnahmefällen selbst von 14 F. Umfang anzutreffen, obwohl er ihnen im Allgemeinen nur eine Höhe von 30 bis 40 Fuß zugesieht. — Auch die Birke zeigt Ähnliches. Denn wenn sie auch in den tieferen Thälern Finnmarkens niemals die stattlichen Formen des südlichen Norwegens annimmt, so beobachtet man doch 20 bis 25 Fuß hohe Stämme von etwa 2 Fuß Dicke. Welcher Unterschied, wenn man bedenkt, daß Grönland schon bei 60° N. nur strauchartige Baumformen hervorbringt und



diese einen Zeitraum von etwa 30 Jahren brauchen, um gegen 5 bis 6 Fuß hoch zu wachsen! Solche außerordentliche Erscheinungen erklären sich nur durch das warme Klima, welches der Gollstrom den westlichen Küsten Norwegens zuführt. Sonst sinkt im Innern des Landes das Höhen- und Dickennwachsthum der Bäume vollkommen entsprechend der nördlichen Lage und den Erhebungsgrenzen. Zu Dulidsjok in Luleå-Lappland (67° N., 1060 Fuß ü. M.) zählte Andersson auf einem Querschnitte der Kiefer 510 Jahresringe bei einer Stammesdicke von 30 Centimetern und, wie schon einmal berührt, auf einem Querschnitte der Birke 70 Jahresringe bei einer Stammesdicke von 8 Centimetern! Ein Wachstum, das der langsamen Zunahme in die Dicke auch bei unseren Alpenbäumen entspricht und jenen merkwürdigen Widerspruch von schönerer Jugend und mitterlichem Alter hervorruft, über den ich schon gelegentlich bei der Schilderung der Baumformen sprach.

Dagegen ist es sonderbar genug, daß der Verlauf der Holzfaser an den lapplischen Bäumen, wie schon Linné zu seinem Erstaunen fand, eine schiefe Richtung einhält, daß sich, mit andern Worten, die Stämme rechts, und zwar rechts ganz nach Art der Bohne und Birke, nicht aber wie der Hopfen drehen. Der unglückliche Wichura bestätigte diese Thatfache neuerlings durch eigene Anschauung in Lappland und war im Stande, sie nicht nur auf die Kiefer, wie Linné, sondern auch auf die Fichte, die Birke und den Eberwachsbolzer auszuheben. Das weicht insoweit von dem Wachstume unserer Bäume ab, als selbige sich ebenso häufig rechts wie links obwohl schwach drehen, während die Rechtsdrehung in Lappland, dem Laufe der Sonne entgegengekehrt, fast ausnahmslos, eine Linksdrehung fast nur in der Jugend der Bäume erfolgt. Nach Wichura's Beobachtungen steht diese normale Rechtsdrehung der älteren Nadelholzstämmen in innigem Zusammenhange mit der im Alter eintretenden Verschmälerung der Jahresringe, welche so ausgesprochen ist, daß die Drehung um so stärker wird, je dünner die Jahresringe werden. Diese scheinbar unbedeutende Thatfache greift doch tief in das Leben der Bäume ein; denn sie nöthigt dazu, beim Bauen der Wohnungen sorgfältig die Stämme auszuwählen, an denen die geringste Drehung vorkommt, weil sich stark gedrehte zu Bauholz nicht verarbeiten lassen. Was diese auffallende Doppelrichtung der gleichen Holzfasern veranlaßt, steht noch dahin; jedenfalls wird sie mit den Lichtverhältnissen der Polargezone in Verbindung stehen, weil Drehungen solcher Art ja völlig von dem Lichte veranlaßt, die Art ihrer Richtung aber von der Holzfaser bedingt werden. Sicher dürfen wir darum auch die Rotationsverhältnisse der Polargezone einen Einfluß üben.

Ueberhaupt weicht die Tracht der hochnordischen Bäume, wie ich schon bei Gelegenheit vielfach zeigte, nicht un-

wesentlich von der Tracht der unsrigen ab. In dieser Beziehung steht die Kiefer obenan. Je weiter sie nach Norden geht, um so mehr schreien ihre Gipfel gleichsam vor der sturmgepeitschten Luft zurück, die Krone wölbt sich, bis sie immer flacher, schließlicb wie plattgedrückt erscheint, so daß sie fast das Ansehen einer flachschirmigen Eder annimmt. Kürzer und breiter werden ihre Nadeln, feister und spärlicher, als ob sie sich quersförmig um den Zweig heften. Zugleich erreichen sie ein Alter von 7 Jahren, während die unsrigen nur 2 bis 3 Jahre ausdauern; selbst die Rinde des Stammes ändert sich um und geht aus einer sich selbst abblösenden Schale in eine rissige über. Mit diesen Eigenschaften steigt die lapplische Kiefer meist höher, wie die Fichte, die bei uns umgekehrt die höchsten Grenzen erreicht. Das Alles sind so viele Merkmale, daß man Wichura begreift, als er diese Kiefer für eine besondere Art (*Pinus Friesiana*) beschrieb. Nichtsdestoweniger, und wohl mit Recht, stimmen ihm die skandinavischen Botaniker nicht bei. Denn selbst die Fichte hätte Aehnliches aufzuweisen und hat darum auch Gleiches erlitten. Doch unterscheidet sie sich (als *Pinus Abies medioxima* Nyl.) nur durch ihre abgerundeteren Zapfen und ihre flattere Form. — Wie sich Lärchen und Birken verhalten, ist schon genügend hervorgehoben. Letztere verhalten außerdem ganz außerordentlich in ihren Blatteinschnitten, und erstere nehmen in ihrer Starchelt, in ihrem fuchtbaren Schweigen, wo sie zu Wäldern vereint sind, eine ebenso tief inbegrabene oder schwarze Färbung an, wie umgekehrt auf den einsamen wüsten Hochebenen Lapplands die Kiefernen bielehrig gegen den aschfarbigen Himmel abstechen. Birken sind darum im hohen Norden das freundlichste des Waldlandes; um so mehr, da sie den Wohlgeruch, welchen sie in der gemäßigten Zone führen, zu einer Intensität steigern, von der sich der Südländer kaum einen Begriff zu bilden im Stande ist. Ein Beweis, daß die Birke so recht ein Kind des hohen Nordens ist, da andere Holzgattungen, wie z. B. die Weiden (Prunus Padus), daselbst ihrem im Süden so intensiven Geruch nach Bittermandelöl völlig einbüßen. — Auch was in den Wäldern eingeatmet lebt, nimmt Theil an diesen Veränderungen. Am meisten die Eberesch; sie erscheint auf das Feinste zerschliffen, mit linienförmig schmalen spitzen Wäldchen, während umgekehrt der Eumpfsport (*Lodum palustre*) oft mit so breitem Laube auftritt, daß man ihn schon als eine eigene Art (*L. latifolium*) betrachtet hat.

Diese mannigfachen Veränderungen gehen in ähnlicher Weise selbst auf die Kräuter über. Daß sie gegen den Pol hin immer kleiner werden, kann nicht mehr überraschen; sehen wir es doch ebenso auf unsern Bergspitzen! *Solidago virgo aurea* sinkt in Lappland zu einem zollhohen Pflänzchen auf dergleichen Höhen herab. *Dol-dempflanzen* (*Chaeophyllum bulbosum*), welche um Upsala gegen 2 bis 4 Ellen hoch wuchsen, fand Lund am

Imandra: See im russischen Lappland ( $67\frac{1}{2}^{\circ}$  N.) nur  $\frac{1}{2}$  Elle hoch. Gräser, die bei uns zwar nicht zu den längsten, aber auch nicht zu den kürzesten gehören (*Festuca ovina*, *Agrostis caulina*) sah man am Eimichfund auf ein Paar Zoll herabsinken. — Andere Kräuter (*Hippuris vulgaris*), die bei uns in ihren Wirteln eine Fülle von Blättern offenbaren, selbst wenn sie in kalten Sümpfen erscheinen, verküppeln im äußersten Norden des lapplischen Strandes und beschränken sich auf eine geringe Blattzahl. Bei einigen (*Chrysosplenium alternifolium*), die sonst 8 bis 10 Staubfäden erzeugen, können selbst diese Organe fehl schlagen, so daß oft nur die Hälfte der Staubfäden erscheint; eine Variation, die wiederum mit einer Verküppelung der ganzen Pflanze verbunden ist (Lund). Diese Verküppelung geht bei *Saxifraga stellaris* sogar auf die Samenbildung über, so daß sie sich

nur durch fleischige Knospen, in welche die Blumen verwandelt werden, fortpflanzt; ein Fall, den wir auch in unsern Alpen beobachten, wenn die Pflanze an den kältesten Gletscherbächen wohnt. — Mit vielen Alpenpflanzen theilen andere Arten die Neigung, sich in ein Paartheil zu hüllen, obgleich sie in den Niederungen besser entbehren. So bleibt das Alpenhorntraut (*Cerastium alpinum*) in den untern Regionen Lapplands glatt; höher steigend, behaart es sich und wird schließlich wollig. Die Strandschiffe (*Pisum maritimum*) unser Meeresküsten, hier glatt, geht im Norden des Bottenischen Meerbusens zu einer zottigen Form über. Ranunkeln (*R. acris*) belegen ihre sonst so glatte Oberfläche mit einem selbsthaarigen Besatz. Das Wiesen Schaumkraut (*Cardamine pratensis*) nimmt dünnbehaarte Wurzelblätter an, während die Blumen sich zu einer aufwühlenden Größe entwickeln.

## Vom Monterosa zum Montblanc.

Von G. H. M.

### 8. Von Chatillon zum Fuß des Montblanc.

Nur in flüchtigen Zügen vermochte ich dem Leser ein Bild des Aosta-Thals und seines Reichthums an landschaftlichen, geschichtlichen und wissenschaftlichen Reizen zu zeichnen. Ich betrat es bei Chatillon an einem seiner schönsten Punkte. Die Felswände des Mont Jovet drängen hier die Doire gegen Norden zurück, und ihnen gegenüber jenseits der weiten gartengleichen Fläche, die sich am linken Ufer der Doire ausdehnt, erblickt man am Eingange des Thales von Val-Tournanche, amphitheatralisch auf den Gehängen des Gebirges gelegen, in einem Kranze der üppigsten Vegetation die Stadt Chatillon. Wenn man auf der Brücke steht, die sich kühn über den Marmorbach wölbt, und unterhalb deren man noch die Reste der alten Römerbrücke sieht, und seine Blicke schweifen läßt über das eben durchwandelte romantische Thal, über dem sich noch immer in der Ferne die stolze Pyramide des Matterborns erhebt, so vergißt man über all dieser Herrlichkeit der Natur die überflankenden Mäßen fünfstündiger Wanderung auf Pfaden, die mit einem ausgebrochenen Pflaster täuschende Ähnlichkeit besitzen. Ausgedehnte Hütenwerke und tiefsige Höhlen zeugen von dem betriebsamen Geiste der Bewohner, und wenn in der Nacht ihre Feuer glühen und unter den dröhnenden Schlägen die Riesenhämmer Fünkengarben aufsprühen, dann bedarf es keiner lebhaften Einbildungskraft, um sich vor die Grottenhöhlen der Rache verfest zu mahnen.

Wenn man die Straße gegen Aosta hin verfolgt, so gelangt man etwa nach einer Stunde zu dem anscheinlichen Gieden Chamabae, dessen Windberge einen der besten Weine Piemonts erzeugen. Die Berge treten hier von beiden Seiten näher aneinander und engen die Doire ein, die in

vielfachen Windungen tief unten über gewaltige Felsblöcke hinschäumt. Hoch oben von steilen Felsen schauen die wohl erhaltenen Trümmer der alten Burg Eis herab, ein mächtiger vieredriger Thurm inmitten einer von Zinnen gekrönten Mauer, an deren vier Ecken elegante Thürmchen, sogenannte Schwalbennester, hervortragen. Gleich hinter Chamabae öffnet sich eine tiefe Schlucht, durch die ein kleiner Bergstrom hervorbricht, jetzt im August ein unscheinbarer Wasserfaden, aber zur Zeit der Schneeschmelze oder heftiger Regengüsse ein gefährlicher Nachbar für den Flecken, der im J. 1519 seine Dämme durchbrach, die Häuser forttrieb und Thal und Felder haushoch mit Kies und Sand überflutete. Weiter wird wieder das Thal, zwischen Weinbergen und Fruchtseiden hin, über denen bewaldete Gehänge herabschauen, führt die Straße. Bald erblickt man den Kirchthurm von Nus und drüben kaum über dem Bett der Doire erheben die gewaltige Burg Genis. Das Dorf Nus selbst, das seinen Namen von Nonus herleitet (ad nonum ab Augusta praetoria lapidem, d. h. 9 römische Meilen von Aosta), gewährt nur den Anblick der Armuth und des Schmutzes. Nichts erregt die Aufmerksamkeit, als die Ruinen eines alten Schlosses, das man das Schloß des „Platus“ nennt. Der Sage nach soll hier der bekannte Statthalter Judäas, vom Kaiser verbannt, seine Zuflucht, und von Gewissensqualen verfolgt, sein Ende durch eigene Hand gefunden haben. In Wirklichkeit freilich dürfte dieser Bau nur aus dem 12. Jahrh. herrühren und auf den Trümmern einer alten römischen Villa errichtet sein. Als er späterhin durch eine Feuerbrunst gestört wurde, erbauten sich die Herren des Thales hoch oben auf felsiger Höhe in wunderbarer Lage eine neue

Burg, deren Trümmer nun auch von verschwundener Herrlichkeit zeugen. Nach abermaliger einflussiger Wanderung öffnet sich das bis dahin vielfach verengte Thal zu einem weiten, herrlichen Boden. Vor den Blicken des Wanderers liegt der unanschauliche Fleden Willersfranche. Darüber erhebt sich auf jädem Felsen neben einer furchtbar wilden Schlucht das Schloß Quart (ad quantum ab Augusta praetoria lapidem), und in der Ferne winken die Thürme der alten Römerstadt Aosta (Augusta praetoria). Bald ist der Rauthier überschritten, und wir betreten den stolzen Triumphbogen, der einft zu Ehren des Augustus errichtet ward.

Wenn ich für Touristen schreibe, böte sich mir hier ein reiches Feld für Schilderungen dar. Mitten aus den weiffchimmernden Häusern der Stadt erheben sich die erdwüthigen Ruinen der Römerzeit, die mit Zinnen geschmückten Thürme des Mittelalters, die schlanken Thürme der Neuzeit. Wenige Minuten, nachdem man den Triumphbogen durchschritten, dessen wohlbehaltene corinthische Säulen noch heute Zeugniß ablegen von dem hohen Kunstgeschmack des alten Kulturvolks, steht man unter den Arcaden des alten Festungsthor's, der Porta praetorinna, und nur wenige Schritte weiter hat man sich zu wenden, so erblickt man die noch immer Staunen erweckende Ueberreste der gewaltigen Mauer, die einft in einem Viertel die ganze Stadt umschloß. Eine kleine enge Gasse führt den Wanderer vor eine imposante Ruine, in der die Einen die Ueberreste des Palastes der römischen Statthalter erblicken, während die Andern, und wohl mit dem meisten Rechte, sie für die Trümmer des alten Theaters halten. Umweit davon umschließen die Mauern eines Klosters die Ruinen eines römischen Amphitheatres von gewaltigem Umfange. Noch erblickt man nur einige Arcaden, welche die äußere Fassade des Gebäudes bildeten, und von den Marmorsäulen, die es schmückten, erzählen fast nur noch die zahlreichen wohlgehaltenen Kapitäl. Die Gemölde, auf denen sich einst die Siege erhoben, von denen 15,000 Römer dem Schauspiel der Arena zuschauten, dienen jetzt zu Vorrathsräumen für die Bewohner des Klosters. Ueberall umweht uns der Odem uralter Vergangenheit; hier stehen wir auf den Trümmern des alten Forums, dort erzählen uns Mosaik und Inschriften von dem Kunstsinne und von den Thaten des wunderbaren Römervolks. Aber aus den Träumen römischer Herrlichkeit wecken uns die Zeugen einer späteren wildbewegten Zeit. Hier stehen wir staunend vor den gewaltigen Thürmen, welche die Feudalzeit errichtete, dort führen uns dunkle, zum Theil noch mit alten römischen Säulen geschmückte Krypten in die ersten Zeiten des Christenthums, vielleicht in die Constantinische Zeit zurück. Die beiden herrlichen Mosaiken in dem Chor der Kathedrale und die schönen Kreuzgänge der St. Ursulenkirche mit ihren phantastischen Sculpturen, wecken in uns Erinnerungen

an die Religionschwärmerei des 11. und 12. Jahrhunderts, während die Inschrift der mit einem einfachen Kreuz geschmückten Säule vor der Kathedrale uns an die Gluth Calvins und den anbrechenden Morgen einer neuen Zeit erinnert, und das prachtvolle neue Rathhaus uns vollends mitten in das moderne Leben und Treiben der Völker zurückführt.

Aber wie reiche Erinnerungen uns auch umgeben, wie mächtig man auch versucht sein mag, unter Trümmern von vergangenen Zeiten zu träumen, die wundervolle Natur, die wie ein Kranz die schöne Stadt umschlingt, fesselt doch immer wieder die Blicke, und man braucht nicht gerade Naturforscher zu sein, um das Verlangen zu empfinden, hinein zu eilen von den Trümmern und Gräbern, hinein zu flüchten in ihr frisches, ewig schönes, ewig junges Leben. Dort über jene mit reizenden Wiesen und grünen Weinbergen geschmückten Hügel, über denen die silberglänzenden Gletscher des Mont-Blanc und Mont-Combin herabschaute, führt der Weg zum großen St. Bernhard hinauf. Dort im Süden über Wiesen und Wälder herab, ladet der See de Neve ein zum Genusse der herrlichsten Rundsicht. Gegen Westen hin aber, wo sich das Thal verengt und die Gletscher von Valgranche den Hintergrund schließen, dort liegen die Quellen der Doire, die dieses reizende Thal bewässert, dort ist der König der Alpen, der stolze Montblanc, und dorthin zieht es mit unwiderstehlicher Gewalt den Wanderer wie zum Urquell der Schönheit.


Nichts ist entzückender, als in leichtem Einspanner auf guter Landstraße durch ein mit allen Reizen der Natur und der Romantik geschmücktes Thal dahin zu rollen. Unten im Thal der rauschende, ewig wechselvolle Bach, die grünen Wiesen und Gärten und Fruchtfelder, die Weinberge und schattigen Fuß- und Kastanienbäume, brechen auf den Hügeln und Felskuppen die alten Burgen und Schlösser, in der Ferne die ewigen Gletscher! Nichts Stereodes als die elenden Dörfer mit ihren engen, trümmerten Gassen und schumigen Hütten und noch schumigeren Menschen! Dazu ein Himmel so blau, eine Luft so mild, wie sie nur Italien kennt, und doch so rein und frisch durch den Hauch der Berge! Man müßte aller Poesie bahr sein, wenn Einem das Herz nicht aufginge in solcher Natur.

Jenseits des Dorfes Sarra schließt sich der weite, grüne Thallef von Aosta. Die Straße windet sich um einen vorspringenden kahlen Felsen und überschreitet oberhalb des Fledens St. Pierre die Doire. Ein wundervolles Panorama eröffnet sich. Zur Linken des Wanderers erheben sich gemaltige, vielgipfelige Felsmassen, die einen kahl und nackt, die andern im frischesten Grün prangend; auf ihrer Seite thront das alte Schloß von Châtel; Argen, an ihrem Fuß lagern sich bis zu den Ufern der Doire die Häuser des Fledens Willeneuve. In weiterer Ferne

erscheinen zwischen dunklen Wäldern Dorf und Schloß Introß, dahinter öffnet sich das Thal von Rhêmes, und den Hintergrund des entzückenden Gemäldes erfüllen die imposanten Gletscher von Balgrisanche.

An wohl erhaltenen Ueberresten der alten Römerstraße vorüber, deren gewaltige Mauern und Arcaden noch heute mit Bewunderung und Ehrfurcht vor der Intelligenz und Arbeitskraft des alten Kulturvolkes erfüllen, an dem ro-

Doire hinüber. Die Landschaft wird wilder und rauher; die Weinberge erscheinen nur noch vereinzelt; die Kastanienbäume verschwinden. Der Hauch der Gletscher macht sich bemerklicher. Drüben stürzen herrliche Cascaden von den Bergen zur Doire hinab. Bald ist Morger erreicht, der Hauptort des oberen Kothalbales, ein enges, schmugiges Städtchen dicht am Ufer der Doire, schußlos den wilden Fluthen preisgegeben, die in jedem Frühjahr verheer-



Die Montblanc-Serie von Pré-Saint-Dizier gesehen.

mantisch gelegenen Flecken Liverogne mit seiner schönen Römerbrücke vorüber, gelangt man zu einem Punkte des Thales, von dem sich ein neuer überraschender Anblick darbietet. Das Thal verengt sich zu einer wilden Felschlucht, die den Namen „Pierre-Taillée“ führt. Die Straße ist in die Felswand eingesprengt und steigt steil aufwärts. Drunten in tiefen Abgründen rauscht und schäumt über Felsblöcke die Doire. Im Hintergrunde aber erscheint zum ersten Male der königliche Montblanc, bis zum Fuß in das schimmernde Gewand des ewigen Schnees gekleidet, stolz herabschauend auf die Alpengläse zu seinen Füßen. Man ist fern genug, um die ganze Großartigkeit seiner Verhältnisse zu erfassen, und in der That nie hat ein Berg auf mich einen so überwältigenden Eindruck gemacht, als hier der Montblanc, wie er zwischen den gigantischen Felswänden der Schlucht so plötzlich den Blicken sich darbietet. In kühngewölbten Bogen führt eine Brücke den Wanderer wieder auf das linke Ufer der

rend aus den Schluchten in die unglücklichen Gassen herabzubrechen. Immer großartiger gestaltet sich die Scene, und endlich sieht man sich bei Pré-Saint-Dizier am Eingange des Thales von Courmayeur, der Pforte zu den Herrlichkeiten des Montblanc. Alles mahnt an die Nähe der hohen Gebirgswelt, die gewaltigen Felsmassen, die drohend auf die Häuser des Ortes herabschauen, das wilde Brausen des Gebirgsbaches, die dunklen Tannen und Fichten, welche die Gehänge bedecken, die felsigen Matten, welche jede kleine Weltung des Thales erfüllen. Aber nichts geht über den Anblick, der den Wanderer in Courmayeur erwartet. Das Dörfchen selbst (Curin major), einst in der Römerzeit Auri lodinus genannt und der Mittelpunkt einer zahlreichen Bevölkerung, die den Schooß der Berge nach Gold durchwühlte, liegt malerisch an den Gehängen ausgebreitet. Seine mit Galerien versehenen und mit reichem Holzschnitzwerk geschmückten Häuser erinnern an die des Berner Oberlandes. Zur Linken erheben

sich die nackten und steilen Abhänge des Mont-Évêê und des Crémont, von dessen Höhen man den umfassensten Anblick der gewaltigen Montblanc-Kette genießt. Zur Rechten zeigen sich die wildzerklüfteten Felsen von La Saze, an deren Fuß grüne Wiesen, parkartig mit zerstreuten Baumgruppen geschmückt, das Auge erquicken. Im Hintergrunde starrt uns die Misenmauer der Montblanc-Kette entgegen, die hier steil fast 8000 Fuß hoch gegen das Thal abfällt, von glänzenden Schneegipfeln gekrönt, kalte Gletscherarme bis tief in das Thal zwischen dunkle Wälder herabsinkend. Hoch oben schaut drohend das phantastisch geformte Horn des Dent du Géant herab, an

dessen Fuß der schwierigste aller Gletscherpfade über das stolze Gebirgsmassiv nach Chamounix hinüberführt. Man muß dieses Gemälde geschaut haben, um sich einen Begriff von der Gewalt des Eindrucks zu machen, den eine an Contrasten so überschwengliche und doch in sich so harmonische Natur hervorbringt: blendende Schneeflächen, durchfurcht von schwarzen, eifigen Felspyramiden, drohende, wilde Gehänge und an ihrem Fuße eine üppige Vegetation, eine sonnige Landschaft, geschmückt mit schattigen Wäldern und zahlreichen Hütten und Häusern. Es ist ein Paradies, in das der König der Alpen seinen Fuß gesetzt hat.

## Die Klugheit der Thiere.

Von Karl Schmeling.

Dritter Artikel.

Um mit den Hausthieren fortzufahren, wäre jetzt das Kind an der Reihe. Meine Beobachtungen desselben sind nicht von Bedeutung; doch habe ich häufig bemerkt, daß neu angekaufte Thiere ein Aussehen hatten, als trauerten sie. Als 16-jähriger Bursche ward ich eines Tages von unserm selten aus dem Stalle und fast nie aus einem umzäunten Raume kommenden stößigen Bullen attackirt; ich ergriff eine mit zur Hand befindliche Bohnenstange und stieß sie ihm zufällig — denn eine eigentliche Absicht hatte ich gar nicht — in's Auge; er verlor dasselbe, war aber von seiner Untugend kurirt und ging später mit zur Weide wie jedes andere — verständige gehörnte Vieh. Beispiele von Rachsucht des Rindviehs sind ebenfalls vorhanden, doch bei seinem Phlegma selten und es scheinen verschiedene Umstände zusammenzutreffen zu müssen, um das Kind wild zu machen. Im Ganzen ist es ein zutrauliches, für gute Behandlung sehr empfängliches und dankbares Thier, das nur weniger im Stande ist, seine Empfindungen auszudrücken, als die bei den Vorübergehenden. Eine Collegin, ich glaube Frau Kure, nennt die Kühe „gemüthliche Thiere“ und ich will ihnen Gemüth und Gemüthlichkeit nicht streitig machen.

Vom Schafe verlange man nicht viel mehr als Wolle und Braten, vom Schwein sein Fleisch. Man müßte Schäfer oder Sauhirt gewesen sein, die Fähigkeiten dieser Thiere zu ergründen, und Welches war ich nicht, aber Pizarro, der Eroberer Peru's, soll letzteres gewesen sein und seinen Schweinen militärische Marschordnung beigebracht haben — wenn's wahr ist. Vom Esel will ich nur sagen, daß man ihn viel zu sehr schmäht, und von der Biene, daß sie klug und schlau, launisch und neidisch, booshaft und zuthunlich — wie eine Biene ist. Uebermuth ist ihr Hauptfehler und eine eingehende Beschäftigung mit ihr würde manches hübsche Resultat gewähren.

Von der Kage kann ich nicht viel sagen; alle Stie-

der meiner Familie haben einen gewissen Widerwillen gegen sie und ich mache davon keine Ausnahme, obson jenes Gefühl bei mir nicht so weit geht, eine Kage nicht anfassen oder lieblos zu können. Erschreckliche väterliche Prügel haben mir überdem noch die Erschließung des widernden schwarzen Katers, einer alten, obligen Dame eingebracht und das Belauern der unschuldigen kleinen Vögel durch die Kage, welche sie nur aus reiner Neigung zu Mord tödtet, dürfte auch noch für andere Menschen einen unangenehmen Anblick bieten. Meine eigenen Beobachtungen dieses Thieres sind daher sehr dürftig und beschränken sich fast nur auf gelegentliche Zeugenschaft seines grausamen Spiels mit Mäusen. Die vielfach gemachten Beobachtungen in Betreff säugender Kagen und deren Junge lassen aber ebenfalls auf Nachbenten und Ueberlegung schließen; bekannt ist ihre Neigung, andere Thiere an Stelle der ihr genommenen Jungen zu säugen. Vor wenigen Jahren soll in diesem Falle irgend eine Kage einen Wurf Ferkel erst auf den Heuboden geschleppt und dann vier Wochen lang gesäugt haben — wenn es wahr ist, füge ich wiederum hinzu. Geben wir aber von Hinz, Kunz, Murner und Wies zu dem hauptsächlich von ihnen verfolgten Mäuschen über, für welches ich mich stets interessiert habe.

Zuerst muß ich dabei auf das Wunder der Singmaus kommen. Ich habe häufig harmonisches Mausgequieck vernommen und bei Nachsuchungen fand immer, ein Mal sogar hinter einer Tapete, Mäusestest mit Jungen gefunden, welche dies Concert veranstalteten. Ich habe als Kind häufig stundenlang an Kornmieten gestanden, dem Zueinandergerissen des Pfeifens der Mäuse zu lauschen; doch war dies Gespitz weniger harmonisch als das erstere; ich habe viele Mäuse gesehen, doch nie eine einzelne singende Maus. Da die Berichte über solche, so viel mir zu Gesicht gekommen, nur von Großstädtern herrühren

ten, so kenne ich nur eine Möglichkeit, wodurch die Maus zum Singen gebracht werden könnte. Ich habe nämlich seit Jahr und Tag das Glück, neben einer Klavier- und Gesangslehrerin zu wohnen und bei ihren eigenen, wie den Exercitien ihrer Schüler und Schülerinnen bekomme ich auch gelegentliche Anwandlung von Singelaß; — doch aus reinster Vergeßlichkeit. Wenn nun aber zwischen uns in der Wand eine Maus mit Sangesanlage wohnte, so müßte sie unfehlbar zur Singemaus werden. Doch im Ernst gesprochen: ich habe mich oft bei Leuten, die Gesangsbegeisterung hatten viel Mäuse zu beobachten und auch beobachtet — es gibt nämlich viel Menschen, die mit dieser Schwäche behaftet sind — nach der Singemaus erkundigt, habe sie aber nur immer Gesichter schneiden sehen, als hätte ich ihnen die Frage vorgelegt, wann der Heerdefler kalben würde?

Als ich in jüngern Jahren Tenk's Lebensgeschichte gelesen, begann ich ebenfalls, wenn auch nicht im Porsen, eine Maus zu zähmen und es gelang mir nicht allein, sondern ich kann versichern, daß die Maus mit ihren klugen Augen, ihrer feinen Nase und ihrem nachhaltenden Temperament ein höchst unterhaltendes Stubenthierchen ist; ich hatte dieselbe gegen zwei Jahre, sie kam auf Lockung, folgte aus einem Zimmer in das andere, fraß aus der Hand, verbar sich in den Alkoven und zeigte bei jeder Gelegenheit eine große Neugierde. Ihr Ende blieb mir unbekannt, da ich sie, dem Elternhause Valet sagend, den Geschwistern überließ, denen sie fortkam.

Schon zu Hause hatte ich Gelegenheit, die Ratte, wenn sie in Schaaeren auftritt, zu beobachten. Als Militair auf einem Marsche mit Andern in den erhaltenen Resten eines alten Schlosses einige Zeit einquartiert, fanden wir dort eine Raze, wie die Käber groß, doch außerordentlich scharf und nur des Nachts sich zeigend. In einer Nacht saß ich schreibend am Tische; meine Gesellen schliefen bereits auf der Streu, als 3 oder 4 der Thiere hervorkamen und mich scharf beobachteten; so wie ich mich bewegte, waren sie fort. Ich warf ihnen Brod hin, sie holten es sich und wurden nach und nach dressirt. Nachdem ich dies mehrere Nächte wiederholt, erschienen sie auch bei Tage und bald war ein so freundschaftliches Verhältniß zwischen uns und den Ratten eingeleitet, daß sie auf eine Lockung hervorkamen und wenn auch schüchtern, so doch in unsrer Nähe die ihnen hingeworfenen Brocken aufsaßen, auch sonst im Gemache umherpflanzten. Der alte Verwalter des Schlosses erklärte die Sache dadurch, daß alle Thiere den Seibaten Anhänglichkeit zeigten.

Es ist etwas Wahres an der Sache, daß aber vielleicht seinen Grund darin, daß dieselben Leute, deren Endzweck der Menschenmord an Masse ist, geringeren Gesichts im Allgemeinen viel Zehlnahme bemessen und sich nicht ohne Noth verfolgen. Dasselbe findet man bei See- leuten, nur nicht in Betreff der Ratten und Mäuse,

wenn sie überhand nehmen. Der gewöhnliche Seemann hält jedoch das Schiff verloren, wenn jene es gänzlich verlassen.

Es ist möglich, daß die Zutraulichkeit jenen Ratten einß theuer zu stehen kam. Leider ist das Ende gezähmter wilder Thiere fast immer ein Bedauerliches. Ich habe keinen Hott nur angeführt, um darauf hinzudeuten, wie leicht es ist, kluge Thiere — und die Ratte zählt zu ihnen — an sich zu locken und beziehungsweise zu zähmen. Man war früher darin der gegenwärtigen Zeit voraus, es gab Löwenfuhwerke, Jagdleoparden u. s. w., doch unsere nur den Nutzen berechnende, Gewinn erstrebende Zeit hat diese Spielereien ausgeschlossen. Wilde Thiere sind gewiß ebenso klug, als bereits domestisirte oder von jenen erstern abkommende. Nur sind die Beobachtungen auf diesem Gebiete noch geringer als bei den Hausthieren, außerdem aber die richtige Erkenntniß ihrer Handlungen, ohne vorhergegangene naturhistorische Studien nicht immer möglich; in der Gefangenschaft läßt nur gütliche und umsichtliche Behandlung den bessern Charakter und die Fähigkeiten wilder Thiere vollkommen hervortreten und ein Schatten von Freiheit wirkt hier besonders günstig. Des Erforderniß fehlt jedoch meistens bei solchen Zählungen, und den Zählern fast eben so oft die nöthige, allerdings als unerhöplich zu bezeichnende Geduld.

Daß ich als naber Verwandter zweier Forstbeamten bald ein großer Altmob wurde, ist erklärlich; dazu kam später die Bekanntschaft mit einem Rittmeister von W., der meiner Jagdlaß jedoch eine ganz andere Richtung anwies. Früher verfolgte ich das Wild nur, um es zu fangen oder niederzuschleßen; er machte mich mit dem Geruche bekannt, es zu beobachten und ich versichere, daß derselbe im Stande ist, sehr schnell die Mortalität des Jagdlebhaders zu dämpfen; kleines Federwild habe ich seit jener Zeit nie mehr geschossen. Das Spiel der Hirsche, Rehe, Hasen, Füchse ist interessant und lehrreich, und wenn man auch Keimle meistens zu viel Klugheit beimißt, so ist er doch wirklich klug — ein geschickter Kerl — zu nennen.

Die Beobachtungen, welche ich in dieser Weise machte, gehören jedoch nicht hierher, oder vielmehr sie liefern höchstens Beweise für stark ausgebildete instinktive Klugheit der Thiere, ohne gerade auf Ueberlegung, Nachdenken, also wirklich vorhandenen Verstand schließen zu lassen. Sehr oft versuchte ich jung eingefangene Thiere zu zähmen, ohne damit zu Stande zu kommen, weil der Wirtschaftsbetrieb im elterlichen Hause meinen Bemühungen entgegenstand und alle späteren an den Verhältnissen, in denen ich zu leben gezwungen war, scheiterten. Gezähmte und abgerichtete Thiere des Waldes, sowie deren ihnen handwerksmäßig beigebrachte Künste habe ich sehr viel gesehen,ungsweise jedoch dieselben auf die überall vorübergehend sich darbietenden Schaubuden der Menagerien, Affentheater

und andere Erscheinungen dieser Art. Andauernde interessante Beobachtungen habe ich nur ein Mal und zwar an einem Reh zu machen Gelegenheit gehabt.

Das Thier, ein Reh, war einem Arzte, dessen Haus ich als Schüler fast täglich besuchte, von einem Fürsten geschenkt worden, „Hans“ getauft und wuchs ganz prächtig in der Freiheit eines geräumigen Hofes und Gartens heran. Hans attachirte sich besonders der Ältesten Tochter des Hauses; weshalb, war nicht zu ergründen. Männer mit Wägen, wie der Doctor selbst, konnte er nicht leiden, stoh vor ihnen oder ging ihnen, je nachdem er aufgelegt war, zu Leibe. Mit uns Knaben spielte er oder flog uns, was, seit er Gehörn bekommen, nicht ganz ungefährlich war. Dem Fräulein Therese folgte er im Hause, Hofe und Garten überall hin, betrat die Zimmer und stieg Treppen. Die Kasse beachtete er nicht und Hunde lernte er bald angreifen und abwehren. Der Weg, auf welchem er dazu gelangte, war eine der anmerkwürdigen Beobachtungen, welche man an dem Thiere machte.

Der im Hofe liegende Kettenhund sprang jedes Mal wüthend bellend auf, sobald „Hans“ den Hof betrat, was diesem vielfach Furcht und Zagen einflößte; ein Mal jedoch, als er sich dem schlafenden Fiedmann unvorsichtig näherte, dieser aber, beim Hinfpringen ihn doch nicht erreichte, blieb „Hans“ nach ein Paar Sätzen stehen, schenkte sich die Fesselung näher zu betrachten und überhaupt zu überlegen. Nach kurzer Zeit ging er auf den Hund los und von diesem Momente ab hatte Fiedmann verspielt, das Blatt wendete sich der Art, daß dieser von nun an sich in der Hütte versteckte, wenn „Hans“ im Hofe erschien.

Noch auffallender war die Bemerkung, daß „Hans“ im Garten nie aus den Seilen auf die Beete sprang. Wohl knabberte er an Gräsern und Blättern der Bäume, in dem sich an den Garten schließenden Parkwäldchen, doch nie an den Pflanzen der Beete oder an den Weingeländern. Und doch war das Thier nie davon abgehalten oder fortgeschreckt; durch sein Waldbleben wie seine Herkunft aber gewohnt und geneigt, den seinen Fuß überall hinzusetzen. Man kann nicht anders, als darin ebenfalls Einsicht, Ueberlegung — Verstand zu erkennen.

In dem Glauben der Völker, welche eine Seelenwanderung annehmen, mag diese nur eine poetische Auffassung des Lebens bilden. Doch wie mir lange ein Vermittelungsglied zwischen vermeintlichen Engeln und dem genus homo in der Geisteswelt suchten, so hat wirklich die Natur Uebergänge hinsichtlich der Gestalt und Intelligenz zwischen Menschen und Thieren bereinigt. Die erstere und einen stark ausgebildeten Nachahmungstrieb,

mitunter ebenfalls nur die einzige Fähigkeit des Menschen, — finden wir in verschiedenen Abstufungen im Affen wieder; die letztere, ohne die Gestalt bisher besonders im Elephanten, im Hunde, im Pferde; vielleicht liegt sie auch noch unentdeckt in andern Thieren. Neigung zur Dankbarkeit beim Menschen, ein recht rar gewordener Artikel, der sich nur durch sehr bedeutende geistliche Höhe und reines Gemüth erzielen läßt, findet sich sogar bei Thieren niedriger Stufe; oder ist etwa Dankbarkeit auch Instinkt?

Ich für meinen Theil bin daher überzeugt, daß die Säugethiere, wenn auch in verschiedenem Maße zugetheilt, Gedächtniß und Vorstellungsgabe haben, daß sie vermöge dieser zur Ueberlegung und zu Entschlüssen fähig sind und daß bei diesen Entschlüssen eine Ueberzeugung vorherrscht, durch welche sie im Stande sind zu wählen, was für den Moment angemessen erscheint; daß ihre in Folge dessen vorgenommenen Handlungen aber dadurch verständige werden und sie selbst also mit Verstand begabt sind.

## Literarische Anzeigen.

In C. J. Lüderich's Verlag in Berlin erschien:

**Ueber Arbeitstheilung in Natur- und Menschenleben.** Von Prof. Ernst Daecl. Mit 1 Kupferbild und 18 Holzschnitten. 1869. 10 Sgr.

**Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts.** Von Ernst Daecl. 15 Sgr.

**Ueber die erste Entstehung organischer Wesen und ihre Spaltung in Arten.** Von Prof. Aug. Müller (Königsberg). 2. verbess. Aufl. 1869. 10 Sgr.

**Alexander von Humboldt und der Geist zweier Jahrhunderte.** Von A. Bernstein. 7½ Sgr. **Schimmel und Hefe.** Von A. de Bary. Mit 7 Holzschnitten. 15 Sgr.

In der C. F. Winter'schen Verlagsbuchhandlung in Leipzig und Heidelberg ist forden erschienen:

**Die Natur im Lichte philosophischer Anschauung.** Dargelegt von Maximilian Perle, Professor zu Bern. 51 Druckbogen. gr. 8. Preis 3 Thlr. 20 Ngr.

Das vorstehende Buch, eine Frucht langjähriger Arbeit, ist zunächst für Philosophen und wissenschaftlich gebildete Laien geschrieben; für letztere ist es jedoch möglich, die umfassenden Studien zu machen, die objectiven Anschauungen des Naturforschers zu gewinnen, welche zum Theil nur durch künstliche Mittel und Experimente zu erhalten sind. Aber auch für Naturforscher wird dieses Buch nicht ohne Nutzen sein, da sie in denselben eine zusammenfassende, in sich barmanische, auf positive Gesetzmäßigkeiten gründende Schilderung des Naturganzen finden, wie sie nur ein Einzeler geben kann.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 21 Sgr. (A. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verkauft -Schneideleides Buchdrucker in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

N. 44.

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

3. November 1869.

Inhalt: Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 9. Die Characteränderungen im Pflanzenreich. Zweiter Artikel. — Zur Geschichte der Stenokollen, von Rudolph Waldner. Erster Artikel. — Das „Weltende“, vom Standpunkte der Naturwissenschaft, von August Bischof. — Bilder aus Griechenland, von D. Rind. Rezensionen. Erster Artikel.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 9. Die Characteränderungen im Pflanzenreich.

Zweiter Artikel.

Alles bisher Gesagte bleibt weit hinter den Farbenänderungen der Blumen zurück; hier treten die widersprechendsten Töne auf. Eine Kragedistel (*Cirsium heterophyllum*), bel uns mit dunkel-purpurothen Blumen, geht in Weiß über; ein Ehrenpreis (*Veronica serpyllifolia*), sonst nur in Weiß oder Bläulich gekleidet, nimmt das dunkelste Ultramarin an; der Gletscherbärenfuß (*Ranunculus glacialis*) ändert sein Weiß oft in Roth um, die Trollblume ihr Gold in Silber, der Sturmbut (*Aconitum Lycoctonum*) sein Gelb in Blau, so daß hieraus für Andere eine neue Art (*A. septentrionale*) entsteht. Ein Geranium (*G. sylvaticum*) verwandelt sein schönes Roth in Weiß, während ein Hornkraut (*Cerastium vulgatum*) seine Kelchblätter färbt. Am überraschendsten von Allen

ändert die zierliche Dreifaltigkeitsblume, in unsern Alpenländern sonst so selten, ihre weiße Axtblume um: sie wird, je höher sie steigt, immer röthlicher, bis sie endlich ganz in Roth aufgeht. Das Gleiche wird an weißblumigen Teichrosen (*Nymphaea alba*) und Anemonen beobachtet. Wenn auch selten, geht diese Farbenänderung selbst auf Beeren über, und das Christophskraut (*Actaea spicata*) kann, statt mit schwarzen, mit rothen Früchten erscheinen. — Nicht minder wunderbar sind die Veränderungen des Geruchs. Ich habe schon früher die Abfälle dafür genannt. Allein, es ist Thatsache, daß die meisten Kräuter innerhalb der Polarzone ihren Geruch verlieren, nur wenige ihn erhalten, noch wenigere einen solchen annehmen. Zu den ersteren gehört der Waldrian (*Valeriana*



officinalis) und die Angelika (*Archangelica officinalis*); zwei Kräuter, die bei uns zu den stärksten riechenden zählen und diesen Geruch fast gänzlich aufgeben. Die zweite Gruppe vertritt den Gelbthymian (*Thymus Serpyllum*). Am Archangel sammelt ihn das Volk darum als das kräftigste Gewürz und verkauft ihn zu hohen Preisen, wie Njander berichtet. Zur dritten Gruppe beobachtete der Genannte im Norden des Bortnischen Meerbusens das Köstkrant (*Cochlearia officinalis*) unserer Meeresküsten. — Von Giftpflanzen finde ich nur vier angegeben: unsern Wasserfuchterling (*Cicula virosa*), den Süßklee (*Hedysarum Mackenzii*), den Germer (*Veratrum album*) und den Sturmhut (*Aconitum septentrionale*).

Unter allen diesen Nennungen sind doch die der Gärten am bedeutendsten; selbst Standblavier gesehen zu, daß manche Orte wahrhafte Gartenasen sind. Unter Anderem sagt Elias Fries von den Pflanzen, welche Njander am Imandra sammelte, daß man im Süden von dieser Freude, welche manche süßliche Pflanzen dort annehmen, sich kaum einen Begriff zu machen im Stande sei. Die Polarflor theilt das mit der Alpenflor. Wie in dieser die Pflanzen zwar kleiner werden, aber die Blumen doch zum so mehr hervortreten, ebenso dort. Alles neigt sich dem Boden als der eigentlichen Wärmequelle zu; kurz und gedrungen sprossen die Kräuter, und darum erscheinen die Blumen größer, farbenreicher, als sie es an sich sind. Manche, wie der arktische Mohr, sind beides in Wirklichkeit. Sein Goldgelb, in Verbindung mit einigen andern Blumen, namentlich Compositen und Potentillen, ist die herrschende Farbe, wie in den Alpen; Blau und Purpur folgen nur als Ausnahmen, wenn dort ein Vergißmichtheut oder hier eine *Claytonia saccata* im Westskandinavien auftreten; Scharlach fehlt gänzlich; sonst gesellen sich den gelben Tinten am meisten die weißen — die, selbst genug! auch der Thierwelt so vielfach zukommen, — und röthlichen zu. Wo ein Verein solcher Tinten überrascht, da kann man wohl auf Augenblicke der Wirklichkeit entrückt und in den fernsten Süden versetzt werden. Auf Augenblicke; denn die ächte Farbenfarbe der Polarzone ist — Tonlosigkeit. Sie nimmt immer mehr zu, je mehr man sich dem Pole nähert und das ist auch der Grund, warum der civilisierte skandinavische Mensch, der es überhaupt noch wagt, in den Einöden Lapplands sein Leben zu verbringen, zum Farbensoppe greift und seine Wohnungen mit grellen (rothen) Farben bemalt, um Ton in die Landschaft zu bringen. Sie liegt überall in einem solchen uralten grauen Gewande, daß man sich um Abtaufende, in Zeiten zurückversetzt wähnt, in denen die Erde zuerst als eifriger Sumpf auftauchte. Ein melancholisches Dunkel schwebt über ihr, schwebt über den Wäldern, den Wiesen, dem Wasser, je näher wir dem Eismeer kommen. Dort gibt es Gegenden, von denen die Priester der Samojeden bezeichnend sagen, daß sie

„gar nicht von Gott geschaffen, sondern erst nach der Sündfluth entstanden sein können.“ So über alle Beschreibung düster, öd und wild sind 3. B. die Lunden am Ausflusse der Petchora in das Eismeer, d. h. von 68° bis 66° n. Br. Kein menschliches Wesen, kaum das Schneehuhn, hat sich da niedergelassen; hier ist der wirkliche Pol des Lebens, das auf dem ewigen Wobense gleichsam seine letzten Pulse schlägt.

Der Abstand vom Süden ist ein überwältigender. Die ganze Zusammenfassung der Pflanzenbede, wenn man hier noch von einer solchen reden darf, ist eine andere geworden. Nur was sich in der Polarebene noch auf dem Sumpflande zu erhalten vermag, führt ein beschreibendes Dasein. Meist sind es Niedgräser, überhaupt Monocotlen; denn obgleich sie ihre eigentliche Zone am Äquator haben, nehmen sie doch gegen den Pol wieder zu. Freilich nur in diesen Formen, welche kaum noch zur Erhaltung der Landschaft beitragen; die schön blühenden Formen sind fast gänzlich ausgeblieben. Ich zähle für die ganze Polarzone noch etwa 27 Erdbeeren, 5 Lilaceen, 5 Asparaagen, 2 Eoldhiaceen, 1 Fritter, 2 Euphaceen, 1 Lemnacee, 1 Najade, 14 Potamen, 3 Juncaceen, 1 Alismacee und 1 Hydrocharitide; allein, diese allein bleiben fast burchweg am Südrande der Polarzone zurück, damit die Knollen blühenden und jene Gewächse, die bei uns die Gemäßer zu bedecken pflegen. Nur die grasartigen farblos blühenden Monocotlen (Juncaceen, Euphraceen und Gräser) führen ihren Trupps bis in die Sahara des Polarlandes, ein Abglanz seiner Nebel, welche Alles verschleiern und verbüßern. Auch die Dicotlen sinken auf den einfassenden Bau zurück. Mit den windenden und rankenden Formen sind auch die Dornen blühenden ausgeschieden; selbst die letzten Ausläufer der Rosaceen, die Brombeerartigen, treten nur noch als krautartige auf. Die edle Form der Farnkräuter (selbst mit den schön blühenden Monocotlen aus) und überspizit kaum die Waldzone, in welcher sie doch noch in 27 Arten und 12 Gattungen auftritt. Selbst der Sumpfpflanzen (Polystichum Thelypteris), der doch bei uns gern die kältesten Moore bewohnt, scheitert nicht mehr auf das Sumpfland der Polarebene hinaus. Kein Wunder, daß wir nur noch zwei polare Arten (*Cystopteris renata*, *Aspidium fragrans*) finden, die unsere gemäßigte Zone nicht bewohnen. Die letzten in Europa bringen nach den Angaben von Lindblom bis gegen 71° N., d. h. bis zum Porfangerfjord und Nordkap, etwa 5 Arten (*Polypodium Phlegopteris*, *Aspidium Louchitii*, *Cystopteris fragilis*, *Asplenium viride*, *Blechnum Spicant* var. *crispum* Hn.), denen sich eine Eocopelacee (*Selaginella spinulosa*) und 2 Schachtelhalme (*Equisetum arvense*, *scirpoides*) zugesellen. Von den beiden letztgenannten Familien der Gefäßkryptogamen zählt sonst das Polarland noch je 8 Arten, von denen aber auch nur 2 (*Lycopodium dubium*

Netz, auf Island und Equisetum scirpoides) der gemäßigten Zona Europa's nicht mehr zukommen. Das sagt Allee; es sagt, daß wir hier in das Gebiet eingetreten sind, wo nicht mehr Gefäß-, sondern einfache Zellenpflanzen eine fast ausschließliche Herrschaft ausüben. Auf dem Eise des Wellington-Canals wuchert nicht einmal eine Flechte mehr; eine zu den Rosschiracinen gehörige Schleimalge (Hormosiphon arcticus Berkel.) vertreibt aber, wo kaum noch eine Spur pflanzlichen Lebens die Insein beglückt, die vegetabilische Schöpfung in höchst einfacher Form. Die einfachste ist gleichfalls eine Alge, folglich eine Pflanze, die zu den untersten gehört, mit denen das Pflanzenreich seine Formen eröffnet: der rothe Schnee. Darum auch könnte man ihn, den ich schon in der vorigen Schilderung erwähnte, gleichsam als die Auflösung

des Pflanzenreichs in eine einfache mikroskopische Zelle betrachten. Wie der Gletscherfloh nach der letzte Anklang an das thierische Leben mitten im Eise, so ist diese einfaches aller selbstständigen Pflanzen der letzte Anklang an das pflanzliche. Aber er ist der letzte anmuthigste; denn wie ein Abglanz des strahlenden Nordlichts, hält die in Moränen ausgebreitete Zelle oft alle mit Schnee besetzten Orte in ein Rosagewand, das seltsam belebend abstricht auf dem Weiß seines Bodens, von welchem das Auge erblinnet. Man weiß, daß diese Orte selbst constant zu sein pflegen und daß John Ross eine ganze Reihe von Klippen im Süden des Emsitfundes darum die Scharlachklippen nannte. Welcher Abstand, wenn man an den Fuß des Polberges, an den Aequator zurückdenkt!

## Zur Geschichte der Steinkohlen.

Von Rudolph Mildenner.

Erster Artikel.

Ueber die Geschichte der Industrie besitzen wir unglücklicher Weise ebenso wenig sichere Nachrichten wie über die Geschichte des Ackerbaues. Man kennt selbst die wesentlichsten Thatfachen derselben nicht, und leider ist auch nicht zu erwarten, daß wir jemals das Dunkel erbellen werden, welches die Urgeschichte der menschlichen Industrie bedeckt. Politische Thatfachen sind zuweilen in Manuscripten verzeichnet, welche ein Zufall zum Nutzen unserer jetzigen Generation an das Licht bringt, die wichtigsten Erfindungen hingegen sind im Dunkel geboren, haben sich langsam ausgebreitet und Boden gewonnen, ohne daß irgend Jemand ihnen die Ehre erwiesen, sie aufzuzeichnen. Erst die neuere Zeit ist sich der ungeheuren Bedeutung der Industrie klar bewußt geworden und nimmt heute von deren Fortschritten ebenso gewissenhaft Akt, wie von den Intelligen der Höfe und den Bewegungen der Armeen.

Der Nutzen, welchen die Steinkohlen uns im Frieden leisten, ist im buchstäblichsten Sinne des Wortes unbeschreiblich, und auch im Kriege erwiesen sie sich als ebenso unentbehrlich wie Pulver und Blei. Gleichwohl wissen wir nur wenig von der Geschichte derselben, so weit letztere sich nämlich auf ihre Gewinnung und Anwendung auf Zwecke der Fabrication bezieht. Der Historiker sieht sich in dieser Beziehung auf einige dürftige Notizen beschränkt, die aber eben ihre Nützlichkeit nur um so schätzenswerther macht. Im Alterthum konnte man die Steinkohlen gar nicht, wenigstens erwähnen die alten Schriftsteller ihrer nicht.

Die Steinkohlen sind nämlich vorzugsweise in kälteren oder gemäßigteren Zonen zu finden, denen die Natur damit gleichsam einen Ersatz für das gewährte,

was wärmere Gegenden durch eine heißere Sonne und eine üppigere Thier- und Pflanzenwelt voraus haben. Weder Aegypten, noch Palästina, noch Italien, Indien\*) oder Griechenland, welche zu verschiedenen Zeiten Herde der Civilisation gesehen, besitzen Steinkohlenlager. In Folge dessen kannten auch die Bewohner dieser Länder die Steinkohle nicht, und es ist mithin leicht erklärlich, daß ihre Schriftsteller derselben nicht gedenken. Dagegen ist es schwer zu glauben, daß die von Alters her durch ihre metallurgische Industrie und ihren Bergbau so berühmten keltischen Völker Jahrhunderte lang ein mit Steinkohlen angefülltes Gebiet, auf welchem die Steinkohle selbst häufig zu Tage ausläuft, bewohnen konnten, ohne diesem sonderbaren Steine, schwarz wie Kohle und brennbar wie diese, ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Allein, damals waren die Wälder noch so ausgedehnt und so dicht, daß die keltischen Völker sich wahrscheinlich nicht veranlaßt fühlten, in den Eingeweiden der Erde ein Brennmaterial zu suchen, welches die Oberfläche derselben ihnen so verschwenderisch bot.

Das älteste auf die Steinkohle, diese Hauptquelle des Nationalreichthums, mit der verglichen Gold und Platin kaum in Betracht kommen, bezügliche Dokument datirt aus dem 12. Jahrhundert. Es ist das eine in England entdeckte Aste, das Bouldon-book vom J. 1183, in welchem ein Steinkohlenbesitzer der zinspflichtigen Hammermühle von Warmouth und Sheffeld Erwähnung geschieht, und der Inhalt der eben citirten Aste macht es wahrscheinlich, daß die Steinkohle in diesen bel-

\*) In neuester Zeit hat man jedoch in Indien Steinkohlen entdeckt; auch Italien besitzt Steinkohlenbau.

den auf ursprünglich keltischem Boden gelegenen Orten schon dergleichen seit Langem in Gebrauch war.

Die älteste Kunde, welche der europäische Continent von der Steinkohle besitzt, ist eine Legende, welche verschiedene Chroniken des Lütticher Landes uns fast mit denselben Worten erzählen. Nach dieser Legende verdankt man die Entdeckung der Steinkohle einem Engel, der einst an der Schmiede eines armen Hufschmiedes vorbeiging und mit demselben eine Unterhaltung anknüpfte. Der Schmied klagte dem Engel seine Noth, da die Feuerung der Kohle mit jedem Tage zunehme und er den Preis derselben nicht mehr zu erschwingen vermöge. Der Engel gab hierauf dem Schmied den Rath, in einem benachbarten Berge, Namens Publement, nachzugraben, wo er Kohlen im Ueberflusse finden würde. Der arme Hufschmied vertraute den Worten des Engels, so sonderbar sie ihm auch erschienen mochten, und sein Glaube wurde belohnt. Er fand die Steinkohle, deren Gebrauch sich dann im ganzen Lütticher Lande rasch verbreitete. Wie die Chronik berichtet, so soll der Schmied Hulloos geheißen haben, weshalb man dem von ihm aufgefundenen Mineral seinen Namen gab. (Houllé, französischer Name der Steinkohle.)

Ueber diese Legende ist Seitens belgischer Schriftsteller viel geschrieben worden. Die Einen haben dieselbe ihres miraculösen Gewandes entkleidet und sie auf eine der Wahrscheinlichkeit nicht erlangende historische Thatsache zurückführen wollen. Die Chronik, behaupten sie, habe ursprünglich das Wort Angelus (Engländer) gebraucht, welches dann durch Schuld der Abschreiber in Angelus (Engel) verandelt worden sei. Da die Steinkohle schon früher in England bekannt war, so würde die Entdeckung dieses Minerals in Belgien durch einen reisenden Engländer allerdings nicht unwahrscheinlich sein. So sinnreich diese Annahme übrigens auch sein mag, so wird man doch zugeben, daß der Glaube an eine direkte göttliche Dazwischenkunft ungleich mehr der Anschauungsweise des Mittelalters entspricht. So existirt z. B. im Erzgebirge eine der hier mitgetheilten ganz analoge Sage, wonach einem Bewohner von Annaberg ein Engel erschienen und ihm eine Stelle im Walde angedeutet habe, wo er ein Nest mit goldenen Eiern finden würde. Der glückliche Visionär habe sich an den angedeuteten Ort begeben und dort eine zu Tage auslaufende Silberader gefunden. Beide Sagen tragen, wie man sieht, denselben Charakter.

Der historische Kern beider Sagen ist übrigens leicht herauszuschälen; derselbe besteht in dem einen Falle in der Entdeckung einer Silberader durch einen Bewohner Annabergs, in dem andern Falle in der Entdeckung eines Steinkohlenlagers durch einen Schmied des Dorfes Plénérac bei Lüttich. Die Geschichtschreiber des Lütticher Landes verlegen diese letztere Thatsache in die Jahre 1198 oder 1200; allein Dreyz in seiner Histoire de Liège datirt

das Faktum weiter zurück und Willensagne beweist, gestützt auf seine Forschungen in den Urkunden der Abtei du val Saint Lambert, in den Memoiren der Brüsseler Academie vom J. 1823, daß die erste Entdeckung der Steinkohle in Belgien wahrscheinlich um das J. 1049 stattgefunden habe.

Im Hennegau verlegt man die erste Entdeckung der Steinkohle, oder, deutlicher gesprochen, deren erste praktische Verwendung in das 13. Jahrhundert. Der Sage nach soll ein Bauer bei dem Graben eines Brunnens auf ein Steinkohlenlager gestoßen sein und, nachdem er die Brennbarkeit des auf diese Weise an das Licht geförderten Minerals erkannt, dasselbe ausgebeutet haben. Doch ist Hennegau dem Lütticher Lande so benachbart, in beiden Ländern liegt die Steinkohle so nahe unter der Oberfläche, daß wohl anzunehmen ist, daß der Bau auf Steinkohlen, einmal im Lütticher Lande begonnen, sich schnell nach Hennegau verbreiten mußte.

In Frankreich hat man noch kein auf den Steinkohlenbau bezügl. Document zu entdecken vermocht, welches weiter als bis zum 14. Jahrhundert hinauf reicht. Das älteste Document dieser Art ist eine im 1842 er. Jahrgange der Annales des Mines mitgetheilte Acte, aus der hervorgeht, daß im J. 1315 ein einem Knecht aus Pontolse gehörendes Schiff eine Ladung Getreide nach Newcastle führte und mit einer Ladung Steinkohlen nach Frankreich zurückkehrte. Indessen waren um diese Zeit die Kohlengruben Saint-Etienne in Frankreich bereits in der Ausbeute begriffen; ein Document vom 18. Februar 1321, welches mehr als 6 Jahre jünger als das oben erwähnte Actenstück ist, stellt diese Thatsache außer allen Zweifel. In diesem in Peyret-Lallier's Traité sur la législation des mines citirten Document maßt sich der Seigneur de Rochela-Molière (bei Saint Etienne) ein Recht an, welches zu den Hoheitsrechten der Krone gehört; denn er autorisirt den „Sieur Martin Chagnon“ unter der Bedingung eines an ihn zu zahlenden Zinses in Höhe der Hälfte des gewonnenen Productes, auf dem Eigenthum des Sieur de Lurieu Steinkohlen zu graben.

Wahrscheinlich wurden um diese Zeit auch bereits die Steinkohlenminen der Auvergne ausgebeutet, wie ein kürzlich entdecktes, auf die Minen von Brassac bezügl. Document beweist. Aus diesem im Jahre 1851 in der Description des mines de Brassac veröffentlichten Documente, welches gelegentlich einer am 29. und 30. Januar 1349 vorgenommenen gerichtlichen Untersuchung aufgenommen wurde, erhellt, daß die Steinkohlenbergwerke von Roche-Bretons seit unendlichen Zeiten bekannt waren. — „Jean Jamme le Vieux, Bewohner des nach Anzai sur Allier eingepfarrten Dorfes Brézens, 90 Jahre alt, sagt aus, daß der besagte de Saint Quentin und alle seine Vorfahren seit unendlichen Zeiten das Recht gehabt und ausgeübt haben, Steinkohlen zu graben,

zu verkrennen, zu verkaufen und das Geld dafür in Empfang zu nehmen, alles ohne Widerspruch und Einrede."

Wie man sieht, bezieht sich, mit Ausnahme der erwähnten Legende des Lütticher Landes, welche indessen wohl kaum als ein historisches Dokument zu betrachten ist, keines der hier angeführten Altenstücke auf eine erste Entdeckung und praktische Anwendung der Steinkohle; im Gegentheil sehen dieselben eine vielleicht schon alte Gewohnheit, sich dieses Minerals zu bedienen, voraus. Gleichwohl hat seine Verwertung nicht ohne Schwierigkeit in den Städten Boden zu verschaffen vermocht. Lange Zeit diente die Steinkohle jedenfalls nur zum Gebrauche der ländlichen Bevölkerung, ähnlich wie es in Bezug auf den Torf noch heute in vielen Gegenden der Fall ist. Den Schmieden empfahl sich die Steinkohle zwar durch ihre Eigenschaft nicht nur Flamme, sondern auch Glühfeuer zu geben; allein für den häuslichen Gebrauch bot sie keinen andern Vortheil, als den eines billigen Preises dar.

Es wurde die Steinkohle in Paris, z. B. erst gegen Anfang des 16. Jahrhunderts, in einigermaßen be-

trächtlicher Menge konsumirt. Noch existirt ein auf Ansuchen des Parlaments und des Prevots der Stadt Seintens der Fakultät von Paris abgegebenes, vom 13. Juli des Jahres 1520 datirtes Gutachten über die Gefahren und Nachtheile des Gebrauchs der von England importirten Steinkohlen im Innern der Capitale. Wie man sieht, waren die Kommunikationsmittel im Innern Frankreichs damals noch so unvollkommen, daß in Paris nur von englischen Steinkohlen die Rede sein konnte, obgleich die Steinkohlengruben der Auvergne und des Joréz damals bereits im schwunghaften Betriebe standen.

Auch die englischen Parlamentsakten geben Kunde von der Opposition, welche sich gegen den Gebrauch der Steinkohle in der Capitale erhob. Unter der Regierung der Königin Elisabeth stellte eine Deputation des Hauses der Gemeinen den Antrag, daß, da mehrere Färber, Brauer, Schmiede und andere Handwerker von London angefangen, sich statt des Holzes, der Steinkohle zu bedienen und dadurch die Luft mit schädlichen Dünsten und Rauch zu füllen, künftig der Gebrauch der Steinkohlen in London wenigstens während der Parlamentszeit untersagt werden möge.

## Das „Weltende“ vom Standpunkte der Naturwissenschaft.

Von August Wilhelm.

Wie durch die mannigfache Zusammenstellung nur weniger Buchstaben die große Anzahl der Wörter entsteht, so bildet in unendlich vielen qualitativen und quantitativen Verhältnissen, sich unter einander verbindend, eine relativ nur geringe Menge von Elementen oder Grundstoffen jene staunenswerthe Mannigfaltigkeit von Verbindungen, Gestalten und Formen, welche auf unserm Planeten uns entgegentritt. In dem Luftpne, welches unsere Erde umfließt und auf dessen Boden wir wandeln, in den Tropfen des Ozeans, der brandend an seine Felsen schlägt, in den Gesteinsarten, welche die erhärtete Rinde des von uns demonteten Sterns ausmachen, wie in der Lava, die aus ungemessenen Tiefen hervorquillt, in der unscheinbaren Flechte, welche der Felsen erste Stirn umzieht, wie in jenen riesigen Baumgestalten der Tropenwelt, in den Insuforien unserer Gewässer, die zu Millionen einen Tropfen beleben, wie in dem wunderbaren Bau des menschlichen Körpers, in dem „Himmelskräfte auf- und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen“ — überall zeigt des Chemikers Kunst uns dieselben Stoffe. Aber nicht allein die Stoffe sind überall dieselben, sondern auch die Kräfte, welche mit diesen Stoffen verbunden sind, und auf deren geheimnißvollem Spiele alle Bewegung und alles Leben in der Natur beruht — und diese Stoffe und diese Kräfte sind ewig, unvergänglich, mögen die Formen, in denen sie ihre

Thätigkeiten äußern, auch unendlich wechseln. — Den luftförmigen Sauerstoff treibt eine ihm innewohnende Anziehungskraft (chemische Verwandtschaft) zum festen Kohlenstoff; er verbindet sich mit demselben bei der Verbrennung zu der luftförmigen Kohlenäure, die der Atmosphäre sich beimengt. Die Blätter (Athmungswerkzeuge) einer Pflanze nehmen im Sonnenlicht diese Kohlenäure auf, welche in der Pflanze in ihre beiden Bestandtheile, Kohlenstoff und Sauerstoff, zerlegt wird. Den Sauerstoff geben die Blätter wieder nach außen ab, während der Kohlenstoff den Leib der Pflanze aufbauen hilft. Die Pflanze dient einem Menschen als Nahrung; der Kohlenstoff wird da ein integrierender Bestandtheil des menschlichen Organismus, bis er endlich durch die Lungen in der Form von Kohlenäure der Atmosphäre zurückgeführt wird, von der aus er den nämlichen Kreislauf von Neuem beginnt. — Wie nun das Atom Kohlenstoff mit den ihm eigenen Kräften nicht verschwindet, mag es heute im Gehirne eines Dichters die Flamme der Begeisterung nähren, oder morgen in den Säften einer Pflanze kreisen, so geht überhaupt im Universum an Stoff und Kraft nichts verloren. Tod, aufgefaßt als das Ende von Etwas, existirt in der Natur nicht; das, was man Tod nennt, bildet nur den Anfang von neuem Leben. Tod ist Wechsel, nicht Ende. Für den, der an die Brust eines geliebten Todten tritt, ist das immerhin ein erhebender Ges-

danke, auch wenn die Verheißungen der Religion in ihm die Kraft hoffnungsvollen Glaubens nicht erlangt haben sollten. Er sieht im Tode nicht Untergang, nur Uebergang zu neuen Lebensformen. Anbetend beugt er sich vor jenem heiligen Kreislaufe der Stoffe und Kräfte, durch den das Weltganze als „ein großes Lebendiges“ besteht, und durch den er Eins wird mit der Natur um ihn. In dem Weichen, das dem Grabe des theuren Todten entspringt, in der Kerze, die hoch über ihm ihr schmetterndes Lied singt, in dem Lusthauche, der seine glühende Stirn kühlt, erkennt er bewundernd das Spiel derselben Stoffe und derselben Kräfte, welches in dem betraurten Dahingeschiedenen einst thätig war und in ihm selbst noch thätig ist. Der Todte ging ihm nicht verloren; er fühlt ahnungsvoll seine Gegenwart um sich, er fühlt sie in sich.

Nach den vorausgegangenen Betrachtungen muß die Frage: Haben wir einmal einen Untergang der Welt zu erwarten?“ entschieden verneint werden, wenn unter diesem Untergange eine völlige Vernichtung, das Entstehen einer großen Reere, eines Nichts verstanden wird. Eine andere Frage ist indes die: „Können, oder vielmehr müssen nicht bereits Verhältnisse eintreten, unter denen die Welt in der Gestalt, wie sie uns jetzt sich darstellt, nicht mehr existiren kann? wird michin nicht endlich auch unsere Erde mit ihrem unermesslichen Reichthum an Formen als solche zu bestehen aufhören?“ Auf diese Frage antwortet die Naturwissenschaft nach ihrem heutigen Standpunkte: „Ja, diese Zeit wird und muß kommen.“ Versuchen wir es, dies näher darzulegen!

Nach dem erst neuerdings aufgestellten Gesetze von der Erhaltung der Kraft, dessen Erkennung und nähere Begründung wir zwei deutschen Forschern, dem Arzte J. M. Mayer in Heilbronn und dem berühmten Physiker und Physiologen Helmholtz in Heidelberg verdanken, kann zwar von einer Kraft nie etwas verloren gehen, oder eine Kraft kann sich in eine andere umsetzen, verwandeln. Wenn wir mit unseren Händen rasch über eine raube Fläche streichen, so haben wir ein Gefühl der Wärme; die Achse eines Wagenrades erhitze sich bei ihren Umdrehungen in den Naben. Woher kommt diese Wärme? Sie entsteht unter unseren Händen, denn sie war vorher nicht da. Aus nichts? Keineswegs. Der Sachverhalt ist, daß sich die mechanische Kraft unser Armmuskeln, die mechanische Kraft, welche das Wagenrad umtreibt, verwandelt; sie verschwindet in ihrer ersten Form und erscheint als Wärme wieder. An unzähligen Beispielen ließe sich noch zeigen, wie mechanische Kraft in Wärme sich umsetzen kann. Aber umgekehrt ist es auch möglich, die Wärme in mechanische Kraft umzusetzen, wie dies ja in unseren Dampfmaschinen fortwährend geschieht. Wer wüßte nicht, daß die Wärme Lichterscheinungen hervorruft, und umgekehrt, Electricität Magnetismus u. s. w. ! Es erscheint so die ganze Reihe der Naturkräfte: mechanische

Kraft, Wärme, Licht, Electricität, Magnetismus in sich auf das Engste zusammenhängend. Wahrscheinlich liegt allen dieselbe eine einzige Kraft zu Grunde, denn sie lassen sich sämmtlich in einander überführen.

Nun aber stellt es sich als eine Thatfache heraus, daß bei der Umwandlung der Kräfte in einander eine verhältnißmäßig sehr große Menge Wärme gebildet wird, die nicht wieder in eine andere Kraft sich umsetzt. So geht bei jeder Bewegung irdischer Körper, in großartiger Weise vor Allem bei den täglichen Bewegungen der Erde und Gluth in den Meeren, wie in der Atmosphäre, durch Reibung und Stoß ein Theil mechanischer Kraft in Wärme über, von der nur ein Theil wieder mechanische Kraft wird. Ebenso entsteht bei den meisten chemischen und electrischen Processen ein Ueberschuß von Wärme, der nicht wieder in chemische und electrische Kraft sich umwandelt. Was geschieht mit diesem Plus von Wärme? Es geht hinaus in den unendlichen Weltraum und so für unsere Erde verloren. Hieraus folgt, daß der Vorrath an mechanischen, electrischen und chemischen Kräften unseres Planeten fortwährend sich verringern muß. — Sind in der Welt außerhalb unser Erde, wie wir jeglichen Grund haben anzunehmen, ja, wie wir zum Theil mit Bestimmtheit wissen, dieselben Kräfte in denselben Stoffen thätig, wie auf dem Sterne, den wir bewohnen, spielen sich dort ebenfalls physikalische und chemische Processen ab, so muß dort in gleicher Weise wie hier die Menge der Wärme auf Kosten des übrigen Kraftvorraths in stetiger Zunahme begriffen sein. Zu der Ueberschreitung der bewegenden Kraft der Gestirne in Wärme, und somit zur fortschreitenden Verminderung der ersteren, wird auch vornehmlich die Reibung beitragen, welche alle Weltkörper auf ihren Bahnen durch den unermesslichen Weltraum erleiden müssen, wenn, wie Enke aus den immer mehr sich verlangsamenden Bewegungen des nach ihm benannten Kometen geschlossen und außerdem die meisten Astronomen behaupten, dieser Weltraum mit einem widerstehenden Medium angefüllt ist.

Nothwendig muß, nach dem Vorhergehenden, wenn das Weltall ungehört dem Ablaufe seiner physikalisch-chemischen Processen überlassen bleibt, endlich ein Zeitpunkt kommen, wo aller Kraftvorrath des Universums Wärme geworden. Ist dieser Fall eingetreten, so muß alles Leben, alle Bewegung sowohl auf Erden, als im übrigen Weltganzen aufhören. Die Möglichkeit organischen Lebens auf unserem Planeten existirt also dann nicht mehr. Dieser Planet selbst wird, wie alle übrigen Sterne, in seine Atome sich auflösen, weil das Band zwischen denselben, die chemische Anziehungskraft, geschwunden, d. h. in Wärme übergegangen ist — das Weltall wird in atomistischen Staud zerfallen, in welchem die Ruhe der ausgleichenden Gegenkräfte herrscht. In diesem Sinne predigt also die Naturwissenschaft die Erfüllung der biblischen

Beifügung: „Himmel und Erde werden vergehen.“

Wann wird diese großartige Katastrophe sich vollziehen? wann wird der „jüngste Tag“ erscheinen? Diese Frage läßt sich auch nicht annähernd mit Bestimmtheit beantworten. Wahrscheinlich werden noch Millionen von Jahren in das Meer der Ewigkeit hinabrollen, ehe die Welt jenem von der heutigen Wissenschaft prophezeigten Untergange, d. h. jener völligen Umwandlung in eine andere Form anheimgefallen. Jedenfalls wird aber das Geschlecht der Menschen nach Erfüllung seiner

sittlichen Zwecke bis dahin schon längst andern Lebensformen wieder Platz gemacht haben. Als Beleg dafür, wie außerordentlich langsam kosmische Veränderungen vor sich gehen und zugleich zur Verhütung ängstlicher Gemüther, sei hier nur angeführt, daß, wie der große französische Astronom Laplace aus den Beobachtungen des vor 2000 Jahren lebenden Sternkundigen Hipparch gefolgert, sich in diesem ganzen Zeitraum die Dauer des Tages nicht um 1<sup>100</sup> Secunde geändert hat, folglich die Kraft, mit der unsere Erde sich um sich selbst und um die Sonne des wagt, fast dieselbe geblieben ist.

## Bilder aus Griechenland.

Von D. Ainz.

### Messenien.

Erster Theil.

Messenien ist die südwestliche Landschaft der peloponnesischen Halbinsel, welche im Süden und Westen vom Meere bespült, im Osten durch die Kette des Targetostoges, dieses von Lakonien und im Norden durch den Gebirgskamm, dessen Mittelpunkt der Tetrass ist und der sich von S. O. nach N. W. hinzieht, von Arkadien und Elis abgeschlossen wird. Ihren Hauptbestandtheil macht das Gebiet des Pamisos (jetzt auch Dipotamos genannt) aus, welcher der Hauptfluß von Messenien ist und das Land seiner Länge nach von Nord nach Süd durchfließt und bei dem Städtchen Nisi in den messenischen Meerbusen (jetzt Golf von Koron) sich ergießt. Er gilt für den wasserreichsten der Flüsse der Halbinsel, obgleich er nicht der längste unter ihnen ist, und an seiner Mündung ist er sogar eine Strecke lang für kleinere Fahrzeuge schiffbar. Das ganze Flußgebiet zerfällt entschieden in zwei Theile, und die dadurch gebildete Doppellebene mit den nach ihr sich öffnenden Seitenthälern ist der Haupttheil Messeniens.

Ganz Messenien zeichnet sich vor allen griechischen Landschaften durch die Milde des Klima's aus. Indem sich das Land im Süden nach dem Meere zu abacht und hohe Berge dasselbe vor den N. O. und Nordwinden beschützen, erstreckt es sich eines fast ägyptischen Klima's. In dessen Folge ist auch das Land von außerordentlicher Fruchtbarkeit; vorzüglich gilt dies jedoch von der südlichen Ebene, die sich gegen S. O. mit breitem Küstenrande nach dem Meere zu öffnet. Ein Reisender machte dort die Erfahrung, daß, während auf der andern Seite des Targetostoges der Frühling kaum begonnen hatte und die Hochebene von Arkadien noch düster und grau wie im Winter vor seinen Blicken lag, auf der messenischen Ebene der Sommer sich bereits eingestellt hatte. Diese breite, durch verschiedene Bergtäler reich bewässerte Ebene, führte im Alterthume den Namen Makaria (die Geseg-

nate, die Glückselige), und diesen Namen verdient sie auch noch heute in vollem Maße. Wie hier in dieser herrlichen Natur alle Früchte des Südens auf das üppigste gedeihen, so ist auch das Gebirgeland zum großen Theile reich an Fruchtobäumen und Feldern, an Weide und Wald. Man darf Messenien in der That einen der gesegnetsten Punkte der Welt nennen, aber in jener südlichen Pamisosene vereinigen sich vorzüglich alle Reize des Klima's, der Vegetation und der Kultur. Ebgleich die Orangen- und Oliven-, die Feigen- und Maulbeerwäldchen Messeniens während der ägyptischen Occupation unter Ibrahim Pascha im Jahre 1825 u. folg. durch das Umbauen und Verbrennen der Fruchtwälder gänzlich verwüßt worden waren, hatten doch später die alten Baumsrümpfe wieder neue und kräftigere Schößlinge getrieben, und das verheerete Land war von neuem „ein Garten und so schön und fruchtbar, wie in alten Zeiten.“

Die einzelnen Reisenden, die in den letzten dreißig Jahren zu verschiedenen Zeiten Messenien besucht haben, können die Herrlichkeit der dortigen Natur und Vegetation nicht reichend und kräftig genug schildern, auch wenn der eine und andere von ihnen noch im J. 1853 vielfache Spuren jener Verwüstungen sehen konnte. Bei dem langsamen Wachsthum des dort vorzugsweise verbreiteten Leibaums war eine solche Verheerung besonders empfindlich, — empfindlicher als bei den messenischen Fruchtobäumen; aber man hatte, wo die Vegetation sich aus sich selbst nicht hatte wieder erheben und entwickeln können, Sorge getragen, durch neue Pflanzungen die tiefen Wunden zu heilen. Bereits im J. 1840 erklärte ein Reisender, daß dies von der Natur zu dem größten Reichtume bestimmte Land in einem erfreulichen Aufschwunge begriffen sei, und er kam damals an Hunderttausenden seit wenigen Jahren ausgepflanzter Feigenbäume vorüber,

während die neuen Pflanzungen von Del- und Maulbeerbäumen nach Verhältnis nicht minder zahlreich waren. Außerdem fand er dort auch eine reiche Vegetation von Drangen, Citronen, Granat- und andern Fruchtbäumen. Leider hatten in den Frühlingmonaten des Jahres 1846 wiederholte heftige Erdbeben gerade diesen südlichen Theil Messeniens schwer heimgesucht und viele Ortschaften in Trümmer geworfen und dadurch den steigenden Wohlstand der Einwohner aufs neue untergraben; aber doch hatten die Natur und menschliche Cultur auch hier bald wieder Ersatz gewährt und gefunden.

Im Allgemeinen finden sich in Messenien und namentlich in seiner südlichen Ebene, die sich von Kalamata aus, ebenfalls am messenischen Meerbusen gelegen (und die Hauptstadt der Nomarchie), nordwestlich über Nisi und Andrusia hinzieht, Del- und Feigen-, Drangen- und Citronen-, Granat- und Maulbeerbäume in reichster Vegetation, zum Theil in weiter Ausdehnung und großen Pflanzungen und Waltungen. Dort kommt der Reisende auf seinem Wege nach Kalamata durch die fruchtbare und zugleich eine der schönsten Gegenden Griechenlands. Die Ebene ist mit einem ausgedehnten Walde von riesigen Feigenbäumen bedeckt, die eines der wichtigsten Produkte des Landes liefern. Die Kalamata-Feigen, die an langen Schmüren von Binsen zu Kränzen aufgesaft werden, gehören zu den besten und werden in großen Quantitäten ausgeführt. In der Nähe von Kalamata treten an die Stelle der Feigenbäume mehr Delbäume, überhaupt aber liegen an den über der Ebene aufsteigenden Anhöhen zahlreiche Dörfer, meist zwischen hohen und dichten Baumgruppen in anmuthiger Lage. Dunkle Cypressenhaine erinnern an die noch nicht ferne Zeit, wo die Rußmänner hier ihre Begräbnisplätze mit diesem Baume schmückten. Das ganze Land ist hier sehr gut angebaut, auch für Griechenland stark bevölkert. Weiterhin liegt das freundliche Kalamata „in einem wahren Garten“, den prächtige Drangen- und Citrongärten schmücken, und wo bereits im April die Bäume im vollen Schmuck der Blüthe und der goldenen Früchte prangen. Die Früchte erreichen hier eine Größe, wie selbst in Italien nicht. Die einzelnen Grundstücke sind häufig von Hecken von Cactus und Aloë umgeben, und die Palme vollendet den ganz südlichen Charakter, der diese Gegend vor allen andern griechischen Landschaften auszeichnet. Die Vegetation ist an diesen fennigen Südküsten des Peloponnes, wo es dem Lande an Bewässerung nicht gebricht, von dem üppigsten Reichthum. Außer den schon genannten Fruchtbäumen der edelsten Art gedeihen Mandeln und Granaten, Pfirsiche und Aprikosen; süße und Wassermelonen

werden in ganzen Feldern gezogen, und die Mänder der natürlichen oder durch Menschenhand weiter geleiteten Wasserläufe schmücken Oleander und Agnus Castus mit ihren lieblichen Blüten. Und das dies Alles nicht, wie in übercivilisirten Ländern, nach Schnur und Richtmaß in pedantischen Linien oder in regelmäßigen Quadraten gezogen und geheckt wird, sondern in halb wilder Natürlichkeit durcheinander wächst, erhöht nur den landschaftlichen Reiz.

Kalamata, die Hauptstadt von Messenien, liegt am westlichen Fuße des Targetos, an der Stelle des alten homerischen Pherä, wo einst Telemach auf seiner Reise von Pelos nach Lacedämon übernachtete; nur hat sich die flache Küste seit dem Alterthume durch die Anschwemmungen des dicht an der Stadt vom Targetos herabfließenden Bergstroms Nedon weiter hinausgeschoben, als die alten Geographen angeben, denn sie ist jetzt eine starke Viertelstunde von der Stadt entfernt. Von alten Resten ist wenig mehr zu sehen. Nur Ruinen des mittelalterlichen Schlosses aus der Zeit der Frankenherrschaft thronen nördlich von der Stadt auf einem mäßig hohen Hügel. Während des späteren kurzen, nur 30-jährigen Besizes der Venetianer ward das Schloß wieder ausgebessert, und noch prangt der Löwe von S. Marco über dem Thore. Von hier aus hat man eine reizende Aussicht über den breiten messenischen Meerbusen und die ihn umgebende Nord-, Ost- und Westküste. Zu den Füßen liegt die Stadt mit ihren an den beiden Ufern des Nedon sich ausbreitenden Fruchtgärten und ihren steinernen Häusern, die noch zum Theil von fränkischer und venetianischer Bauart sind. Dicht unter dem Fuße des Schloßberges fließt der Nedon hin, und er zeigt durch sein breites Kieselbett und die darin liegenden Felsblöcke, daß er oft gewaltig anschwellt. Zu anderen Zeiten und im Sommer ist er trocken. Diese Eigenschaft ist den meisten griechischen Gewässern gemeinsam, und sie läßt sich zum großen Theile aus der Entblößung der Berge von Wäldern erklären. Indes soll gerade der Nedon ganz besonders launenhaft sein, indem er, so ruhig er gewöhnlich ist, doch oft furchtbar daher braust, weshalb ihm die Umwohner den bezeichnenden Namen des „Narrenflusses“ gegeben haben. Obgleich übrigens Kalamata statt eines Hafens nur eine offene und unsichere Bude hat, die nur bei vollkommen ruhiger See zu gebrauchen ist, und weshalb man sich des entfernteren Hafenplatzes von Armeros an der östlichen Küste des messenischen Meerbusens bedienen muß, treibt es doch einen bedeutenden Ausfuhrhandel mit den Erzeugnissen der messenischen Ebene und des unteren Schtirges, vorzüglich mit Del, Seide, Feigen und andern Südküsten.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 45.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

**10. November 1869.**

**Inhalt:** Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 10. Der arktische Sommer. — Vom Neuterofa zum Rentbianc, von Otto Ale. 9. Die Rentbianc-Gruppe. — Silber aus Griechenland, von D. Rind. Rezensionen. Zweiter Artikel.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 10. Der arktische Sommer.

Man empfängt ein drückendes Gefühl, wenn man sich mit dem allmähigen Erlöschen des Pflanzenlebens gegen den Pol hin vertraut macht. Wie, sagt man sich, kann da noch von einem Frühling, Sommer und Herbst die Rede sein, wo kaum noch Etwas sprießt, wo nur noch Moose und Flechten in ihrem unveränderlichen Gewande erscheinen!? Die Vorstellung ist berechtigt, aber falsch. Zwar sind wir nur sehr dürftig unterrichtet über das Periodische im polaren Pflanzenleben; was wir jedoch wissen, versetzt uns zu den höchsten Alpengipfeln.

Im Polarlande, berichtet uns Berthold Seemann, welcher den „Herald“ zur Auffindung Franklin's nach Kap Esburne im westlichen Eismalande an der Beringsstraße begleitete, gibt es nur zwei Jahreszeiten, die ohne vermittelnden Uebergang rasch aufeinander

folgen. „Um die Mitte Octobers beginnt der Winter; alles Leben erscheint erloschen. Der Himmel ist wolkenlos, die Atmosphäre ruhig; die meisten Thiere, die während der langen Sommertage nach den Moossteppen gepilgert waren, sind in die wärmeren Regionen hinabgeflogen, um ihre Nahrung zu suchen, welche ihnen die Polargegend verweigert. Melnabe neun Monate lang sind die Gewässer mit Eis, ist der Boden mit Schnee bedeckt, die Temperatur manchmal so niedrig, daß Weingeist und Quecksilber erstarren, wenn sie der freien Luft ausgesetzt werden. Die Luft ist so rein, daß zwei Menschen auf eine Entfernung von zwei englischen Meilen miteinander reden können, daß selbst das leiseste Geflüster hörbar ist. Mit dem eintretenden Winter werden die Tage kürzer. Im November dauern sie nur wenige Stunden, und im



December läßt sich die Sonne in mehreren Breitengraden nicht mehr über dem Horizonte bilden. Nordlichter von magischem Glanze erheben dann jeweilen die Gegend in wunderbarer Weise. Der Winter ist es, in dem sich die Großartigkeit der arktischen Regionen entwickelt. Todtenstille fern und nah. Sterne, Mond, Ede Schnee und Eiskröten sind die einzigen sichtbaren Gegenstände. Hier lauscht der Wanderer vergebens einem befreundeten Tone. Kein Glockenklang, kein Hundgebell, kein Hahnschrei deuten auf die Nähe einer menschenbewohnten Welt. Sein Athem, sein eigener Herzschlag ist Alles, was sein Ohr vernehmen kann. In solchen Momenten ist die Einsamkeit der Polarwelt drückend, überwältigend. — Endlich kehrt die Sonne wieder. Es wachsen die Tage und mit ihnen steigt die Temperatur. Zu Ende Juni bricht das Eis, der Boden streift seine Schneedecke ab. Der Sommer bricht mit Einem Male herein. In wenigen Tagen ist die Landschaft mit lebhaftem Grün bedeckt. Heerden von Enten und Gänsen kommen aus dem Süden geflogen. Aibize, Schnepfen und andere Vögel beleben die Scene, und das Murmeln kleiner Bäche, wie das Gesumme der Insekten — die freilich fast überall im Polarlande den Genuß des Sommers wesentlich verkümmern — geben Zeugnis, daß der Sommer da ist. Die Sonne verschwindet jetzt noch so wenig als im Sommer der Tropen. Ihre ununterbrochen auf den Boden fallenden Strahlen lassen die Temperatur nicht zum Abkühlen kommen, und so wird trotz des geringen Höhenstandes der Sonnenkugel ein Wärmegrad hervorgerufen, wie es unter andern Verhältnissen unmöglich wäre.“ In rascher Aufeinanderfolge sprießen jetzt die Pflanzen, Blumen und Früchte hervor.

So ist es auf der großen Strecke vom Norton-Sund bis zur Barrow-Spitze, d. h. von 84° bis etwa 70° n. Br. im westamerikanischen Polarlande. Es ist aber überall ähnlich, wo es gleichsam nur Einen Tag und Eine Nacht gibt; denn die vorstehende Schilderung paßt auf das ganze Polarland. Ob am Saume des Polarkreises oder innerhalb desselben, ob in der Wüste oder in der Steppenzone, — überall nach langer Winterruhe offenbart sich mit der Schneeschmelze ein Wachen und Blühen von ganz außerordentlich intensiver Schnelligkeit und Energie. Pflanzen, deren Blüthezeiten bei uns weit aus einander liegen, treffen schon in Lappland fast gleichzeitig zusammen. „Es ist“, bemerkt Wichura sinnig, „als ob Alles eile, um vor der nahen Wiederkehr des Winters zum kurzen Genuß seines Daseins zu gelangen.“ Schon in Dänemark bei Dannemora in Mittelschweden beobachtete der Benannte Pflanzen (Anemone nemorosa und Menyanthes trifoliata) gleichzeitig blühend, die bei uns um mehr als einen Monat getrennt sind. Unter 62° N. fand er bei Subbisevall die Ahtikische und Hieracium Pilosella zusammen blühend treiben, obwohl jene bei uns einer der ersten Frühlingssträucher ist und dieses erst vom Mai

bis October blüht. In Quikjod (67° 3' N.) aber, mitten im lapplischen Hochlande, war die Ahtikische am 14. Juni noch nicht abgeblüht, und schon entfaltete Parnassia pulstris an einzelnen günstigen Stellen ihre Blumen, die bei uns erst im Hochsommer oder im Herbst erscheinen. Sehr richtig bemerkt Wichura hierzu, daß das gleichzeitige Blühen von Bäumen und Kräutern eigentlich ein Widerspruch sei, da Holzpflanzen sich frühzeitigere als diese im hohen Norden zu entwickeln pflegen. Auf seiner Fahrt von Uleå nach Jodmoek fand er die Birken schon belaubt, während der Kiefern unter ihnen noch völlig abgestorben war. Auch Kane bestätigt diese Erfahrung sogar für weit nördlichere Breiten. Bei 79° trieb am 23. Mai zuerst die irdische Cassiope tetragona grüne Spizzen; am 9. Juni folgten ihr Zwergweiden mit jungen Blättern, und noch war kein Gras sichtbar. Am 11. Juni gelagte sich die Cassiope bereits mit Blumen, während Steinbreche, Silenen, Hornkräuter und Niedgräser erst zwischen ihren vorjährigen verdorrten Kassen zu grünen begannen. Es muß diese Erscheinung in hohen Breiten wohl eine allgemeine sein; denn Franklin berichtet in seinem Tagebuche gelegentlich seines Aufenthaltes in Fort Eschschmeyer ausdrücklich, daß der schnelle Eintritt des Frühlings dadurch einen hohen Genuß bereite, daß, nachdem der Schnee kaum verschwunden, auch sofort die Bäume ihr grünes Raub entfalten. Das Umgekehrte würde um so unverständlicher sein, als die Holzpflanzen, ein tiefer gehendes Wurzelwerk bildend, aus größeren Tiefen des Bodens eine größere Wärmesumme beziehen müssen, als die Kräuter mit ihrem kürzeren Wurzelstock. Gleich manden, für höchst geringe Temperaturen organisierten Kräutern, z. B. gleich den Solbanelen der Alpen, die mitten im Schnee ihre Blumen treiben können, sangen darum die Zwergweiden schon an, ihre Säfte zu bereiten, während noch Eis und Schnee rings um sie herum flarren. Eine Eigenthümlichkeit, welche das Polarland mit der Schneeregion der Alpen theilt.

Selbstverständlich wird der Frühling um so früher eintreten, je weiter der Ort vom Pole entfernt ist. Doch mit der Einschränkung, daß der Nordpol nicht zugleich auch der Kältepol ist. Denn die Kälte nimmt nicht gegen den Pol hin stetig zu, sondern erreicht ihren Höhepunkt für den Sommer wahrcheinlich auf Winterland, im Winter an der Mündung der Lena. Nur relativ, veranlaßt durch die Ungleichheit von Tag und Nacht, ist der Sommer gegen den Pol hin in Nachttheil. Am Pole selbst gibt es nur 1 Tag und 1 Nacht, beide gleichlang, d. h. 6 Monate während. Unter 83° 5' N. währet die Nacht noch 5 Monate, zu Port Soule unter 78° 17' noch 4 Monate (126 Tage, vom 6. October bis 18. Februar), unter 72° 3' zu Upernivik, dem „entlegenen Punkte des civilisierten Lebens“ in Grönland, 79 Tage (12. November bis 30. Januar), unter 71° 10' 15" am Nordka

10 Wochen, unter  $60^{\circ}$  zu Nischne Kolsmk in Sibirien 38 Tage (22. November bis 28. December), unter  $68\frac{1}{4}^{\circ}$  zu Esgebesmbe in Grönland 40 Tage (1. December bis 11. Januar), unter  $67^{\circ} 18'$  nur 1 Monat; am Polarkreise selbst ( $66\frac{1}{4}^{\circ}$ ) geht die Sonne nur einmal nicht unter (21. Juni) und nur einmal (21. December) nicht auf. Es gibt Vieles in dieser arktischen Nacht, was sie groß und majestätisch hinstellt: das flammende Nordlicht, das sich wunderbar geheimnißvoll abhebt auf Hügel, Bergen und Eis, die entscheidende Hölle des Mond- und Sternennichtes, der Widerschein der Eiseisfelder, das tiefe Schweigen, die tiefe Einsamkeit der Natur, und Anderes. Allein das Alles kommt der Pflanzenwelt nicht zu Gute, alles Leben ist vergraben, und wenn es reden könnte, spräche es vielleicht mit Hayes: „Ich habe auf dem Antlitz der Natur keinen Ausdruck gefunden, der so schreckensvoll ist, wie das Schweigen der arktischen Nacht.“ Vielleicht tiefe es dann aber auch mit dem in langer Winternacht gebliebenen Menschen am Rande dieser Nacht: Ich habe die Sonne niebergelesen! Was das sagen will, erfährt man erst am Pol, aus den enthußastischen dankerfüllten Jubelrufen des Menschen, nicht am Aequator, wo die Sonne als der allgemeine Feind gilt, vor dem man sich verbirgt, wo und wie man kann. Freilich tritt mit dem Erscheinen der Sonne noch lange kein Frühling, tritt nur erst die lange Frühlingedämmerung ein; doch gibt nur sie Bürgschaft für sein Erscheinen, weil es auch mitten im Winter vorkommen kann, daß der Schnee thaut, wenn warme Winde nach dem Pole strömen, die vielleicht forben erst vom Aequator, aus einem Meere voll Leben und Blumenfülle in ein Meer voll Tod und Starcheit kamen. Die Sonne wirkt erst, sobald sie einen bestimmten Winkel am Horizonte einengenommen, und wenn sie dies vollbracht, hat sie fast nur die letzte Arbeit zu thun. Nach den Beobachtungen von Kane nämlich schwinden die Eisberge weit früher, als das Thermometer den Hauptpunkt anzeigt. Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkte haben das Eis immer mehr ausgebeutet und morsther gestaltet. Das Fallen warmen Schnees; Winde, die aus allen Richtungen warme sind; die mechanischen Wirkungen des Druckes, Zerreißen, Einsinken u. s. w. — Alles das hat das Eis schon nach allen Richtungen so vorbereitet, daß die Sonne fast nur noch den letzten Aufammenhang der Eisdede zu zerlösen hat. Unterbreß ist der Frühling schon eingezogen, bevor man eine Ahnung von ihm hat. Denn da die 6 bis 10 f. hohe Schneedecke ähnliche Wirkungen erfährt, wie die Eisdede, so ist der belebende Hauch bis zu ihrer Tiefe gedrungen, in der die eingeduckten Pflanzen wie unter Eiderbaunen die lange kalte Winternacht verbrachten. Als unter dem Schnee vergraben, treibt die Cassiope junge, grüne Triebe und man muß erst jenen defestigen, um diese zwischen den alten, rothbraunen Zweigen zu gewahren. Die Anzeichen

des polaren Frühlings sind so wenig, daß schon das Erscheinen der ersten Blüthe zum Ereigniß werden kann. Weil aber diese Anzeichen so heimlich noch unter der Schneedecke für die Pflanzenwelt spielen, so könnte man den Polarfrühling eine kryptogamische Jahreszeit nennen, die sich der flüchtigen Beobachtung entzieht; was dieser als Frühling erscheint, ist bereits der Sommer.

Leider sind wir nur höchst mangelhaft über die Auseinanderfolge der Gewächse und ihr Leben unter der Polarsonne in sehr hohen Breiten unterrichtet. Doch vermag ich den oben gegebenen Äugen noch folgende anzureihen. Etwas nördlicher als  $78^{\circ}$  glaubte Dr. Hayes im J. 1861 um seinen Winterhafen, Port Foulke, zu bemerken, daß am 23. Juni die meisten Pflanzen in Blüthe standen. Unter  $79^{\circ}$  N. vergehte Kane am 20. Juni eine Hand voll Löffelfraut (*Cochlearia fenestralis*), das nahe dem Ausbrechen seiner Blumen war. Am 21. Juni, gerade zur Zeit der Sommer Sonnenwende, fiel bereits der erste feuchte und flodige Schnee, welcher die Eidergänse wieder zum Süden trieb. Zwei Grade nördlicher, in der Kasavettedai am Kennedys Canal, war am 23. Juni der arktische Mohu zu erkennen, der Steinbrech (*Saxif. oppositifolia*) begann, der Hahnenfuß (*Ranunc. nivalis*) stand in Menge da, *Hesperis Pallasi* besaß noch seine alten überwinterten Schoten; mit derselben junge Schößlinge der Grasnelke und war besonders erstaunt über die Menge kleiner Steinsamenpflänzchen, die erst eine Erbe groß waren. Dennoch hatte man es nur mit einer frühzeitigen Dase zu thun, welche grüner als alle übrigen Stellen des Kanals war. Mitte Juli ist die Brutzeit der arktischen Wasservögel fast vorüber. Mitte August fand Kane auf der Rückreise vom hohen Norden schon wieder viel junges Eis, vor dem Verlassen seines Winterquartiers bei Etah ( $78\frac{1}{4}^{\circ}$  N.) gegen Ende Mai eine purpurbüthige *Lychnis* und eine *Arenaria*. — Auf der relativ doch so pflanzenreichen Melvilleinsel ( $74^{\circ}$ — $75^{\circ}$  N.) sah Parrs noch am 22. Mai kleine Blätter am Alpenrhabarber (*Oxyria*); erst am 8. Juni fing der oben erwähnte Steinbrech zu blühen an, und am 12. Juni fand ein Hahnenfuß in voller Blüthe. In derselben Insel fand Mac Clintock in der Hecla- und Gröper-Bucht noch am 9. Juli denselben Steinbrech, sowie die sich kräusende „spinnenbeinige“ *Saxifraga flagellaris*, einen Hahnenfuß und den arktischen Mohu blühend. Im Norden derselben Insel dagegen beobachtete Commander Richards 1853 in der ersten Hälfte des Juni noch keine blühende Pflanze; eine solche fand er erst am 24. Juni an der Südküste der benachbarten Cornwallis-Insel in einem Steinbrech, neben welchem der Alpenrhabarber socken erwachte. Und doch kommen die Renkthee aus Süden schon Anfang April auf der Insel an, während sie der Bismarck selbst im Winter nicht verläßt! Auf Elybergen blühten am 4. August, als Matmgen die Insel besuchte, die allgemeinsten

ihrer Pflanzen auf einem Gebiete, das auf allen Seiten von Eis und Schnee umgeben war.

In Lappland rechnet man durchschnittlich 3 Monate auf die gute Jahreszeit, und diese fällt auf den Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte September; der Juli ist der Bonnemonat. Zu Äten kann man gegen 4 Monate — von Mitte Mai bis Mitte September — rechnen. Nach Mar tin kommen 7 Monate auf den Winterschlaf, vom October bis zum April. Mai ist der Frühling, allein die erwachte Natur wird oft wieder zum Stillstand genöthigt. Erst im Juni tritt die ununterbrochene Vegetation ein; das Thermometer sinkt nicht mehr unter den Gefrierpunkt. September ist der Herbst, die Zeit der Samenreife mancher Pflanzen. Selbstverständlich ist das für die übrigen Polarländer nicht maßgebend, weil Äten unter den großen Ausnahmehedingungen des Gelfstromes liegt. Doch kann man für Lappland im Specielem etwa 100 Tage rechnen, innerhalb deren die Vegetation ihren Cycles vollendet haben muß; denn noch unter 69° N. beginnt der Sommer selbst an der nordöstlichen Spitze Sibiriens, zu Nischna Kolesmk, Ende Mai, wo die Flüsse aufgehen und die Zwergweiden ihre Blätter treiben. Schon in den letzten Tagen des Septembers feiert hier die Kolemia wieder zu. Es liegt folglich auf der Hand, daß unter höheren Breiten, wie wir schon oben vielfach gesehen konnten, diese Zeit sich mit der Verlängerung der Polarnacht verkürzen muß und schließlich vielleicht nur noch 2 Monate währt. Schon unter 69° N. verwelkt die Vegetation zu Tschuam im nordöstlichen Sibirien im Juli, während bei erst Ende Mai zu grünen begann. Wenn dennoch bei einer so kurzen Sommerzeit Wachsthumerscheinungen hervorgerufen werden, wie sie im Laufe dieser Schilderungen so vielfach dasen bildend auftraten, so liegt das eben nur an der ununterbrochen am Horizonte strahlenden Sonne. Zwar nähert sie sich auch in der langen Polarnacht dem Horizonte um die Mittagzeit bis zu 13 1/2° und färbt die Landschaft mit einer Art von Mittagseroth, das ein Paar Stunden hindurch die feinste Schicht zu lesen gestattet; jezt indß sinkt sie nicht mehr unter den Horizont, nur zur Abendzeit nähert sie sich ihm und hüllt, während ihr ein violettes Licht prachtvoll vorausellt, selbst gegen den Polarkreis hin die Gipfel der Berge, die sie dem Auge verhüllen, in einen röthlichen Scheln, den sie auch gegen Mitternacht von Norden her sendet.

Von 8 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens aber markirt sie den noch den Tagesabschnitt. Sie hat ihren tiefsten Stand erreicht; die Vögel suchen ihre Ruhestätte, und nur ausnahmungsweise singt einer derselben sein Lied durch die im tiefen Schweißen liegende Nacht; selbst die Blumen halten ihre Zeit ein. Die Blätter senken sich in dem mäteren Lichte, unter dessen Wirkung Land und Meer ihre scharfen Umrisse verlieren, die Blumen schließen sich zur bestimmten Stunde. So schließt sich z. B. die zweigige *Gentiana nivalis* in Lappland am Kuldsjok schon zu Mittag und entzieht sich damit dem Auge des Beobachters vollkommen. Sogar Pflanzen, welche Berthold Seemann aus der gemäßigten Zone lebend mit in das Polarland brachte, falteten sich unter dem sanften Zwiellichte der polarischen Tagnacht traumhaft zusammen wie in ihrem Vaterlande, und der Beobachter meint, daß diese Blumen durch ihre Nichtigkeit selbst einem am Pol verirrten Wanderer den etwa verloren gegangenen Compaß würde ersetzen können. Nur Eines erreicht dieser lange Polartag nicht, daß unter seinen Wärmestralen jeder Zeit jede Pflanze ihren Lebenscycus vollende. Auf Nónaja Semlja fand v. Baer manche Art, die ihre Früchte in dem einen Sommer anlegte, um sie erst in dem nächsten zur Reife zu bringen.

Das sagt Alles. Trotz aller Erfolge, bleibt der arktische Sommer ein unwirtlicher. Die Sonne, betont v. Miksdendorff, braucht nur hinter Wolken zu treten, und augenblicklich erzeugen sich Stofwinde, dicke Nebel breiten sich über das Land, zügellos treiben die Stürme über die leeren Ebenen und peitschen den Schnee in dicke Massen zusammen. Kein Wunder, daß selbst das Vorgehen der Vegetation noch auf Hindernisse stößt. Die Verwesung schreitet langsam vorwärts, und mehrjährige Pflanzenteile umgeben fast unverändert die neuen Triebe; ein vor einem halben Jahrhundert errichtetes Grabkreuz — schreibt Waimgren — sieht aus, als wäre es von gestern; fast übertrifft die Vergänglichkeit der Steine und Bergarten die der organischen Natur; die Torfbildung verzögert sich, und da sie dennoch vorhanden, dennoch in manchen Theilen der Polarzone das Brennmaterial herbeischafft, so leuchtet auch hieraus hervor, unter welchen Schwierigkeiten die polare Natur schafft und wirkt.

## Bom Monterosa zum Montblanc.

Von Otto Mier.

### 9. Die Montblanc-Gruppe.

Unter allen Centralmassen der Alpen ist die ausgeprägteste, gedrängteste und selbständige ohne allen Zweifel die des Montblanc. Nicht mit Unrecht hat man sie

mit einem riesigen Eisfen-Rückgrat verglichen, aus dessen gewaltigen Wirbeln nach beiden Seiten hin als Rippen scharfe Gebirgsketten absinken, deren Zwischen-



artigen Reize, zu den Seltenheiten. Am besten beginnt man diese Wanderung von Martigny, wo die wildschäumende Dranse zur Rhone hinabfließt und in der ursprünglichen Richtung des sich hier nach Norden umbiegenden Rhonetals durch eine wilde Schlucht ein Bergpfad zum Col de Jorclaz oder Col de Trient hinaufführt. Von der Höhe des Passes (4531 F.) bildet man noch einmal über das schöne Rhonetal zurück bis zu den Schneefüssen der Altsch, Jünseraar- und Gletscherhöner, während nach vorn sich ein neues, wildes Gebirgsbild aufthut, das von tiefen Felsenmauern umrahmt Hochthal von Trient. Ist man in dieses hinabgefallen, so bieten sich zwei Wege dar. Der eine führt über die Passhöhe des Col de Balme (6858 F.) in das Chamonix-Thal hinüber, dessen Sohle man am Fuße des Tour-Gletschers erreicht. Auf der Passhöhe selbst entfaltet sich in unvergleichlicher Pracht das Panorama des Montblanc, von dem Riesen des Gebirges selbst, der, in seinen herrlichen Schneemantel gekleidet, im Hintergrunde thronet, bis zu dem Wald kolossaler Granitnadeln, die ihn wie ein schützendes Walfallenber umgeben, und zu den langen Gletscherschlangen, die sich zwischen diesen Nadeln in das Thal Chamonix hinabsinken, das wie ein schmaler Smaragdflecken sich in die Tiefe hinzieht. Zur Rechten erblickt man die wilde Gebirgsmasse der Aiguilles rouges, welche das Chamonix-Thal von der Montblanc-Gruppe trennt, mit seinen fast überhangenden kahlen Felsenhöhen und seinem fienbedeckten Huei im Hintergrunde. Rückwärts reicht der Blick weit hinaus zu den Schneehäuptern der Berner Alpen. Der zweite Weg, zwar weniger reich an Ueberrassungen, aber romantischer, führt über die Tête noire bald durch tiefes Waldesbündel, bald durch eine malerische Wälfen mild durcheinander gemener Granitblöcke, führt der Weg längs der schwarzen, aus Thonschiefer bestehenden Felswände hin. Tief unten braust der Trient, der hier das schäumende Wildwasser der Faux noires aufnimmt. Unwillkürlich wird man an die schauerliche Via innula Graubündens erinnert, besonders an dem imposanten Felsensthor der Roche percée, wo der Weg den Felsen durchbohrt, und an den drohend überhängenden Klippen der Balme rousse. An der herrlichen Cascade der Barberine vorüber, dann durch eine von Lavinen furchtbar verödetete Kanalschlucht, erreicht man endlich eine durch ein Kreuz bezeichnete Höhe, von welcher man in das von der Arve durchströmte Thal den Chamonix hinabschaut. Dem Lauf der Arve durch eines der schönsten und wechselvollsten Thäler der Alpen folgend, würde man bis nach Genf geleitet werden. Wer aber nur den König der Alpen, den Montblanc, umkreisen will, darf nur den oberen Theil dieses Thales durchwandern, wo er desständig zur Linken die Gletscher hat, die sich bis tief in die Wälder hinab aus den eisigen Regionen senken, vom Gletscher von Argentière bis zum Tacconnar- und Glaz-Gletscher. Da wo die Arve plötzlich den Fuß des Montblanc verläßt und sich rechtwinklig nach Nordwesten abwendet, bei dem Dorfe les Ducs, 1 1/2 Stunden unterhalb Chamonix, führt ein steiler Pfad zum Col de Weza (5571 F.) hinauf, der das Chamonixthal von dem Montjeu trennt. Man betritt nun das zweite Thal, das den nordwestlichen Fuß des Montblanc auf eine Strecke von 4 Stunden begrenzt. Auch hier steigen zahlreiche Gletscher von den eisigen Höhen nieder, unter ihnen durch schauerliche Schönheit und Wildheit ausgezeichnet der Miage-Gletscher.

Ein schöner Bach, der Ven Rant, durchströmt in tiefespaltentem Felsenbett das Thal, manche herrliche Cascade bilden. Seinem Laufe aufwärts folgend, sieht der Wanderer endlich das Thal durch den gewaltigen Gebirgskamm des Bonhomme geschlossen. Ueber die Geröllhalden, die nur von dem rothfarbigen Raube der Alpenrose geschmückt sind, geht es nun steil hinan, zu immer unheimlicheren, rauhen Höhen. Ist noch im Hochsommer muß man hier über weite Schneefelder wandern, die nur mit glattem, schwarzem Schiefergeröll wechseln.

Jähe Felshöner ragen zu den Seiten empor, die nur einmal einen wohlthuenden Blick in ein grünes Thal, das Val de Beaufort, freilassen. Endlich ist die Passhöhe, das Croix de Bonhomme (7558 F.) erreicht, und zu den Füßen des Wanderers liegt tief unten das Thal von Chapuis. Dorthin geht es auf lumpigem Felsen hinab, um abermals zur jenseitigen Höhe hinaufzusteigen, zum 8422 F. hohen Col de la Seigne, der die Zugängeblete der Rhone und des Po theilt. Hier eröffnet sich eine der großartigsten Perspektiven der ganzen Alpenwelt. Zum ersten Mal tritt dem Beschauer der Montblanc von seiner Südseite entgegen, so jäh abflügend, daß kein Schnee an seinen Wänden haftet, daß er wie eine kühle, fast senkrechte Felsenmauer von fast 9000 F. Höhe aus den Eismassen des Miage-Gletschers emporwächst. Schroffe Felsenpfiler streben an der Hauptmasse empor, zwischen denen jene zahlreichen Gletscher herabrollen, von denen der südwestliche Theil des 12 Stunden weit zu den Füßen des Wanderers hinziehenden Thales den Namen der Allée blanche erhalten hat. An Gletschern vorüber und über Schneefelder hin führt der Weg zu dem einsamen Lac Combal hinab, in dessen blaugrünen Fluten sich der Glacier de Miage spiegelt. Weiterhin folgt die schöne Thalebene von Veni, von der jungen Doire durchkroßt, rechts von den dachförmig abflügenden Wänden des Crémont und Mont-Chef begrenzt, links überragt von dem drohenden, einem Gemsgewölbe gleichenden Doppelgipfel der Aiguille du Géant. Hoch von dem Gipfel des Montblanc selbst steigt bis zu den Lärchenwäldern des Thales der prächtige Glacier de la Brenva herab, unter dessen Eisgewölbe hin die Doire sich ihren Weg sucht. Da endlich, wo vom Col du Géant die Gletscher des Mont Joret und von d'Entrèves herabhängen, wendet sich die Doire, ihrer eisigen Wiege entweichend, plötzlich nach Südosten, um durch die Felsenschlucht von Courmayeur dem schönen Aesthale zuzueilen. Dort aber an dieser Wendung strömt ihr von Nordosten her genau in der Fortsetzung der Allée blanche der Thalbach des Val de Ferrex entgegen. Dem Laufe dieses Baches aufwärts muß der Wanderer folgen, der die Rundreise um die Gebirgsmasse des Montblanc vollenden will. Raub und Eile ist der Weg bis zu der 7300 F. hohen Passhöhe des Col de Ferrex und wieder hinab durch das schweizerische Greter-  
Thal bis zu seiner Vereinigung mit dem Val d'Entrèves, durch welches der Weg vom großen St. Bernhard nach Martigny, dem Ausgangspunkt der großen Wanderung, hinabführt.

Wie großartige Wälder sieht auch dem Wanderer auf diesen Bergen darüben, so schaut er doch immer nur von außen die Herrlichkeit des stolzen Alpengebirges, und das Verlangen regt sich wohl in Wandern, auch in das Innere dieser Welt einzubringen. Nur Wenigen freilich ist gestattet, sich diesen hohen Genuß zu verschaffen, den Wer

nigen, welche das nicht gewöhnliche Maas von Kraft, Ausbauer und Ruth beßsen, das eine Bergbesteigung in dem Keiler des Montblanc erfordert. Davon werden wir uns überzeugen, wenn wir einen Blick auf die Gestalt dieser Berggruppe werfen.

Das Massiv des Montblanc bildet eine jäh aufsteigende, compacte Bergmasse. Kein Thal führt in das Herz dieser Gebirgswelt ein, ähnlich dem Lauterbrunnens, dem Kandertthal u. A. In den Berner oder dem Vispethal in den Walliser Alpen. Vom Gipfelnoten, der 14,809 p. F. hohen Bosse du Dromedaire, wo der höchste Gipfel des Montblanc nach seiner einem Kameelhöcker ähnlichen Form genannt wird, laufen scharfe, kurze, starbverwiltete Höhenränge aus, die auf einer Länge von 9 Stunden niemals unter 10,000 Fuß herabsinken. Auf diesen Graten erheben sich schlanke, nadel- oder thurmspähnliche Aiguilles genannte Gipfel, die diesem Gebirge ein ganz eigenthümliches bizarres Gepräge geben. In nördlicher und nordwestlicher Richtung vom Montblanc sind es hauptsächlich der Dome de Gouté (13,040 p. F.), der Montblanc de Tocul (12,770 F.) und die Aiguille du Midi (12,054 p. F.), welche den Verlauf dieses Felsgerippes bezeichnen. In nordöstlicher Richtung sind es die Aiguille de Géant (13,019 p. F.), die Grandes Jorasses (12,662 F.), der Mont Mallet (12,262 F.), die Aiguille de Dru (11,480 F.), Aiguille verte (12,060 F.) und Aiguille d'Argentière (11,500 F.).

Keine eigentlichen Thäler durchfurchen diese gewaltige Gebirgsmasse. Tief eingeschnittene, jäh absteigende wilde Schluchten und Spalten vertreten die Stelle der Thäler. Sie sind es, welche den ungeheuren Firnmulden, die sich zwischen den Gipfeln ausdehnen, den Abfluß gestatten und durch die Eismassen, die sie erfüllen, vollends das Ansehen von Thälern verlieren. Nirgendes in den Alpen sind so viele, so selbständige und so reich entwickelte Gletscher vorhanden, als hier, und diese Gletscher zeigen überdies wegen der jähen Neigung des Gebirges und seiner Thäler einen Charakter besonderer Wildheit. Besonders

ist dies am Südrande des Gebirges der Fall. Da der Hauptgipfel dem Südrande sehr nahe liegt und der bedeutendste Höhenrath sich gleichfalls an diesem Südrande hinzieht, so ist der Abfall des Gebirges nach Süden weit steiler als nach Norden. Wenn man eine Linie vom Gipfel des Montblanc nach der Sohle des Chamoni's Thales und eine andere nach der Sohle der Allée blanche zieht, so ergibt sich für die erstere eine Neigung von etwa 28°, für die letztere eine solche von 45°; eine Neigung, wie sie nur äußerst selten in Gebirgen vorkommt. Die Gletscher auf der Südostseite des Montblanc sind daher nur sehr kurz, aber steil abwärts und wild zerstückelt. Die bedeutendsten sind noch die von Trelaite, von Mluge, von Brenva, von Triolet und von Mout Dolent. Die Gletscher des nordwestlichen Abhanges sind länger, weniger steil, aber auch massenhafter und gehören wegen der Firnmulden, die sie speisen, zu den größten der Alpen. Die bedeutendsten sind von Westen her die Gletscher de Bionnassay, de Tacconnaz, des Bossous, des Bois, d'Argentière, de Trient und de Tour.

Diese Gletscher nun sind es, welche die einzigen Zugänge zu den Höhen des Gebirges bezeichnen, die einzigen Wege, welche beschritten werden müssen, wenn man über diese Felsenmauer hinweg, aus dem Thale von Courmayeur in das von Chamoni's gelangen will. Man wird es nun begreifen, warum der Wanderer, der sich nicht den erheblichen Mühen und Gefahren aussetzen will, um von Courmayeur nach dem in gerader Linie kaum 4 Stunden entfernten Chamoni's zu kommen, eine Wanderung von mindestens 3 Tagen über 3 hohe Alpenpässe unternehmen muß. Man wird es vollends begreifen, mit welchen ernstesten Schwierigkeiten und Gefahren derjenige zu kämpfen hat, der diese Felsenmauer selbst erklimmen und über ihre zerklüfteten Gletscher hin sich den Weg zum felseitigen Thale suchen will. Dennoch will ich es dem Leser zumuthen, mit auf einer solchen Wanderung zu folgen, die ihn auf dem einzigen, wenigstens für kühne Bergsteiger noch gangbaren Paf, dem über den Col du Géant in das Herz der großartigsten Alpenwelt einführen soll.

## Bilder aus Griechenland.

Von P. Lind.

Messenien.

Zweiter Artikel.

Von Kalamata führt der Weg in westlicher Richtung längs dem Fuße des Gebirges an prächtigen Felswänden vorbei, durch Anpflanzungen von Zedern und andern Fruchtbaum und durch viele Dörfer, deren eigenthümliche, gegen die griechisch-morgenländische Sitte verhältnißmäßig hohe Kirchthürme ohne Zweifel aus der venetianischen Zeit herrühren und hier das Einzige sind, was noch augenfällig an die vorübergehende Herrschaft der Venetianer erinnert. Weiterhin kommt der Reisende auf einer Brücke über den tiefen, gelblichen Pamisos nach dem an dessen rechtem Ufer gelegenen Städtchen Nissi, das sich durch guten Weinbau und Seidenzucht auszeichnet, und noch vor einiger Zeit sogar eine Seidenfabrik besaß. In weiterem Verfolge des Weges, der hinter Nissi zu steigen beginnt, zeigt sich die Gegend reich an besonderem landschaftlichen Reizen.

Während man von der Ebene selbst aus beständig einen herrlichen Blick auf den Meerbusen zur Linken und den prächtigen Thöme zur Rechten hat, entfaltet sich im Osten, je höher man steigt, desto weiter und großartiger die ganze Kette des Taygetos, die in der Ebene durch die Vorberge noch theilweise verdeckt ist. Ueber den niedrigeren Verzweigungen, die gegen Messenien viel breiter und allmählig abfallen, als an der Seite von Lakonien, treten immer höher und höher die hinteren Stufen empor bis zu den höchsten schneebedeckten Gipfeln, und südwärts verfolgt man das Gebirge mit den Schluchten und Küsten der Maina bis hin gegen das tänarische Vorgebirge. Die unmittelbaren Umgebungen des Weges sind meist wasserreich und mit größeren und kleineren Bäumen und Sträuchern bewachsen. Den Kentaurus fand

ein Reisender in außerordentlicher Größe, und der Jodannelsbrodbaum (*Ceratonia Siliqua* — griech. *Καρανα*, *Καρανία*, auch *Σολοκαριά*), der sonst in Griechenland nur ziemlich verkümmert sich zeigt, kommt hier als ein stattlicher Baum vor. Bei einer allerliebste an einem Bache zwischen Platanen und anderen Bäumen gelegenen Mühle, welche Chersomeli (Goldmühle) heißt, hielt hier jener Reisende seine Mittagsrast.

Die Straße führt weiterhin in anmuthig strenger westlicher Richtung nach Navarin. Wenn man hier auf die nur mäßig hohe Wasserscheide zwischen dem messenischen Meerbusen und dem ionischen Meere gelangt ist, wird der Boden dürrer, die Vegetation dürrflügel, dagegen öffnet sich nun eine großartige Aussicht auf die Bucht von Navarin mit der dahinter gelegenen, die Bucht einschließenden Insel Ephyagia oder Ephyakteria und auf das ionische Meer. Am südlichen Ende der schönen Bucht liegt das Städtchen Navarin oder Neokastron. Wie ein beträchtlicher See tritt die Bucht halbkreisförmig, von Norden nach Süden wohl über eine Stunde lang, in das Land hinein, und in der ganzen Länge ist von ihr das schmale, hohe Klippenland Ephyagia hingestreckt, so daß das Beden fast vollständig gegen Stürme geschützt ist. Am südlichen Ende ist jetzt die einzige, etwa 4000 Fuß breite Einfahrt; die viel schmalere Öffnung zwischen dem nördlichen Ende der Insel und dem Festlande ist so versandet, daß sie bei ruhiger See durchwatet werden kann. Der Hafen ist einer der schönsten, die es gibt, und man könnte sich wohl wundern, daß an ihm niemals eine große Stadt entstanden ist. Indes liegt der Grund davon offenbar darin, daß sich keine geräumige Ebene an ihn anschließt, kein Flußgebiet und kein Thal sich hier öffnet, also der Platz zwar zur Seeverbindung trefflich geeignet ist, nicht aber zur Vermittelung des Verkehrs mit dem Binnenlande, und daß er ebenso wenig zum Mittelpunkt eines größeren Gebietes sich eignet. Schon die Küste gewährt für einen Joden, der von der Seefseite herkommt und bei Navarin das Land betritt, einen trostlosen Anblick. Die Küste von Messenien ist hier da und bietet nur Erinnerungen von Unfällen, und Ruinen über Ruinen bar, die, seit den Zeiten des Homer keine Tage des Glücks wiedergesehen“, und wo außerdem Fieber, nur traurige Sandflächen und ungesunde Sümpfe über das Land hin gelaagert sind. Gleichwohl ist dort in der Nähe, in dem 3 Stunden von Navarin entfernten Dorf Lagudissa, eine der anmuthigsten und reizendsten Gegenden. Anfangs geht der Weg über das Gebirge, dann führete er meist durch Pflanzungen von Korinthen und Delbäumen, durch Wald und Gebüsch an einem beträchtlichen Bache auf die erste Gebirgsküste, die einige Dörfer trägt, welche unter dem Namen Choras (*Χώρα*) zusammengefaßt werden und unter denen Lagudissa, auf lufziger Höhe reizend gelegen, das Hauptdorf ist. Die sauberen und, wie es scheint, meist neuen Häuser sind weit auseinander gebaut und liegen

zwischen Fruchtbäumen aller Art. Neben wahrhaft riesigen Delbäumen, Maulbeerbäumen, Citronen und Drangen finden sich hier besonders viele schöne Walnussbäume, wie sie sonst in Griechenland selten gefunden werden, und mitten im Dorfe selbst stehen Hunderte von zierlichen Cypressen, die außerhalb tüchtiger Begräbnißplätze nirgend sonst so massenhaft vorkommen. Wo die Cypresse — sagt ein griechischer Reisender — in üppiger Kraft, besonders zwischen anderen Bäumen emporsteigt, hat sie mit ihrem dunkeln Grün und ihrer feinen Bildung einen unschreiblichen Reiz. Im südlichen Griechenland erreichen die Cypressen oft eine außerordentliche Größe. In Lagudissa standen sie, als jener Reisende im J. 1853 dort war, höchst malerisch gruppenweise bei einander, meist noch ziemlich jung und schlank aufgeschossen. Man sagte ihm, sie seien „nicht gepflanzt“, sondern wachsen von selber wild auf.“ Zwischen den Häusern und Bäumen fließen hier reichliche Bäche, die damals nicht weniger als 13 Mühlen trieben. Ein sauberes, neues Schulhaus und 3 stattliche Kirchen zierten den Ort, dem auch ein wohlverschener Bazar nicht fehlte. Der dortige vortreffliche, nur unmettlich (gegen die sonstige Landesküster) mit Hatz versehete Choraswain zählt zu den besten des Landes. An die wohlbestellten Felder, Weinberge und Baumpflanzungen in der nächsten Umgebung von Lagudissa schlossen sich prachtvolle Wälder von Platanen und Eichen der verschiedensten Arten an, besonders riesengroßer, immergrüner Eichen (*Quercus sempervirens*), und auf den Höhen schweifte der Blick weit über das schöne Land und das Meer. Es ist „einer der anmuthigsten Orte in Griechenland.“

Ein besonderer Beweis für die Fruchtbarkeit des Klimas in Messenien und der dortigen Vegetation, so wie für die Cultur des Landes sind die statistischen Angaben, die ich einer, im J. 1867 in der Rationaldruckerei in Athen erschienenen, wesentlich auf offiziellen Aufzeichnungen beruhenden Schrift von Manselats entnehme. Darnach hatte Messenien im J. 1860 45,633 Stremmen (ein Stremma, Morgen Landes, beträgt 100 Hektaren) Weinland, und unter 153,058 Stremmen, auf denen in einzelnen Provinzen des Peloponnes und des griechischen Festlandes im J. 1866 Korinthen erbaud wurden, kamen auf Messenien allein 36,159 Stremmen, so daß es nach Achaia und Elis (mit 87,033 Stremmen), wo die Korinthenkultur besonders betrieben wird, die nächste Stelle einnahm; außerdem erzeugte Messenien im J. 1860 von seinen Delbäumen einen Ertrag von 904,110 Dekka Del (an zweiter Stelle nach Lakonien mit 1,467,900 Dekka) und von den Feigenbäumen 87,804 Centner Feigen (an erster Stelle, bei einem Gesamtertrage von den anderen Landestheilen von 111,845 Centner), wogegen es damals 398,623 Maulbeerbäume (ebensfalls an zweiter Stelle nach Lakonien mit 517,930 Maulbeerbäumen) zählte.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 25 Sgr. (1 R. 30 Kr.)

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Schauer — Scherzhaftige Buchdrucker in Halle.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins.“)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 46.** [Achtzehnter Jahrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

17. November 1869.

**Inhalt:** Beitrag zur Quellenkunde, von M. E. Grandjean. Erster Artikel. — Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 11. Die artistischen Ruhestätten. — Zur Geschichte der Steinkohlen, von Rudolph Müllener. Zweiter Artikel.

## Beitrag zur Quellenkunde.

Von M. E. Grandjean.

Erster Artikel.

Wie allgemein bekannt, gibt es auf unsrer Erde sehr verschiedene Wasserquellen: warme und kalte, süße und saure u. s. w. Man unterscheidet sie auch in Siphonwasser und Mineralquellen; wobei die letzteren wieder in mancherlei Varietäten, wie Schwefel-, Salz-, Sulfid-, Bitter- und sonstige Wasser zerfallen. Hierbei entscheidet in der Regel der Geschmack und Geruch; denn chemisch genommen, gehören alle Quellwasser zu den mineralischen, da es wohl keine gibt, die nicht mineralische und auch zugleich organische Stoffe enthalten.

Alle Quellen werden von den atmosphärischen Wassern gebildet, welche in Gestalt von Regen, Thau oder Schnee auf die Erde herabfallen, durch die Dämme oder Felsen sich sichern; in das Innere des Erdbinnen mehr oder weniger ein- und diese durchdringen, sich in Spalten

und anderen Räumen der Gesteine sammeln — und dann zu Tage wieder austreten. Was dann in ihrem Lauf nach größeren Gewässern Pflanzen und Thiere nicht aufnehmen, wird, wenn sie nicht ins Meer gelangen, mit Hinterlassung ihrer festen Bestandtheile verbunket — und so wieder in die Atmosphäre geführt, um aufs Neue ihre Funktionen zu beginnen.

Von dem Wanderungstrieb des Wassers, einem der merkwürdigsten Phänomene in dem Haushalte der Natur, das gewöhnlich dessen Kreislauf genannt wird, hängen alle mechanischen und chemischen Vorgänge ab, welche in der unorganischen Natur thätig sind. Ebenso ist aber auch alles organische Leben durch diesen Kreislauf bedingt. Selbst die vulkanische Thätigkeit könnte ohne Mitwirkung des Wassers nicht stattfinden. Das Wasser könnte man



eigentlich als das Blut der Erde ansehen, das durch den Verdunstungsproceß aus dem Meere, als dem Herzen derselben, allbelebend und allerbaltend ausgesendet wird, um dann wieder durch das Adergeflecht der Bäche, Flüsse und Ströme in dieses Herz zurückzulehren.

Alles Wasser, welches aus der Atmosphäre auf die Erde kommt, enthält Luft, Kohlenäure und Ammoniak, wovon letzteres, in so weit es nicht an die ebenfalls in der Atmosphäre enthaltene Salpetersäure — oder mit Chlor verbunden, vorkommt, als kohlenfaures Ammoniak in demselben aufgelöst ist. Mit diesen Stoffen beladen, welche alle nur in verhältnismäßig geringen Mengen in ihm enthalten sind, wirkt das Wasser sowohl auf die Thier- und Pflanzenwelt, wie auf Dammerde und Gesteine aller Art so ein, daß ihm das Hauptverdienst neben Licht und Wärme zugeschrieben werden muß, wodurch das Schöpfungswerk im Gange erhalten wird. Ja, selbst in die Gewässer, in welche es fällt, bringt es die Bedingungen des organischen Lebens, Luft und Kohlenäure. Licht und Wärme sind aber seine thätigsten und unentbehrlichsten Helfer!

Obgleich die mechanischen Wirkungen des Wassers in der Oekonomie der Natur von hoher Bedeutung sind und zu einem großen Theile vorher gehen müssen, ehe es seine chemische Thätigkeit mit Erfolg entfalten kann, so haben sie doch in Bezug auf die Bildung der Quellen keine besondere Wichtigkeit; denn alle Substanzen, welche in denselben nur suspendirt, d. h. nicht chemisch gebunden, vorkommen, haben an ihrem eigentlichen Charakter keinen Antheil. Hier von sind natürlich die Ausscheidungen aus wirklich chemischen Verbindungen, (welche viele — und namentlich viele Sauerquellen — zeigen, wenn sie mit der Atmosphäre in Berührung kommen, wie z. B. das aus kohlenfaurem Eisenoxyd ausfallende Eisenoxydhydrat, und der aus dem Bicarbonat sich abscheidende einfach-kohlenfaure Kalk u. s. w.) ausgenommen.

Der Thätigkeit der atmosphärischen Wasser in der Dammerde und tiefer liegenden Gebirgsgeschichten, ist in neuerer Zeit durch die Agriculturnchemie und chemisch-physikalische Geologie so vielfältig und gründlich nachgeforcht worden, daß es überflüssig erscheinen muß, hier noch ein Weiteres darüber zu bemerken. Die Lehre von den Quellen ist aber, wie die von der Entstehung trockniallischer Gesteine und der Vulkane u. s. w. noch mit mancherlei Theorien verwebt, die ihrer weiteren wissenschaftlichen und technischen Entwicklung sehr hinderlich waren.

Wie wohl kaum bemerkt zu werden braucht, läßt das meiste atmosphärische Wasser, wenn es die feste Erde berührt, oberflächlich wieder ab; nimmt von der Dammerde und dem vermittelten Gestein und was ihm sonst in den Weg kommt, so viel mit sich fort, als es findet, schleben und tragen kann; geht in immer größere Gerinne

und kommt, nachdem es die in ihm suspendirten Stoffe, die es unterwegs auch chemisch bearbeitet, zum Theil oder ganz abgesetzt hat, endlich wieder in's Meer — oder wird in Sümpfen und Sand aufgesogen und verdunstet. Die kleinere Portion des aus der Atmosphäre auf die feste Erdoberfläche herabfallenden Wassers wird dagegen von der Dammerde, den Blättern und Humusschichten der Wälder und den Rissen und Spalten der nackten Felsen aufgenommen. Aber auch dieser Theil geht meist nicht tief; sammelt sich in Mulden und anderen hierzu geeigneten Vertiefungen, um dann als gewöhnliches Quellwasser wieder zu Tage zu treten, wo es Bäche und Flüsse bildend dem Meere u. s. w. zufließt.

So weit sind wir von der Natur des Umlaufs der Gewässer ziemlich genau unterrichtet — und es bedürfte darüber auch keinerlei Zweifel und Meinungsverschiedenheiten unter den Forschern. Was aber nun weiter die warmen und kalten — oder die sogenannten mineralischen Quellen anlangt, so sind wir noch keineswegs über die Entstehung vieler derselben im Klaren.

Wir wissen zwar, wie sich Salz, Schwefel, Zink und andere Wasser, sowie auch Säuerlinge bilden können; wie sie aber die Gesteinsgeschichten durchdringen, darin einen mehr oder weniger complicirten Umlauf halten, sich mit mineralischen Stoffen beladen und damit verschiedene chemische Geschäfte treiben, Wärme empfangen und abgeben u. s. w.: das ist bei vielen derartigen Quellen noch sehr räthselhaft, oder doch mit Zweifeln und verschiedenartigen Ansichten umgeben. — Besonders ist es aber der Umlauf dieser Gewässer in der Erdoberfläche, welcher durch die Hypothese von der sogenannten Erdwärme oder dem feuerflüssigen Zustande des Erbinners bisher nicht zu klarer Darstellung kommen konnte.

Da sich die Theorie von der Erdwärme oder dem feuerflüssigen Erbinner, welche äußerst einfach, bestmöglich und sehr bequem ist, trotz der gewichtigen Gründe, welche ihr entgegen stehen, fast überall Eingang verschafft hat, — und die Erdwärme den meisten Geologen und Physikern als feststehende Thatsache gilt, aus der bestimmte Gesetze, wie z. B., daß die Zunahme derselben nach dem Erbinnern auf  $105 - 115 \text{ }^{\circ} \text{R.} = 1^{\circ} \text{R.}$  zu berechnen sei, abgeleitet wurden, so lag es denn auch nahe, die Entstehungstiefe der warmen Quellen oder der Quellen überhaupt nach diesem Schema zu bestimmen. Dieses geologische Dogma hatte lange Zeit eine solche Herrschaft über alle anderen Wärmeursachen gewonnen, daß diese kaum mehr einer Beachtung gewürdigt wurden; obgleich es klar war, daß dadurch der Umlauf der Gewässer verdunkelt und ihre Wirkungsweise auf Schrauben gestellt wurde. In neuerer Zeit hat sich jedoch die Situation in Ansehung der Erdwärme und der damit zusammenhängenden geologischen Fragen, also auch bezüglich der Quellen,

bedeutend geändert, denn es wurden nicht allein von den Männern der chemisch-physikalischen Schule in der Geologie über den Umlauf der Gewässer und ihre Funktionen die interessantesten und wichtigsten Beobachtungen und Entdeckungen gemacht, sondern es sind auch Gründe gegen die Feuerflüssigkeit des Erdinnern geltend gemacht worden, denen dieselbe nicht Stand halten kann — so daß sie wenigstens wesentlich modificirt werden muß.

Die Quellen sind, abgesehen von ihrer Wichtigkeit, welche sie im Haushalte der Natur und namentlich für die Lebens- und Kulturzwecke des Menschen behaupten, wenn wir ihre Funktionen nicht absichtlich mißverstehen oder unterschätzen wollen, äußerst schätzbare Dolmetscher der chemischen und physikalischen Vorgänge in den Gesteinsschichten, mit denen sie in Berührung kommen, und können wir durch sie, wenn wir sie zu befragen verstehen, Auskunft über viele Dinge erhalten, die uns ohne sie

ewig verborgen bleiben würden. G. Bischof z. B. und andere Forscher haben es schon gut verstanden, den Quellen ihre Geheimnisse abzufragen. Dessen ungeachtet sind aber noch immer große Schwierigkeiten bezüglich der Fragen zu überwinden, welche sich an den Umlauf der Gewässer knüpfen.

Da es neben den Forschungen von Bischof und anderen Meistern in der chemisch-physikalischen Geologie, nicht meine Absicht sein kann, eine Darstellung der Vorgänge zu versuchen, welche durch den Umlauf der Gewässer in der Erdrinde hervorgerufen sind und erhalten werden; da ich aber doch auch meine eignen Beobachtungen und Erfahrungen gemacht habe, welche geeignet sein dürften, manchen Irrthum zu berichtigen und manches Räthsel zu lösen, so glaube ich der Wissenschaft und Technik nützlich werden zu können, wenn ich diese Beobachtungen u. s. w. als Beitrag zur Quellenkunde mittheile.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Carl Müller.

### 11. Die arktischen Ruhspflanzen.

Unfruchtbarkeit und Unwirtlichkeit sind die Attribute der Polarzone. Aber seltsam contrastirt hiermit die Thatsache, daß sich auf unserer nördlichen Halbkugel nirgends ein so großartiges Thierleben anhäuft, wie gerade im höchsten Norden. Von einer großartigen Mannigfaltigkeit der Arten ist freilich abzusehen; allein dafür wird die Zahl der Individuen, ganz wie bei den Pflanzen, um so imposanter. Die Schaaren der Lemminge in Lappland und Sibirien; die zahlreichen Heerden wölber und jagder Kenthiere, welche rings um den Pol gehen; die Eleuthiere, welche sowohl in Sibirien, als auch im arktischen Amerika (als Musethiere) weit über die Wäldzone hinaus schweifen und hier besonders von Weidentrieben leben; der Bismach, dessen gewaltige Formen noch heute, mitten im arktisch-amerikanischen Archipel, an die Zeit erinnern, wo noch gewaltigere Mammuths das Polarland Asiens, seine unendlichen Lunden bewohnte; der Bär, welcher sammt dem nördlichen Vielfraß, dem Polarfuchs, dem Polarwolf und dem Hermelin den flüchtigen Spuren dieser, sowie des Polarbären, der zahlreichen Fühner u. A. folgt; die unzählbaren Schaaren von Kühen- und Süßwasser-Vögeln, welche zum Theil wieder auf eine Fülle von Fischen, Crustaceen und Mollusken oder auf Regionen von Insekten angewiesen sind, die, den Sümpfen entsteigend, in Zahl und Zudringlichkeit ganz an die Niederungen der Tropenwelt erinnern; endlich an den Küsten, auf den Inseln oder in der Eiswelt des Meeres die Colosse des nördlichen Oceans, die Walrosse, die Robben, die Eiskären, die Walthiere u. s. w., — welcher Reichtum von Formen und Kraft! Wenn aber Eines im Andern bedingt,

schließlich Alles auf das Pflanzenleben gegründet ist, das zuerst die Stoffe der Polarwelt in Nahrungswerte umsetzt, — dann muß man erstauern, wie das sonst so kargliche Pflanzenleben dieser äußersten Thule der Welt noch ein Thierleben hervorruft, das sich in seiner Weise an die Seite von Ländern stellt, die, wie z. B. Südafrika, als Muster eines reichen Thierlebens gelten.

Welche Fülle von Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen- und Thierwelt somit selbst im Polarlande noch zu erforschen ist, liegt auf der Hand. Nur auf dieses Thierleben konnte der Mensch seine Existenz gründen, als er es wagte, seinen Verbreitungskreis bis hierher auszu dehnen. Nur thierische Nahrung vermochte ihm eine Heimat zu gründen, wo der allein ausharrt, dessen Verdauungsstern im Stande ist, die größten Massen jener Nahrung zu verarbeiten, um der Kälte des Polarlandes eine gleich große Wärme entgegenzustellen. In dieser Beziehung freilich ist das Dasein des Polarmentchen wesentlich nur auf das Thierreich gegründet. Da jedoch dieses wiederum auf das Pflanzenleben fußt, so ist es schließlich immer die Pflanzenwelt, die hier sein Leben, wenn auch mittelbar bedingt. Trotzdem kann man von einem unmittelbaren Einflusse reden; denn wenn auch thierische Nahrung, besonders Fette, ein Haupterforderniß seines Daseins sein mögen, er würde schließlich nicht ganz des vegetabilischen Eiweißes und der vegetabilischen Säuren, die ihm zugleich für sein Knochengestütz mineralische Stoffe zuführen, entbehren können. Man weiß, daß der Ecorbtt unfähig aufreht, was dieser Nahrung gänzlich ermanact. Aus diesem Grunde hat es ein großes Interesse, diesen Wech-

selbstbeziehungen nachzuspüren; wäre es auch nur, um die Ausdehnung der Unfruchtbarkeit des Polarlandes kennen zu lernen.

In der That kann sie nur eine beziehungsweise sein. Alles Leben entsteht mehr als andernwärts dem Wasser; denn dieses Element allein ist durch eine wohlbegründete Einrichtung der Natur so organisiert, daß es nicht wie der feste Boden bis auf seine tiefsten Tiefen gefriert. Selbst bei 74° N. frieren im Polarlande See'n und Flüsse nur bis 8 F. tief; da aber, wo größere Schneemassen schübend auf der Eisdecke lagern, nur bis 4 1/2 F., wie v. Middendorff berichtet. Darum liegt vor Allem der Schwerpunkt des polarischen Lebens in dem Meere. Wie in dem antarktischen Oceane, entwickeln sich in dem arktischen die Meeresgewächse in einer Uppigkeit und Größe, als ob sie das Nahen der reißigsten Thierformen, die wir kennen, das der Walthiere, voraus verkünden sollten. Was das von eisiger Kälte heimgesuchte Land nicht vermag, vollführt der wärmere, von diesen Hindernissen mehr verschonte Meereschoof. Seine Tange sind die eigentlichen Wälder; als Dichtke bilden sie sich an den felsigen Küsten submarinisch aus; in vielerlei Formen geben sie einer reichen, zum Theil noch sehr unbekannten Thierwelt Wohnsitz, Nahrung, und bereiten den höher organisierten Formen durch niedrige ihren Lebensboden vor. Gerade an den Küsten des eisigsten aller Polarländer, an den grönländischen, erinnern zahlreiche Tangarten an die Galle der Tropenwelt; oft 6 bis 8 Ellen lang, 1/2 Elle breit, nicht selten in wunderbaren, nicht einmal der Kanbfarbe bekannten Scharlachfarben prangend, treffeisen sie durch Wafsenhaftigkeit mit jenen kleinsten aller organischen Wesen, die, wie Scoresby im nördlichen Eismeere beobachtete, über 1000 □ Meilen dieses Meer in eine schumig-grüne Farbe hüllen und jenen kleinsten Meeresblüthen zur Nahrung dienen, welche sich in jenen Tangstücken niedergelassen haben, um ihrerseits wieder höheren Formen Speise zu liefern. Genau so hat sich die Sache dem Polarfahrer Robert Brown dargestellt. Im Grönländischen Meere wechselt die Farbe des Wassers von Ultramarinblau bis zu Olivengrün, von der reinsten Durchsichtigkeit bis zu auffälliger Undurchsichtigkeit, und diese Farbentöne erstrecken sich dafelbst mitunter über 2 bis 3 Breitegrade in der Länge, bis 15 Seemeilen in der Breite. Das ist das sogenannte „schwarze Wasser“ der Walfischjäger; ein Wasser, in dem sich der Walfisch allein befindet, weil es nur hier seine Nahrung findet. Denn jene Färbung hängt von Worlaben der Ursplanzen, von Elefantiellen, mikroskopisch-wingigen Diatomeen verschiedenster Gattungen (Grammonema, Pleurosigma, Tricraticum, Navicula, Surirella u. A.) ab. Diese sammeln sich in so bedeutenden Massen an, daß sie die bewegte See oft so erscheinen lassen, als ob die langen Nebel brauner Tange (Laminaria longicurvis) in ihr auf- und abflutheten. Von

diesen braunen Schleimkreisen der See leben zunächst Massen der Pteropoden, zu denen auch das bekannte Walfischhaas (Clio borealis) gehört, der Medusen und Crustaceen (Entomostracoen-Arten); diese wiederum sind es, welche den Walfen der Meere sowohl im arktischen, wie im antarktischen Oceane ernähren. Eine Dekonomie der Natur, welche durch die außerordentlichen Eigenschaften der Größenverhältnisse das größte Wunder dieser Meeres Tiefen ist. Die Tange verhalten sich dabei wie unterseefische Wälder, die in ihrem Schoofe verbergen, was sonst keine vegetabilische Heimat gehabt hätte. Nur Stürme entreißen sie ihrem Wohnsitz und wälzen sie an den Strand auf wildemörten Wogen. Dort ist es, wo zur Zeit der Noth auch der Mensch einmal zulandt, wie er es überall thut, wo Tange wachsen. Nach Robert Brown gesiegt man in Nordgrönland etwa 5 Arten: oben den Aufpablatotek oder unsern Fäbentang (Chorda Filum), den Blafantang (Fucus vesiculosus), den Flügeltang oder Eutluisetok (Alaria Pylaisiae) und einen nahen Verwandten (A. esculenta), den man auch an den englischen Küsten gesiegt, und den schönen Rosentang (Rhodymenia palmata). Der Zuckertang (Laminaria saccharina) und die scharlachrothe blüthlaube Iridaea edulis kommt an den isländischen und norwegischen Küsten ebenfalls auf den Tisch, wie höchst wahrscheinlich auch noch andere Arten an die Reihe kommen. An den isländischen Küsten namentlich, wo man Tange von über 15 F. Länge kennt, die man unter dem Namen Thare (norm. Tare) oder Söl angesehen findet, spielen diese Meerespflanzen nicht allein wie in Norwegen als Viehfutter, sondern auch als köstliches Nahrungsmittel der Einwohner, eine große Rolle. In letzter Beziehung steht der oben genannte Rosentang obenan; man sammelt ihn massenhaft an der Westküste, laugt ihn im Süßwasser aus, trocknet ihn sorgfältig, verpackt ihn in Tonnen, damit er keine Feuchtigkeit anziehe, und verkauft ihn als ein sehr beliebtes Nahrungsmittel. „Solchergestalt“ meint der alte norwegische Historien-schreiber Pontoppidan, welcher so viele Notizen über die Tange Norwegens gibt — ist von den Werken Gottes nichts überflüssig oder unnützlich“; denn es gilt ihm ebenso für ausgemacht, daß auch manche Walfischarten mit Tangen angefüllt waren, als man ihren Leib aufschnitt.

Was die Tange im Meere, sind die Flechten zu Lande. Doch habe ich schon das Wichtigste über dieselben bei der Schilderung der Flechtensteppe beigebracht. Es sei darum nur noch erwähnt, daß die Isländer ihre Jialla-Gras (isländisches Moos) mit besonderer Sorgfalt sammeln, weil sie seiner vollen Entwicklung einen Zeitraum von drei Jahren zuschreiben. Es geschieht bei frostigem Wetter, das die Flechte durch ihr Aufschwellen bemerkbarer und weicher macht. Auch diese Pflanze wird vorher ausgelegt, um sie von der vulkanischen Asche zu befreien, die in ihrer

vulkanischen Region, wo die Fichten am häufigsten wächst, oft massenhaft die Fluren bedeckt; dann holt man das Ganze, trocknet es, hebt es in Tonnen auf und verbäckt es zu Brod oder kocht es mit Milch zu einer Gallerte, die, als tägliche Nahrung hochberühmt, gern genossen wird. Manche Fichten liefern zugleich Farbstoffe. In Norwegen nennt man sie nach Pontoppidan Korke und das hiermit roth oder braun gefärbte Zeug, ein Tuch der größten Art, Bammel. Seitlam genug, erwähnt der Genannte auch einer Fichte, die in goldgelben Bärten an Fichten und Kiefern, ein hoher Schmuck der Bäume im feuchten Zustande, herabhängt und die man, mit Grüze oder Asa vermischt, den Wölfen (und Füchsen) vorsetzt, um sie zu tödten. Es ist die schöne *Evernia vulpina*, die ich massenhaft auch im Engadin in der oberen Waldregion traf. Sie soll jedoch nur durch ihr Aufquellen, nicht durch ein besonderes Gift, obwohl sie gelb färbt, tödten. Ein Umstand, der auffallend genug ist, wenn man bedenkt, daß bei uns Gesseln vielfach von Bartflechten, Renthiere fast ausschließlich von Cladonien leben.

Doch so wenig das Ren nur von Fichtenstärke zu leben vermag, obgleich seine ganze Organisation für dieselbe eingerichtet ist, so wenig vermöchte es der Mensch, ohne grüne, saftige Vegetabilien zu leben. Nicht einmal der Eskimo, dieser Thranmensch, eignet sich dazu, und in dieser Beziehung trägt er jenen, aus dem Indischen (von Eskimantik) verführten Namen eines Mohlschneiders mit Unrecht. Wie auch bei uns nach langem Winter eine Begehrte nach frischen Frühlingskräutern naturgemäß sich einstellt, so auch im Polarlande. Mancherlei Kräuter dienen hierzu; als die frühesten vor allen die Koffelkräuter (besonders *Cochlearia fenestrata*). Sie bilden auf der westlichen Halbkugel ein allen Polarkahrern wohl bekanntes Scorbutfkraut. Ein zweites ist der Sauerampfer (*Rumex Acetos*), der in der Birkenregion Lapplands gegen 3 bis 4 F. hoch wird und breite Blätter erzeilt (*R. alpinus* Willd.); die Lappen bereiten eine Art Mus aus ihm, die Grönländer einen Salat. Dasselbe geschieht mit dem Alpenhabarber (*Oxyria digyna*), dessen Verbreitung bis zum höchsten Norden reicht. Ueberhaupt zeichnen sich die Polygonen als die werthvollsten Scorbutfkräuter aus. Denn wie im West-Eskimolande die Wurzeln des „Maschu“ (*Polygonum bistorta*), unseres Weizenkörners, genossen werden, ebenso mehrfach und süßlich werden, besonders auf den höchsten Alpen Lapplands, die des alpinen spitzkeimenden Knöterichs (*P. viviparum*), der mit dem Habarber zu sehr hohen Breiten geht. Werthvoller, weil milder, dient zu gleichem Zweck die Angelika oder Engelwurze (*Archangelica officinalis*); um so mehr, als sie im hohen Norden, wie schon einmal berichtet, ihr bei uns so starkes Aroma fast gänzlich einbüßt. Der Lappe speist ihr Mark bis Mitte Juli;

dem Grönländer ist ihr Stengel, roh genossen, der delikate Lwan. Er findet ihn im Süden als Strandpflanze häufig in den Fjorden, im Norden aber auf der Insel Disco, so daß der Grönländer diese Insel von einem Zauberer nach Norden versetzt wähnt. Auch die schottische Angelika (*Ligusticum [Haloscias] Scoticum*) wird hier und da gern als Luthat zu Fischen genossen. Von der haustaubartigen Rosenwurze (*Rhodiola rosea*), die freilich in Grönland nur ganz südlich, unterhalb Egedbörns, und auf der Insel Disko in der Südküste nach Kink vorkommt, genießt man dort roh oder gekocht die ätherische Wurzel, wie man von einem Weidenröschchen (*Epilobium angustifolium*) und einem Läusekraut (*Pedicularis hirsuta*) die Blumenkeise als Kohl speist. Sonst rühmen die Polarfahrer, namentlich Franklin, einen Abzug der Blätter des Sumpfsorbes (*Ledum palustre*), den sie in Ermangelung eines andern Ide's sehr erquickend fanden, obgleich er dem Geruche des Habarbers nahe kommen soll. In Hudsonien werden auch die Wurzeln von Kräutern der Hülfengewächse (*Phaca aboriginum*) von den Eskimos verpeist.

Eine so dürftige Liste essbarer Kräuter verspricht nicht viel für die Früchte des Polarlandes. Dennoch sind gerade sie die wichtigsten und bedeutendsten Nahrungsmittel des Pflanzenreichs. Die nördliche Baumfrucht der Erde liefert die „sibirische Ede“, unsere Birckelkeiser (*Pinus Cembra*). Denn wie ihre Nüsse überall in den mitteleuropäischen Alpen gern genossen werden und an manchen Orten unsere Haselnuß zur Weihnachtszeit vertreten, ebenso genießt man sie in Sibirien. Die Erdbeere, welche in Hudsonien noch bei 65° N. um Jort Franklin reisend erwähnt wird, dürfte innerhalb des Polarkreises nur noch in Lappland genießbar werden; an der norwegischen Küste reist sie bis Alten (70°). Hier auch reist noch die Mutterbeere, und der Besitz eines von diesem Strauche bewachsenen Sumpflandes (norm. Mutterbeere) gehört dort zu den wesentlichsten Annehmlichkeiten eines ländlichen Eigenthums. Wahrscheinlich reist sie überall, wo man noch Wälder findet. Empfindlicher dagegen ist die Aderbeere; nur in heißen Sommern reist sie um Alten ihr feines Fruchtstück. Als der beste Fundort in Norwegen gilt der Strand des Treffjord in Nordland (68°), wo sie nach Schübler in außerordentlicher Menge vorkommt. Himbeeren scheinen als Nahrung hintenanzustehen.

Für die eigentlich, baumlose Polarzone gelangen natürlich nur die Beerenkräuter der Tundren zu dem Range von Nahrungsgewächern. In Grönland nimmt die Krähenbeere (*Empetrum nigrum*) nach Kink den ersten Platz ein. Sie, deren Beeren bei uns nirgend, außer von Alpenhühnern gespeist werden, erzeugt dort eine Frucht, welche die Eingeborenen ausschließlich sammeln. Sie verbannt das nur ihrer Dürftigkeit, weniger ihrer besonderen Schmachtheit. Man speist sie darum im

Herbst als eine Art zweiten Gerichtes zu dem ewig wolkendeckenden Seebundesspeise; um so mehr, da die Frucht von der Wärme und Befruchtbarkeit des Sommers nicht so berührt wird, als die übrigen Beerenfrüchte und sie überdies am weitesten nach Norden reicht. Viel weniger gern essen die Eskimo's in Grönland die Sumpfbere (*Vaccinium uliginosum*), die sie für nicht unschädlich halten. Die Heidelbeeren sind mehr auf den Süden beschränkt und gehören darum besonders auf Island zu den Annehmlichkeiten des Fisches. Auch die Preiselbeeren reifen ihre Früchte nur im Süden und erlangen deshalb keine größere Bedeutung; um so weniger, da sie doch nur einige Zeit des Obigenusses beraubt gewesen war; ein Gleiches berichtet Franklin. Die Moosbeere scheint weniger in Gebrauch zu sein, wie es auch bei uns der Fall ist; daß in Hudsonien aber ein Paar andere Arten unsere Heidelbeere vertreten, ist bereits gezeigt worden. Alle diese Beerenarten sind um so bedeutungsvoller, weil sie erst spät im August reifen, schon von den Größten überrascht, von den ersten Schneewehen eingebettet werden. Unverändert halten sie sich unter dieser Schneedecke bis zum folgenden Sommer an den Zweigspitzen, die

ihrerseits nicht wieder blühen; die Natur selbst übernimmt hilfsreich ihre Aufbewahrung und gibt dem armen Polar-menfchen somit den ganzen Winter über Gelegenheit zum Sammeln einer Speise, ohne welche der Mensch nicht mehr bestehen würde.

Das ist der Fruchtreichthum der Polarzone. Nur auf Island spendet die Natur in dem Strandhafer (*Maritima*, *Ammophila arenaria*), den man deshalb auch manchmal anbauet, eine Art Getreide, das mit dem *Zuccarata*-Reis der Canabier (*Zizania aquatica*) wohl das nöthigste sein dürfte, welches die Natur freiwillig liefert. Kein Wunder, daß die civilisirten Ansiedler Alles versucht haben, um durch den Anbau südllicher Culturpflanzen das Leben erträglicher zu machen. Es sagt Alles, wenn man sieht, daß der Eskimo den Docht zu seiner Tranlampe aus Torfmoosen bereitet, die er kranzförmig in seinem Speckfeinnapfe ausbreitet, daß selbst der südlcher wohnende Kriech-Indianer Subsoniens des Säuglings Wiege, einen Beutel, mit diesem Moose stopft und ihn sammt dem menschlichen Inhalte an den ersten besten Baumast hängt, um ihn von den Winden schaukeln zu lassen. Wir befinden uns eben in dem Reiche der Moose, und nirgends hat dieses aus sich selbst heraus auch nur das Mindeste geleistet, aus welches der Mensch sein Dasein hätte gründen können.

## Zur Geschichte der Steinkohlen.

Von Rudolph Müldner.

Zweiter Artikel.

Was speciell Paris betrifft, so scheint dort die Anwendung der Steinkohle zur häuslichen Feuerung selbst noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine sehr beschränkte gewesen zu sein. In einem Briefe Franklin's an Ingenhousz rath Ersterer den Pariser die Steinkohlenfeuerung dringen an. „Das Holz“, schrieb der berühmte Amerikaner, „wird in Frankreich außerordentlich selten werden, wenn anders nicht die Steinkohlenfeuerung sich in diesem Lande ebenso Bahn bricht, wie in England, wo sie anfangs auch auf so viel Widerstand gestossen.“ Paris gibt alljährlich für Brennholz enorme Summen aus, welche sich mit jedem Jahre noch vergrößern werden, wenn die Bevölkerung anders nicht ihr Vorurtheil gegen die Steinkohlenfeuerung überwinden lernt.

Nun, man muß gestehen, daß die Pariser dieses Vorurtheil gegenwärtig glücklich besiegt haben; heut zu Tage flammt die Steinkohle in Paris ebenso wohl im Kammin der reichsten Fürstenthümer, wie in dem der ärmsten Duvriers.

Hier versiegt uns die französische Quelle, welcher wir folgten. Interessant würde es sein, einige zuverlässige Nachrichten über die erste Entdeckung und Ausbeu-

tung der deutschen Steinkohlenlager zu erhalten: — mögen diese Zeilen dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der deutschen Geschichtsforscher auf diesen Gegenstand zu lenken. Schreiber dieser Zeilen stehen in diesem Augenblicke nur zwei hieher gehörige Notizen zu Gebote, wonach die Steinkohlenlager von Wettin in der preussischen Provinz Sachsen im J. 1466 entdeckt und die dort gewonnenen Steinkohlen zum ersten Male im J. 1624 in Halle zum Salzfeuern verwandt worden sind. Das Zwickauer Steinkohlenlager wurde, der Sage nach, im 10. Jahrhundert von einem Schäfer entdeckt, mithin wären die Steinkohlenlager von Zwickau selbst früher als die von Lütich bekannt gewesen. Dies ist, wenn auch nicht unmöglich, doch jedenfalls nicht sehr wahrscheinlich, im Gegentheil dürfte die bergmännische Gewinnung der Steinkohle in Deutschland wohl am frühesten in der Umgegend von Aachen begonnen haben. Das Aachener Kohlenbeken ist nämlich nur als eine Fortsetzung des Lütlicher Steinkohlenlagers zu betrachten, und wahrscheinlich dürfte sich der Bergbau auf Steinkohlen von Lütich aus in das Aachener Land verbreitet haben. Daß übrigens der Steinkohlenbau in Zwickau gleichfalls sehr alt, erhebt aus einer

kürlich im Zwickauer Archiv aufgefundenen Witzscheift vom J. 1551, wonach der Bau auf Steinkohlen in Zwickau und Umgegend schon seit länger denn 100 Jahren in regelmäßigem Betriebe ist.

Als Entschädigung für die Dürftigkeit meiner historischen Mittheilungen mögen hier einige statistische folgen.

Nach den im J. 1866 dem englischen Parlamente übergebenen Reports received from Her Majesty's secretaries of Embassy and Legation respecting coal productions:

1862 Großbritannien	83,633,538	Tonnen à 20 Centner
„ Preußen	13,088,390	
„ Belgien	9,935,645	
„ Dänemark	7,731,602	
„ Oesterreich	2,525,000	
1863 Frankreich	10,707,980	
„ Rußland	6,350,000	

Seibstverständlich sind diese Zahlen jedoch etwas vorsichtig aufzunehmen, dieselben sind jeden Falles nur approximativ richtig.

Im J. 1864 producirten:

Großbritannien	1,855,757,460	Centner Kohlen.
Preußen	330,954,892	
Sachsen	42,182,202	
Hannover	6,890,671	
Baiern	4,888,817	
Rheinland	2,926,638	

Kold stellt in seinem Handbuche der vergleichenden Statistik, 5. Aufl., Leipzig 1868, folgende Tabelle auf.

Es producirten

J. 1864 Großbritannien	1970	Mill. Kil.
„ 1860 Vereinigte Staaten	300	
„ 1864 die Staaten des deutschen Zollvereins	388,17	
„ 1866 Frankreich	240	
„ 1861 Belgien	233	
„ 1861 Oesterreich	50,75	
„ 1863 Rußland	5,7	
„ 1861 Italien	1,5	
„ 1864 Schweden	4,4	

und berechnet somit die Gesamtsteinkohlenproduktion der Erde in runder Summe auf 3,000,000,000 Centner.

Alein diese Angabe ist jeden Falles zu niedrig, schon weil bei derselben der so wichtige Steinkohlenbau Australiens, Neu-Seelands und Indiens dabel außer Betracht geblieben.

Nach Edham betrug die Kohlenausbeute in Bengalen im J. 1858: 226,140, im J. 1860: 370,206 Tonnen; von 1850—1866 lieferte Neu-Süd-Wales 4,617,100 Tonnen Steinkohlen, wovon 585,525 im J. 1865. Ueber die Kohlenausbeute in Neu-Seeland, Borneo, Labuan, Bruni u. s. w. fehlen mir die Nachrichten.

Das Journal of Society of Arts schätzt die Zahl der in sämtlichen Steinkohlengruben der Erde beschäftigten Arbeiter auf 600,000, welche mit ihren Frauen und Kindern eine Kopzahl von 2 1/2 Millionen Menschen repräsentiren.

Alein die ungeheure Wichtigkeit der Steinkohle für unser modernes Leben springt auch wohl ohne doch immerhin nur annähernd richtige Zahlenangaben selbst dem Ausschätzten in das Auge. Abgesehen vom Getreidebau und der Gewinnung und Verarbeitung der Baumwolle und des Eisens, welche beide letzteren Zweige der menschlichen Thätigkeit indessen selbst wieder von der Steinkohle abhängig, setzt die Gewinnung dieses unschmelzbaren Materials, welches, wie wir gesehen, anfangs nicht nur mit dem Vorurtheile der großen Masse, sondern selbst mit dem Unverstande der Geseßgebung zu kämpfen hatte, heute aber die Basis jedes industriellen Fortschrittes geworden, mehr Menschenhände in Bewegung, als irgend ein Zweig der menschlichen Thätigkeit; namentlich wenn man, wie billig, nicht nur alle bei der Steinkohlengewinnung direkt Beschäftigten, sondern auch deren Familien, die Fuhrleute und Schiffer, die durch den Kohlentransport den Unterhalt für sich und die Ihrigen gewinnen, in Anschlag bringt, wie auch alle die Industriezweige, welche heute die Steinkohle nicht mehr entbehren können.

Der Gelbwerth der alljährlich gewonnenen Steinkohlen ist dem des alljährlich gewonnenen Goldes ungefähr gleich, allein für unsere moderne Industrie ist, ganz abgesehen davon, daß der Kohlenbau unendlich mehr Menschen in Bewegung setzt, als die Gewinnung des Goldes, die Steinkohle von ungleich größerer Bedeutung, als selbst das Gold: das Gold, als Edelmetall, ließe sich entnehmen, in seiner Eigenschaft als Werthmesser könnte man einen Ersatz für dasselbe finden, aber die Steinkohle ist gegenwärtig unersetzlich.

Um so natürlicher drängt sich uns die Befürchtung auf, daß dieses kostbare Mineral sich einst erschöpfen könne, und die Frage, wie lange die im Boden ruhenden Kohlenschätze bei so riesig wachsendem Verbrauch vielleicht noch vorhalten möchten, erscheint darum keineswegs als eine müßige. Man schätzt das gegenwärtig in Arbeit genommene Steinkohlengebiet auf 20,711 Quadratkilometer; nimmt man die durchschnittliche Mächtigkeit der Steinkohlengruben zu 9,45 Meter an, — was keineswegs zu hoch gegriffen, denn die künftigen Steinkohlengruben haben eine Mächtigkeit von 16,76 Meter, die an der Ruhr von 40,84, die in Staffordshire von 46 Meter, — so würde die vorhandene Steinkohlennasse den gegenwärtigen Bedarf noch auf 38,000 Jahre decken, mithin die Befürchtung einer Erschöpfung der Steinkohlengruben wenigstens dem gegenwärtigen Gesichte noch ziemlich fern gerückt sein, und sollte der Zeitpunkt der Erschöpfung eintreten, so dürfte dann vielleicht auch die Zeit gekommen

men sein, welche Liebig und verkündigt, in der der Mensch gelernt hat, sein Eisen mit Wasser zu schmelzen, die Steinkohlen ihm mithin entbehrlich werden.

Andero gestaltet sich die Steinkohlenfrage, wenn man dabei nicht den Vorrath der gesamten Erde, sondern nur den Vorrath bestimmter Länder in das Auge faßt. Namentlich in England bewegt die Furcht vor einer Erschöpfung der Steinkohlenlager bereits manche Gemüther, und Stuart Mill und Gladstone haben dieser Furcht bereits im Parlamente einen Ausdruck gegeben.

Nach „Jarves, the coal question“ enthält das englische Steinkohlengebiet einen Flächenraum von 6000 □ Miles. Zwar werden schon jetzt in England Kohlen unter dem Meerespiegel gewonnen, und ohne Zweifel setzen sich viele Kohlenflöße weit unter dem Meere fort, allein die Ausbeute derartiger Flöße stößt auf zu bedeutende technische Hindernisse, als daß der auf diese Weise zu erzielende Gewinn sonderlich in das Gewicht zu fallen vermöchte. Erwägt man nun, daß die Ausbeute aller tiefer als 4000 Fuß unter der Erdoberfläche liegenden Flöße — die größte bis jetzt erreichte Tiefe beträgt 2500 Fuß — ebensoviele wegen des Kostenpunktes, als wegen des Druckes der aufliegenden Erdschichten und wegen der in dieser Tiefe c. 35° N. betragenden, jedes regelmäßige Arbeiten unmöglich machen den Erwärme unthunlich ist, und schreibt dann alle Flöße von geringer Mächtigkeit denn 2 Fuß als nicht baumwürdig aus, so berechnet Jarves den Kohlenvorrath Englands auf 80,000,000,000 Tonnen.

Nimmt man mit Mac Culloch die Kohlenproduktion Englands im J. 1840 auf 30 Mill., im J. 1865 nach R. Hunt (Mineral Statistics) auf 98,150,587 Tonnen an, so hat sich die Kohlenproduktion Englands durchschnittlich jedes Jahr um 2½ Mill. Tonnen vermehrt \*).

\*) Wie rasch die Kohlenproduktion in den einzelnen Ländern im Zunehmen begriffen, ist aus folgenden Zahlenangaben ersichtlich. Dieselbe betrug:

	1845	1865
in Großbritannien . . .	31,500,000	98,150,587 Tonnen
Belgien . . . . .	5,000,000	10,700,000 „
Frankreich . . . . .	4,200,000	10,707,980 „
Preußen . . . . .	3,500,000	18,592,110 „
Rußland . . . . .	2,800,000	6,350,000 „
verschiedenen Staaten von Nordamerika . . .	4,400,000	16,472,410 „

Wie man sieht, so war die relative Produktionssteigerung am bedeutendsten in Preußen und dann in den Vereinigten Staaten.

Im J. 1864 besaß Preußen 2313 Gruben, darunter 407 Steinkohlengruben; die Gesamtproduktion des preussischen Bergbaues —

Die obengefundene Kohlenmenge von 80,000,000,000 Tonnen würde also bei feststehendem Bedarf von jährlich 98,000,000 Tonnen, wie er im J. 1865 sich herausstellte, noch c. 900 Jahre ausreichen, dahingegen schon in ungefähr 200 Jahren erschöpft sein, wenn der Bedarf, wie bisher, progressiv um jährlich 2½ Mill. Tonnen wachsen sollte.

Man muß gestehen, die Erschöpfung der Kohlenlager, bevor für die Steinkohle ein ausreichender Ersatz gefunden, würde für England eine Katastrophe sein, der gegenüber Zentnerunruhen, Kontinentkriege und Baumvöllennoth bis zur Unbedeutendheit zusammenschrumpfen würden. Kein Wunder daher, daß die Kohlenfrage in England alle Gemüther in Bewegung setzte; eine Royal Commission of inquiry wurde zur Untersuchung der Sache eingesetzt, allein wir können nicht sagen, ob dieselben ihren Rapport bereits erstattet hat.

Aber nicht bloß in England, sondern auch in anderen Ländern hat man versucht, die vorhandene Steinkohlenmenge zu berechnen, um dadurch zu ermitteln, auf wie lange Zeit der vorhandene Vorrath den Bedarf wohl noch zu decken vermöchte.

Erwägt man, wie unsere gesamte Industrie, mithin als von derselben bedingt, unsere gesamte Kultur auf der Steinkohle beruht, so erscheinen derartige Untersuchungen wahrlich nicht überflüssig. Einige dieser Berechnungen, welche sich auf preussische Kohlenlager beziehen, mögen hier eine Stelle finden.

Nöggerath und v. Dechen berechnen den Inhalt des Kohlenbeckens an der Saar auf 43,200,000,000 Tonnen, wonach derselbe bei der gegenwärtigen Ausbeute von jährlich 2½ Mill. Tonnen noch 17,000 Jahre ausreichen würde. Im J. 1857 kalkulierte Herr v. Carnall, daß der Kohlenvorrath Schlesiens noch auf 6000 Jahre vorhalten würde. Den Inhalt der baumwürdigen Flöße des Ruhrbeckens berechnete der Oberberggrath Kipper auf 39,000,000,000 Tonnen, die bei der heutigen Produktion noch auf mehr als 5000 Jahre zur Deckung des Bedarfs genügen würden, jeden Falles lange genug, um wenigstens der jetzt lebenden Generation zu erlauben, sich der Furcht vor Erschöpfung der Kohlenlager zu entschlagen.

excl. Hütten und Salinen — belief sich auf 463,846,917 Centner im Werthe von 41,050,860 Thlr., wovon allein auf den Steinkohlenbau 330,954,892 Centner im Werthe von 27,540,333 Thlr. entfielen. Die Zahl der in sämtlichen Gruben beschäftigten Arbeiter betrug 130,443, darunter allein 80,175 in den Steinkohlengruben.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 47.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwetfche'scher Verlag.

**24. November 1869.**

**Inhalt:** Beitrag zur Quellenkunde, von M. C. Grandjean. Zweiter Artikel. — Vom Montblanc zum Monterosa, von Otto Ale. 10. Der Mont-Preto. — Das Herings-Mas. Nach dem Dänischen des Axel Voed, von Hermann Meier. Erster Artikel. — Kleinere Mittheilungen. — Literarische Anzeigen.

## Beitrag zur Quellenkunde.

Von M. C. Grandjean.

Zweiter Artikel.

Zunächst will ich an einem Beispiele die Vorgänge zu erläutern suchen, welche meiner Ansicht nach den Umlauf der Gewässer in den Gesteinsschichten im Allgemeinen charakterisiren. Wählt man nämlich hierzu die allgemein bekannte Grauwackenformation am Mittelrhein, so werden sich bei deren näherer Betrachtung schon That-sachen genug ergeben, welche Aufschluß über manche räth-selhafte Erscheinungen zu ertheilen im Stande sind, die nicht allein mit der Natur der Quellen selbst, sondern auch mit den Veränderungen zusammenhängen, welche die von ihnen durchströmten und von ihnen bearbeiteten Ge-  
steine durch sie erlitten haben.

Die devonische Grauwacke oder das rheinische Schie-fergebirge erscheint uns in seiner jetzigen Gestalt als eine Reihenfolge von sandigen, schiefrigen und kalkigen Ab-

derschlägen, die der ältesten Schöpfungsperiode, in der schon organisches Leben auf Erden bestand, angehören. Fast in allen Sedimentärformationen wiederholt sich dieser Charakter der sandigen, schiefrigen und kalkigen Gebilde und läßt darauf schließen, daß die Entstehung derselben gleichen Ursachen zuzuschreiben ist. Wenn nun in der rheinischen Grauwacke keine organischen Reste enthalten wären, so würde ihr relatives Alter, da sie am Mittel-rhein nur sporadisch von Tertiargebilden bedeckt ist, schwie-rig auszumitteln sein, wie es denn auch in der That mit dem sogenannten Taunusschiefer der Fall war, ehe Ver-steinerungen darin gefunden wurden, die ihn, der früher als viel älter angesprochen wurde, zu den jüngeren Gliedern des rheinischen Gebirges stellten.

Dahingegen sich das eigentliche Ablagerungsgebiet der



rheinischen Grauwacke noch nicht genau begrenzen läßt, so darf man doch wohl als sicher annehmen, daß dieses devonische Gebilde viel weiter verbreitet ist, als die geologische Karten nachweisen. Dieses geht schon allein daraus hervor, daß die Grauwacke an vielen Punkten unter jüngeren Steinschichten durchgeht und in tief eingeschnittenen Thälern wieder hervortritt.

Betrachtet man den Bau des rheinischen Gebirges etwas näher, so findet man, daß dasselbe aus einer Reihefolge allgemein und auch mitunter lokal entwickelter Niederschläge besteht, welche ursprünglich horizontal oder doch mit geringer Neigung und auch in einzelnen Mulden in einem salzigen Meeresbecken abgelagert wurden. Mulden finden sich noch bei Limburg a. d. Lahn, Weylar, Neuwied u. s. w.; es ist indessen für den Zweck der nachfolgenden Ausführung gleichgültig, welcher Art diese Unterlage war oder noch ist.

Wie schon bemerkt, ist die Grauwacke aus sandigen, schieferigen und kalkigen Schichten im Wesentlichen zusammengesetzt, wovon aber die ersteren ihren ursprünglichen Zustand am treuesten bewahrt haben; nur das lose Sand, aus dem sie am Anfange bestanden, im Laufe der Zeit und unter den Bewegungen, welche im Gebirge stattfinden, durch Vermittlung des Wasserumlaufs mit amorpher Quarzmasse verfestet wurde. In diesen sogenannten Spitzfelsen sandsteinen kommen vereinzelt oder in Bänken, welche sich als örtliche Ansammlungen, wie sie sich jetzt noch häufig an den Meeresküsten finden, kumben, meist dickschalige Brachiopoden vor, die aber nur ihre Abdrücke und den feinen Sand, welchen sie eingespült enthielten, als Steinerne verfestet, zurückließen. Die Kalkschalen wurden aber gelöst und fortgeführt, während zugleich die Verfestigung des Sandes stattfand.

Die schieferigen Schichten sind fast alle als ein Gemenge von verschiedenen, zerriebenen mineralischen Substanzen aus älteren Gebirgsarten mit Pflanzen- und Thierresten anzusehen, welche letztere ihnen den in den meisten Varletaten frequenten Kohlenstoff gelieft haben. In den kohligen Schieferen kommen größtentheils die dünnschaligen Cephalopoden, Gasteropoden und Pteropoden u. s. w. vor, welche zum Theil nur ihre Abdrücke zurückließen, aber sich auch als Abgüsse und Steinerne von Schiefermasse, Quarz, Schwefelkies u. s. w. erhalten haben. Daneben finden sich nicht selten anthracitartig ausgebildete Pflanzensammlungen oder sogenannter Kohlenchiefer in besonderen Schichten und Nestern.

Die Schiefer des rheinischen Gebirges haben ohne Ausnahme eine sehr bedeutende Reduktion ihres ursprünglichen Volumens erlitten, wie einestheils die in ihnen enthaltenen Abdrücke organischer Reste darthun, welche nur einen kleinen Bruchtheil ihrer ursprünglichen Körperlichkeit gelassen; andertheils sind die während der Kalk-

Extraktion versteinerten oder vertieften Organismen so herumgebeugen, daß man zu demselben Schluß gelangt.

Die kalkigen Schichten der Grauwacke sind theilweis Art, nämlich entweder Bänke von zusammen gespülten Muschelschalen, die mit Kalk- und Schiefermassen oder mit ersteren allein verfestet, zu festem Gestein verbunden wurden; oder es waren wirkliche, von verschiedenen Positionen aufgeführte Korallenbauten. Diese letzteren, mögen sie nun geschiebt auftreten oder an lokal entwickelte Korallenriffe erinnern, umschließen in der Regel zahlreiche Reste von Mollusken und Crustaceen u. s. w. nebst sandigen Bestandtheilen, welche während des Baues von den Strömungen und dem Wellenschlag, wie man deutlich an den abgeschliffenen Schalen sehen kann, ebenso, wie auch noch heute in dieselben hineingeführt wurden.

Bei dieser in Bezug auf Zusammensetzung, Widerstandsfähigkeit und lokale Vertheilung u. s. w. so verschiedenen Beschaffenheit der Niederschläge und Thierbauten, mußten schon während ihrer Entstehung mancherlei Bewegungen entstehen und die chemischen Kräfte, welche in ihnen schlummerten, zur Thätigkeit gereizt werden. Da nämlich die kohligen-schieferigen die sandigen und kalkigen Schichten an Masse jetzt noch weit übertreffen, so muß man aus den schon angeführten Gründen schließen, daß die welchen moderneren Gebilde, woraus die Schiefer entstanden, zur Zeit, ehe sie fest waren, und auch dann noch viel mächtiger gewesen sind, als jetzt.

Man kann hierbei nicht viel lernen, wenn man annimmt, daß sämtliche Schichten des rheinischen Gebirges, als es abgelegt und fest war, die jetzige Mächtigkeit, wenn man dieselbe zu 2000 F. durchschnittlich schätzt, um das Fünffache überstieg, daß also das Meer, in dem es sich bildete, über 10,000 F. höher stehen mußte, als das jetzige Weltmeer. Schon allein aus diesem Grunde ist die so sehr beliebte Hebungs- und Senkungs- theorie für das nord-europäische und auch wohl für jedes andere, ihm analog ausgebildete Gebirgssystem ganz unzulässig; denn es müßte dann unterstellt werden, daß die Depression seiner Unterlage um ebenso viel tiefer unter dem jetzigen Meeresniveau gewesen sei. Woher sollte dann aber, wenn auch zugegeben werden könnte, daß ein solches Hebungs- und Senkungs- system, wie das nord-europäische, durch plutonische Kräfte 10,000 F. gehoben worden wäre, das Material zur Bildung der Grauwacke und der darauf gelagerten sedimentären Gesteine gekommen sein? Man kann aber auch noch aus anderen Gründen und zumal aus den unzweifelhaften Spuren, welche die allmählig sinkenden Gewässer hinterlassen haben, auf's Sicherste nachweisen, daß der Abgang der nord-europäischen Sedimentgesteine in einem hochgelegenen, bis in die Jetztzeit salzigen, dann bradigen und endlich süßen Wasserbecken stattfand, welches von noch viel höheren und älteren Gebirgen umwallt war, aus denen durch die mecha-

nische und chemische Thätigkeit der atmosphärischen Wasser das Material zu den genannten Gesteinen in denselben entnommen wurde, — und die nach und nach durch die fortschreitende Thalbildung mit tiefer liegenden Becken in Verbindung kamen; wodurch die Wasser abgeführt und das große Becken bis auf seine jetzige Gestalt trocken gelegt worden ist. Vollständig ist dieses aber bis heute noch nicht geschehen; denn die Nord- und Ostsee, welche zu den nordeuropäischen Gebirgssystemen gehören, sind noch Theile desselben. Hierzu ist auch noch, wie die Organismen der späteren Formationen zeigen, der Umstand in Rechnung zu bringen, daß nach der Periode der Grauwackenablagerung, und bis in die Jetztzeit hinein eine allmähliche Veränderung des Klimas in Nordeuropa stattgefunden hat, die aus einer Vertiefung des Schwerpunktes und damit zugleich der Ekliptik der Erde entsprang, welche durch den Abfluß der Gewässer aus den hochgelegenen Wasserbecken der nördlichen Hemisphäre in die tiefer gelegenen südtlichen oder in das jetzige Weltmeer bedingt war. Dadurch wurde der Schwerpunkt der Erde natürlich mehr nach der südlichen Halbkugel und mit ihm die Ekliptik auch weiter gegen Süden verlag.

Anknüpft man nach dieser, wie es mir schien, nöthigen Erläuterung, nun wieder an den Zustand an, in welchem sich die Schichtenteihe des rheinisch-deutschen Gebirges während ihrer Bildung befand, so ist es klar, daß die untersten Glieder desselben schon stark comprimirt und sowohl chemisch, wie mineralisch verändert sein mußten, als sich die oberen noch im weichen Zustande befanden; wobei der Natur der Vorgänge gemäß anzunehmen ist, daß lokale Vertiefungen, wie die Becken von Limburg und Weimar u. s. w. erst mit kalkigen Gebilden ausgefüllt wurden, nachdem die Schieferungen und sandigen Schichten

schon vollständig oder doch, wie die organischen Reste in denselben darthun, größtentheils abgesetzt waren.

Da nun so verschiedenartige Niederschläge schon an und für sich, wenn sie nicht in gleicher Mächtigkeit und auf einer durchaus ebenen Sohle abgelagert werden, einen ungleichen Druck auf einander ausüben müssen, so wird dieses noch um so mehr geschehen, wenn sie unter Wasser stehen und einander ausweichen können. Es ist daher nicht zu verwundern, daß die weichen Schiefermassen den auf sie gelagerten Sandstein- und Kalken auszuweichen suchten und dadurch wellenförmige Erhebungen und Vertiefungen bildeten, die gegenwärtig die Sättel und Mulden darstellen, welche die Grauwackenformation in so eigenthümlicher Weise charakterisiren. Wurden dann später, als die Formation zum Theil trocken gelegt war, die Sättel durch die Thalbildung rasir, so mußte der Zusammenhang der Schichten aufgehoben werden, und es entstanden dann durch die einsinkenden atmosphärischen Wasser, welche durch die Einleitung des Verwitterungsprocesses die Schieferblätter aufblähten oder durch Frost auseinander drängten, die mitunter so steil aufgerichteten oder sogar rückwärts gebogenen Schichtenköpfe, welche uns nun so rathselhaft erscheinen. Es versteht sich von selbst, daß die zwischen den Schieferlamellen eingeschlossenen Petrefakten diesem Impulse folgten, und daß die dünneren Zwischenschalen, welche ursprünglich, wenn sie keine Thiere mehr enthielten, auf der breiten Seite liegen mußten, genau angeben, ob die Aufrichtung oder Schieferung eine ächte oder falsche ist; denn es fällt nicht immer die Schieferung mit der Schichtung zusammen oder in eine Ebene. Diese weichen vielmehr mitunter sehr wesentlich von einander ab, und bei manchen Schiefen ist die Spaltbarkeit sogar nach verschiedenen Richtungen entwickelt.

## Vom Monterosa zum Montblanc.

Von Otto Wic.

### 9. Der Mont Jérémy.


Wie vor einer Kiesenmauer steht der Wandrer, der von Courmayeur her sich dem Montblanc nähert. Kein Thal durchfurcht dieses gewaltige Massiv, keine Einsattelung bietet sich dar, die einen Uebergang über diesen furchtbaren Wall ermöglichen könnte; nur Gassen scheint es gegeben, diese Felsen zu erklimmen, hinter denen unaussprechbare Schneefelder und zerklüftete Gletscher des Wanders haren, um ihn unter unsäglichem Mühen zum ienseitigen Thale von Chamounix hinab zu geleiten. Aber trotz dieser starrten Felswände und drehenden Gletscher richtet sich doch sehnsuchtsvoll der Blick des kühnen Bergsteigers dort hinauf, der es ja gewohnt ist zu siegen und selbst die stolzen Herrscher der Alpen zu seinen Füßen zu sehen.

Manchem Leser wird diese Sehnsucht eine unbegreifliche scheinen. Er wird es nicht verstehen, daß es Gassen gewähren soll, so harte Kämpfe mit den Schrecknissen der Natur zu bestehen, ernste Lebensgefahren auf sich zu nehmen, um für wenige Stunden oder gar Minuten den Fuß auf die schwindelnden Zinnen über die Wolken aufragender Eis- und Felsberge setzen zu können. An Tölpelheit wird es ihm zu grenzen scheinen, daß man stundenlange Wanderungen über zerklüftete Gletscher, über scharfsackige Grate, über Schnee und nacktes Gestein, an schauerlichen Klüften und Abgründen hin unternimmt, daß man Entbehrungen, Anstrengungen, Wagnissen sich aussetzt, die selten nur und auch dann meist für wenige Augenblicke selbst vom dem ermateten Genuße gekrönt

werden, weil Kälte und Ermattung oder die Rücksicht auf den zeitraubenden Rückweg den Wanderer meist zwingen, das Ziel wieder zu verlassen, nachdem es kaum erreicht ist. Nicht Wenige freilich gibt es, die nur Modesucht oder gar eitle Prahlsucht zu jenen Regionen ewigen Eises hinantreibt, und denen gegenüber mag man mit Recht von Tollheit reden. Von weiter Ferne kommen sie oft her, ohne die geringste Kenntnis des Landes, ohne irgend welche vorbereitende Studien, ohne irgend einen höheren Zweck, nur um einen berühmt gewordenen Gipfel der Alpen, eine noch unerstiegene Spitze der Gletscherwelt zu erklimmen. Sie sind die Plage der Führer, von denen sie Unmögliches verlangen, denen sie Vorwürfe machen, wenn die Natur unüberwindliche Hindernisse entgegenstellt, denen sie die augenscheinlichsten Lebensgefahren zumuthen, weil sie die Erreichung ihres Zieles für schweres Geld erkaufen zu haben meinen. Der Gewinn solcher Bergsteiger ist freilich ein klägliches. Haben sie den Gipfel erreicht, so erblicken sie rings um sich eine starre Welt von Bergen und Eismüsten, von kahlen Alpen und nebligen Thalgründen, ohne sich in diesem Chaos zurecht finden zu können, ohne zu wissen, was sie vor Augen haben, als so weit sie es aus den mangelhaften und unzuverlässigen Angaben der Führer erfahren. Sie schauen in eine fremde Welt, die sie nicht einmal durch bunten Farbentz zu fesseln vermag; denn in solchen Höhen wird selbst der schönste Schmuck der Thäler und Ebenen, das Grün der Wiesen, das Blau der See'n, das Gold der Kornfelder getrübt und verschwimmt mit dem Horizonte in nebligem Grau. Keine besfreundete Gestalt ist da, an der das Auge gern haftet. Das Gefühl läßt sie kalt, und dieses Gefühl innerer Kälte wird bei dem Mangel an lebhafterem Interesse und warmer Begeisterung bei solchen Bergsteigern noch erhöht durch das von äußerem Frost und von Ermüdung erzeugte Unbehagen; denn die Temperatur ist auf solchen Höhen selten mild und der Aufenthalt selten ein behaglicher. Gleichgültig wendet daher der Bergsteiger, der nur seine Eitelkeit befriedigen wollte, dem kaum erstiegenen Gipfel den Rücken. Einen realen Gewinn trägt er nicht mit sich, und sein Scheingenuss ist theuer erkaufte durch Anstrengungen, die nicht selten Gesundheit und Leben gefährden.

Ganz anders steht es mit dem Bergbesteiger, der von dem Drange wissenschaftlicher Forschung oder dem berechtigten Verlangen getrieben wird, mit den erhabenen Bildern der Alpenwelt vertraut zu werden, ihre verborgenen Schönheiten aufzusuchen und sich den unschätzbaren Genuss zu verschaffen, den der Blick in diese wunderbare Welt von hohem, übersichtlichem Standpunkt aus gewährt. Denn aus der Tiefe gesehen, bietet jede große Gebirgsmasse immer nur ein verschobenes und verzerrtes Bild dar. Erst in der Höhe treten die räthselhaften Verschlingungen der Gebirgssysteme, die Gipfelformen, die verborgenen

Continent mit Übergang über den Gotthard und die Höhe des Jura.



genen Gletscherthäler klar vor das Auge. Freilich bedarf es eines vorübergehenden ersten Stäublums, um sich in dem Chaos näher und ferner Berggestalten, die oft zu Hunderten dem ausgebreiteten Horizont entsteigen, zurechtzufinden. Aber immerhin bleibt dies der Hauptgenuss auf solchen ungewöhnlichen Standpunkten. Der Reiz malerischer Schönheit ist durch den geschwächten Lichteffect und die große Entfernung der Gegenstände des Naturbils des gestört. Aber den Bau eines großen Theiles des Alpengebirges, den Zug ganzer Gebirgsketten und ihrer Verzweigungen, die Form ihrer Gipfel, die plastischen Verhältnisse des Bodens überhaupt, den Lauf der Thäler und Flüsse, die Ausbreitung der Vegetation und Kultur, das Alles mit einem Blicke zu überschauen, das bleibt ein Genuss, der für den ersten Forscher selbst großer Mühen und Gefahren werth ist.

Man wird es nun verstehen, wenn auch ich, Angesichts dieser wunderbaren Gebirgswelt, dem Verlangen nicht widerstehen konnte, meinen Fuß auf ihre Zinnen zu setzen. Freilich gleicht der Weg, der über dieses Gebirgsmassiv führt, keinem der Pässe, die andere noch so hohe Gebirge übersteigen, weder einem Gemmapass, noch selbst einem St. Theodul- oder Weisshorppass. „Über den Mont-blanc“, sagt Berlepsch in seiner Schneisekunde, „führt kein begangener Paß; der Col du Géant ist ein Gletscherpaß, nur für Verwagene, an harte Strapazen gewöhnte Berggänger praktikabel, der 16—18 Stunden verlangt.“

„Kaum einige Male alljährlich wird diese Reise namentlich von Engländern unternommen.“ In der That hat schon unsere neuliche Betrachtung des Gesamtbau's der Montblanc-Gruppe zu diesem Ergebnis geführt. Es gibt ja hier keine Thäler, durch die man sich allmählig zur Höhe hinanwinden kann; man muß den ungemein steilen Abstieg der Südselte ohne alle Vermittelung erklimmen und findet sich dann auf den einsigen Weg zur Nordseite hinab durch den langen Gletscher angewiesen, der bei der noch immer ziemlich steilen Neigung des Gebirges von vornherein eine gewaltige Zerklüftung verspricht. Wenn ich mich in Courmayeur zu der schwierigen Wanderung entschloß, so bestimmte mich dazu, abgesehen von der lockenden Aussicht, einmal den Gletscher in seiner Weite und in seinem ganzen Verlaufe, mit allen seinen interessanten Erscheinungen kennen zu lernen, der Umstand, daß ich zwei Reiseführer fand, die bereits mit kühnigen Führern versehen waren. Denn solche mühe- und gefahrvolle Wanderungen sind in der Regel überlies noch kostspielig, da für den einzelnen Reisenden mindestens zwei Führer erfordert werden, deren jeder einen mit kleinerem noch unbillig erscheinenden Lohn von 60—80 Fr. zu beanspruchen hat.

Noch am Abend des 27. August beschloßen wir zur Abkürzung des folgenden Tagesmarsches bis zu dem in etwa 6500 F. Meereshöhe oder 3000 F. über Courmayeur gelegenen Pavillon du Mont Gréty hinaufzusteigen. Der

Weg führt längs der schäumenden Doire hinan, über herrliche Wiesen an dem Schwefelbade la Saze vorüber und überschreitet oberhalb des Dorfes Entrèves, wo sich eine großartige Aussicht auf die Allee blanche zur einen und das Thal von Ferret zur andern Seite eröffnet, den hier aus dem letzteren Thale herabströmenden Queldab der Doire. Beim Welter la Palue standen wir am Fuße des Mont Gréty, eines jener gewaltigen Felsenspitzen, welche sich fountiffenartig vorschleiben, an der Südselte gleichsam die Kiesenmasse des Montblanc stützen. Durch Wälder, auf steinigen, schmalen Pfaden ging es nun den steil ansteigenden Berg hinan; niedriges Gestrüpp von Aueholz und Alpenrosen trat allmählig an die Stelle der Wälder, und die Nacht war längst hereingebrochen, als wir die einsame Blockhütte erreichten, die den fleißigen Namen des Pavillon du Mont Gréty führt, und die den Reisenden, die sich die Uebersteigung des Col du Géant zum Ziel gewählt haben, zur nächtlichen Ruhestätte zu dienen pflegt. Man darf in solchen Höhen keine großen Ansprüche auf Comfort machen; man muß zufrieden sein, wenn man für hohe Preise ein bescheidenes Abendbrot und Frühstück erhält, wenn man den nöthigen Proviant für den Marsch des folgenden Tages und endlich ein Lager, wenn auch nur von Stroh, findet, um seinen ermüdeten Gliedern für einige Stunden die ihnen für die bevorstehenden Anstrengungen so nöthige Ruhe zu gewähren.

Die beschwerliche Wanderung am Abend hatte mich fast wieder in meinem Vorhaben wankend gemacht, da ich mir auf dem steinigen Wege im unteren Val-Tournanche und auf der Chaussee im Noththal jenes Uebel zugezogen hatte, das zu den störendsten Feinden des Fußgängers gehört, und das mir auch jene Erklimmung des Mont Gréty fast zu einer Fußsüßeln gemacht hatte, nämlich Wäsen an einem Fuße. Dazu kam, daß die beiden Engländer, mit denen ich die gemeinsame Uebersteigung des Col du Géant verabredet hatte, plötzlich ihren Plan änderten und, statt vom Col nach Chamounix hinabzusteigen, von dort gradewegs den Gipfel des Montblanc zu erklimmen beschloßen. Aber statt der beiden Engländer fanden sich zwei Belgier, die gleichfalls bereits mit Führern versehen waren, bereit, mit mir das Wagnis auszuführen, und von meinem Fußsüßeln befreite ich mich glücklich durch eine glückliche Operation. So war denn jedes Hinderniß beseitigt, und frohen Muthes und gespannter Erwartung voll traten wir am frühen Morgen des 28. Aug. 3¼ Uhr unsere Wanderung an. Unsere Gesellschaft bestand aus den beiden Belgiern und mir und 4 Führern, von denen allerdings nur zwei als solche zu rechnen waren. Der dritte war nur ein Träger, der sich uns angeschlossen, um das Gepäck der erwähnten Engländer nach Chamounix zu bringen, und der vierte war mein guter Schaller aus dem Barmatthal, der bei aller Gletscher-Erfahrung

in den Walliser Bergen doch noch niemals seinen Fuß in das Gebiet des Montblanc gesetzt hatte.

Finstere Nacht umgab uns, als wir die Hütte auf dem Mont Grétre verließen, um den Felsenpfad zu erklimmen, der zum Col du Géant emporsteigt. Aber die Sterne flimmerten mit seltsamem Glanz, und der Anblick zu ihrem fröhlichen Heer erhellte unser Gemüth und es hob unsere Hoffnung auf das Kommen eines schönen Tages. Schwerelos schritten wir durch die nächtliche Stille. Eigentümliche Empfindungen durchwogten unsere Brust, Empfindungen, wie sie sich in solchen Augenblicken ausdrängen, wo man einem noch unbekannten, von heber Alpenzinnen wirkenden Ziele entgegenzieht, und wo sich doch auch mit voller Macht der Gedanke an alle die Schwierigkeiten und Gefahren geltend macht, die bis zum letzten Schritte noch drohen, an alle die Zufälle, die am Ziele selbst noch den Genuß vereiteln können — ein leichter Nebel, der sich um die Gipfel lagert, ein eisiger Wind, der nur zu oft auf solchen Höhen bläst, das physische Unbehagen in Folge der Erschöpfung. Niemand tritt wohl eine solche Wanderung ohne eine gewisse in-

tere Erregung an. Mit Lust und zugleich auch mit Bangen wendet sich das Auge nach dem hohen Ziel, das kaum erkennbar am Sternenhimmel zu hangen scheint. Einend bleibt es an den dunkeln, riefenhaften Gebirgswänden haften, an denen sich der schwindende Pfad hinanziehen muß, und die in ihrem Schooße vielleicht noch manche gefährvolle Stelle bergen, deren Anblick, wenn sie plötzlich offenbar würde, selbst den kühnsten Wanderer zurückschrecken geeignet wäre. Wenn aber auch momentan wohl laise Bedenten das Gemüth beschleichen und eine ernste Stimmung erzeugen, der Reiz des Abenteuerlichen, der an der Wanderung haftet, der begeisterte Gedanke, sich in Räume zu erheben, wohin der Fuß nur weniger Menschen dringt, die Ahnung des herrlichen Genusses, der dort oben den glücklichen Sieger erwartet, wirkt immer wieder erheitend und erhebend. Der hehre Friede, der auf den stillen Höhen thronet, bringt Frieden auch in den erregten Geist. Der Muth beibt sich im Gefühl der oft bewährten physischen Kraft, und der Anblick der bezugewohnten, festen Trittes und in ruhigem Gleichmuth vordringenden Führer hebt das Selbstvertrauen und die Zuversicht.

## Das Herings-Aas.

Nach dem Dänischen des Axel Jøech.

Von Hermann Meier.

Erster Artikel.

Unter den nördlichen Heringefischereien ist die, welche im Frühjahr nördlich von Stavanger und Bergen betrieben wird, wegen des großen Fanges die interessanteste. Dieser betrug in den letzten Jahren 600,000 bis 1 Mill. Tonnen jährlich. Aber diese Heringe haben eine geringere Güte, als die, welche später, während der Sommers und Herbstmonate, an unsern nördlichen Küsten gefangen werden. Letztere sind ausnehmend fett und fett, und bei guter Zubereitung werden sie den englischen ganz, den holländischen fast gleich gestellt. Ein großer Nachtheil dieser Fischerei ist jedoch das Aas, welches den gefangenen Hering verdirbt und dadurch dem Lande großen Schaden zufügt, indem in einigen Jahren ein nicht geringer Theil des gefangenen Fisches hieturch für den Handel unbrauchbar gemacht wird. Erst in neuerer Zeit sind die Klagen hierüber lauter geworden, während man früher bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts wenig oder nichts darüber vernahm, obgleich schon damals die Fischerei großartig betrieben wurde. Doch läßt sich nicht daran zweifeln, daß der schädliche Einfluß des Aases den Fischern und Kaufleuten bereits bekannt gewesen ist; denn in den Handelsverträgen jener Zeit wird mehrfach erwähnt, daß die Heringe zu gewissen Zeiten des Jahres sich nicht zum Einsalzen eignen. Doch hielt man dies für eine göt-

liche Zügung, gegen welche menschlicher Rath nichts ausrichte.

Bestimmteres findet man in einer Beobachtung vom J. 1753, die in Folge lauter Klagen der Kaufleute über schlechte Breitung des Heringes erschien. In dieser findet man Folgendes:

„Da wir uns allernädhast haben berichten lassen, daß außer dem früher erwähnten nördlichen Hering zu gewissen Zeiten des Jahres weiter nach Süden in der Bucht Nordmør und Romsdal im Stift Drontheim, wie auch in der Bucht Sudmør und den übrigen des Stiftes Bergen eine große Menge Heringarten vorkommen, als Frühlingshering, Strohhering und Sonnenhering (Vaar-, Strang- oder Solhovesild), die meistens bis zum Januar und Februar bleiben, ferner Sommerhering (Sommersild), der mit St. Johannis kommt, und Herbsthering (Høstsild), der gewöhnlich um Michaelis erscheint, welche Heringarten von großem Nutzen für den Handel sein würden, wenn sie ordentlich behandelt würden, statt daß sie in einigen Jahren durch schlechte Behandlung unsern Unterthanen keinen Vortheil gebracht haben, wohl aber den Export bedeutend schädigten, — so wollen wir, daß es auf's Strengste verboten sei, daß kein Sommerhering, welcher Art auch, aus dem Reiz genommen, gefalzen und zube-

reltet werden soll, bevor er drei oder vier Tage im Netz geblieben ist, um indeß das schädliche Aas zu entfernen. Diese Methode, ihn im Netz zu halten, muß von Johanni bis Michaeli dauern, aber man muß sowohl diesem als jedem andern Hering so viel Raum geben, daß er auch, wenn das Netz an's Land gezogen wird, nicht sterbe."

Als diese Verordnung erschien, hatte die Heringsfischerei an den Küsten von Nordmör, Romsdal und Söndmör noch nicht den Umfang, den sie später erhielt, welches gewiß theilweise darin seinen Grund fand, daß nun der größte Theil der früher durch das Aas verdorbenen Heringe ein brauchbarer Handelsartikel wurde. Es scheint auch, daß die in der Verordnung gegebenen Vorschriften anfänglich besser befolgt wurden, als dies in dergleichen Fällen geschieht; das eigene Interesse der Kaufleute wird hier seine Rolle gespielt haben.

Schon vor dieser Zeit hatten die Holländer ihre Aufmerksamkeit auf den durch das Aas verdorbenen Hering gelenkt. Als die große holländische Heringsfischerei sich gegen das 17. Jahrhundert stark ausbreitete und die Anzahl der Schiffe, die daran theilnahmen, mehr als tausend betrug, suchten viele auch an der norwegischen Küste oder kauften dort Heringe.

Da der große Frühlingshering seit 1738 die Küste nördlich von Bergen verlassen hatte und die Concurrenz unter den Kaufleuten zunahm, wurde die Verordnung nicht mehr so genau befolgt als früher, und bald wurden wieder Klagen über die schlechte Zubereitung, u. a. auch darüber laut, daß Aas enthaltende Heringe in großer Menge eingefalzen wurden, und Viele verlangten jene Verordnung wiederum einzuführen. Man behauptete, daß es zu gewissen Zeiten nicht hinreichend sei, den Hering 3 Tage im Netz zu lassen, um ihn vom Aas zu befreien, daß dazu vielmehr 10 Tage erforderlich seien; ja, man wünschte sogar, daß zu gewissen Zeiten der Gebrauch des gewöhnlichen Netzes verboten werde und man statt desselben nur Treibnetze und Reusen gebrauchen solle, weil man meinte gefunden zu haben, daß der auf diese Weise gefangene Hering weniger Aas enthalte. Dies wurde auch von Prof. Ratke angeführt, als er im Auftrag der Regierung 1799 und 1800 die Fischerei an unsern Küsten untersuchte.

Der Vogt Blostrup zu Nordmör sagt in einer Anmerkung zum Plakat vom 29. Juni 1775, welches in dieser Beziehung ganz mit dem vom J. 1753 übereinstimmt, daß das Aas des Sommerwäme auf dem Boden oder aus dem Schlamm der See entstehe und den Fischen zur Nahrung diene, so daß es nicht möglich sei, sie davon zu reinigen. Das Wette (Welle, in jener Zeit keinen Fisch zu fangen. — Von Seiten der Gesetzgebung wurde wenig in dieser Sache gethan.

Wiewohl es also für unser Land von größtem Interesse sein mußte, das Aas des Heringes kennen zu lernen, so wußte man doch bis jetzt sehr wenig davon. Mit dem Worte „Aas“ bezeichnen die Fischer und Naturforscher alles, was dem Hering als Nahrung dient. Prof. Ström erwähnt dieses in seiner Beschreibung von Söndmör (Bd. I. S. 160), wo er sagt, daß es nur im Frühlings vorkomme, aber nicht jedes Jahr. Nach ihm würde es ein Wurm von rother Farbe sein. Nach ihm nennt auch Bod (Versuch einer vollständigen Natur- und Handelsgeschichte des Heringes, 1762) es ein wurmförmliches Thier. Später fand Ström (Norske, Vidensk. Selskabs Skrifter, Ny Samling, 1784) daß es kein Wurm, sondern eine Art Garneele sei, welches auch Fabricius annahm, der die Art als *Cancer ostageus harenium* bezeichnete. Auch Naturforscher anderer Länder haben das, was sie von der Nahrung des Heringes wußten, mitgetheilt. So nimmt Bloch (Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands, 1782) an, daß diese aus kleinen Schalthieren und Würmern bestehe, während Prof. Kroyer (Danmarks Fiske, III. p. 168) solche für eine Garneele (Mysis) hält. Im Magen des schottischen Heringes fand nach Valenciennes einige kleine Schalthiere aus der Ordnung der Copepoden gefunden, vorzüglich *Tispe furcata* und *Canthocamptus Stroemli*, und Prof. Münter sagt (Archiv für Naturgeschichte, 20. Jahrg. S. 306), daß die Hauptnahrung des Heringes an der pommerischen Küste aus *Cyclopsene castä* bestehe, die in gemischtem Wasser lebe.

Bei meinen Untersuchungen an unser Westküste habe ich Gelegenheit gehabt, das Aas der Heringe näher kennen zu lernen, da ich sie theils lebendig, theils mir zugesandt, und theils den Inhalt der Magen jener Fische untersuchte, die durch das Aas als Handelsartikel unbrauchbar geworden waren.

## Kleinere Mittheilungen.

### Die Literatur auf zoologischem Gebiete.

Zeit einigen Jahren wird durch eine Gesellschaft englischer Zoologen, welcher Dr. A. G. Günther vorsteht, ein Jahrbuch über die im abgelaufenen Jahre erschienenen zoologischen Schriften unter dem Titel: *The record of zoological literature* herausgegeben.

Die Jahrgänge dieses interessanten Werkes sind erschienen, der letzte über 1867. Wie geben nachstehend eine Recapitulation vieler Blattsseiten der dort verzeichneten Schriften, geordnet nach den Hauptabtheilungen des Thierreichs. Dem ersten Jahrgang gibt der Herausgeber nur das Endresultat an:

	1864	1865	1866	1867
Säugethiere	—	2400	3000	4030
Vögel	—	3500	4500	8340
Reptilien	—	1300	1000	710
Fische	—	3100	2400	1180
Wirbelthiere	—	4400	2000	6200
Schalthiere	—	1570	900	470
Sinnesorgane	—	490	1000	540
Insekten	—	14,300	11,000	13,000
Würmer	—	1250	1900	660
Schnecken	—	600	170	350
Gelenkthiere	—	750	500	70
Protozoen	—	1030	900	770
<b>Zusammen</b>	<b>25,000</b>	<b>34,610</b>	<b>29,930</b>	<b>36,390</b>

Das ergibt im Ganzen 125,920 Blattseiten oder 300 Bücher, jedes von mehr als 400 Seiten, darunter viele in Quart und Folio, die meisten mit zahlreichen Bildtafeln.

Wir haben noch hinzuzufügen, daß in obiger Aufstellung die Schriften über vergleichende Anatomie und Physiologie, sowie über Paläontologie nicht aufgenommen sind, und daß auch die zahlreichen populären Schriften darin fehlen.

#### Zwei Sonntage in einer Woche.

Bekanntlich verliert man auf einer Reise um die Erde, wenn man dem Laufe der Sonne folgt, einen ganzen Tag. Dasselbe geschieht natürlich auch, wenn Völker wandern, und wenn sie dann, nach entgegengesetzten Richtungen ausgezogen, inmittlen ihrer Wanderung etwa an den Ufern eines Meeres zusammentreffen und jedes seine gewöhnliche Zeitrechnung mit sich bringt und beibehält, so geschieht es, daß das eine seinen Sonntag feiert, wenn das andere noch seinen Sonnabend hat. Ein solches Zusammentreffen von Völkern von verschiedener Richtung war bei besonders an den Küsten des nördlichen Ozeans (Near?) stattgefunden, wo die Russen nach Osten, die Amerikaner nach Westen hin die Küsten erreicht haben, und wo es sich nun um so auffällender geltend macht, seit das frühere russische Amerika in den Besitz der Vereinigten Staaten Nordamerica's übergegangen ist, ohne daß man die alte russische Zeitrechnung aufgegeben hat. Ein gutgehabter Bürger America's hat es daher in seiner Nacht, sich zwei Sonntage in jeder Woche zu machen, neben dem allgemein gefeierten russischen auch noch den amerikanischen am Montag zu feiern. Freilich kann das auch für die Geschäfte recht störend werden. Kommt nämlich Jemand von San Francisco, wie eine californische Zeitung sagt, in Sitta, der Hauptstadt von Alaska, dem ehemaligen russischen Amerika, nach seiner Berechnung am Freitag Abend an, so findet er am nächsten Morgen dieäden geschlossen und alle Geschäfte unterbrochen. Er verliert dann nicht bloß diesen Tag, sondern auch den nächsten dazu, wenn er aus Gewohnheit oder aus Liebezeugung seinen Sonntag feiern will. Auf der andern Seite wird der fremde Kaufmann aus Alaska im heutigen Sitta mit wahrem Abscheu sehen, daß der gottlose Amerikaner am Sonntag Rattun mißt oder Pfeffer schneit, am Montag Morgen aber plötzlich ein reines Abend anzieht, einen schwarzen Frack anlegt, durch die Nase spricht und jene feierliche und selbstzufriedene Miene annimmt, die der nationale Ausdruck für religiöse Stimmung in Amerika ist.

C. U.

### Literarische Anzeigen.

Im Verlage von **Edward Ardenarius** in Leipzig erscheint auch für das Jahr 1870:

#### Literarisches Centralblatt für Deutschland.

Herausgegeben von Professor Dr. Friedr. Zarncke.

**Wöchentlich eine Nummer von 12-16 zweispaltigen Quartseiten. Preis vierteljährlich 2 Hlr.**

Das „Literarische Centralblatt“ ist gegenwärtig die einzige kritische Zeitschrift, welche einen Gesamtüberblick über das ganze Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit Deutschlands gewährt und in fast lückenloser Vollständigkeit die neuesten Erscheinungen auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft (selbst der Landkarten) gründlich, gewissenhaft und schnell bespricht.

In jeder Nummer liefert es durchschnittlich gegen 25, jähr. lich also wenigstens 1200 Besprechungen.

Ausser diesen Besprechungen neuer Werke bringt es eine Angabe des Inhalts fast aller wissenschaftlichen und der bedeutendsten belletristischen Journale, der Universitäts- und Schulprogramme Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz; die Vorlesungs-Verzeichnisse sämtlicher Universitäten und zwar noch vor Beginn des betreffenden Semesters; eine umfängliche Bibliographie der wichtigeren Werke der ausländischen Literatur; eine

Uebersicht aller, in andern Zeitschriften erschienenen ausführlichen und wissenschaftlich werthvollen Recensionen; ein Verzeichniss der neu erschienenen antiquarischen Kataloge, sowie der angekündigten Bücher-Auctionen; endlich gelehrte Anfragen und deren Beantwortung, sowie Personal-Nachrichten. Am Schlusse des Jahres wird ein vollständiges alphabetisches Register beigegeben.

Prospecte und Probennummern sind durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu erhalten.

Verlag von **Friedrich Vieweg und Sohn** in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

### Archiv für Anthropologie.

Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen.

Herausgegeben von C. E. v. Baer in St. Petersburg, E. Desor in Neuenburg, A. Ecker in Freiburg, W. His in Basel, L. Lindenschmit in Mainz, G. Lucae in Frankfurt a. M., L. Rütimeyer in Basel, H. Schaaflhausen in Bonn, C. Vogt in Genf und H. Welcker in Halle.

Unter der Redaction von **A. Ecker** und **L. Lindenschmit**.

Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten und lithographirten Tafeln. 4<sup>te</sup>. Fein Velinpapier. geb.

Dritte Band. Drittes und viertes Heft. Preis 4 Thlr.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 25 Bgr. (1 R. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 48.**

(Achtzehnter Jahrgang.)

Halle, C. Schwetcksche Verlag.

**1. December 1869.**

**Inhalt:** Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller. 12. Die arktischen Culturpflanzen. — Vom Montblanc zum Montroja, von Otto Ule. 11. Der Gol du Géant und seine Schneefelder. — Das Herings-Raß. Nach dem Dänischen des Axel Beck, von Hermann Reier. Zweiter Artikel. — Literarische Anzeigen.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 12. Die arktischen Culturpflanzen.

Wenn man die Dürftigkeit der Polargezone an Nahrungspflanzen erwägt, so tritt unwillkürlich ein Lächeln auf die Lippe, wenn man noch von einer Culturregion innerhalb derselben hört. Trotzdem ist sie vorhanden; und wie noch ein Saum von Wald das Polarland umringt, ebenso schlingt sich, wenn auch mit vielen Lücken, noch ein Saum von Culturland um dasselbe, die letzte Erinnerung an bessere Gefilde.

Ich habe in der That schon einmal Gelegenheit gehabt, auf das freundliche Bild zu verweisen, das man am Saume des Polarkreises in Lappland empfängt, wenn man von seinem äußersten Norden in den äußersten Süden tritt und nun statt der öden, baumlosen Flächen des Hochlandes auf Felder stoßt, die mit Wald und Wiese anmuthig gemischt, der Pflug umwühlt. Sowohl auf der norwe-

gischen, als auch auf der schwedischen Seite gewährt uns die frühe Gerste noch bis 70° N. dieses Bild; dort bis Eisevaten über Vosselap, hier bis Mattaringi oder Ober-Torneå. Sie ist das letzte Getreide, das rings um den Pol noch die meiste Aussicht auf Gedeihen findet, während in Lappland der Roggen an der Westküste schon bei 67°, an der Ostküste zwischen 65—66° N. zurückbleibt und in 6—7 Wochen reifen muß. Auf Island fügt sich zu beiden Getreidearten wohl auch der Hafer; aber selten reift eines von ihnen, und wenn es geschieht, nur wenigfältig. In einem Inselklima eignet es sich viel zu selten, das die letzten Wochen, auf denen das Reifen beruht, heiteren Himmel und ausreichende Wärme besitzen. Selbst in Lappland kehrt nur zu oft das trübste Bild erstorbenen Palmes ein. Grönland macht auch in seinen südlichsten Gegenden dies



sen Getreidebau unmöglich, obschon dieselben um 6 volle Breitengrade außerhalb des Polarkreises liegen. Hier und in Labrador liegt eben jenes Sommerältegebiet, das alles Reisen unterbrückt und die Baumgrenze so weit nach Süden (bis 58° N.) drängt. Dagegen rückt die Geste in Hudsonien mit der Zunahme des continentalen Klima's in nordwestlicher Richtung bis Fort Franklin (bei 65° N.) vor, bleibt also gegen Lappland um 5 Breitengrade zurück. Aber auch hier, und selbst noch um Fort Simpson (bei 61°), sind ihre Erträge ebenso unsicher, wie überhaupt auch in Canada über frühe und späte Nachfröste geklagt wird. In dem polaren Asien sind die Verhältnisse noch ungünstiger. An der Ostküste Sibiriens fällt aller Getreidebau schon in den niedrigen Breiten von 50° bis 58° N. hinweg, indem die Sommerwärme durch zu häufige Nebel, welche von einer kalten Strömung an der Küste hervorgehen sind, wesentlich erniedrigt wird. Nach dem Innern zu steigert sich die Möglichkeit des Getreidebaues bei höheren Breiten durch die Zunahme des continentalen Klima's ganz wie in Hudsonien, und man könnte ihn an der Lena wohl bis Jakuzk (62° N.) betreiben, sobald nur der Mal immer ein warmer sein wollte. So aber drängen ihn Frühfröste im Allgemeinen auf die Breite von 32° für das südöstliche Sibirien zurück, so daß hier die Getreidegrenze nördlich von Irkutsk und Nerchinsk liegt. Westlicher, nach dem Ural zu, erhebt sie sich allmählig darüber hinaus, so daß sie an den Westgrenzen Sibiriens bis 55° N. reicht. Im Finnland endlich, wo wir den Kreis um den Pol schließen, erlangt sie ihren dritthöchsten Punkt. Hier, in der alten Kornkammer Schwedens, reicht die Geste um einen vollen Grad über den Polarkreis hinaus, der Roggen bis Kemi (65° 48'), der Hafer bis 64° und 63°, während Kartoffeln die Geste bis zum Polarkreis begleiten.

Alles, was über diese curventreide Getreidebreite hinausreicht, gehört den Staudenformen an. An der schwedischen Küste verliert der Weiskohl schon zwischen 63° bis 61° die Fähigkeit, Köpfe zu bilden, obwohl noch Erbsen, Wicken und Bohnen reifen. Nördlicher wird ihre Reife zweifelhaft, und auch der Flachsbau bringt keinen Samen mehr. Bei Uleåborg (65° N.) kommen zwar noch kleine Obstgärten vor, aber der Hafer gedeiht häufig. Zwischen 65°—66° hat auch das ein Ende und der Hanf beginnt, unsicher zu werden, obgleich noch Gartenerbsen vorkommen. Am Polarkreis lohnt der Roggenbau nicht mehr die Mühe; doch gibt es noch Mohrrüben und Pastinaken. Zwischen 67°—68° kommen nur noch Kohlrüben und Meerrettig fort, obgleich die Stachelbeere noch bis 67° in Norrbotten reicht; das Leben des Menschen beginnt sich ausschließlich auf Viehzucht zu stützen. Bei 70° endlich schließen Rüben, Kartoffeln und Geste den Ackerbau. — Halten wir hiergegen die norwegische Westküste, so gibt es bei 63°—64° noch Äpfel (Granatapfel,

pommerscher Krummstiel), Kirschen, Pfäumen und Stachelbeeren an den warmen Küsten; bei 64°—65° noch Hafer, selbst einigen Weizen, Flachsbau, Erbsen, Bohnen, Hopfen; bei 65°—66° noch Hanf, Sommerroggen, Winterroggen (der freilich häufig misfrucht) und Kohl. Bei 66°—67° endet der Roggen; von da ab tritt die Fischelei als die Hauptbeschäftigung des Menschen auf; um Asten endet die Geste; auf der Insel Haapar (71° N.), an der äußersten Spitze des europäischen Festlandes, wachsen die letzten Gemüße. Hier sah Martins in dem wohlgepflegten Garten des letzten europäischen Kaufmannes sehr schöne Weißkohl und Kohlrabi; Erbsen liefern zuweilen ebare Schoten; Möhren und Runkelrüben erlangen die Dicke eines Zeigefingers; Salat, Kresse und Blumenkohl schlagen etwa alle 5—6 Jahre einmal ein. Immerhin ein glänzender Erfolg für ein Klima, das im Winter —8°, im Frühling —5°, im Sommer +6°, im Herbst +2°, im Mittel —1° C. besigt. Es muß hierzu bemerkt werden, daß diese Culturgewächse im hohen Norden weit breitere Blätter entwickeln, als in ihrer süblichen Heimat; eine Erscheinung, welche nicht allein von dem ewigen Tageslichte, sondern auch von der netreichen Luft dieser Gegenden herzuweisen ist. Aber ebenso muß man ausdrücklich wissen, daß in Lappland die Kartoffel nur in seltener Ausnahme einmal einen achtsachen Ertrag liefert und daß sie meist im October schon vor ihrer Reife ein Opfer der Herbstfröste wird.

Auf Island liegen die Verhältnisse noch viel herber. Frühjahrsfröste und kalte Sommer, besonders gegen den Herbst hin, machen selbst den Kartoffelbau zu einem Wagnis. Selten, daß sie größer als Wällnüsse und mehlig werden; häufig, daß sie nur die Größe einer Kirsche oder eines Pfefferkorns erreichen und natürlich einen ausgedehnten Anbau nicht lohnen. In der Regel zieht man sie darum in seinem kleinen Hausegarten auf gut Glück, was jedoch nur im Südwesten der Insel häufiger der Fall ist. In diesen Gärten baut man zugleich Kohlrabi, Stachelrüben, Rettig, Radieschen, Kohl der verschiedensten Art (Grün-, Kopf-, Blumenkohl), Kresse, Senf, Spinat, Salat, Petersilie, Erbsen, Zwiebeln, Thyman, Krausminze, selbst einige Bierpflanzen; gelbe Lupinen, Türkenbund, Kiese, blauen Sturmhut, Malven und Platterbäume. Das ist auch Alles, was die Natur der Insel hervorbringt, obgleich der Juli im Südtheile mit 13,4 N. dem September von Kopenhagen entspricht. Kohl ist deshalb weitaus das bedeutendste Gemüße, gegen das die andern nur wie Jergengewächse erscheinen. In dem eiligen, von Treibels häufig berührten Norden schrumpfen diese Ackerbauversuche auf Nichts zusammen.

Die gleichen Bedingungen wiederholen sich in Grönland. Ueberall von mächtigen Eismassen herüber, verliert die Sonne ihre Kraft; jeder Ackerbau ist vergebens. Zwar haben die dänischen Beamten vor ihren Häusern ebenfalls

kleine Gärten angelegt, die, gebüngt mit Erde aus alten Eskimo-Wohnungen, in den dortigen Eindrücken noch einen anheimelnden Eindruck üben. Ein Sommerhäuschen, wie es Robert Brown an der Discobucht zu Aktenbent sah; ein Salat-Bet, überzogen von einem Rebe gegen die Vögel; die grüne Gießkanne daneben; in den Stuben Geranien, Fuchsen, Rosen, Nasturien, Heliotrop, Epheu u. s. w., die freilich im Freien sterben würden, treu gepflegt von den Händen dänischer Damen: — das Alles kann, inmitten einer Wüste von Eisniet oder Granit und Hunderten von Eisbergen, für einen Augenblick die Illusion erregen, unter einem milden Himmel zu sein. Allein selbst die üppige Vegetation, unterstützt von freundlichen Klebewegen und andern Erinnerungen an eine entfernte Civilisation, Alles ist Schein. Unter 70° 40' N. kann man bei Dmenak im August wohl noch Salat, Grünkohl und Radieschen haben, aber weiße Rüben entwickeln sich nicht mehr zu nennenswerther Größe. Man muß folglich froh sein, wenn man diese Gemüse nur noch als Gewürze zu ziehen vermag, wie man Möhren, Zwiebeln und Petersilie als solche zieht. Bei Jacobshavn und Godhavn (69° 15' N.) zieht man unter treuer Pflege noch vorzügliche weiße Rüben und Radieschen, Grünkohl, Spinat, Salat, Kerkel; doch erlangt weder der Kohl noch der Kerkel je einen würzigen Geschmack. Weiße Wurzeln bleiben als solche fast unerkennbar und die Kartoffeln erreichen kaum die Größe beider, welche ohne Erde aus alten Knollen herauswachsen. Im Süden, i. B. um Julianshaab (etwas über 60° N.), ist man etwas günstiger gestellt. Hier, wo Ende Mai der Boden doch wenigstens einen Spatenstich tief aufthaut, kann man schon Anfangs Juni in trocknen Tagen eine Pflanzung wagen. Dennoch kommt die Kartoffel, auch hier ein Leckerbissen von hohem Werthe, nicht mehr zur Würde, obgleich man im Jahre 1855 eine Knolle von 7½ Loth zog; sie bleibt schlüffig und gibt eine dreis- bis vierfache Ernte. Weiße Rüben gedeihen am besten; man hat solche bis 3 Pf. schwer gezogen. Auch Möhren kommen gut fort; gelbe Rüben bleiben aber klein. Vortrefflich wachsen Salat, Spinat, Sauerkraut, Kohabarber und Kerkel; doch bildet der Kohl niemals Köpfe, Erbsen blühen noch, reifen aber nicht, selbst Petersilie hat nicht viel Arom. Nur in Treibbeeten, welche der Sonne sehr ausgesetzt sind, gelangen Erbsen und Gurken zur Entwicklung. Noch milder ist die Umgegend von Aktenau, südlich von Julianshaab; hier dürfen es die Missionäre wagen, sonst schwer durchzuwintende Flegeln, Schafe und Kühe zu halten, welche mitunter noch im November zur Weide geben.

Weit ungünstiger, als der Süden Grönlands, ist Labrador gestellt; seine Winter sind eisiger, seine Frühjahre später. Darum fällt die Befüllung der Gärten meist auf das Ende des Juni, während die Ernte schon im September geschehen muß. Trotzdem giebt man in guten

Jahren Rüben, Kohl und Kartoffeln noch ziemlich gut; letztere gaben zu Hebron (58° 15' N.), seit Menschengedenken freilich zum ersten Male, im J. 1857 reichlichen Ertrag und Knollen von 12—20½ Loth. — In Hudsonien reicht die Kartoffel mit der Gerste am Mackenzie bis zum 85° n. Br.; kein Wunder, daß auch die Kohlarten und Wurzelgewächse bis zu den nördlichsten Forts der Hudsonbaygesellschaft (Rüben noch bei Fort Good Hope, 67° N.) gezogen werden. Selbst an den westlichsten Küsten des ehemals russischen America's sind Kohl, Rüben und Kettige das letzte Gemüse am Nortonfund, wie an der nordöstlichen Spitze Sibiriens zu Nischne Koisinet (69° N.) Radieschen und Kohl, der aber auch keine Köpfe mehr bildet, es find.

Unter so dürftigen Verhältnissen muß man sich wundern, daß der Mensch in jenen hohen Breiten überhaupt noch im Stande ist, seine Speisen zu kochen, da er, wenn er nur auf das letzte Gestrüpp angewiesen wäre, dieses, welches so langsam wächst, bald ausgerottet haben würde. Auf Island hilft das Treibholz aus, wenn es an anderem Feuerungsmateriale fehlen sollte. Doch erzeugt die Natur, wenn auch langsam, bei dem sich verzögernden Verwesungsproceß der Pflanzgen, ihre Fortsager, und diese sind es, welche in den baumlosen Polarländern das Brennholz ersetzen. Auf Grönland wird der Torf nach Kink zwar weniger gut, als in der gemäßigten Zone, allein, er brennt und holt, besonders wenn man ihm von dem Gestrüpp des Porfies (*Ledum Groenlandicum*), der Cassiope, der Weiden und Zwergbirnen oder etwas Treibholz zusetzt. Das bezieht sich freilich nur auf die civilisirten Ansiedler des hohen Nordens. Der eingeborene Mensch weiß nichts oder wenig von dieser Zubereitung und bezieht sich lieber des Robbenspeds. In jeder Beziehung ist der Polarmensch auf das Fleisch angewiesen; und befasse er es nicht, die Pflanzennwelt würde nicht im Stande sein, ihn von einem Cannibalismus zurückzuhalten, in den er sicher verfallen müßte, wenn sie nur die Grundlage seines Daseins bilden sollte. Eine Thatfache, in der sich der Vegetarianismus unserer Zeit seltsam abspiegelt.

Nur an dem äußersten Saume der Polarzone zeigt sich darum noch ein Culturleben, welches dem in südlicheren Breiten einigermaßen ähnelt. Als das Erbaunste muß man verzeichnen, daß der Mensch, soweit er es nur immer vermag, einen Drang in sich fühlt, nicht allein die gewöhnlichen Culturpflanzen, sondern auch die Bierzgewächse mit sich zu führen, so weit er vordringt. Auf Grönland haben wir diese Blumentheile in fast ergreifender Form noch unter den ungünstigsten Verhältnissen pflegen. In Schweden dagegen, unter einigermaßen heiteren Bedingungen, schließen sich in der Provinz Norrbotten unter 66° n. Br. selbst die Sträucher an, wie wir durch Kingius (in Anderfson's *Aperçu de la végétation*

et des plantes cultivées de la Suede) erfahren. Hier pflügt man noch neben der Stachelbeere die letzten Anklänge an Mittelschmeden: den Spitzkorn, die Linde, den schwedischen Heißbeerbaum (*Sorbus scandica*), die Weigeltirische (sogar noch als Baum, die Haselnuß, das Pfaffenbüchchen und das blaubeerige Gaisblatt (*Lonicera coerulea*). Aber nicht genug damit, hat es der Mensch gewagt, selbst fremde Länder (Nordeuropa, Nordamerika, Sibirien, Japan) tributär zu machen; und so findet man noch mit Erstaunen Felsenmispeln (*Amelanchier botryapium* Dec.) ihre Früchte reifen, die Balsampappel, die virginische Pflaume (*Prunus Virginiana*), den Erbsenbaum (*Caragana arborescens*), Kornelkirschen (*Cornus alba stricta*, *Sibirica*), Flieder (*Syringa vulgaris*), Delweiden (*Elaeagnus macrophylla* Thbg.), Rothbörn (*Crataegus sanguinea*), Alpenkaisblatt (*Lonicera alpigena*) und an-

dere Verwandte (L. tatarica, Ledebourii Eschs.), Berberis (*Mahonia aquifolium*), Goldbeere (*Ribes aureum*), Brombeere (*Rubus odoratus*), Zwergmandel, Spiersträucher (*Spiraea acutifolia*, *alpina* Pall., *salicifolia*, *sorbillifolia*), wilder Wein, Deuglen (*D. gracilis*), Wintergrün (*Vincetoxicum*), Aberraute (*Artemisia Abrotanum*). Regelmäßig erstieren leider: die Rosskastanie, verschiedene Pappeln, Esche, Ulme, Weißbörn, Alpenböhnenbaum (*Cytisus alpinus*), Liguster, süße Berberis (*Berberis dulcis*), *Symphoricarpos racemosa* u. A. Wie sie aber auch geüben mögen, so sind sie doch treue Zeugen dafür, daß selbst bis in das Polarland hinein der Mensch den Kampf mit der harten Natur nicht aufgibt und daß er ihr Dinge abtrotzt, die wir in gemäßigteren Breiten um so höher veranschlagen müssen, als auch uns dieser Kampf, obgleich unter freundlicheren Verhältnissen, keineswegs erspart wird.

## Dom Monterosa zum Montblanc.

Von Otto Ull.

### II. Der Col du Géant und seine Schneefelder.

Es war ein schmaler, feinstiger Fußpfad, den wir verfolgten, und im Dunkel der Nacht gehörte ein sehr kundiges Auge dazu, ihn aufzufassen. In der That verlieren wir ihn auch bereits nach der ersten halben Stunde, und mußten uns mühsam durch das niedrige Alpenrosengestrüpp emporarbeiten. Allmählig jedoch begann es sich im Osten zu lichten; links vor uns trat nun das weiße Antlitz des Montblanc hervor, und sein Widerschein warf nur ein milches Licht über die farblose, von düsterem Dämmerchein des graubenden Morgens umfängene Gegend. In diesem Lichte wurde es uns möglich, auch den verlorenen Pfad wiederzufinden, wenn es überhaupt noch eines solchen auf dem schmalen Terrain bedurfte, das der Rücken des Mont-Gréto hier darbot, dessen Flanken zwei Gletscher bedrängten, rechts der Glacier du Mont Gréto, links der Glacier d'Entrèves. Immer entzündender entwickelte sich das Schauspiel über uns. Die stolzen Gipfel des Montblanc begannen sich im Schimmer der aufgehenden Sonne zu röthen, und als diese endlich ihren vollen Glanz auf die Schneefelder warf, schienen wahre Lichtfluthen dem Montblanc gleich einer zweiten Sonne zu entströmen.

Jetzt standen wir vor der letzten Schanze der gewaltigen Felsenburg, die wir erklimmen sollten. Man täuscht sich gewöhnlich über die Neigung steiler Gebirgsabhänge und spricht gern schon von senkrechten Abstürzen, wo die Neigung kaum 45° erreicht. In Wirklichkeit gehören Abhänge von 45° Neigung zu den allersteilsten und pflügen nur ausnahmungsweise erstiegen zu werden. Hier war diese Grenze freilich erreicht und in den letzten hundert Fuß sogar überschritten. Wir standen vor einer Felsenwand, die aus dem eigenthümlichen, Protogyn genannten,

an Tzapfen und Bergkristallen reichen, in mächtige Blöcke gespaltenen Gneis-Granit besteht und sich wie eine Festungsmauer himmelhoch vor uns aufbäumte. Es war in der That ein rauher Weg. Bald mußten wir uns auf schmalen Vorsprüngen an tiefen Abgründen hin um glatte Felswände herum winden, bald in den Klüften und Furchen, welche die Natur gegraben, mit Hüfte der Hände uns aufwärts schieben, bald auf den jاذigen Kanten des kalten Gneis emporklettern. Rechts lag wohl 3000 F. tief unter uns der Gletscher des Mont Gréto, und so sah wir hier der Abzuz, daß, wenn wir uns das Vergnügen machten, einen großen Portogenblock am Wege abzulösen und in die Tiefe zu stürzen, er nur einmal an der Felsenwand aufschlug und dann, in tausend Bruchstücke zerfallend, mit gewaltigem Krachen auf den Gletscher niederprasselte. Die größte Vorsicht mußte beobachtet werden, wenn unablässig unter den Füßen eines Vorankletternden ein Stein sich ablöste, und mehr als einmal mußte ich mich hurt an die Felswand drücken, um einem über meinem Kopf herabpolternden centnerschweren Blocke auszuweichen. Bei schwindelstreichem Kopf und der nöthigen Vorsicht war indeß keine ernstliche Gefahr vorhanden. Ich will freilich gern einräumen, daß ein Absteigen auf diesem Wege denklicher sein mag, weil man es dann nicht vermeiden kann, beständig den Blick in die schwindelnde Tiefe zu richten. Im Aufwärtsschreiten blühten wir nur hin und wieder und dann mit stiller Lust in den Abgrund, der sich zu unsern Füßen öffnete, und dessen zunehmende Tiefe für uns der Maßstab war, wie wir Schritte für Schritt dem Ziele näher kamen; aber freudiger noch richteten wir das Auge empor zu den weißen Gipfelfeilen,

die in stets mächtigerer Zahl vor und über uns auftauchten.

Endlich — es war 7¼ Uhr Morgens — war die Höhe erreicht. Hier unter dem Schutze einer Felsenmauer, welche die über die Schneefelder des Montblanc herabstehenden kalten Winde von uns fernhält, hoch über dem Abgründe, in dessen Tiefe der Gletscher des Mont Gréty in den Strahlen der Morgensonne glänzte, hielten wir Rast, um unser frugales aus Brod, Käse, Hammelfleisch und Wein bestehendes Frühstück einzunehmen. In weitem Horizonte dehnte sich vor uns eine herrliche Gebirgsweit aus. Gipfel an Gipfel, wie ein wogendes Meer erhoben sich gegen Süden die Schneegebirge Savoyens bis fernhin zum Mont Cenis, durch dessen gewaltige Masse hin zieht die menschliche Kunst die bewunderungsmürbige aller Straßen bohrt. Aber nicht der Blick in die Ferne und nicht die ungeheure Ausdehnung des Gesichtskreises ist es, die der Aussicht von solchen Höhen ihren eigenthümlichen Reiz verleiht, sondern gerade der Blick auf die näheren Umgebungen und ihre riesenhaften Verhältnisse. Wer darauf gerichtet hat herrliche Fernsichten zu bewundern und ein prachtvolles, durch seine Unbegrenztheit imponirendes Panorama sich entfalten zu sehen, wird sich fast immer enttäuscht finden. Je höher der Standpunkt, desto enger zieht sich der Kreis eines klaren und scharfen Ausblicks zusammen. Die Umrisse der Gebirgsketten, die den fernen Horizont umfäumen, sind unbestimmt, ihr Gewand ist farblos, ihre zahllosen Gipfel sind so zu chaotischen Gruppen in einander geschoben, daß ihnen jeder malerische Effect abgeht und nur unter den allgünstigsten atmosphärischen Verhältnissen es möglich ist, ihr Detail zu entziffern. In der näheren, klareren Umgebung, in dem stolzen Gipfelkreise, der den Standpunkt des Schauenden umgibt, in den schwindelnden Abgründen, den tief eingeschnittenen Thälern ringum, in der Gletscherpracht, die dem Auge entgegenleuchtet, liegt das Charakteristische des Hochgebirgs-panorama's, entfaltet sich die ganze Fülle seiner erhabenen Bilder. So war es auch hier auf der Höhe des Col de Géant, c. 11,000 Fuß über dem Meere, der Blick in die Abgründe zu unsern Füßen, in die Tiefe der Aölle blanche und des Val de Férret, der uns unablässig fesselte. Da reichte sich Gletscher an Gletscher bald von der jähren Felswand schreckhaft niederhangend, bald den Fuß in das grüne Thal legend oder in den Furten eines Sees badend. Vor uns öffnete sich die Schlucht von Courmayeur, dessen freundliche Häuser uns aus frischem Grün entgegenblickten. Darüber hinaus dehnte sich das Thal von Aosta uns gegen den Horizont hin allmählig in nebligem Grau verschwimmend, aber doch für die Phantasie wenigstens durch die in seinem Schooße geachteten Dörfer und Städte den Contrast gegen die nahe Eis- und Schneewelt setzend. Denn diese Eismwelt, die gegen Norden

hin den ganzen Horizont einnahm, so greßbar nahe überdies, daß man jeden Steinblock, jede Spalte darauf erkennen zu können meinte, bildet doch den großartigsten Theil dieses Hochgebirgs-panorama's, eines der großartigsten Bilder überhaupt, das sich auf Alpenpisten darbieten möchte. Dort zur Linken lag das weiße, ehrwürdige Haupt des Montblanc, dem sich die schroff abfallenden schwarzen Felsen der Monts maudits angeschlossen. Weiterhin folgten, aus unabsehbarer Schneemasse aufragend, die nackten Eispfelsgaden des Montblanc du Tacul, der Aiguille du Midi und der Alg. de Malitère. Rechts startete uns in erschreckender Nähe, einem riesigen Gemshorn ähnlich, die nackte, schwarze Nadel der Aiguille de Géant entgegen und dahinter folgten die wild zerfissenen Gipfel der beiden Jorassen, des Mont Rallet, der Alg. du Moine, Alg. de Dru und Alg. Verte. Es war eine unabsehbare Wildniß von Eis und Schnee, von schwarzen, zackigen Nadeln und Hörnern, die sich dem Bilde darbot, und die an Großartigkeit wohl kaum irgendwo in den Alpen übertroffen werden möchte.

Aber so fesselnd auch der Anblick sein mochte, wir mußten uns nach halbständigem Genuße bereit zum Abschied entschließen. Wir hatten zwar den Gipfel des Passee erreicht, aber bei weitem noch nicht den Gipfel der Anstrengungen und Gefahren. Noch lag ein weiter, mühevoller Weg vor uns, über die Schneefelder und Gletscher, die in das Thal von Chamounix hinabführten. Wenige Schritte über die schützende Felsmauer hinaus genügten, um uns die Größe der noch bevorstehenden Aufgabe zu vergegenwärtigen. Unabsehbar dehnten sich die Schneefelder vor uns und seitwärts, hier zum Montblanc, dort zur Aiguille de Géant aus, nur unterbrochen von vereinzelt schwarzen Klippen und Graten. Eiskalt wehte der Wind uns entgegen und zwang uns, zu Plaids und Handschuhen die Zukunft zu nehmen. Unheimlich dunkel, fast grauschwarz, erstahen über uns der völlig wolkenfreie Himmel, so daß es mich fast in Verwunderung setzte, nicht jeden Augenblick das Heer der Sterne daran hervorstechen zu sehen. Wenn auch der erste Theil der Wanderung über die Schneefelder völlig gefahrlos war und mehr das Gepräge eines Spazierganges trug, so gebot doch die Vorsicht uns durch Stride an einander zu binden. Man hat zwar oft dieses Anbinden für zwecklos oder gar gefährlich erklärt und sich namentlich auf die Kastastrophe, die sich vor einigen Jahren bei Befestigung des Matterhorns ereignete, bezogen, bei welcher 3 Personen durch den Sturz des Eises in den Abgrund gerissen und die Uebrigen nur durch das Zerreißen des Seiles gerettet wurden. Bei einer Wanderung über Gletscher aber wird man schwerlich die Nothwendigkeit dieses Anbindens bestreiten können. Der vereingelte Wanderer ist jeden Augenblick der Gefahr ausgesetzt, in eine vorber-

gene Spalte zu fallen und dann mit seltenen Ausnahmen unrettbar verloren. Verbindet ihn aber das Seil mit seinen Gefährten, so hat ein Sturz in verborgene Spalten gar keine Bedeutung, da er durch das Seil entweder von vornherein vor einem eigentlichen Sturze bewahrt wird, oder doch sein Herausziehen aus der Spalte mit Leichtigkeit bewirkt werden kann. Für uns war es immer nur eine Veranlassung zur Hülfsleistung, wenn Einer oder der Andere plötzlich vor uns mit einem Fuße oder auch mit halbem Leibe in einer unter dem Schnee verborgenen Spalte verschwand. Allerdings muß man darauf achten, daß das Seil zwischen den einzelnen Wandern stets gespannt erhalten wird und daß Jeder das ihn mit seinem Vordermann verbindende Seil fest in der linken Hand hält, damit er nicht von einem Sturze desselben überrascht und selbst umgerissen werde. Auch wir erhielten in dieser Beziehung eine Lehre, als wir ein ziemlich steil abfallendes Schneefeld in schräger Richtung durchschritten, an dessen Rande sich ein breiter und vielleicht mehrere hundert Fuß tiefer Firsenslund hinzog. Der Schnee war mit einer harten Eiskruste überzogen, und es mußte daher mit dem Bell einige hundert Stufen gemacht werden. Einer meiner Reisebegleiter, dessen Wangel an Gewandtheit wir schon bei der Besteigung des Col du Géant kennen gelernt hatten, fiel bei dieser Gelegenheit und riß die vor und hinter ihm gehenden Führer in Folge ihrer Unachtsamkeit mit sich, so daß mit Ausnahme des ersten Führers meine sämmtlichen Vorderleute in ziemlich schnellem Tempo die Schneeflächen hinabstürzten. Ich selbst war bei der Vorlesie im Zuge und war aufmerksam genug gewesen, so daß ich durch Anziehen des Seiles den ganzen Zug wieder zum Stillstand zu bringen vermochte und der Unfall ohne ernsthafte Folgen verlief. 2 1/2 Stunden

den Schritten wir über die Schneefelder hin, nur selten breitere Spalten und Klüfte überspringend und kaum von erheblichen Gefahren bedroht, obwohl auch ein Sturz auf diesen Schneefeldern wegen der empfindlichen Verletzungen, die man sich an den scharfen Eiskanten und harten Schneekrusten zuziehen kann, für das weitere Fortkommen leicht bedeutend werden mag. Die Felssteile verliefen uns keinen Augenblick, und von Müdigkeit empfand ich wenigstens in der wunderbar reinen Luft dieser Höhen keine Spur. Selbst der Glanz, der von den vollen Sonnenstrahlen beleuchteten Schneefläche befallte mich in keiner Weise, obgleich ich die sonst gebotene Vorsicht versäumt hatte, mich mit einer schützenden Schneeröhre oder einem grünen Schleier zu versehen. Trotzdem ich fast 10 Stunden auf Schneefeldern und Gletschern zubrachte, habe ich nicht die geringste nachtheilige Folge davon getragen. Doch möchte ich Andern keineswegs rathen, diese Vorsicht zu unterlassen, da nur zu häufig eines der empfindlichsten und schmerzvollsten Uebel, die Schneebblindheit, als Strafe einzutreten pflegt, die, wenn sie auf der Wanderung selbst bereits sich einstellt, in den gefährlichsten Lagen, in die man bei einer Herabsteigen durch die sogenannten Seracs des Gletschers geräth, höchst bedenklich werden kann. So harmlos also auch der erste Theil unsrer Wanderung über die Schneefelder des Col du Géant verlief, so frei und unbengt sie unsern Blick für die großartigen Schönheiten dieser wilden Hochgebirgsnatur ließ, die Schrecken einer Gletscherwanderung sollten wir in um so stärkerem Maße kennen lernen, als wir die Gegend der Seracs betraten. Bevor ich jedoch diese abenteuerliche Wanderung schildere, muß ich den Leser mit der Natur des Gletschers, namentlich seiner oberen Partien und der Ursachen und der Art seiner Zerklüftung näher bekannt machen.

## Das Herings-Aas.

Nach dem Dänischen des Axel Voeck.

Von Hermann Meier.

Zweiter Artikel.

Die Fische vertheilen das Aas in dreierlei Arten und nennen es Rothaas (rødtaas), Gelbaas (gulaa) und Schwarzaas (svaltaas) oder Krutaas (Krutaa). Diese Namen verdankt es theils der Farbe des lebendigen Aases, theils der der Korbstoffe des Herings. Da diese verschiedenen Aasarten aus sehr verschiedenen Thierformen bestehen und nicht alle gleich schädlich für die Zubereitung des Herings sind, so will ich über jede einzelne Art im Besonderen sprechen. Das Rothaas ist das meist gewöhnliche und darum auch das am meisten bekannte. Man findet es längs der ganzen Küste Norwegens und am häufigsten in den Mündungen der Bufen, während es dagegen im Wasser der Bufen selbst und in offener

See weniger gefunden wird, als ob es mit der Tiefe stets abnehme. In gewissen Zeiten des Sommers kann es in so unglaublicher Menge sich zeigen, daß das Meer in großer Ausdehnung davon roth gefärbt wird.

Vor einigen Jahren hatte ich bei Mandal Gelegenheit, diese Erscheinung zu sehen und zu untersuchen. Nachdem es längere Zeit ruhiges Wetter gewesen war, sah ich längs der Ufer des Eliands, aber durch einen ziemlich weiten Raum davon getrennt, einen breiten, roth gefärbten Gürtel. Die Fischer sagten mir, daß die Farbe vom Rothaas (rødhaas oder rødtaas) erzeugt werde und zeigten mir, wie Scharen von Matrelen sich daran nährten, während Fischer mit großen Netzen beschäftigt waren, diese

Fische zu fangen, die merklich weniger scheu waren, als sonst. Ich nahm eine große Anzahl der Thierchen, die diese Farbe erzeugten, aus der See auf und fand, daß es lauter kleine Copepoden waren. Die größten waren kaum  $\frac{1}{4}$  Linie lang und nur mit Mühe dem Auge sichtbar. Besonders fand ich Repräsentanten von Calanus, Eukalanus, Centropages und Anomalocera. Man kann es kaum glauben, daß so winzige Thierchen von solchem Interesse für die Wohlfahrt eines Landes und seiner Bewohner sein könnten; aber in der That verdanken die Kraken und die Herbstheringe diesen Thiere ihre Fettigkeit, denn innerhalb ihrer dünnen Schale sieht man mittelst des Mikroskops das Fett in deutlichen Streifen zwischen Muskeln und Eingeweide.

Bei Epibergen findet man diese Thierchen in so unglaublicher Menge, daß viele Schwämme sich davon nähren und im südlichen Eismeer dienen dergleichen Organismen sogar den Walfischen als Nahrung.

Wenn nun der Hering eine große Quantität von diesem Kothaas verschlungen hat und dann gefangen und getödtet wird, ohne es vollkommen verdaut zu haben, dann beginnt das Aas im Magen der Fische zu faulen, noch bevor es vom Salz erreicht wird. Der Magen selbst geht ebenfalls in Gährungs über und auch das große Blutgefäß, welches unter dem Rückgrat liegt; der Farbestoff des Blutes färbt das Fleisch am Rückgrat roth. Darum wurde beobachtet, den Hering drei Tage im Netz zu lassen, damit alles Futter verzehrt werden könne, während der Fisch kein neues erhalten konnte. Letzteres kann indeß doch stattfinden, wenn Sturmwinde das Aas in das an Pfählen befestigte Netz treiben und der hungrige Fisch macht sich natürlich diese Gelegenheit begierig zu Nutze und verschlingt, was in sein Reich kommt. So kann also auch diese Vorsehung ihren Zweck versehen und Viele, die den eigentlichen Hergang der Sache nicht kennen, glauben machen, daß ganz andere Ursachen herrschen und daß deshalb dergleichen Vorschriften völlig unnütz seien.

Wenn der Hering gebrüdt wird, entleert er gelbe Kothstoffe; man sagt dann, daß er Gelbaas (gulant) gegessen habe. Dies Aas ist nicht so vielasch und ich habe keine Gelegenheit gehabt, es in der See zu sehen; doch haben Gespräche mit alten Fischern mir die Ueberzeugung gegeben, daß auch diese Aasart vorzugsweise aus ganz durchsichtigen Copepoden bestehe, zum Theil vielleicht hauptsächlich aus Larven von Ringelwürmern und andern Würmern, die in unglaublicher Menge an unser Küste vorkommen können. So hat mir Prof. Chr. Voed die Mittheilung gemacht, daß man bei Christiansand die Oberfläche der See mit kleinen Würmchen von etwa  $\frac{1}{4}$  Linie bedeckt gesehen habe; sie schwammen lebendig umher vermöge gewisser Haare, die gürtelweise um ihren Leib standen. Diese Thierchen waren schon hindurch entwickelt, um den Ringelwurm (*Leucodore ciliata*) darin

zu erkennen. Die Fischer erzählten mir, daß diese Erscheinung keineswegs selten sei und daß Heringe und Kraken sich von diesen Thierchen nähren, so daß das Gelbaas größtentheils aus seinen Nadeln bestehe; gewiß nichts Anderes, als die Würmenbündel, mit welchen solche Ringelwürmer-Larven bedeckt sind. Diese Aasart ist für den Hering bedeutend weniger gefährlich, weil es in kurzer Zeit verdaut wird.

Schwarz-Aas (svariant) ist dagegen das gefährlichste aller Aasarten. Man nennt es auch Krantaas (Krutaan), weil man es im Meere als kleine Körnchen sieht, die sich an der Oberfläche bewegen, aber bei der Berührung sofort untersinken. Dieses Aas muß besonders in regelmäßigen Jahren vorkommen, wenn die Witterung eine kurze Zeit schön und hell war. Der Hering, der sich damit genährt hat, wird für das Einsalzen als ganz untauglich gehalten, sogar dann noch, wenn man ihn länger im Netz läßt, als vorgeschrieben ist; denn der gefasene Fisch riecht auch dann noch abschaulich, wenn der Magen mit dem Aas entfernt ist. Im vorigen Jahre erhielt ich durch Vermittelung des Ministers des Innern eine Quantität dieses sogenannten Krantaas, welches aus gefangenen Heringen genommen und theils in Spiritus, theils in getrocknetem Zustande bewahrt war. Als ich die Spirituslösung öffnete, stank die Feuchtigkeit. Der Geruch erinnerte mich an den von faulenden Schnecken. Der Inhalt bestand aus einem zähen, dunkel gefärbten Schleim, in welchem viele kleine Schneckenhäuschen zerstreut lagen, die größtentheils noch unbeschädigt waren, während kleine Theile derselben auf dem Boden der Glaske lagen. Als ich nun jene Schalen unter dem Mikroskop betrachtete, erkannte ich sofort jene Schalen, die ich früher in großen Massen an einem südlicheren Theile unsrer Küste gesehen hatte. In der Straße zwischen Karmö und dem Festlande sah ich nämlich eines Tages im Monat Juli, als der Strom nicht besonders stark war, daß die sonst helle See streifenweise dunkel gefärbt sei, und in der Nähe des Strandes zeigte sich die Farbe noch stärker. Ich schöpfte mir Wasser mit diesem gefärbten Stoff und fand nun, daß dieses ausschließlich aus kleinen Schnecken bestand. Es waren lauter Junge einiger zwischen dem Seegrass lebenden Arten von Rissoa. Sie schwammen vermöge zweier mit Härchen besetzter Schwimmklappen; die durchscheinende Schale hatte 3 bis 7 Windungen. Sie waren etwa  $\frac{1}{4}$  Linien lang und ziemlich breit, besonders wenn sie die Schwimmklappen ausgebreitet hatten. Bei Berührung zogen sie diese sofort in die Schale zurück und sanken zu Boden. Sind diese Thiere ganz ausgewachsen, dann haben sie die Schwimmklappen verloren und kriechen vermittelst eines großen Fußes im Seegrass umher. Bei der Vergleichung der von mir von Karmö mitgebrachten Jungen der Rissoa mit dem mir zugefandenen Krantaas aus den Magen der Heringe, fand ich, daß

beide vollständig übereinstimmen. Des Krutaas besteht also aus kleinen Schneckenlarven, welches später durch verschiedene Fische und Kauffleute, die ich danach fragte, bestätigt wurde.

Warum dies Krutaas gefährlicher ist als die andern Aasarten, läßt sich leicht begreifen, wenn man die Zusammensetzung dieser Thiere betrachtet. Während die Schalen der Thierchen, die das Krutaas bilden, ziemlich dünn und die Körperchen der das Geisbaas bildenden Thierchen ganz weich sind, ist dagegen der Körper des Schwarz-aases ganz durch eine Schale bedeckt, die von den Verdauungsorganen nicht angetastet wird, so daß allein die äußersten Körpertheile, die Schwimmklappen, rascher verdaut werden, aber die übrigen innerhalb der Schale liegenden Theile müssen in Säure übergehen. Darum muß auch das Fleisch solcher Fische sinken, sogar dann noch, wenn sie Zeit haben alles Unverbaute von sich zu geben; auch dann, wenn das Thier nicht verwest, hat es schon einen unangenehmen Geruch, der sich dem Fleische des Fisches mittheilt, der es verschlungen hat. Darum würde

eine Austreibung des Magens wenig helfen, denn die abscheulich riechende Feuchtigkeit hat bereits den Körper des Fisches durchdrungen.

Schließlich tritt an uns die Frage heran: warum nähren sich Sommer- und Herbsthering von diesem Aas, nicht aber der Frühlingshering oder der, den die Holländer auf offener See fangen? Denn beide werden ohne Zögern, sofort zubereitet. Die Gründe sind einzig und allein darin zu suchen, daß die Frühlingsheringe und die der Holländer zu der Zeit gefangen werden, wenn der Trieb der Fortpflanzung und das Auffuchen geeigneter Stellen für die Entwicklung ihrer Jungen sie leitet. In dieser Zeit scheint die Nahrungsfrage auf 0 oder eben nur darüber zu stehen; ich habe in den Frühlingsheringen stets nur sehr geringe Futterreste angetroffen, die vor längerer Zeit eingenommen waren. Sommer- und Herbsthering ziehen dagegen, um Futter zu suchen, weil sie gerade in dieser Zeit Jagd machen können auf die alldann in großen Massen erscheinenden Larven niederer Thiere, die an der Oberfläche des Meeres schwimmen.

## Literarische Anzeigen.

Verlag von D. F. Voigt in Weimar.

### Winterflora

oder  
Anleitung zur künstlichen Blumenzucht und  
Freibkultur in Glashäusern und Zimmern  
im Winter.

Nebst Kulturangabe und Beschreibung der schönsten, naturgemäß  
im Winter blühenden Pflanzen.

Von H. Jäger,

Großherzog. Gd. Hofgärtner.

Dritte umgearbeitete und sehr vermehrte  
Ausgabe.

1870. Elegant gebunden. — 27 Sgr.

Vorwiegend in allen Buchhandlungen.

In der C. F. Winter'schen Verlagsbuchhandlung in Leipzig  
und Heidelberg ist soeben erschienen:

**Baron Carl Claus von der Decken's  
Reisen in Ost-Afrika. Dritter Band:**  
Wissenschaftliche Ergebnisse. Erste Abtheilung:  
Säugethiere, Vögel, Amphibien, Crustaceen, Mol-  
lusken und Echinodermen. Bearbeitet von W. C.  
H. Peters, J. Cabanis, F. Hilgendorf, Ed. v. Martens  
und C. Semper. Mit 35 lithographirten Tafeln, zu-

meist in Buntdruck. Lex.-8. Cartonirt. Preis  
13 Thlr. 10 Ngr.

Die vorstehende Abtheilung des von der Decken'schen  
Reisewerkes enthält die Bearbeitung aller von dem Reisenden  
und seinen Begleitern gesammelten Thiere — ausgenommen der  
Insekten, welche in einer besonderen Abtheilung beschrieben  
sind — sowie die Abbildungen der meisten neuen und einiger  
noch nicht bildlich dargestellten Arten der Sammlung. Einen  
erhöhten Werth, namentlich auch für spätere Erforscher jeder  
Gegend, erhält das Buch durch die Beigabe von *faunistischen  
Uebersichten*, in denen alle bisher im äquatorialen Ost-  
Afrika beobachteten Arten der angezogenen Thierklassen zu-  
sammengestellt sind, begleitet von Notizen über die geographi-  
sche Verbreitung derselben.

In der C. F. Winter'schen Verlagsbuchhandlung in Leipzig  
und Heidelberg ist soeben erschienen:

**Heuglin, M. Th. v., Reise in das Ge-  
biet des Weissen Nil und seiner west-  
lichen Zuflüsse in den Jahren 1862—1864.** Mit  
einem Vorworte von Dr. Aug. Petermann. Nebst  
einer Karte, sowie 9 in den Text gedruckten Holz-  
schnitten und 8 Tafeln, nach Originalzeichnungen  
entworfen und auf Holz übertragen von C. Heyn.  
gr. 8. Cartonirt. Preis 4 Thlr.

Die in diesem Buche beschriebene Reise nach den Quellarmen  
des Gazellenflusses bis zu den westlichen Grenzen des oberen  
Nilgebietes gehört zu den glänzendsten Leistungen v. Heuglin's.  
Er hat durch dieselbe nicht nur die Karte der Niländer bedeu-  
tend vervollständigt, sondern das ganze Gebiet des Gazellenflus-  
ses, das wohl schon von mehreren Europäern bereist, aber nicht  
erforscht war, zum ersten Male wissenschaftlich beleuchtet.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 25 Sgr. (1 fl. 30 Kr.)  
Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Subscriptions an.



# Die Natur

Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss  
und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N 49.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

**8. December 1869.**

**Inhalt:** Die Pflanze am Nordpol, von Karl Müller, 13. Der arktische Mensch. — Beitrag zur Duckenkunde, von R. G. Grandjean. Dritter Artikel. — Meinet Schleiereule, von Richard Schüller. — Literaturbericht.

## Die Pflanze am Nordpol.

Von Karl Müller.

### 13. Der arktische Mensch.

Wohl darf man das Dasein des Menschen im Polarlande einen immerwährenden harten Kampf mit der Natur nennen. Sowelt auch der Ackerbau leicht, so kann der Mensch doch nie mit Sicherheit auf die Ernte rechnen; selbst in südlicheren Breiten des Immerbin noch bevorzugten Lapplands, z. B. schon in Norrland, erlischt die Ernte binnen drei Jahren einmal. Die Einwirkung auf das menschliche Gemüth kann nicht ausbleiben; es muß allmählig gleichgültig und sorglos gegen alles Kommende werden. „Die Berührung des Eises“, bemerkt Bayard Taylor in seiner Winterreise durch Lappland sehr richtig, ist der des Feuers ähnlich. Die heiße Zone erschläft, die kalte erstarrt; aber das praktische Resultat ist in beiden Fällen dasselbe. In dem langen, langen Winter, wenn es nur eine vierstündige Dämmerung (im

schwedischen Lappland) und eine zwanzigstündige Dunkelheit gibt; wenn die Renthiervähe zu Hause gebracht sind, das Holz gehauen, das Heu eingesammelt ist, die Gerstenkeile und Fichtenrinde zum Brote bereit liegen, und die im Sommer gefangenen Fische eingefalzen sind, — was kann dann ein Mensch anderes thun, als essen, plaudern, Tabak rauchen und schlafen? So wird er zuletzt unthätig und träge, wie der Bär in seinem Winterschlaf. Im Sommer hat er ununterbrochen Tageslicht und bedarf keiner Eile. Weshalb sollte er sich besonders anstrengen, um sich einen ungewöhnlichen Vorrath von Glace und Gerste zu verschaffen, wenn eine einzige Nacht ihm den Gewinn aller seiner Arbeiten rauben kann? Selbst mitten im Sommer kann sich der verderbliche Frost einstellen. Die Natur scheint ein grausames Vergnügen darin



zu finden, seine Pläne zu durchkreuzen; nur durch Zufall ist er glücklich; und so nimmt eine Art von arabischem Fatalismus und Ergebung in Alles Besitz von ihm."

Diese Bemerkungen passen auf alle Polarländern, soweit sie sich noch vom Pflanzenreiche abhängig fühlen, und nur der Isländer kann von sich rühmen, eine Civilisation in das Polarland getragen zu haben, die noch ein menschenwürdiges Antlitz zeigt. Dafür wohnt er aber auch noch außerhalb des Polarkreises, unter Verhältnissen, die sich zu der Polarzone wie der Süden zum Norden verhalten. Ihm gegenüber erscheint bereits der Kapp wie ein untergeordnetes Wesen der menschlichen Gesellschaft. Wie die Pflanzen im eisigen Klima verküppeln, so auch der Mensch; gleichviel, ob er zu dem großen Völkerramme der Kappen, Karoten, Murmannen und Finnen, die bis zum Weißen Meere reichen, zu den Sorjänen in ihrem Süden, den Samoeden in ihrem Osten, jenseits des Urals zu den Ostjaken am Ob, zu den Jakuten in den östlichen wüsten Eissteppen, zu den Tschutschen und Tugen, die sich nach dem Nordost-Cap Sibiriens ausbreiten, zu den Jakuten zwischen Lena und Kolima, oder zu dem niedrigsten Stamme der Polarländer, zu den Eskimo's gehört. Die lange Nacht, der trübe, nebelreiche Sommerhimmel verdüstern sein Gemüth; die furchtbare Kälte wirkt berauschend auf das Gehirn und erzeugt einen Menschen von denselben Leidenschaften, wie am Äquator; in Verbindung mit der ausschließlichen theilweisen Nahrung erregt sie bei dem Samoeden eine Berserkermuth, die sich als Geisteskrankheit darin äußert, daß sie den Menschen antreibt, Andere anzufallen und blutig zu belien. Vielleicht hat Dr. Haves das Rechte getroffen, indem er den Eskimo Grönlands einen negativen Menschen nennt, einen Menschen, der selbstvertrauen keine Hilfe erwartet, aber auch keine gewährt. Ich kann mir, sagt er, kein lebendes Wesen denken, das so gefühllos ist wie er; selbst meine Eskimohunde zeigen mehr Theilnahme an ihrem gegenseitigen Wohlergehen, denn sie hätten wenigstens zusammen, wenn sie einen gemeinschaftlichen Zweck verfolgten. Dieser Insel-Eskimo stellt überhaupt den Polarländern in seinem ganzen erdarmungswürdigen Zustande vor. Er, der niemals einen Baum gesehen, er besitzt auch keinen Bogen, keine Pflle, kein Boot, das ihn über die aufstrebenden Stunde trägt. Nur bewaffnet mit einer Kanze, die er sich aus Treibholz bereitete, mit einer Harpune und einer Harpunemeile, ist er allein noch auf das Meer angewiesen, das ihn durch Robben und Seevögel ernährt; nicht einmal des flüchtigen Ren's vermag er sich zu bemächtigen, und so eilt er unaufhaltsam, wie er selbst fühlt, seinem gänzlichen Erlöschen entgegen. Auf eine so zufällige Quelle der Nahrung angewiesen, oft längere Zeit ohne lehtere bleibend, beweist er nur zu deutlich den Ausdruck Taylor's, daß der Polarländer nur durch Zufall glücklich sei; und eine solche Thatsache ist

um so entsetzlicher, als der Mensch dem eisigen Polar Klima allein durch massenhafte Nahrung einen wirksamen Damm entgegenstellt.

Es gibt viel Räthselhaftes in dem Polarlande, das unser Geist wegen des Ungenohnten nicht zu fassen vermag. Es ist schwer, sagte schon Dr. Haves, die ungeheure Menge Eis zu begreifen, die um uns her auf dem Polarmeere schwimmt. Ebenso schwer ist es, einen Boden zu begreifen, der schon in Lapland das ganze Jahr hindurch 9 F. tief gefroren bleibt, dessen Eis aber zu Jakut in Sibirien schon unter 62° N. gegen 600 F. tief reicht. Nicht minder schwer ist es, sich eine Kälte vorzustellen, bei welcher die Kartoffeln nicht als Knollen, sondern als Kieselsteine, Zucker und Salz als feine Massen, Wein und Weingeist als feste Körper eingeführt werden, Quecksilber schmelzbar wie; eine Kälte, welche Haves an der Cairns Spitze bei 78 1/4° N. bis unter 44°, 70° N., Niveroff zu Jakut sogar bis — 46°, 26° N. beobachtete. Noch unbegreiflicher ist es, daß die Bäume ohne allen Schutz bis auf das Herz gefrieren und, wie Franklin schon in Fort Entrepasse bei 64° 28' N. beobachtete, hart wie Stein werden und keine Art ausbreiten, ihr Holz zu spalten, ohne zu zerbrechen, daß dieselben Bäume doch nichtsdestoweniger im nächsten Frühling wieder aufleben, ihre Säfte bereiten, treiben, kühlen und fruchten, daß die spröde wie Glas gewordene Aermgewinde wieder elastisch und biegsam werden. Noch ungläubiger erscheint es uns, wenn derselbe Franklin von jenem Orte Hudsoniens berichtet, daß bei einer Kälte, unter welcher der Brantwein erstarrte und aufgethaut die wie Honig auf dem Glase floß, an dessen Rande er bereits wieder gefror, eben gefangene Fische zu einer harten Masse erstarrten, daß aber trotzdem ein Karpfen, welcher 36 Stunden in diesem Zustande verharret, am Feuer aufthauend wieder auflebte und sich mit großer Kraft in die Höhe schmetterte. Das Alles und noch vieles Andere ist räthselhaft genug; aber das Räthselhafteste von allen Mythen des Polarlandes ist und bleibt doch das Dasein des Menschen.

Man kann sich zurückdenken zu einem Anfange des Polarlandes, wo es noch keine Eispanzer gab, die, wie auf Grönland, Tausende von Quadratmeilen ununterbrochen überziehen, und darf sich vielleicht der Vermuthung hingeben, daß dieser Eispanzer sich erst bildete, nachdem sich Berge bis zur Schneegrenze emporgehoben hatten. Man kann sich dieses Polarland denken als eine weite, freundliche Niederung, an deren Ufern und See'n anmuthige Wälder mit gleich anmuthigen Weiden abwechselten. Man kann sich vorstellen, daß, wie die fossilischen Pflanzen des Polarlandes ergeben, manche Frucht- und Holzpflanze in diesen Wäldern erho; auch zugeben, daß man vielleicht Vieles dem Nordpol andichtet, was vielleicht nur fossilisiertes Treibholz ist. Man kann sich diese Wälder beleben mit den Riesengiganten der Mam-

muthe und Nashorne, deren massenhaft angehäufte Gehirne, über Tausende von Quadratellen, von einem Ende Sibiriens bis zum andern verbreitet, laut genug für eine bessere Vorzelt sprechen. Man kann es sich auch lebhaft vorstellen, daß sich im Laufe der Jahrtausende allein die Gletscher-Üngeheuer bildeten, die, auf das Meer strömend, Geloße von Eisebergen erzeugen; daß mit der Zunahme dieses Eises und seines Transportes zu südlichen Breiten allmählig nicht allein das Polarland, sondern auch die ehemals heisse Temperatur Nord- und Mitteleuropas abgekühlt, ihre frühere subtropische Vegetation vernichtet wurde, da nothwendig ein ewiger Austausch von kalter und warmer Luft zwischen Pol und Äquator stattgefunden haben muß. Man kann es sich aber nicht vorstellen, daß der Mensch unter den ewig unverrückbaren Erscheinungen des Poles, unter einer langen Nacht und einem langen Tage, unter den furchtbaren Nebeln und Stürmen der Luftsäule, unter abwechselnden Strömungen von kalter und warmer Luft im Sommer, unter den erstarrten Einwirkungen des Polarwinters, unter den entsetzlichen Invektiven der Moskitochaaren und der Raubtiere oder ähnlichen Einflüssen des Polarlandes als Ausodthone desselben hätte auftreten können; um so weniger, da er nicht wie die Thiere des Polarlandes in diesen Peinen geboren wurde, sondern nackt und hilflos allen feindlichen Einflüssen des Lebens ausgesetzt sein mußte. Darum ist es um so unbegreiflicher, daß der Mensch aus milderen Zonen schon vor Jahrtausenden zum Pole vordrang, der sein Leben nicht mehr an die Pflanzen zu fesseln vermochte, daß er sich hier einheimisch machte und nun einen Charakter an sich trägt, der ihn ganz als einen Schnee- und Eismenschen, als das treue Abbild seiner pflanzenleeren Zone hinstellt. Als solcher vertritt er gleichsam eine eigene Gattung des Menschen, den Eismenschen, dessen Natur dem Wesen nach ausschließlich thierische Kost ist. Wo hin er bei derselben gekommen, spricht so laut für den eigenthümlichen Charakter der Polarzone, daß man ihr eigentliches Wesen nur ein winterliches nennen kann.

In der That auch drückt sich alle Polarwelt, alles Ergreifende und Begreifende derselben so recht eigentlich nur im Winterleben aus. Während sonst der Winter den Vorbeh der Menschen mehr zu unterbrechen als zu mehrern pflegt, übt er im Polarlande die umgekehrte Wirkung, weil im Sommer die Moräste zu tief, das Insektenleben so peinigend ist, daß man, — nur die norwegische Seite Lapplands ausgenommen, wo diese Landplage gänzlich unbekannt ist, — nur mittelst Pechöl, wie im schwedischen Lappland, oder nur mittelst eigenthümlichen Wäsklen aus Pferdehaar sich dieser selbst das Athmen erschwernenden Plagegeister erwehren kann. In der winterslichen Jahreszeit erlangt auch die Wäldung des Polarlandes ihren größten Reiz. Es ist, — so etwa schildert Barard Tarkor an verschiedenen Stellen seiner aben-

teuerlichen Winterreise die Situation — beinahe unmöglich, die Schönheit dieser Winterwäldungen zu malen. Jeder mit dem reinsten Schnee beladene Baum gleicht einem gothischen Springbrunnen von Bronze, der mit gefrorenem Schaum bedeckt ist. Von jeder Anhöhe blickt man auf Tausende solcher Springbrunnen, die sich gleichsam auf einem Fußgestell von Eisenblein und Alabaster niedriger oder höher erheben. Es ist eine verzauberte Wildniß, weiß, schweigend, strahlend, mit unerschöpflichen Formen der Schönheit angefüllt. Die Fichten tragen Mäntel von Hermelin, Manschetten und Kragen von den weichen Schwammsäulen. Hier sind knieende Nymphen, deren Arme sorglos an ihren Seiten herabhängen, während die weißen Kapuzen über ihre Gesichter fallen. Dort liegt der Helm eines Kriegers. Von den Gipfeln der kleinen gothischen Alchäbäume hängen zerfissene und zerlumpte Vorhänge von Spitzen herab. Höhlen, mit einem Ueberzuge von Marienglas verschlossen; silberne Palmenblätter, Thüren, Schießscharten, Bogen und Arcaden kreuzen sich in phantastischer Verwirrung, mit den entschleierten Formen der größeren Bäume vermischt, die dennoch nur der Form nach Bäume sind. Solche Springbrunnen, Kandelaber, gothische Zinnen, Federbüsche, kostbare Korallenzweige können weder mit der Feder, noch mit dem Pinsel beschrieben werden. Es ist eine Wildniß von Schönheiten, und das Auge weiß nicht, wohin es blicken, wie es die Formen der blendenden Verwirrung deuten soll. Schweigend und unbewegt von dem Winde stehen sie da, scharf, spröde, wie von jungfräulichem Erz. Keine lebenden Formen der Vegetation sind so herrlich. Man fühlt sich versucht, diese Bäume nicht irdische, sondern himmlische aus Odin's Paradiese, aus Asgard zu nennen. Die tropischen Palmen, die baumähnlichen Farnkräuter, die Lotuspflanze der indischen Gewässer, der gefiederte Bambus, die Arcas-Palme, dieser „gleichsam vom Himmel herabgeschossene Pfeil“, — was sind sie neben diesen wunderbaren winterlichen Gemäßen, diesen glänzenden Ketten von Perlen, Eisenblein und Opal, die in dem milden, orangefarbenen Lichte der arktischen Sonne schimmern? Womit soll man diese Lichter unter den Aesten, in die Tiefe der Wälder hinein vergleichen, wo der Schnee jede Perspektive vernichtet, die entferntesten fernsten Winkel und Dichtke, die zu schön und zu zerbrechlich aussehen, um kalt zu scheinen, in den glänzenden Vordergrund bringt? Wundervoll! Herrlich! ruft die Lippe in atemberaubender Bewunderung, und der Wanderer, der unter einem milderen Strahle der Sonne erwacht, vergißt, daß er sich in dem Vaterlande des Nordlichts befindet. Ebenso fernhaft ist die Wirkung der Landschaft, wenn der Wanderer aus der Dämmerung des winterlichen Polarlebens heraus in den freundlichen Tag des eisigen Nordens tritt. Die Wirkungen des Tagelichts auf die Bäume sind prachtvoll. Die Wirkungsweite und

Zichtengapsen, in Kressall gehüllt, funkeln gleich einem Diamantenschmuck am Busen des unbesteckten Schnees. Die Birken können mit nichts, als mit einem Sprünge drinnen verglichen werden, der, während er in voller Thätigkeit war, gefror, und dessen zahllose Wassertheilchen, von ihrem Falle zurückgehalten, noch in der Luft schweben. Fast ist diese Welt zu feenhaft um leblos zu sein. Doch jedes Gesicht, das uns begegnet, erinnert von Neuem daran, daß es die kalte Schönheit des Todes der todtten Natur sei. Tod ist in der funkelnden Luft, in den mit Juwelen bedeckten Bäumen, in dem fadenlosen Schnee. Ziehe deine Peizhandschube aus, und die Hand des Todes wird die deinige ergreifen; entblöße deinen Mund, und deine erfrorenen Lippen werden bald seinen Kuß fühlen.

Mit Entsetzen wendet man sich von diesen Erscheinungen einer erstarrten Natur hinweg, um in milderen Zonen seinen Geist an heiteren Bildern zu weiden. Aber man vergißt, daß auch diese nicht vorhanden sein würden, wenn das Polarland nicht wäre, das Kälte bereitend die Furchtbarkheit des südlichen Sonnenbrandes mildert. Wie hohe Berge in fentrechter, so übt das Polarland in wogender Richtung diesen heilsamen Einfluß aus, und diese Vorstellung ist ganz geeignet, uns mit den Schrecken des Polarlandes auszufohnen. Unter der schielrechten Sonne steigt eine heiße Luftsäule auf, die auch von Legionen glänzender Blattflächen durch Spiegelung bereitet wird; sie sättigt sich mit Wasserdampf und läßt sich aus der Höhe wieder am Pole nieder. So heist sie, die eben über Tausenden wunderbarer Blumen aufsteig, ein Land, um

neuen Blumenformen Leben zu geben, wo sonst keine ersichen würden. Dafür sendet sie der Pol in kalten Luft- und Meeresströmungen zu dem Aequator zurück, um sämmtlichen dazwischen liegenden Zonen die Kälte zu geben, deren sie so sehr bedürfen und die sie doch selbst in dieser Weise nicht einmal durch hohe Alpenwälle bereiten könnten. So bedingen sich Pol und Aequator gegenseitig, beleben sich gegenseitig und verhalten sich wie das entgegengesetzte Gliede, in dessen gegenseitigem, obgleich so entfernten Schoße allein die Schöpfungskraft schlummert, die durch das Licht der Sonne sowohl am Aequator, wie am Pole, wenn auch in so entgegengesetztem Maßstabe, geweckt wird.

Ebenso ist der Polarmensch die notwendige Ergänzung des Tropenmenschen. Wäre das Polarland nicht von ihm erfüllt; gäbe es hier keine Pflanzenwelt, die sein Dasein durch zahlreiche Stufen thierischer Lebensformen mittelbar veranlaßt; die Erde würde eines logischen Gegensatzes entbehren, der ihre Lebensformen erst in sich abrundet. Durch ihn allein empfangen wir das großartige Schauspiel einer Accommodation an die entgegengesetzten Schöpfungsbedingungen, einer Dehnbarkeit der Organisation, welche nicht großer gedacht werden kann. Wie viel Hobeit und Innigkeit muß noch in einer Zone liegen, die trotz ihrer furchtbaren Schroffheit doch Menschen so an ihre Scholle zu fesseln wußte, daß sie außerhalb dieser Zone verkümmern, wie die Polarpflanzen, welche in südlicheren Breiten selbst unter der aufmerksamen Pflege verwelken, versiegen!

## Beitrag zur Quellenkunde.

Von M. C. Grandjean.

Dritter Artikel.

Was außer den durch die Bewegungen in dem Gebirge bedingten, mitunter sehr verworrenen Lagerungsverhältnissen in der Grauwackenformation besonders auffällt, sind die auf Gängen, Klüften und Rissen ausgeschiedenen Mineralien und grünsteinartigen Lagen; wobei Quarz, Baryt, Spathisenstein, Kalk- und Bitterspath nebst verschiedenen Erzen in erster Linie kommen. Die Grünsteine oder vielmehr Hyperite kommen in Gängen oder örtlichen, mitunter massenhaften und verschiedenartig ausgebildeten, aber doch immer dem Streichen und Einsinken des Gebirges folgenden Lagerstätten vor. Sowohl diese, wie die ausgeschiedenen Mineralien, sind ihrem Vorkommen und ihrer Natur nach Ergebnisse des Wasserumlaufs, — wie nicht minder die verkieselten Sandsteine und Quarzite, so wie die verkalten Gneise u. s. w.

Wie die auf der Grauwacke an geeigneten Vertikalkanten abgelagerten Quarzgerölle, welche ohne Zweifel dem

rheinischen Gebirge angehören, beweisen, mußten schon zur Zeit, als dieses Gebirge noch tief unter Wasser stand, Quarzmassen in demselben durch Vermittelung des Wasserumlaufs ausgeschieden und zu Lagern und Gängen formirt worden sein. Dieses konnte aber nicht ohne einen lebhaften Verkehr der Wasser in sämmtlichen Schichten des Gebirges geschehen; wobei es indessen einigermaßen schwierig ist, zu begreifen, wie dieser Verkehr unter einem stehenden Gewässer möglich war, — und wie Salzwafler hierbei thätig sein konnte: wenn es auch hierdurch erklärlich würde, wie die unerschöpflich scheinenden Vorräthe von Chloratrium, welche die Quellen dem rheinischen Gebirge (das anscheinend so arm daran ist) entnehmen, hineingekommen sind.

Wie die Produkte derselben beweisen, so mußte aber diese Thätigkeit stattgefunden haben, es mußten Ursachen zu Strömungen vorhanden gewesen sein. Diese Ursachen könnten

aber nur in chemischer Anlebung und durch diese verursachten partiellen Wärmetheileilung oder in der Erdwärme gesucht werden. Da aber die letztere noch zu problematischer Natur ist und die mittlere Wärme eines Gesteins, das nicht von der äußeren Temperatur alterirt wird, auch Ausgleichungsströmungen hervorruhen kann, so bedarf es nicht einmal der Erdwärme, um den Umlauf der Gewässer erklären zu können. Hierdurch und weil kein Gestein gegen das Wasser absolut undurchdringlich ist, wird es auch erklärlich, wie sowohl unter Wasser, als trocken gelegen, in allen Gesteinen Strömungen entstehen und die atmosphärischen, wie auch die Meereswasser bis zu großer Tiefe und weite Entfernungen dringen können; wobei sie sich mit Wärme und mineralischen Stoffen zu beladen vermögen, während sie zugleich Quarz und andere Mineralien in Klüften, Drusen und Algen absetzen. Die lebenden Organismen und zumal die Infusorien und Algen, welche manche warme Quellen mit sich führen, widersprechen aber sehr deutlich der Lehre, daß dieselben ihre Wärme von dem feuerflüssigen Erdbinnen empfangen sollen.

Es ist hier der Ort nicht, auf die chemischen Vorgänge näher einzugehen, welche — ganz abgesehen von der sogenannten Erdwärme — den in der Erdrinde umlaufenden Gewässern Wärme mitzutheilen oder sie zur Aufnahme mineralischer Stoffe geschikt zu machen im Stande sind. G. Bischof und andere gründliche Forscher haben sich eingehend mit diesen Vorgängen beschäftigt und die Natur der meisten außer Zweifel gestellt. Dagegen haben die meisten mineralischen Sauerquellen, welche aus Sümpfen und ähnlichen Vertikalitäten hervorkommen, noch nicht diejenige Würdigung gefunden, welche ihnen gebührt — und daran ist wieder eine der Theorien Schuld, welche dem gesunden Fortschritt in der Geologie so sehr hindern ist.

Nach einer sehr gangbaren, fast allgemein angenommenen Vorstellung von der Entstehung der Sauerlinge, soll nämlich die freie Kohlensäure, welche sie enthalten, von Erhalationen herkommen, welche mit verborgenen oder bekannten vulkanischen Vorgängen zusammenhängend dem Innern der Erdrinde entstammen. Unter den gasförmigen Produkten der Vulkane ist nun zwar die Kohlensäure wohl bekannt und wird dieselbe dann besonders häufig erhalten werden, wenn das vulkanische Feuer mit kohlensauren Erden, wie Kalk und Magnesia, in Berührung kommt, oder organische Stoffe verbrannt werden; es gehören aber die Sauerquellen, welche auf diesem Wege ihre freie Kohlensäure empfangen, gewiß nicht zu der Mehrzahl. Man kann nämlich bei den meisten Sauerlingen die Beobachtung machen, daß sie in, oder doch in der Nähe von Sümpfen, sumpfigen Wiesen, oder diesen verwandten Lokalitäten entspringen, — und daß sie erst in einer nicht überall gleichen Tiefe ihre Kohlensäure aufnehmen. Treibt man nämlich in diese Sauerlinge ein am

Boden durchlöcherter Rohr möglichst tief ein, so wird man in den meisten Fällen süßes oder doch sehr schwach gesäuertes Wasser erreichen. Es ist deshalb schon seit alten Zeiten in Gegenden, wo viele Sauerquellen vorkommen und zumal auf dem Lande üblich, solche Quellen, wenn sie benutz werden sollen, mittelst eingelassener hölzerner Baumstämme oder Röhren zu fassen, die nicht tiefer eingetrieben werden als absolut erforderlich ist, um klares und gut gesäuertes Wasser zu erlangen. Soll die Fassung aber solider werden und in Steinfasen oder Mauerwerk geschehen, so muß der größte Sättigungspunkt mit der Kohlensäure vorher genau ermittelt werden. Man darf nur den Boden vieler sumpfigen Wiesen und das stagnierende Wasser derselben ansehen, um an den Ecken ablesen und dem schwimmenden Erdböl die Ueberzeugung zu gewinnen, daß diese Produkte von chemischen Vorgängen stammen müssen, welche in diesen Vertikalitäten stattfinden.

Je tiefer der Punkt liegt, wo von Unten oder vielmehr von der Erde die größte Kohlensäureströmung stattfindet, um so mehr wird auch unter sonst gleichen Umständen, wegen des Drucks der Wassersäule die Absorption der Säure befördert werden; denn ebenso wie man die gasförmige Kohlensäure durch Schütteln und Einpressung im Wasser zur Lösung bringt, ebenso geschieht dieses auch unter dem natürlichen Druck einer hohen Wassersäule. Das Wasser kann aber auch schon vorher, ehe es in die Fassung tritt, mehr oder weniger mit Kohlensäure gesättigt sein, — und dann wird bei dem verminderten Druck in derselben die überflüssige Säure frei werden und in Blasen aufsteigen; oder es kann auch ein Theil der Bikarbonate und Mangan, welche das Wasser gelöst enthält, zerlegt und deren Kohlensäure ausgeschieden werden.

Um die Bildung der so viel verbreiteten mineralischen Sauerlinge zu erklären, ist es für die meisten Fälle hinreichend, sich auf die an solchen Orten, wo sie entspringen, gewöhnlich anhäufenden Pflanzenreste zu stützen, die, in beständiger Gährung begriffen, Kohlensäure als Zersetzungsprodukt auscheiden, — welche dann, wenn sie keinen oder nicht hinlänglich lösliche mineralische Substanzen in der Nähe findet, entweder in die Luft entweicht, oder — wenn ihr der Weg hierzu versperrt ist, sich mit dem durchfließenden Wasser vereinigt. Diese Vorgänge verrathen sich in der Regel schon durch die Abfälle von Eisenoxyd, Kalksinter u. s. w. Der Boden der Sümpfe ist aber auch noch außerdem, wenn Kohlensäure auf ihn wirken kann, besonders geeignet, mineralische Bestandtheile dem durchfließenden Wasser mitzutheilen.

Der Heerd der Kohlensäurebildung ist aber — abgesehen von den vulkanischen Erhalationen und der massenhaften Entwicklung derselben bei Gesteinsumbildungen, wie z. B. wenn Schwefelsäure in Gegenwart von kohlensaurem Kalk unter Zertrümderung von Wärme zerfällt wor-

den und sich Gyps bildet — nicht immer in Sümpfen und Wiesengründen zu finden. So findet man im Ries der Flussbette, wie z. B. am Rhein in der Gegend von Coblenz, bei Rhens, Oberlahnstein, Camp u. s. w., — wenn derselbe organische Stoffe enthält, Kohlensäure: Exhalationen und Sauerlinge, die mitunter auch reich an mineralischen Bestandtheilen sind und als Mineralwasser benutzt werden; die Brunnen, welche in diesem, meist mit Alluvionen bedeckten Riese schöpfen, haben meist kohlensäurehaltiges Wasser. Aber auch in den Flussbetten des Rheins und selbst der Lahn (wie bei Lahnstein und Rhens) gibt es Ausströmungen von Kohlensäure und Sauerquellen, die ungewisselhaft denselben Ursprung haben.

Welche Entstehung Kohlensäure: Exhalationen und Sauerlinge selbst in ehemals vulkanischen Gegenden haben können, hat sich bei einer Säurequelle gezeigt, die vor der letzten Niederlegung des Laacher-See's, dicht am westlichen Ufer desselben und in der Nähe der Abtei, in einen Lava:See gefasst war. Es war eigentlich eine mit Kohlensäure imprägnirte Süßwasserquelle, die das Kohlensäure: Gas sehr schnell abgab. Mit der Senkung des Seespiegels ging die Quelle zurück, verschwand aber bald gänzlich und konnte auch, als man ihr nachgrub, nicht mehr gefunden werden. Dagegen zeigte es sich, daß ihr früherer Sitz ein Lager von Pflanzenresten war, das, zum Theil aus größeren Bäumen bestehend, nicht von einem angeschwemmten Braunkohlenlager unterschieden werden konnte. Auch andere, der um den Laacher-See so zahlreich vorkommenden Sauerquellen, scheinen diesen Ursprung zu haben oder in den mit organischen Resten vermischten Luff: Kapillän- und Traß: Lagern zu entstehen. Sie hätten dann mit vulkanischen Nachwirkungen nichts gemein.

Diejenigen mineralischen Sauerquellen, welche zugleich viel Kochsalz enthalten und in dem rheinischen Gebirge entspringen, wie die von Selters, Salzig, Soden, Homburg u. s. w., müssen einen besonders weiten und tiefen Umlauf haben, da der geringe Gehalt der devonischen Gesteine an Chlornatrium es nicht gestatten würde, daß sie sich auf kurzem Wege dasselbe aneignen könnten. Die Bohrungen von Neuenahr, Soden und Homburg zeigen aber auch, daß selbst in diesen alten Gesteinen noch chemische Proceß stattfinden müssen, welche mit einer bedeutenden Wärme:Entwicklung verbunden sind und den umlaufenden Gewässern Gelegenheit geben, sich mit mineralischen Stoffen und Wärme zu beladen; ob aber alle warme Quellen im rheinischen Gebirge, wie die genannten, wozu auch ohne Zweifel die von der Kautenbach und Birtlich a. d. Mosel und Ems mit Schlangenbad in Nassau gehören, diese Entstehung haben, ist sehr zu bezweifeln. Die Quellen von Wiesbaden dagegen, welche aus Tertiärgebilden hervortreten, scheinen einer anderen Gattung anzugehören und ihren Sitz in gährenden Torfanhäufungen zu haben, die in den Taunushäusern, welche nach diesem Badeort herabziehen, abgelagert sind. Was besonders hierfür spricht, ist der sogenannte Faulbrunnen, welcher, in einer sumpfigen Wiese entspringend, fast dieselben mineralischen Bestandtheile wie der Kochbrunnen (nur mehrmals mit süßem Wasser verdünnt) enthält und gewöhnlich 75° R., also gegen die gewöhnlichen kalten Quellen, so viel Wärme zeigt, daß die des Faulbrunnens vor der Verdünnung eine bedeutende Temperatur gehabt haben muß. Uebrigens sind auch in gährenden Torfmooren und Braunkohlenlagern Thatfachen genug bekannt, welche die Entstehung warmer Quellen ohne feuerflüssiges Erdinnere oder latente Sonnenwärme u. s. w. erklärlich machen könnten.

## Meine Schleiereule.

Von Richard Schüller.

Unter den vielen einheimischen fliegenden und kriechenden Thieren, die ich zu allerhand Beobachtungen in verschiedenen Zeiträumen gefangen hielt, befanden sich hin und wieder außerordentlich eigensinnige Starkköpfe, die mich trotz der erblichstn Bemühungen durchaus nicht als ihren Brotherern und Gezieler anerkennen wollten; keiner meiner Zöglinge jedoch setzte mir einen so wilden Troß, der sich weder durch Strenge noch Milde brechen ließ, entgegen, als meine Schleiereule, deren Charakter und Eigentümlichkeiten ich hier nach einer allgemeinen Beschreibung in kurzen Zügen zu schildern versuchen will.

Die Schleiereule unterscheidet sich durch die Pracht ihres Gefieders sehr vorthellhaft von den meisten ihrer

Gattungsgenossen, es liegt, obwohl es den Körper, zumal den Kopf, immer noch bei weitem lockerer und reicher umgibt, als es bei Tagraubvögeln der Fall ist, doch viel glatter am Leibe an, wie bei den übrigen Käugen. Die schiefergraue Oberseite des Vogels ist allenthalben mit hellen und dunklen, länglichen, perlartigen Tropfen besäet, ebenso die hell: oder gelbe Unterseite und das noch hellere Gesicht. Die kleinen, fast schwarzen Augen haben einen bösaartigen Ausdruck und sind von einem sehr ausgebildeten herzförmigen Federschleier umgeben, der dem Thier ein fragenhaftes, koboldartiges Ansehen gibt. Der Schnabel ist ganz hell und wie aus Wachs gegossen, dabei ziemlich stark abwärts gebogen, seitlich zusammengebrückt, mit

schmäler Basis, so daß er eher schwach als stark zu nennen ist. Die Beine sind hoch und nach den gelblichen Füßen zu schwach befiedert, die Beinen mit langen, spitzen, wenig starken Krallen bemehrt. Die sehr großen, runden Flügel erreichen fast die Spitze des grauen, rostroth gebänderten und gestreckten, mäßig langen Schwanzes. In der Größe kommt diese Eule der Nebelkrähe gleich und wiegt ungefähr 36 Zoll.

Da der Schleierkauz wie bekannt die Thürme und unbefestigten Häuserhöden der Städte und Dörfer, die Bäume und Schluchten der Wälder als Nist- und Brutplatz unbedingt vorgeht, könnte man bei ihm mit Recht ein dem Menschen gegenüber zutrauliches, wenig scheues Betragen voraussetzen, und viele Forscher behaupten auch, daß selbst erwachsene eingefangene Exemplare sich im Gegeßsah zu dem nahe verwandten Baumkauz ungemein leicht zähmen lassen und bald zutraulich werden. Um so mehr erstaunte ich daher, in meiner Schleiereule ein grimmiges, lahmriges und scheues Thier kennen zu lernen, das allen Liebesungen mit abscheulicher Bosheit begegnete, wozu freilich der Umstand beitragen mochte, daß ich es frei in einer geräumigen Bodenkammer umher fliegen ließ und täglich nur 2—3 mal allein besuchte. Ich hatte der Eule auf einem hohen Kasten einen wagerechten Stengel befestigt, von welchem sie durch einen Sprung in einen finsternen Winkel gelangen konnte, der durch mehrere Balken und das Dach gebildet wurde und mir fast unzugänglich war. Kam ich am Tage auf den Boden, so konnte ich die Eule nur dann durch die mit Lappen halb verhangene Lattenthür der Kammer beobachten, wenn ich in Strümpfen heranschlich. Sie saß dann gewöhnlich in leztergrader Haltung auf ihrem Stengel, die Augen geschlossen, den Schnabel tief in den Schleier gedrückt, auf einem Bein; so wie ich das geringste Geräusch erregte, erwachte sie sofort, sah nach der Thür und verschwand mit einem ungeschickten Sprunge hinter dem Balken. Ging ich zu ihr hinein, so blinnte sie mich mit funktenden Augen starr an, sträubte das Gefieder und schaukelte mit niedergebogenem Kopf langsam hin und her, wie ein Gießer im Käfig, dabei suchte sie oft mehrere Minuten hinter einander ohne inne zu halten, einem großen Walselbald ähnlich. Häufig machte sie sogar Miene, sich auf mich zu stürzen, indem sie häufig einen Schritt auf mich los sprang, ohne jedoch je einen wirklichen Angriff zu wagen. Vertrieb ich sie mit einem langen Stabe aus ihrem Versteck, so schwirrte sie schwanken Flug durch das Gemach, flog auf einen ungefähr 8 Fuß hohen Schrant und stürzte sich zwischen diesem und der Wand mit angelegten Flügeln auf den Fußboden herab, so daß ich anfangs glaubte, sie müsse sich durch den Sturz den Schädel einschlagen. Sie zeigte sich als ein überaus lichtscheues Thier, und nahm bei Tage nur ungern, nie aber, wenn sie meine Gegenwart bemerkte, Nahrung zu sich. Ihre ganze Lebensstätt-

tigkeit begann erst mit der eintretenden Nacht. Schlich ich um diese Zeit die Treppe hinauf, so hörte ich sie schon aus großer Entfernung. Sie raste dann mit ausgebreiteten Flügeln an den mit starkem Bindfaden überzogenen Fenstervorhängen umher, wobei sie hin und wieder ein leises Pfeifen, nie aber das entseßliche Geheul, welches sie in der Freiheit ausstößt, hören ließ. Häufig auch warf sie, mit leisem Fluge umherschwebend oder rasch auf dem Fußboden umherlaufend, kleine Möbelstücke um, alles genau mit dem Schnabel untersuchend. Wollte ich sie des Nachts bei ihren Mordthaten beobachten, so warf ich das betreffende Opfer durch die Latten der Thür, verbarg mich anfangs und erst, wenn sie die blutige Arbeit begann, schaute ich ihr bewegungslos zu. Die Kämpfe, welche ich sie bestehen ließ, waren sehr anziehend und zeigten alle von Kraft und großem Blutwurk dieses Raubvogels und konnte ich sie besonders bei Mondschein genau beobachten. Kurzer Proceß machte sie mit einem Froch oder dergl., ohne ihn zu tödten, verschlang sie ihn ungeschädelt ohne Umstände; ebenso machte sie es mit Mäusen. Ließ ich einen Sperling von außen durch die Latten fliegen, so ersahste sie denselben, auch wenn sie am Fenster umhersprang, welches der Thür gegenüber lag, doch jedesmal in dem Moment, wo er schnell durch die weiten Maschen der Vorhänge zu schlüpfen versuchte, mit den langen Fingern. Der Kampf war kurz, sie sprang sogleich mit der zappelnden, schreienden Beute auf den großen Kasten, riß ihr ohne weiteres den Kopf ab und verschlang sie sammt den Federn, ebenfalls ohne sie zu zerreißen, womit sie freilich manchmal lange Zeit zubrachte. Zuweilen fielen die Spaken, von der Hinfirtheit deirt, unmittelbar an der Thür zu Boden, dann stürzte die Eule mit lautem Krach gegen die Thür und ersahste den Sperling oft, ehe er den Boden berührte, flog dann ebenfalls auf ihren Kasten und verpöste den alten Schreibst. Die erstaunliche Wette ihres Rachens und Schundes zeigte sich am besten, als ich ihre eine große, lebende, sehr blasse Fledermaus vorwarf. Sie packte und erwürgte das laut zwitschernde und kreischende Thier in wenig Augenblicken, worauf sie es ungeschädelt zu verschlingen begann. In diesem Moment erinnerte sie ungemein an eine Beute verschlingende Schlange, denn da sie die Fledermaus das Hinterkeil voran hinterschlucken suchte, hingen die großen Flügel der letzteren wohl 6 3. lang zu beiden Seiten des Schnabels herab und schienen so ein unüberwindliches Hinderniß darzubieten. Dennoch gelang es ihr nach vielerstänßigem Würgen, Schnappen und Schlingen, das große Thier sammt den Flügeln hinabzuwürgen, ohne daß man am Kropf eine Anschwellung gewahren konnte.

Da es eine ziemlich allgemeine Annahme ist, daß die Schleiereule den Tauben, mit denen zusammen sie sogar häufig in den Schlägen nistet, so wenig etwas zu Leide thue, als deren Zungen, setzte ich eines Morgens eine

eben erwachsene, gesunde Taube auf den Kästen, welcher sich unmittelbar unter dem Versack der Eule befand, um ihr Verhalten der Taube gegenüber zu beobachten. So wie ich die Kammer verlassen hatte, kam die Eule aus ihrem Versack hervor und machte, nachdem sie mit allerlei wunderlichen Grimassen den Eindringling betrachtet hatte, einen sehr ungeschickten Angriff auf denselben, so daß jener ohne gefaßt zu werden, herabsag und sich verbarg. Die Eule, durch das Angelegentlich augenscheinlich geblendet, machte nicht den geringsten weiteren Versuch sich der Taube zu bemächtigen, sondern schlummerte fogleich auf ihrem Stengel wieder ein. Ich nahm die Taube heraus, um sie nach Einbruch der Nacht wieder hineinzusetzen und so Zeuge eines etwaigen Kampfes zu sein. Als ich um 10 Uhr Abends wieder hinaussieg, schien der Mond grell in die Kammer und der unheimliche Einsiedler war ungemein lebendig. Sowie ich die Kammer öffnete, flog er hinter seinen Balken und fauchte laut und drohend; Nachdem ich das arme Opfer abermals auf den Kästen gesetzt hatte, verließ ich eilig das Gemach. Kaum hatte ich die Thür zugemacht, als die Eule sich mit großem Ungestüm von oben herab auf die ängstlich umherstippende Taube stürzte, welche nun entsetzt zu entfliehen versuchte, wobei Beide vom Kasten herab mit lautem Gepolter auf den Fußboden stürzten. Die Eule saß ihrem Opfer immer noch auf dem Rücken und blieb, durch kräftige Flügelschläge das Gleichgewicht behauptend, mit dem Schnabel auf den Strampeln, ununterbrochen pfeifenden Gegner los. Nicht ein einziges Mal vermochte die Taube den wilden Räuber abzuschütteln, was mich in dem Glauben versetzte, daß der Bösewicht nicht zum ersten Mal einen so großen Vogel überfiel. Nach mehreren Minuten langem Kampfe wurde die Gegenwehr des Besiegten schwächer und nach einigen Momenten war er erzwungen. Jetzt zeigte der Sieger seine bedeutende Kraft, indem er (freilich mit einiger Mühe) den Kopf und dann die Flügel der Taube vom Rumpfe riß, worauf letztere ziemlich kahl gerupft und endlich vom Halse aus in großen Stücken

verschlungen wurde. Am andern Morgen fand ich nur eine große Menge Federn, die Flügel und den Kopf der Taube, alles Andere war von dem Nimmersatt verzehrt worden. Ich war erstaunt, auf dem Kasten frisches Gewölle zu finden, in welchem ich die beiden Füße der Taube und mehrere starke Knochen, umgeben von einem Haufen Federn fand. Die Eule hatte also in 8—9 Stunden die ganze Taube verdaut, was auf einen ungemein scharfen Magenast schließen läßt. Schon nach zwei Tagen bewältigte und verzehrte die Eule ganz auf dieselbe, von Kraft und Blutdurst zeugende Weise abermals eine Taube, so daß ich nicht annehmen konnte, daß sie sich nur aus übergroßem Hunger über einen so großen Vogel herge macht habe. Es dürfte dennoch lohnen, genauere Beobachtungen betreffs des Verhaltens unseres Vogels den Tauben gegenüber anzustellen; denn wenn ich auch glaube, daß diese Eule in mäusereichen Jahren mit dieser ihrer LieblingsSpeise sich begnüge, so dürfte es doch fraglich sein, ob sie in mäusearmen Jahren der Versuchung widersteht, junge oder alte Tauben, denen sie in Kraft völlig gewachsen ist, zumal im Schlaf zu überfallen, statt sich der mühevollen Arbeit zu unterziehen, kleine Vögel aus ihren meist sehr versteckt gelegenen Schlafplätzen hervorzuziehen oder nur den weniger sättigenden Kirchen- und gewandten Fledermäusen nachzuliegen.

Bei der eben beschriebenen Schleiereule mußte ich endlich auf jeden Jähmungsversuch verzichten und schenkte ihr daher die Freiheit. Bis zum letzten Augenblicke konnte ich sie nur mit bled Lederhandschuhen angreifen, weil sie stets, sobald ich sie zu fassen suchte, sich auf den Rücken warf und mit Krallen und Schnabel meine Hände zu verwunden suchte. Eigentümlicherweise habe ich sie nie, selbst im größten Zorne, mit dem Schnabel knaden hören, was ich sonst bei allen anderen Eulen, die ich beobachtet hatte, bemerkte, besonders beim Baumkau, dessen ich vielleicht in nächster Zeit in diesen Blättern ebenfalls gedenken werde.

## Literaturbericht.

**Aus allen Welttheilen.** *Illustrirtes Familienblatt für Kinder- und Väterkünde.* Redigirt von Dr. Otto Delisch. Leipzig, bei Rudolf Köp. In 32 Nummern oder 12 Monatsheften. Pro Quartal 18 Sgr.

Nach den ersten Nummern zu urtheilen, verspricht diese neue geographische Zeitung eine Lücke unserer Literatur auszufüllen, indem sie bei höchst mäßiger Preise und guter Ausstattung die interessantesten Gegenstände unsres geographischen Wissens zu allgemeiner Kenntniß bringt und doch dabei einen gewissen wissenschaftlichen Charakter

beibehält. Wenn die Fortsetzung dem Anfange entspricht, so wird sie sicher auf ein breiteres Publikum zu rechnen haben. Nur wird sie sich zu hüten haben, eine Anekdote von Reisebeschreibern zu werden, die nur ein vorübergehendes Interesse erregen. Wir hoffen, wieder auf den Gehensand zurückzukommen, würden uns aber freuen, wenn unterdeß das Unternehmen seinen Charakter festsetzt und sich bereits zahlreiche Freunde gewonnen hätte. Die Artikel über die La Plata Staaten von Maca, sowie über die Gesundheitsstation Dardichiling im Zittun-Gebirge von Delisch, der Canal von Surz von Prof. A. Böne sind bis jetzt die Hauptarbeiten. R. M.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 35 Sgr. (1 R. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Verkäufer nehmen Bestellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniss und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ale und Dr. Karl Müller von Halle.

N<sup>o</sup> 50.

[Zwanzigster Jahrgang.]

Halle, G. Schwetitsche'scher Verlag.

15. December 1869.

Inhalt: Die Hügelpflanzung, von Karl Müller. — Der erste Schneefall, von Pfarrr Karl Müller von Alsfeld. — Nicolaus Cusanus, von M. G. Grandjean. — Literarische Anzeigen.

## Die Hügelpflanzung.

Von Karl Müller.

Seit einer Reihe von Jahren hat sich im Königreich Sachsen eine Methode der Waldkultur ausgebildet, die nicht allein von allen bisher befolgten Methoden gänzlich abweicht, sondern auch für manche Lokalkäten die einzig natürliche sein dürfte. Man kennt sie zwar allgemeiner unter dem Namen der Ueberschicht, ist aber weit davon entfernt, sie ebenso allgemein eingeführt zu haben. Dieser Grund bestimmt uns, ihrer auch in diesen Blättern mit einigen Worten zu gedenken, um ihre weitere Verbreitung zu veranlassen.

Wer sie mit Pflanzungen zu thun hatte, sei es für einen Waldverband, für eine Obstanlage oder für eine Promenade, der kennt auch die großen Schwierigkeiten, welche ihm die Zubereitung wahrhaft zweckmäßiger Pflanzlöcher verursacht. In vielen Fällen hat er nichts weiter erreicht, als daß er den Pflänzling gleichsam in einen

Topf oder in einen Küber gesetzt hatte, worin dem Wurzelsystem selbstverständlich seine Grenze der Ausbreitung nur für eine gewisse kurze Zeit gegeben ist. In andern Fällen würde aber auch dieses nicht ausreichen, sofern das Pflanzloch nicht gleichzeitig mit einer entsprechenden Menge fruchtbarer Erde angefüllt worden war. Auf manchen Bodenarten würde aber dieses nicht genügen, das Pflanzenleben regelrecht zu entwickeln, nämlich auf sumpfig-torfigem oder auf humusarmem, karglichem Erdreich. Dort würde der saure Boden mit seiner flagranten Feuchtigkeit bald eine Verkümmernng des Pflänzlings bedingen, wie er hier durch den tiefen Boden bald von jeder Einwirkung der Luft abgeschlossen sein würde. Des Alles umgebt die Hügelpflanzung.

Sie beruht einfach darauf, daß man den seiner Pfahlwurzel beraubten Pflänzling unmittelbar auf die



Gras- oder Kräuterdecke des zu bepflanzen den Bodens stellt, ihn mit nahrhafter Erde umgibt und den Erdbäusen mit umgewendeten Rasenplaggen bedeckt. Der Vortheil dieser einfachen Methode ist klar. Die Wurzeln sind nicht, wie in den Pflanzlöchern, in spanische Erseifen eingewängt, sondern vermögen sich nach allen Seiten horizontal auszubehnen, um sich später selbst ihre natürliche Stellung zu geben. Die Rasendecke des Bodens und der umgewendeten Rasenplaggen verkauft und bietet ihnen eine geeignete organische Nahrung, bei deren Bildung durch Zersetzung zugleich Wärme entwickelt wird. Diese sowohl, als auch die gleichzeitige Dampfbildung der im Erdbügel enthaltenen Feuchtigkeit, verbleibt den Wurzeln um so länger, als die Rasenplaggen mit ihrer umgewendeten flüssigen Wärme und Feuchtigkeit nicht so leicht entziehen lassen, wie eine lockere Erdschicht. Zugleich saugt der Erdbügel während des Tages mehr Wärme ein, als das von einer ebenen Fläche geschehen kann. So hoch aber auch diese Wärme etwa steigen sollte, sie vermag nicht die ganze Feuchtigkeit des Hügelg zu versüßigen, immer behält er einen Theil derselben bei und ernährt auf solche Art das Wurzelwerk gleich einem Wadschen Kasten, der, hermetisch verschlossen, die Feuchtigkeit nur verdampft, um sie auf's Neue zu verdichten und diesen Proceß so lange zu wiederholen, als die Feuchtigkeit von den Pflanzen selbst in ihrem Zellgewebe gebunden ist. Da jedoch dem Erdbügel fort und fort neue Feuchtigkeit von außen zugeführt wird, so ist es klar, daß die Einwirkung der größten Sonnenhitze nicht im Stande sein kann, alles Wasser zu verdampfen. Ebenso wenig will man eine Verbunkstung des gebildeten Ammoniak wahrnehmen haben, obgleich eine durch die größere Verwesungsthätigkeit gebildete bedeutende größere Menge von Kohlenäure aus den Hügeln entweicht, als aus einem flachen und beraisten Boden. Es liegt folglich auf der Hand, daß die junge Pflanze auf eine geraume Zeit hin- aus die vorthellhaftesten Bedingungen zu ihrer Entwicklung erhält; um so mehr, da ihre Wurzeln höchst wahrscheinlich eine größere Menge von atmosphärischer Luft zugeführt erhalten, sie also in innigerer Verbindung mit dem Luftmeere stehen. Ein Vortheil, welcher bekanntlich bewehrte Erde so einflussreich für junge Pflanzungen macht.

Mittels dieser einfachen Methode ist es in Sachsen gelungen, große Waldbestände rascher, als unter andern Umständen, einer günstigen Entwicklung zuzuführen, und dieses Resultat ist um so bemerkenswerther, da in vielen Fällen der Boden auf eine unverantwortliche Art seiner Streu- und Humusdecke beraubt, sein Holzbestand schonungslos und ohne alle Rücksicht auf Nachwuchs abgetrieben worden war. Die Methode bewährte sich vor Allem auf den sorgfältigen Niederungen und den sorgfältigen Hochbeeten, deren eilige Nebel dem Baumwuchs so unendlich

nachtheilig zu sein pflegen. Nur hatte man sorgfältig darauf zu achten, daß dieser sumpfige Boden durch Bleiben von Gräben entwässert und des größten Theils seiner sauren Bestandtheile beraubt wurde. Aber noch mehr. Auf den ersten Blick sollte man glauben, daß die Hügelpflanzung nur in der Ebene ausführbar sei. Trotzdem hat man sie in Sachsen selbst an steilen Lehnen mit entschiedenem Erfolge angewendet, sobald nur die zu bepflanzen den Stellen etwas eingeerbet wurden. In diesem Falle achtet man zugleich sorgfältig darauf, die Bergeabhängen nicht so zu verwunden, daß Wasserläufe entstehen können. Auch legt man die Rasenplaggen etwas anders: nämlich den untern zuerst, den obern zuletzt, damit er mit seinen beiden Enden über jenen hinweggreife und ihn festhalte.

In Bezug auf den sauren Boden hält man in Sachsen die Hügelpflanzung für die einzig zulässige Methode, welche Aussicht auf Erfolg für Holzproduktion gibt, weil der Pflanzling möglichst hierdurch auf einen entsäuerten Boden zu stehen kommt. Bei kleineren Flächen kann sie auch keine Schwierigkeiten haben; Plaggen und Pflanz- Erde sind genügend vorhanden und nur die Herdelschaffung der letzteren, sowie die Entwässerung fallen hier mit ihren Kosten in's Gewicht. Größere Flächen müssen erst mehrere Jahre lang sorgfältig vorbereitet werden, um durch Entwässerung die Erzeugung einer dichteren Graubere hervorzurufen. Denn dies ist der rechte Zeitpunkt, in welchem die Bepflanzung des Torfbodens allein beginnen darf und kann. Erst jetzt hat nämlich dieser durch Austrocknung die rechte Dichtigkeit erlangt, erst jetzt eignet er sich dazu, den Wurzeln einen entsprechenden Boden, den Hügel das Material zu ihrem Aufbau zu liefern. Denn da man in der Regel auf größeren Torfflächen keine mineralische Erde besitzt, so ist man nur auf den Torfschicht angewiesen, und dieser liefert auch in der That eine brauchbare Erde, sofern nur die Moorerde lange genug der Luft ausgesetzt war. Man verwendet deshalb am besten die aus den Gräben ausgeworfenen Plaggen, aber mit der Vorsicht, daß man die Hügel 2 bis 3 Mal größer macht, als das mit mineralischer Erde der Fall zu sein braucht. Auf kleinen Flächen dürfen jedoch diese Plaggen naß sein, weil sie sonst zu fest aufeinander bücken und die Communication der Wurzeln mit der Luft gänzlich abschneiden würden. Nur eine angemessene Feuchtigkeit schadet nicht; im Gegentheil verhindert diese das sonst leicht erfolgende Austrocknen der Hügel. Um dieses gänzlich abzumenden, hat man die Plaggen nicht allein fest aufeinander zu drücken, sondern auch mit einem geeigneten Materiale zu decken. In der Regel fehlt zu diesem Behufe die Rasendecke und es bleibt nur eine Moosdecke übrig, für welche jedes Moor das hinreichende Material gibt. Da es jedoch hierbei wesentlich auf die Befestigung der Hügel ankommt, damit dieselben nicht von den schweren Niederschlägen der Atmosphäre zertrübt und zerwaschen

werden, so möchte ich hierbei darauf aufmerksam machen, nur Polytrichum-Plaggen zu verwenden. Sie vor allen andern sind am meisten geeignet, diese Befestigung im großartigsten Maßstabe auszuführen. Unter allen den Torf verwendenden Moosen bilden sie die dichtesten, sich leicht verfügenden Rasen und entwürfen durch ihre tief gebenden Stengel- und Wurzeltheile den Torf in einer Weise, die nicht zu wünschen übrig läßt. In dieser Beziehung steht Polytrichum strictum Meuz. obenan, und dieses Moos fehlt selten, wo Torf die Unterlage des Bodens abgibt. Selbstverständlich hat man fort und fort dafür zu sorgen, daß die Gräben in ihrem normalen Zustande erhalten werden.

Freilich kann man mit einigem Rechte die hohen Kosten der Hügelpflanzung als eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit betrachten. Näher besehen indes fällt aber auch dieser Einwand in sich selbst zusammen. Der Landwirth ist in vielen Fällen genöthigt, die kostspieligsten Meliorationen — Drainagen, Düngung, Brennen des Torfbodens u. s. w. — vorzunehmen, wenn er Aussicht auf gute Ernten haben will. Der Waldbwirth befindet sich in einem gleichen Verhältniß; er erntet nicht, wo er nicht sorgfältig aderte, säete, pflanzte. Wo er das aber ausführt, da ist ihm auch der Lohn gewiß, und die sächsischen Waldungen liefern den schlagendsten Beweis dazu. In einem Zeitraum von 45 Jahren steigerte sich ihr Netto-Ertrag von 4 — 500,000 Thaler auf 1,300,000 Thaler nur durch die fragliche Culturmethode. Was aber nicht doch genug veranschlagt werden kann, ist, daß die alten Blößen wieder belebt, geringhaltige Bestände rasch verjüngt, die Bodenwerthe allmählig gehoben, die Nutzungen des Holzertrages in steigendem Verhältniß erweitert sind. Natürlich kommt dabei Alles darauf an, die Hügelpflanzung mit der größten Sorgfalt vorzunehmen. In Sachsen verwendet man 3 bis 4 Menschen, welche sie auszuführen haben. Der eine pflanzt, indem er das Bäumchen in vollkommen senkrechter Stellung erhält; die andern tragen Erde herbei und füllen sie um das senkrecht gehaltene Stämmchen, bis dieses den rechten Stand be-

kommen hat. Dann legen die übrigen die Plaggen zunächst kreisförmig um den Fuß des Hügels, bauen auf diesen Kreis einen zweiten, und so fort, bis der Hügel schließlich von halbmonds förmigen Plaggen vollkommen gedeckt ist. Trägt man hierbei nur Sorge, daß bis dicht an das Bäumchen heran gedeckt ist, dann erlangt dieses eine vollkommen sichere Stellung, welche keiner Stütze mehr bedarf. Umgekehrt schlägt jede Oeffnung, die man um das Bäumchen herum läßt, für dieses zum Verderben aus, weil ihm die Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Regen genommen wird. Zum Ueberfluß schlägt der Arbeiter mit der flachen Hand die aufgestellten Plaggen fest, wodurch die Erde des Hügels die rechte Festigkeit gewinnt. Um aber das ganze Verfahren so wohlfeil als möglich zu machen, zieht man weibliche Arbeiter herbei, die es rasch begreifen und wohlcontrolirt gut ausführen.

Die Nuganwendung auf öffentliche Anlagen und Obstpflanzungen liegt so nahe, daß man nur daran zu erinnern braucht, um ihre Bedeutung sogleich zu erkennen. Es existirt ein vortreffliches Buch über „die Hügelpflanzung der Laub- und Nadelbäume“ von Hans Ernst Freiherrn von Mantuffel (Leipzig, bei Arnoldt, 1865, dritte Auflage), welches nicht nur das ganze Verfahren zuerst zur Sprache brachte, sondern auch für weitere Kreise nach allen Richtungen hin speciell auseinander setzte. Wer sich sogleich noch genauer über die Methode und das Culturverfahren der anzunehmenden Hügel unterrichten will, dem sei das Buch auf das Wärmste empfohlen. Es bezieht aber auch in einem Anhange beachtenswerthe Winke zum Hügel der Obstbäume, wie nicht minder kostbare Erfahrungen in Bezug auf die günstige Entwicklung dieser Bäume unter dem eingeschlagenen Verfahren. Ich selbst habe im Weimarischen schon vor vielen Jahren die bedeutendsten Erfolge bei Kiebenpflanzungen gesehen, und in der That ist das ganze Verfahren so einfach, in seiner Theorie so klar, daß es wohl nur dieser kurzen Skizze bedarf, alle Diejenigen darauf aufmerksam zu machen, die es anseht. Möchte es bald in allen Theilen unseres Vaterlandes geprüft und verwerthet werden!

## Der erste Schnepfentag.

Von Max von Hartmann in Amsel.

Das war eine hümmliche Nacht! Der Südwest rüttelte an den Läden meines Hauses, die Regentropfen prasselten gegen die Fensterscheiben, und durch die feinen Ritzen eines schlecht schließenden Fensters drang der nicht zu beschreibende Anhauch der Frühlingsluft wie Wohlgeruch herein. Ich athmete tiefer und freier, ich fühlte mich körperlich und geistig erregt und gehoben. Mit dem Dämmerlichte des Morgens klang aus einer liebevollen Stimme an mein Ohr; das Hausorchestergelächter hat mir von hoher Höhe seine Ankunft in der alten Heimat verkün-

det. Ein paar Töne machen nur die einzige Gesangsstrophe aus, dazu klingt sie noch heiser, aber dennoch ist es eine Weise, durch welche der Frühlings zur Seele spricht. Und einer solchen Waldmannsseele plaudert auch diese Stimme ein besonderes Geheimnis aus: Ich bin nicht allein in dieses Thal gekommen; dort drüben an den sumpfbegrenzten Waldbränden hat sich in der Grube die eine oder andere Waldschnepfe niedergelassen. Reminiscere — den Kopf in die Höh!

Den Kopf in die Höh' hebt mit mir zugleich der alte

Caro. In den Hieroglyphen seiner Stirne lese ich deutlich, daß sich etwas gar Feines in seiner Seele regt. Treu wie diese ist sein Gedächtniß, seine Erinnerungsgabe. Hat seine Nase den Frühling gewittert und mit dem Märzfrühling die „Langschnäbel“, von denen schon mancher „Eulentopf“ vor dem „Feststehenden“ sich über die Büsche erhebt, um, vom Bei des Schüben erlöst, schnell zu Boden zu fallen? Oder hat der aufmerksame Beobachter die Erregung seines Herrn wahrgenommen, dessen Blick aufgefangen, dessen größere Aufmerksamkeit und schmeichelnde Andeutung verstanden? Gleichviel, wie und woher, Caro fühlt sich sympathisch berührt, er hebt den „Behang“ und klopfte unruhig mit der „Kuthe“, ja, er zittert und bellt im Schloße, — offenbar träumt er von der Jagd, und sein Freund allein weiß diese Träume zu deuten.

Der erste Gang zur Frühlingschnepfensuche — wer vermag ihn treu zu schildern? Wer versteht es, das Geheimniß der ächten Naturseelen, das Leben in der edlen Waldmannsbrust zu ergäßen? Die Natur ist Musik, unerschöpflich wie sie, unendlich in ihren Tönen und Harmonie wie sie.

Welche Umwandlung seit gestern! Eine einzige Nacht, ein einziger Sturm hat die rauben Fesseln gesprengt; die Halmte der Gräser wehen hin und her; die Wuchselzen zwischern und zanken sich, die Staare haben ihre Trupps aufgelöst und balzen, und hoch aus der Luft tönt das erste „Kerub“ der Kraniche. Caro vernimmt Alles und denkt und fühlt dabei das Seinige. Schweigend folgt er seinem Führer auf den Felsen; denn die Kreuz- und Quersprünge der Jugend bücken dem Graubart seiner unwürdig, und von Nebenwegen war der ehrliche Charakter nie ein Freund. Er läßt die Hasen paarweise in der Ferne „vorbereiten“ und die Hühner am Wege „aufstehen“ ohne sonderlich Noth von ihnen zu nehmen. Er weiß, daß es heute gilt, höhere, edlere Reute zu erlangen. Jetzt, dem Walde nahe, nimmt er eine andere Haltung an. Der Kopf ist gehoben, die Nase windet, das Auge schaut weit hinaus, die Gestalt wächst gleichsam. Das Wort: „Caro, voran!“ hebt ihn durch alle Glieder, und in gestrecktem Galopp eilt er der jungen Buchenbeerge zu. Hier umkreist er, immer Wind suchend, die einzelnen Wuchspartien; die vortheilhafteste Art des Wachens springt in die Augen; es liegt ihr Plan und Umficht zu Grunde. Kleine Büsche werden in hohem Saß übersprungen, größere Dikungen möglichst vorsichtig trotz aller Behembigkeit durchsucht. Dabei behält der rücksichtsvolle Caro stets die Richtung seines Herrn im Auge. Erfahrungsmäßig windet sich der geübte Schüge, das gespannte Doppelgewehr mit der rechten Hand am Griff hinter den Drückern und Hähnen fassend und die Läufe vorn an die rechte Schulter gelehnt und nach oben gerichtet, durch das Gestrüpp und Gesträ, indem die linke Hand die

Zweige oder sonstige Hindernisse zur Seite biegt. Die Waldblößen werden benutzt, von wo aus Auge und Waffe einen größeren Umkreis beherrschen können, und Caro weiß, daß die Schnepfe gern der Blöße zuläuft „um sich ohne größere Schwierigkeit zu erheben.“ Einem Bächlein oder einer sumpfigen Stelle im Erlengrunde oder einem Strich, wo das Holz wechelt, sei es in Bezug auf die Art oder das Alter desselben, muß ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden. Und kaum gedacht, nehme ich an Caro Zeichen war, daß er „etwas in der Nase hat.“ Die „Kuthe“ ist fast wagerecht in die Höhe gerichtet, die Haare des Rückens haben sich ein wenig gesträubt — der Hund „steht an“. Rasch eile ich zur nächsten Blöße, um Vorsprung zu gewinnen; denn bei solchem windigen Wetter „halten“ die Schnepfen nicht. Ich sehe es an dem bewegten Nachziehen des Hundes, daß die Schnepfe läuft, sehr läuft. Plötzlich läßt er ab, sucht die Schnepfe in weitem Bogen zu umkreisen — eine seltene und darum desto geschätztere Eigenschaft des Hühners hundet. Da höre ich in einer Entfernung von mindestens hundert Schritten das „Flappen“ der aufgehenden Schnepfe, und ein leiser Pfiff führt den Hund an meine Seite. Doppelt vorsichtig suchen wir weiter. Kaum 50 Schritte vorgegangen, gleicht wiederum der Hund an. „Flapp, flapp, flapp“ — dort strich die Schnepfe schon hin. Aber was bedeutet das? Caro bellt, und sein Beilen lautet fast wie Geheul. Der dich seit 10 Jahren kennt und so manche Freude und so manches Leid mit dir erlebte, dein Freund versteht dich. Du kußt die grausame Göttin an, du schmähst Diana, die treulose, weil sie vor die die Schnepfen herausjagt und die keine Zeit läßt, das Meisterstück der Vorfels- und Apportirkunst zu machen. Geduld! wir kommen doch vielleicht an's Ziel. Folge mir! Mit diesen Worten verlaßt ich mit Caro die Hege und schliche den schmalen Weg am Hochwald hinunter dem großen Dornbusch zu, diesem stummen Zeugen eines Falles, wo eine Schnepfe sich dem vorstreichenden Hunde förmlich zur Wehr setzte, indem sie die vordere Hälfte des Oberschnabels mit bewundernswürdiger Biegsamkeit dieses Theiles in einem sanften Bogen hob, die Federn zum Theil aufstellte, den Schwanz ausbreitete und in die Höhe richtete und so mit den großen Augen der Störche im behaglichen Bohrgeschäfte ansah. Diesem unvergeßlichen Plätschen nahen wir uns, wo im Herbst eine „aufstehende“ Schnepfe über Caro raubvogelartig mit glitzernen Flügelferegung und nach unten gerichteter Schnabel einige Augenblicke schwebte und eigenbümlich glucksende Töne hören ließ, die von dem bekannten Balzton ganz und gar verschieden sind. — Nun sehe Einer den alten Kindstropf an, wie er sich gebietet, als müßten die Schnepfen dort in dem wohlbekannten Busch „liegen“! So weit ist der Schlußpfad doch noch nicht gekommen, um zu wissen, daß die rege gewordenen, nicht haltenden Schnepfen


da einzufallen vorzuleben, wo sie im Laufen und „Aufstehen“ nicht gehindert sind. Er „steht“ — sollte? — „flapp, flapp, flapp“, da erhebt sich auf 30 Schritte Entfernung eine Schnepfe; ich sehe nur noch den Schatten, und dennoch halte ich hin. Der Pulverdampf verhüllt mir den Blick. Allmählig vergeht er sich, und mit der Klarheit meiner Umgebung taucht der Kopf meines edlen Thieres vor mir auf; tief im Rachen liegt ihm die Schnepfe, zu den Selten bilden die „Ständer“ und der lang beschwäbelte Kopf hervor. Mit wechsender Ruthe, stolzhobonem Kopf und feurigem Auge umkreist mich Caro; dann setzt er sich ungehelfen neben mich und gibt mir die Schnepfe ab.

Wie ich vermuthet, trifft ich die zweite Schnepfe ebenfalls am Rande des Gehölzes an, aber weder hier noch im angrenzenden Hochwalde, in den ich sie verfolgte, „steht“ sie in schußgemäßer Entfernung vor mir „auf“. Heftige Windstöße führen jetzt seinen Regen und Hagel mit sich, vor dem ich mich hinter einer alten Eiche am Saume des Hochwaldes berge. Plötzlich nehme ich hoch in der Luft ein dunkles Pünktchen wahr, das immer näher kommt und größer wird und, als Schnepfe von mir erkannt, peilartig schnell im Stangenholz vor meinen Augen verschwindet. Solche Antömmelinge erscheinen öfters bei Tage in Begleitung von Strichregen und Hagelwetter. Bald wird der Himmel wieder blau, und die Sonne trocken mit Hülfe des Windes rasch die Hecken. Ich lenke meine Schritte nach jener Richtung, wo ich die ankommende Schnepfe „einfallen“ sah; zu meinem und Caro's Leidwesen hält aber auch diese nicht. Dreimal „thue“ ich sie „auf“, und das letzte Mal erhebt sie sich hoch in die Luft und verschwindet, wie sie gekommen. Das Gefühl der Unsicherheit, verbunden mit dem in Erregung befindlichen Zugtrieb, entführte mich auf diese Weise schon gar manche Schnepfe.

Der Waldmann muß unverbroffen sich in die Um-

stände fügen und über der Gegenwart die künftige Geslegenheit nicht vergessen. Soll der „Strich“ nicht der einträchtig werden, so muß jetzt die Suche ruhen, und ein paar Stunden Wartens bis zur Strichzeit sind geboten. Die erste Schnepfe an der Jagdtasche hat doppelten Reiz für das Jägerberg, und die Ehre eines „Schnepfenkönigs“ kommt in keinen geringen Anschlag im Waidmannsleben. Diese erste Schnepfe hängt an meiner Seite, und neben mir sitzt der alte Caro, der gleichen Antheil mit mir hat an der Königsehre. Diese Schnepfe und dieser Caro — wie viele Erinnerungen sind mit dem Anblick Beider verknüpft! Die dem verglittenen Laub und der Baumrinde ähnliche Färbung des Gefieders, welche

dem Vogel beim Niederdrücken an den Boden dem Feinde gegenüber so sehr zu Statten kommt; der weiche, rinnige, blegsame und lange Schnabel, der mit großer Geschicklichkeit nach Wärmern und Latzen bohrt; die hohen „Ständer“, welche den Vogel ungemein schnell auf ebenem und unebenem Boden dabintragen; der hohe, gewölbte Kopf mit der stark vorsehenden Stirne und den großen Augen — alle diese charakteristischen Eigenschaften,



Die Waidkneipe (*Scolopax rusticola*).

verbunden mit dem geheimnißvollen Wandel des Vogels, beschäftigen die Phantasie des Jägers in hohem Grade. Daß diese erste Schnepfe eine kleine ist, stimmt mit der allgemeinen Erfahrung, daß die kleineren Schnepfen zuerst und die größeren, die sogenannten „Eulenköpfe“, später ankommen, während es im Herbst umgekehrt der Fall ist. Zwei Arten unterscheide ich jedoch darum nicht, sondern führe die Ursache der Verschiedenheit in Färbung und Größe auf die klimatische und Bodenbeschaffenheit zurück.

Gegen Abend legt sich der Wind, und der Himmel klärt sich vollständig auf. Die Dämmerung ist im Anzuge. Die Amsel schwingt sich auf hohe Zweige des Gehölzes oder der Bäume und stößt ihre Elegie; die Singdrossel ruft ihr ehedemendes Lied in das Thal hinein und unterbricht den lauten Gesang mit dem hohen, seltsamen, oft das Jä-

tigen Gezwitscher; das Rothkehlchen, welches schon in einigen Vorboten vertreten ist, läßt seine seltliche Welse hören. Es ist, als wollten die dem Westen zugekehrten Vögel alle dem sinkenden Tag das Abschiedslied singen, und je mehr er sich neigt, desto feuriger und zusammenhängender wird ihr Vortrag. Da schallt mitten durch das Singen und Zwitschern der Vögel der seine Balzton der Schnepfe. Noch weiß ich nicht die Richtung, woher er gekommen. Aber hinter mir sitzt der scharfe Wächter und Hörer, der den Kopf nach jener Elche im Stangenholz gerichtet hält und aufmerksam nach dem Himmel sieht. Jetzt nehme auch ich an dem wiederholten Balzen die Richtung wahr, welche die „streichende“ Schnepfe nimmt; das dumpfe, nicht zu beschreibende Anarten wird hörbar, und im nächsten Augenblicke streicht die Schnepfe gerade über meinen Kopf in einer Höhe von nur 40 Fuß. Ich lasse sie über mich hinstreichen, drehe mich um und schreie. In der Meinung, ich habe gefehlt, sehe ich ärgertlich ihr nach, bis sie verschwindet. Aber da fliegt ein Federchen in der Luft. „Caro apparet!“ und mit gehobener Nase folgt der Hund der Schnepfe, zunächst vom Auge geleitet, das ihr wie das meinige gefolgt war, dann aber von der Nase allein, welche den auf dem Boden und an Büschen niedergetrübsten „Schweif“ (Blut) wittert. Nach kurzer Pause erscheint Caro mit der Schnepfe. In demselben Augenblicke erschallt von Neuem der bellende Balzton. Caro bleibt mitten auf der Waldschneise

regungslos stehen und zeigt mir mit einer Wendung des Kopfes die zweite Schnepfe an. Gespannt erwarte ich sie; doch schnell kehrt der Hund den Kopf der entgegengesetzten Richtung zu. Deutlich vernehme ich im Rücken und vor mir das Balzen. Da blickt sich mir der seltene Anblick zweier sich fliegender Männchen dar. Gerade über der Schnepfe (Wog), aber selber außer Schußweite, steigen die Erhöhten hell vor einander in die Höhe und prallen mit Schnabel und Ständern gegen einander an. Dann trennen sie sich und entgehen sich meinem Gesichtskreis und dem Auge Caro's, der nach dem letzten Bild auf die Verschwindenden sich sogleich ansieht, mir die erlegte Schnepfe zu dringen. Noch eine Zeit lang lausche ich und blicke rings nach dem Horizonte in der Hoffnung, noch eine Spätschneide zu erliegen. Aber die Dunkelheit ist hereingebrochen, und kein Vogel erhebt mehr seine Stimme. Nur in der Ferne fliegt der durch den Schuß vertriebene brütende Koltrabe in weitem Bogen wieder seinem Neste zu. Wohlzufrieden mit der Beute des ersten Schnepfentages, trete ich den Rückweg zur heimischen Wohnung an, und der lebhaft erregte Geist entwirft auf dem Heimweg den Jagdplan für den kommenden Tag. Caro geht hinter mir her, nach seiner Hütte sich sehnend, wie sein Herr und Freund nach dem trauten Familienlebe. Ob er nicht auch an eine künftige Jagd denkt? Caro hat ja eine denkende Seele. —

## Nicolaus Cusanus.

Von H. C. Grundjann.

Der uralten Moselftadt Bernkastel gegenüber und etwas unterhalb des auf der linken Stromseite liegenden Dorfes Cues, liegt ein höchst merkwürdiges, köstlich eingerichtetes, mit seiner hübschen Kirche dem spätgotischen Baustil angehöriges und von weltläufigen Augästen umgebenes Gebäude. Es ist das von dem berühmten Erleuchten und Kardinal, Nicolaus von Cues oder Cusanus, und seinem Bruder, dem frommen Probst von Bernkastel, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gestiftete Hospital für hülfbedürftige Männer.

Diese interessante, im ganzen Rhein- und Mosellande wohlbekannte und hochgerühmte Stiftung hat trotz aller Drangsale, welche diese Gegend im Laufe der vier letzten Jahrhunderte betroffen, sich fast unverändert in die Gegenwart gerettet — und wenn auch mancher gewalthätiger Arm sich darnach ausgestreckt haben mag, so wagte es doch keiner, die Zufluchtsstätte der Armen und Presbysten anzutasten. Im Wesentlichen ist noch alles in dem Hospital so erhalten, wie es die edlen Gründer, als sie vor 400 Jahren starben, verlassen haben. Selbst die kostbare Bibliothek des großen Mannes — aufgestellt in

einem schönen gotischen Gemach, das schon an und für sich Klebe und Ausdauer zu ersten Studien einflößen mußte — und auch in der That demselben als Studierzimmer, als „Sanctum sanciorum“ diente, ist mit den von ihm benutzten und erfundenen mathematischen und astronomischen Instrumenten fast unverändert bewahrt.

Von dem Herkommen und der Jugendzeit des gelehrten Kardinals haben sich nur dürftige, theilweis widersprechende Nachrichten erhalten. So soll er — 1401 zu Cues geboren — der Sohn eines armen Älfters gewesen sein. Ursprünglich schrieb er sich Krebs, welches Vater auch an seinem noch vorhandenen, stattlichen Stammbaume in Cues als Wappen zu sehen ist; erst später nahm er als Gelehrter und Schriftsteller nach der Sitte der Zeit den Namen „Cusanus“ an.

Schon als dieses Haus und Wappen, wie der Umstand, daß er schon als junger Kleriker in das St. von St. Florin zu Coblenz aufgenommen — und bald darauf Canonikus und Probst in demselben wurde, daß er — ein junger Mann — schon als Archidiacon von Lütich auf dem Concillium zu Basel erscheint, wohin er von dem

Hochstift abgeordnet war, sowie die Einrichtung in dem von seinem Bruder und ihm gegründeten Hospital, in welchem es abtlige und bürgerliche Pensionäre gab und noch gibt, die in Wohnung und Tisch geschieden waren, sprechen dafür, daß er von seinen niederen Eltern abstammte.

Nach den Begriffen seiner Zeit, in der die Stände so streng geschieden waren, konnte auch ein Niedergeborener — und wenn er sich durch Gesandengaben noch so sehr ausgezeichnet hätte, nicht so rasch — wie Nicolaus es that — in der Kirche alle Stufen bis an den Papst erklimmen. Es ist deshalb auch die Uebertreibung, wonach dessen Vater ein Lehnsmann der Grafen von Manderscheid war, eines mächtigen, hochadligen Geschlechts, deren Stammburg in ihren Ruinen noch eine Zierde der romantischen Eifel ist und gleich einem Alchorsorge im wilden Thale der Eiser bei dem Orte gleichen Namens auf senkrechtem Felsenkamm, in schwindelnder Höhe liegt, als der Wahrheit eher entsprechend anzusehen, woraus auch zugleich erklärt wird, daß Nicolaus als Knabe in die Gesellschaft der beiden jungen Grafen aufgenommen, mit dem jüngeren, der zum geistlichen Stande bestimmt war, in Doventer Theologie studirte — und dann mit Weiden, um dem Studium der Rechte obzuliegen, nach Padua ging.

In diese Zeit scheint auch seine Bekanntschaft mit dem berühmten Aeneas Sylvius (Piccolomini), seinem Posenfreunde und nachmaligen Papste Pius II., zu fallen, der sich zur Zeit des Concils zu Basel als Secretär Friedrich's III. und später in wichtigen Geschäften des römischen Hofes viel in Deutschland aufhielt. Diesem Freunde, der mit den damaligen politischen-religiösen Verhältnissen sehr vertraut — und ein Staatsmann ersten Ranges war, wird es auch zugeschieben werden müssen, daß er als Abgeordneter anfänglich so eifrig für die Rechte des Concils (den Annahmen des römischen Hofes gegenüber) auftretende Eufanus sich zuletzt auf die Seite des Papstes stellte.

Dieser Gefinnungswechsel läßt sich bei dem geraden, hiebrern Charakter des Eufanus nur dadurch erklären, daß neben dem bekannten terroristischen Verfahren des Concils es der Verdorbenheit seines Freundes gelang, ihn von der Nothwendigkeit der Unabhängigkeit des Oberhauptes der Kirche ungemessenen Ansprüchen gegenüber zu überzeugen.

Wen da an wurde Eufanus nach Rom gezogen, in den wichtigsten Geschäften verwendet — und zur Belohnung seiner Dienste zum Cardinal-Bischof von Viterbo in Airo erhoben. In dieser äußerlich so glänzenden Stellung ging es ihm aber schlecht genug; denn die Airoler waren auf den ihnen aufgewungenen fremden Eindringling (wie sie ihn ansahen), nicht gut zu sprechen;

und als er gar versuchte, die Welt- und Klostergeistlichkeit zu reformiren, gerieth er zuerst mit den Benediktinern: Nonnen zu Sonnenburg im oberen Pustertthal, welche unter Anführung ihrer Abtissin, Veronika Studer, den heftigsten Widerstand leisteten, — und dann auch noch mit dem Beherrscher des Landes, Erzherzog Sigismund, wegen verschiedener Irrungen in großen Streit, der Jahre lang dauerte, ihn längere Zeit seiner Freiheit beraubte und sogar sein Leben in Gefahr brachte. Dieses Alles verleitete ihm sein Bisthum so sehr, daß er es gegen eine Abfindung aufgab, um sich ganz seiner Stiftung der Eues, sowie seinen Studien zu widmen. Er wurde aber nochmals zu einer wichtigen Mission nach Italien berufen, wo er am 6. August 1464 zu Tode seinen Geist aufgab. Sein Leib ruht zu Rom in seiner Titular-Kirche St. Petri ad vincula, und sein Grabmal (Bustbild auf einem Kissen ruhend) ist noch vorhanden. Sein Herz wurde aber nach Eues gebracht und vor dem Hochaltare der Hospitalkirche beigesetzt, wo auch seine prachtvollen geistlichen Gewänder und viele andere Gegenstände von ihm noch zu sehen sind.

Besonders merkwürdig sind die von ihm erfundenen und bei seinen astronomischen Studien gebrauchten, einen tiefen Einblick in die Beschaffenheit und Bewegung der Himmelskörper verrathenden Instrumente. Er hat denn auch, wie seine hinterlassenen Werke, die er zu dem Theil dem gelehrten Papste Nicolaus V. widmete, auf's Deutlichste bekunden, schon viel früher als Copernicus, der erst 1473, also 72 Jahre später geboren war, im Wesentlichen dieselben Entdeckungen, wie dieser gemacht. Auch hat er dem genannten Papste Vorschläge zur gründlichen Kalenderverbesserung überreicht, die aber erst hundert Jahre später bei Ausarbeitung des Gregorianischen Kalenders zur Benutzung kamen. Es ist leicht möglich, daß Copernicus neben seinen eignen Studien auch die Werke des Eufanus benutzte, wovon J. B. „Diversi tractatus Nicolai de Cusa, qui versa pagina patet“ schon 1476 gedruckt erschienen. Willrich gehört Copernicus auch einer der rheinischen Familien an, welche als Verwandte oder Lehnsleute den Deutschordensrittern nach Preußen folgten, und dann würde Coborn an der Mosel als Stammort seiner Familie anzusehen sein.

Wenn man bedenkt, daß zu Eufanus Zeit die astronomischen Entdeckungen der Airo, wie die des Heraclides Ponticus, welcher zuerst die Umkehrung der Erde als Kugel lehrte, des Eraftothenes von Alexandria, welcher das Gradnetz um die Erde zog, des Hipparch von Nicäa, des größten Astronomen des Alterthums, der zuerst den Mondlauf und das Erbjahr auf 365 1/4 Tag bestimmte, des Efigenes, welcher den Julianischen Kalender abfaßte, und des Ptolemäus, der das berühmte Buch „Almagest“ schrieb, und dessen Welt-

systeme lange Zeit das herrschende war, wieder in Vergessenheit gesunken waren — und die mathematisch-astronomischen Studien im früheren christlichen Mittelalter bis auf Hypatia, die berühmte Tochter des Mathematikers Theon in Alexandria hinauf, fast gar nicht mehr gepflegt wurden \*), so muß man billig darüber erstaunen, wie es einem Manne wie Eufanus, der in seinem so sehr bewegten Leben nur verhältnismäßig wenig Zeit finden konnte, so tiefen und mühevollen Studien obzuliegen, möglich wurde, so Erstaunliches zu leisten.

Eufanus lehrte neben der Kreindrechung der Erde die Bewegung derselben um die Sonne und erkannte die Mehrheit der Welten! Die Mängel der Zeitrechnung richtig würdigend, schrieb er den Traktat: „De reparatione calendarii“. Er erkannte ferner die Elliptik der Erde und ihre nahezu kreisförmige Bewegung um die Sonne, deren schwarzen Kern mit der Feuerhülle in den Sonnenflecken, so wie das reflectirte Licht des Mondes u. s. w.

Es ist fast unbegreiflich, wie es geschehen mochte, daß die Entdeckungen des Eufanus gegen die viel späteren des Copernicus so unbenutzt geblieben, und diesem, wie dem Galilei, Verdienste zugeschrieben werden konnten, die sie weder hatten, noch beanspruchten. Dieser offenbare Ungerechtigkeit gegenüber, die leider nicht vereinzelt in der Geschichte steht, muß es uns als eine Pflicht der Anerkennung und Dankbarkeit erscheinen, dem großen Manne zu den seinem Namen gebührenden Ehren zu verhelfen.

Aus den oben angeführten geschichtlichen Thatfachen kann man sehen, daß die kirchlich-astronomische Orthodoxie, wie auch der Gregorianische Kalender selbst schon dardurch, vor der Reformation nicht so unbillig war, wie nach derselben, wo der große Galilei um der Wahrheit willen durch die Inquisition zu Rom viel leiden mußte, während die Protestanten sich gegen den neuen Kalender wehrten, weil er vom Papste kam. Uebrigens sagen und schreiben wir — unseres besseren Wissens zum Trost — ja immer noch: „Die Sonne geht auf und unter“!

\*) Der Apostel der Deutschen, Winfrid, oder der heilige Bonifatius, verlegte noch den Virgillus von Straßburg, weil er an Antipoden glaubte.

## Literarische Anzeigen.

Verlag von OTTO SPAMER in Leipzig.

Illustrirte naturgeschichtliche Prachtwerke.

### Leben und Eigenthümlichkeiten

aus der mittleren und niederen Thierwelt, dem Reiche der Fische und Fische, Insekten und übrigen wirbellosen Thiere, geschildert von Dr. Ludwig Gieser & Dr. Carl Alth. Mit 400 Text-Abbildungen, 11 Tonbildern nebst zwei Abtheilungsfrontispicen. Nach Zeichnungen von Gaudard, J. Kiehl, Miesner, Krellschmer, Ehemme u. A.

Erste Abtheilung: Amphibien, Fische und Stiele. Preis: 1 1/2 Thlr.

Zweite Abtheilung: Mollusken, Würmer, Strahlthiere, Protozoen. Preis: 2 Thlr.

Beide Abtheilungen elegant zusammengebunden 3 1/2 Thlr.

Das vorliegende, elegant ausgestattete Buch bietet eine für einen größeren Leserkreis bestimmte, gemeinlich und unterhaltend geschriebene Zusammenfassung des Wissenswerthigen über Lebensweise und geistliche Eigenthümlichkeiten hauptsächlich der niederen, sogenannten wirbellosen Thiere. — Die Verlagsabhandlung bietet nicht allein im Kreise der studierenden Jugend Leser des Buches zu finden, sie glaubt namentlich auch den Jüngern, denen es obliegt, eine Fachmänner zu sein, naturgeschichtlichen Unterricht zu ertheilen, ein durch Selbsttheil leicht zugängliches, mit Sachkenntnis ausgearbeitetes, mühsames Hülfsmittel zu bieten, das ihnen eine zeitraubende Vorbereitung wesentlich erleichtert. Nicht minder darf das vorliegende Buch allen Schülern, die den Wunsch haben, sich Kenntniss vom Leben einer weniger bekannten Thierwelt zu erwerben, angelegentlich empfohlen werden.

Diesem Werke ging voran:

**Wohnungen, Leben und Eigenthümlichkeiten in der höheren Thierwelt.** Geschildert von Adolf und Karl Müller. Mit 125 Text-Abbildungen, 8 Tonbildern, Frontispice u. Gehefte 3 Thlr. In elegantem engl. Prachtband 3 1/2 Thlr.

Die Verfasser legen es sich durch die Art und Weise ihrer anziehenden Darstellung angelegen sein, die wirklich interessante und charakteristischsten Eigenthümlichkeiten des Thierlebens zu einem Gesamtbilde zu vereinigen.

Die vorstehenden Prachtwerke oder Prospekte über dieselben, letztere gratis, sind durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.

Im Verlage von Gebr. Borntraeger (Ed. Eggers) in Berlin erschien soeben:

**Nebu, Vieler, Culturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien, sowie in das übrige Europa.** Historisch-linguistische Skizzen. 29 Bogen. gr. 8. geh. Preis 3 Thlr.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptionspreis 2 1/2 Thlr. (1 R. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Subscriptionen an.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N<sup>o</sup> 51.**

[Achtzigster Jahrgang.]

Halle, S. Schmeiche'scher Verlag.

**22. December 1869.**

**Inhalt:** Vom Montblanc zum Monterosa, von Otto Ule. 12. Gletscher, Firn und Hocheis. — Der Vulkan von Gelima, von L. Hahn in Mexico. — Auch eine Plage, von Paul Kummer. — Literarische Anzeiger.

## Vom Monterosa zum Montblanc.

Von Otto Ule.

### 12. Gletscher, Firn und Hocheis.

Die meisten Menschen, die noch nie einen Gletscher gesehen oder betreten haben, machen sich davon ganz falsche Vorstellungen. Sie vergleichen ihn wohl gar mit den Schneeflecken, die auch in unsern niedrigeren Gebirgen an besonders geschützten Stellen sich bisweilen das ganze Jahr hindurch erhalten. Aber damit hat weder der ewige Schnee der Alpen, noch viel weniger der Gletscher irgend eine Aehnlichkeit. Der Gletscher ist eine Eismasse, die durch eine tiefe Schlucht weit unter die Grenze ewigen Schnees, oft bis in sonnige, grüne Thäler, mitten unter Wiesen und Felder, zwischen Wäldern und Hütten hinabsteigt. Er ist ein gefrorener Strom gleichsam, von vielen Stunden Länge und oft mehr als eine Stunde breit, der Abfluß der ungeheuren Schneefelder, die sich hoch oben in den muldenförmigen Vertiefungen zwischen den höchsten

Graten und Felsengipfeln der Alpen ausbreiten. Er befindet sich mindestens mit seinem unteren Theile in Regionen, in denen er schmelzen muß, in denen ja die Sommerwärme selbst noch Getreide reift — und er schmilzt in der That, wie die zahllosen murmelnden Wasserläufe auf seinem Rücken, wie der mächtige Gletscherbach bemerkt, der an seinem Fuße, oft aus hochgewölbtem, krystallinem Thore hervordrückt. Aber beständig sich auflösend, wird er doch nicht zerstört; er verschwindet nicht aus dem warmen Thale, und der sorgsamste Beobachter bemerkt nicht eine Abnahme seiner Masse. Er verschwindet so wenig, wie der Fluß, der seine Wogen in das Meer wälzt. Der Gletscher muß also beständig, wie der Fluß, einen Ersatz dessen erhalten, was er aufgelöst im fröhlich rauschenden Bache in die tieferen Thäler entsendet; er muß fließen



wie der Fluß, fließen wie der Lavaström. Wer aber noch zweifeln wollte, würde am Gletscher selbst die unwiderleglichsten Beweise finden. Wenn er sich dem Fuße eines Gletschers nähert, so würde er sich überzeugen, daß dieser seinen Standort nicht so dauernd behauptet, wie es scheinen möchte. Wenn der Gletscher Wiesen und Wälder erreicht, so wird man häufig an seinem Rande Bäume erblicken, die erst seit Kurzem von ihm umgerissen oder abgebrochen sein können; man wird den Rasen wie von einer riesigen Pflugschaar aufgerissen oder vor dem Fuße des Gletschers weit hin in schwere Falten gerunzelt sehen. Man wird freilich auch wieder andere Gletscher finden, deren Fuß mit den Trümmern von Eisern bedeckt ist, die von dem Gletscher herabgerollt sind; man wird weite Felsflächen vor denselben von ihrer Rasenbekleidung entblößt, selbst ohne jede Spur von Erde finden, gerade als ob vor Kurzem eine zermalmende Masse alle Unebenheiten des Bodens niedergemahlen hätte. Im ersten Falle wird man folgen müssen, daß der Gletscher im Vorrücken begriffen ist, daß sein Zufluß die Verluste übersteigt, die er durch Schmelzung erleidet. Im andern Falle wird man an einen Rückzug des Gletschers glauben müssen, der dadurch erfolgt, daß das Schwinden des Eises unten durch den Zufluß von oben nicht ersetzt wird. Wenn man den Trümmerwall übersteigt, der den Fuß des Gletschers von einem Ufer zum andern wie ein Gürtel umzieht, so begegnet man auf der Gletscherfläche neuen, untrüglichen Beweisen der Gletscherbewegung. Töhnliche Trümmerwälle, die hier und da eine Höhe von 80 Fuß erreichen, gleichen sich auch hier, und zwar nicht bloß längs der Ränder, sondern auch selbst in zwei, drei und mehr Reihen, den Gletscher hinauf. Man kennt diese Wälle unter dem Namen der Moränen, Sanden oder Suffertlinien. Daß die Wälle, welche diese Wälle zusammensetzen, von den Felswänden herrühren, welche den Gletscher begrenzen, daß sie durch die Wirkungen des Frostes und der Witterung überhaupt dort abgeblöst wurden, erscheint selbstverständlich. Unbegreiflich ist nur die Gleichmäßigkeit dieser Trümmerwälle, die nirgends Lücken, nirgends größere Anhäufungen zeigen, während doch unzweifelhaft bei der verschiedenen Naturbeschaffenheit, Neigung und Höhe der Uferfelsen es Punkte geben muß, an denen solche Ablösungen sich häufiger wiederholen und darum auch mächtigere Trümmerhaufen erzeugen müssen. Man muß sich auch hier wieder überzeugen, daß eine Fortbewegung des Gletschers stattfinden muß, so daß die herabgefallenen Trümmer beständig fortgeführt werden und den nachfolgenden Raum lassen. Ein einziger, in besonderm Grade der Zerstörung ausgesetzter Fels am Ufer kann also die Quelle einer ganzen Moräne sein, welche die Seite eines Gletschers einfaßt. Dies wird durch die Beobachtung bestätigt, daß auf den unteren Theilen des Gletschers sich häufig Felsblöcke finden, die durchaus nicht den ansehn-

den Uferfelsen angehören, sondern deren Ursprung weit oben in den höchsten Regionen des Gletschers gesucht werden muß. Den entscheidendsten Beweis aber führen die Mittelmoränen, die sich oft mehrere tausend Schritte von den Uferwänden entfernt auf dem Gletscher hinziehen. Man nahm früher an, die Steine, die auf die Ränder des Gletschers herabgefallen wären, hätten sich allmählig nach der Mittellinie des Gletschers, als seinem niedrigsten Theile, hinabgegeben, verlag aber dabei ganz die wahre Gestalt der Gletscheroberfläche, die vielmehr einen gegen die Mitte hin gewölbten Rücken bildet. Nur die Bewegung des Gletschers erklärt auch diese Erscheinung in natürlicher Weise. Die Mittelmoräne entsteht dann durch den Zusammenfluß zweier Gletscherarme, die auch eine Verbindung der beiden Moränen zur Folge haben muß, welche die betreffenden Seiten der Eisfläche einfaßen. Diese durch die Fortbewegung der Fläche, auf welcher sie ruhen, vermächtig gehobenen Moränen können nach ihrer Verbindung nicht plötzlich still stehen, können auch nicht in der Verwitterung, die bisweilen bei dem Zusammenfluß zweier Gletscher entsteht, begraben werden, sondern müssen vereinigt in der Mitte des zusammengefloßenen Gletscherstromes weiter rücken. Ganz vermischen sich die beiden Felswälle — Felsströme könnte man sie nennen — dabei nicht; oft kann man noch Stunden weit die charakteristischen Farben der verschiedenen Steine verfolgen, die aus dem einen oder andern Gletscherarme stammen. Da bisweilen auch 3, 4 und mehr Gletscherarme nach einander zu einem einzigen Stromen zusammenfließen, so können auch 3, 4 und mehr Moränen vorkommen, und die Wirklichkeit bestätigt das in der That.

Der Gletscher ist also ungleichbar ein fließender Strom, freilich ein langsam fließender. Er ist nicht zu vergleichen dem rauschenden Gebirgsbach, dessen wirbelnder Fluß das Auge mit Schwindeln folgt, selbst nicht dem Lavaström, dessen Fortschreiten man doch nach Minuten oder Stunden erkennt; Monate, Jahre vielleicht gehören dazu, um seinen stolzen Gang wahrnehmbar zu machen. Aber ein wie träger Strom er auch ist, und wie sehr die Härte und Gedrächlichkeit des Eises damit anscheinend in Widerspruch stehen mag, so formt er sich doch ganz nach Art aller Flüsse nach den Unebenheiten seines Bettes und den Unregelmäßigkeiten der ihn einschließenden Ufer. Ja, trotz der zahlreichen gewaltigen Wisse, die seine Oberfläche zerspalten, besitzt seine Masse Plastizität genug, um ihm überall seinen Zusammenhang zu wahren. Er fließt langsamer auf wenig geneigtem Bett, schneller, wo die Neigung seines Bettes steiler wird. Er folgt sogar darin den für Flüsse geltenden Gesetzen, daß die Geschwindigkeit seiner Fortbewegung in der Mitte größer ist als an den Seiten. Auf dem großen Gletscher, der die ungeheuren Thälerklüfte im Osten des Montblanc einnimmt, und den man gewöhnlich als Mer de Glace, an seinen

unteren Ende auch als Glacier des bois bezeichnet, auf dem Gletscher also, welchem vorzüglich unsere Wanderung gilt, hat der berühmte englische Gletscherforscher Forbes im J. 1842 eine Reihe von Beobachtungen angestellt, um die jährliche Fortbewegung des Eises zu bestimmen. Er fand diese jährliche Bewegung nahe am Ende des Gletschers zu 209 par. F., etwas weiter oberhalb in der Gegend des Chapeau zu 796 F., unterhalb des Montanvert am westlichen Ufer zu 587, in der Mitte zu 822 F., zwischen Montanvert und den bekannten „les pouts“ am Ufer zu 456, in der Mitte zu 772 F., auf dem oberen Theile des Gletschers, den man auch als Glacier du Géant bezeichnet, zu 387 F., an der Mündung des Glacier du Taléire in diesen an der Seite zu 405, in der Mitte zu 493 F. Diese Beobachtungen bestätigen vollkommen das Obengesagte. Der Gletscher ist, wie Forbes sagt, „eine endlose Schiffröhre, ein Zeitstrom, auf dessen flüchtigen Boden die Auseinanderseige von Ereignissen eingegraben ist, deren Daten über das Gedächtniß der jetzt lebenden Menschen weit hinausreichen.“ Der gewaltigste Felsblock, wie der kleinste Gegenstand, der der Hand des Wandersers entfällt, hat bis zu seinem Grabe am Fuße des Gletschers eine lange Pilgerfahrt zu vollenden, deren Dauer viele Menschenalter, Jahrhunderte selbst umfaßt. Von der Leiter, welche Saurrre im J. 1788 auf dem Glacier du Géant zurückgelassen hatte, wurden vor mehreren Jahren Bruchstücke in der Nähe des Montanvert wiedergefunden, also etwa 13,000 F. oder mehr als eine halbe Meile von der ursprünglichen Stelle entfernt.

Wenn man den Gletscher als Fluß zu betrachten haben, so müssen wir ihm auch zu seiner Quelle folgen, und wir finden sie hoch oben in den ungeheuren Schneefeldern, welche die weiten Thalmulden des Hochgebirges erfüllen. Dort hinauf war mit der Leiter neulich auf meiner Wanderung gefolgt. In diesen Höhen, wie überhaupt in Höhen von 9000 F. und darüber, regnet es in den Alpen nur noch selten. Regenwolken erheben sich kaum über 8000 F. Aber auch der Schnee, der hier fällt, erschelnt nicht, wie bei uns zu Lande, in großen, lockeren Flocken, sondern als feiner, nadelartiger Staub. Blendend weiß und außerordentlich trocken und darum leicht beweglich, bedeckt dieser Hochschnee alle nicht zu steilen Grate und Hörner des Gebirges. Aber die Wärme der Sonnenstrahlen verfeilt auch in diesen Höhen ihre Wirkung nicht, besonders in den langen Sommertagen, wo sie das Thermometer bloßstellen mehrere Grade über den Gefrierpunkt steigen macht. Sie schmilzt den Schnee an seiner Oberfläche, das Schmelzwasser durchtränkt dann die tieferen Lagen des lockeren Schnees, und der Frost der folgenden Nacht vermanbelt sie in Eis. Dieses ungemein feste und völlig durchsichtige Hocheis überzieht die Schneefelder mit einer rauhen, harten Kruste. Es bildet sich aber auch auf den höchsten und isolirtesten Gipfeln der

Alpen, auf denen überhaupt noch Schnee haften kann. Es bedeckt den Gipfel des Montblanc wie der Jungfrau. An den rauhen Wänden solcher hohen Alpengipfel bilden sich oft aus büschelförmigen Anhäufungen zusammengepressten Schnees, der in verschiedenen Abfällen thaut und dann durch den Frost mit einer spröden Kruste überzogen wird, Eisevorsprünge, die mehrere Fuß weit über gewaltige Abgründe hinausragen. Bei Bergbesteigungen müssen sie bloßstellen benutzt werden, können aber durch ihr Abbrechen den Wanderer in die gefährlichste Lage versetzen. Der bekannte schweizerische Alpenforscher Hugi berichtet von einem solchen Abenteuer, das er bei der Besteigung des Zinseraarbores im J. 1828 erlebte. Als er mit seinen Führern die ungeheure Firnwannd ersteigen wollte, die von der Spitze des Zinseraarbores herabhängt, erhob sich ein gewaltiger Sturm. Trodtem entschlossen, die Erstimmung des Gipfels zu versuchen, glitt der Vormannt Hugi's, Arnold Tännler, plötzlich aus. Zum Glück trug er eine lange Stange, die er über die Kante des Firms hinaus streckte. Mit einem Sprunge padte Hugi das Ende dieser Stange. Allein das nur zwei Fuß starke Eiskarnie drach unter dem Gewichte seines Körpers durch, und nun hing er ganz frei an der Stange mehr als 4000 Fuß hoch fast senkrecht über dem Zinseraaraletscher, während Tännler auf der andern Seite über die Firnwannd herabbing. Wie an einem schauerlichen Wagebalen schwabend, mußten sie, trodtem die Kälte ihre Finger erstarrte, festhalten, bis die Gefährten ihnen Hülfe schaffen konnten. Während in den höchsten Regionen die Schneefelder nur an ihrer Oberfläche sich mit einer Eiskruste überziehen, erfassen sie weiter unten, wo die aufsteigende Wirkung der Sonnenwärme tiefer einzudringen vermag, allmählig durch ihre ganze Masse eine Umwandlung. Das beständig durchfließende Thauwasser verfest den Schnee in einen eigenthümlichen Uebergangszustand zu Eis, in welchem er eine königliche Structur annimmt und zusammengebadeten groben Sande gleicht. Man nennt diese Uebergangsform des Schnees' dekanntlich Firn. Gewöhnlich ist die Grenze zwischen Schnee und Firn durch tiefe und weitläufige Risse bezeichnet, die gefährlichen Bergschräben, deren Entstehen durch die Verdichtung des Schnees' beim Uebergange in Firn zu erklären ist. Auch diese Firnmasen erfüllen oft ungeheure Höden, von deren Größe uns das an der Ostseite des Montblanc, aus dem der Glacier du Géant, das nächste Ziel unsrer Wanderung, hervorgeht, eine Vorstellung gewährt, da es nicht weniger als 15,400 Fuß im Durchmesser mißt. Der Anblick solcher Firnmeere ist erhaben und großartig. Ihre Oberfläche ist völlig eben; denn die zahlreichen Spalten, die sie durchfurchen, sind bis in den späten Sommer hinein vom Winterschnee verdeckt. Ueber den blendend weißen Schneeteppich spannt sich ein tiefblauer Himmel. Gegen die Klüften hin steigt die Fläche allmählig an, und dort erheben sich

die zahllosen schwarzen Felsblöcke, an deren schroffen Wänden der Schnee nur in schmalen Rissen und Furchen eine Stätte findet. Jede dieser Felsgrinnen könnte für sich als einer der großartigsten Gegenstände der Natur gelten; hier verliert sie sich in der Menge der Genossen. Freilich ist ein solches Felsfeld auch zugleich eine der ödesten Regionen der Erde. Selbst wenn ein Fels einmal aus seinem Leichentuch aufragt, schmückt kaum ein Moos oder eine

Pflanze seine Ecken. Ein vom Winde verschlagenes Insekt ist die einzige Spur thierischen Lebens. Selbst die Gämse meiden diese Wildnisse, außer in der Angst der Verfolgung, weil sie die Spalten und Klüfte fürchtet, die sich unter der trügerischen Schneedecke bergen.

Das ist der Schock, aus dem der Geister geboren wird, den wir jetzt im Verfolg unserer Wanderung in seiner ganzen schauerlichen Herrlichkeit kennen lernen werden.

## Der Vulkan von Colima.

Von F. Sahn in Mexico.

In diesem Augenblicke (Anfang August d. J.) erregt der Vulkan von Colima die Aufmerksamkeit des ganzen Landes. Mehrere Ingenieure und Geologen sind dorthin gereist, theils von der Regierung beauftragt, theils aus eigenem Interesse. Einer dieser Ingenieure, Ricardo Proscio, theilt über die gegenwärtigen feurigen Erscheinungen dieses Vulkans Folgendes mit.

Seit dem Jahre 1818, wo der Vulkan seinen letzten Ausbruch hatte, glaubte man, daß derselbe erloschen sei; aber die jüngsten häufigen Erdbeben, die man auf sehr weiten Entfernungen wahrgenommen, und die Beobachtungen aller einsichtsvollen Reisenden, welche den Krater desselben besucht haben, bewiesen, daß der Vulkan seine Thätigkeit, wenn auch fast unmerkbar, fortgesetzt hat.

Am 12. Juni d. J. beobachtete man, daß der Krater Rauchsäulen auswarf, und daß sich eine Art von Blase an der Basis desselben zu erheben schien. Am 13. Juni bemerkte man, daß die Blase bedeutend zugenommen hatte, daß sich leuchtende Spalten öffneten, welchen Rauchmassen entströmten, sowie glühende Steine, welche sich sehr bald wieder verbunkelten. Von dem Landtage San Marcos aus, welches 4 leguas (3 d. Meilen) vom Vulkan entfernt liegt, konnte man diese Erscheinungen deutlich wahrnehmen. Die Einwohner der nächstliegenden Dörfer wurden durch die Berichte des Gutsbesizers Morici Gomez sehr beunruhigt, und eine große Anzahl Familien dachte nur daran, sich vor einer pfehlenden, unvermutheten Katastrophe zu sichern und die Umgegend zu verlassen.

Diese Nachrichten hörte ich in Zapotlán, und ich entschloß mich zum Besien des öffentlichen Wohles eine genaue Untersuchung vorzunehmen, und reiste sofort am 14. Juni nach dem Gute San Marcos. Während der Nacht konnte man den Rauch und die Erleuchtung des Vulkans sehen. Die Blase oder wulstige Erhebung wuchs immer mehr.

Am folgenden Tage (15. Juni), Morgens 6 Uhr, unternahm ich meine Expedition nach dem Krater, begleitet von einem Führer und zwei Dienern. Außer einem Réaumur'schen Thermometer hatte ich kein anderes In-

strument bei mir. Um 12 Uhr Mittags gelangte ich zur Basis des Kraters. Ich war, so weit es ging, zu Pferde gereist; doch ich mußte sehr bald die Pferde, der Steilheit des Pfades wegen, zurücklassen. Sehr bald kamen wir auf eine vom vulkanischen Gestein gebildete Fläche, und 200 Meter davon erhebt sich der Krater des Feuer-Vulkans, der ungefähr 450 Meter über diese Fläche erhaben ist. Eine legua ( $\frac{1}{2}$  d. Meilen) nach Norden zu befindet sich der Schnee-Vulkan (Nevado).

Nach den Messungen des preussischen Ingenieurs Harcourt liegt der Feuer-Vulkan 3500 Meter und der Schnee-Vulkan 3790 Meter über dem Meere.

Auf der erwähnten Fläche überraschte uns ein starkes Gemitter, bei einer Temperatur von  $10^{\circ}$  R. — An der Basis des Kraters gegen N. singt der untere Theil der neuesten Erhebung an; sie besteht in Gruppen von ausgeworfenen Eisenmassen, welche sich an der Wölbung des Kraters bis 300 Meter weit und 30—35 Meter dick ausbreiten. Das Ganze hat das Aussehen von Anhäufungen vulkanischer Schladen, ohne Ordnung und Gleichgewicht zusammengefügt. Hier geschah in großem Maßstabe, was mit dem Gipskalk im Kleinen geschieht, wenn er gelöst wird: er bläht sich auf, die Blasen plagen, die Theile trennen sich nach allen Richtungen, und die Temperatur erhebt sich zu einem hohen Grade. Jeden Augenblick bemerkt man neue, ungeheure Spalten, große Massen glühender Steine reissen sich los, wodurch ein so lebhaftes Feuer entsteht, daß das Auge vom starken Scheln geblendet wird. Doch sobald sie mit der Luft in Berührung kommen, fangen sie an zu erkalten, und die vorher feuerroth scheinenden Massen zeigen bald eine graue Farbe. Das Öffnen der Spalten und das Herabrollen der Massen wiederholt sich sehr oft, und der Zusammenstoß derselben gleicht dem Geräusch eines starken Stromes. Ich näherte mich der Blase oder dem ausgetriebenen Wulst; das Thermometer zeigte 42 Grad; einige Fuß von mir riß sich ein großes, feuriges Felsenstück los, und ich schlug mit einem Steine einige Stöckchen davon ab, die eine schwammige Textur zeigten, von grauer Farbe waren und beim Anschlag wie gebrannte Ziegelsteine klangen.

Die zusammengebrückte und an den Seiten runde Form der Blase zeigte die Weichheit der ganzen Masse, und daß wenig fehlte, um die complete Schmelzung zu Stande zu bringen. Sobald jene ungeheure Masse flüssig geworden, wird sie frei durch zwei Schluchten laufen, welche, vom Krater ausgehend, sich nach N. und West erstrecken. Bei dieser Lage der Sache würde sich daher die Blase ohne Explosion entladen. Der drohenden Gefahr wegen, in welcher ich mich befand, sowie wegen der unerträglichen Hitze, zog ich mich von der Stelle zurück und

stieg eine Rauchsäule auf, bald bläulich, bald gelblich von Farbe, welche ähnlich roch wie brennende Steinkohlen. Im Westen und Süden war Alles mit Wolken bedeckt, und nur nach Nord und O. hatte man eine ziemlich weite Fernsicht. Das Thermometer zeigte  $4\frac{1}{2}^{\circ}\text{R}$ . Meine Kleis der waren ganz durchnäßt, und ich fühlte eine starke Kälte. Begleitet nur von zwei Dienern, erschöpfte durch die Strapazen, setzten wir uns am Rande des Kraters nieder, um ein wenig Nahrung zu uns zu nehmen. Nach kurzer Rast ging ich am Rande des Kraters entlang. Derselbe



Der Vulkan von Gelima während seines Ausbruchs im Sommer d. J.

stieg zum Krater hinauf, um von dort die Erscheinungen auf dem obern Theil des Blasenwulstes zu beobachten. Diese Besteigung war sehr mühevoll und anstrengend und vielen Gefahren ausgesetzt; denn die Böschung des Kraters ist von losem Gestein und vulkanischem Sand gebildet, mit einer Neigung von 45 Grad. Wenn man einen Schritt vorwärts thut, rollt das Gestein in großer Menge hinab, und man kommt mehr hinunter als hinauf. Nach allen Richtungen haben sich Spalten gebildet, und man kann sagen, daß sich Alles ablöst. Zur Vorsicht stieg ich im Hock, und mich auf die Hände stützend, konnte ich besser vorwärts kommen. Gegen  $2\frac{1}{2}$  Uhr Nachmittags kam ich am oberen Rande des Kraters an und bemerkte, daß oberhalb der Blase dasselbe geschah wie von den übrigen Seiten. Von dem höchsten Punkte derselben

hat eine fast kreisrunde Form von ungefähr 450 F. Durchmesser. Das Innere ist kegelförmig, und vom Grunde, sowie aus vielen Seitenspalten, steigen dichte Schwefelsdämpfe auf.

Zum Zeichen, daß ich den Krater besucht, befestigte ich auf einem Felsenstücke eines meiner Kleidungsstücke, poncho (Póntscho) genannt \*).

Um 3 Uhr Nachmittags stieg ich auf der Nordostseite wieder eine Strecke abwärts, um die erhöhte Wulst (pro-

\*) poncho ist ein Stück weissen Zeug, das als Ueberwurf oder Mantel dient; es ist ohne Aermel und hat in der Mitte eine Oeffnung, wodurch der Kopf gesteckt wird. Die Mexikaner nennen es jorongo (kerongo) und ist für Reisende ein sehr bequemes, vor Sonne und Regen schützendes Kleidungsstück. Man hat dasselbe von groben und feinen Zeugen.

tuberancia) noch mehr zu beobachten. Die Hinunterfahrt war ebenso schwierig als das Hinaufsteigen. Die steile Böschung und das lockere Gestein verhinderten mich geradeaus zu gehen, und ich mußte wieder in schrägen Linien abwärts schreiten. Bei jedem Schritt machten sich Massen von Steinen los, die mit der größten Schnelligkeit hinsabollten. Gegen 3 1/2 Uhr kamen wir wieder an der Basis des Kraters an, wo die jüngste Erhebung desselben anfängt. Von hier an rüstig vorwärts schreitend, gelangten wir bald an den Punkt, wo wir unsere Pferde gelassen hatten. Um 9 1/2 Uhr Abends erreichten wir wieder San Marcos, wo sich eine große Anzahl Personen aus der Stadt Colima versammelt hatten, um zu hören, was im Vulkan vorgehe, und ob Gefahr in Aussicht stände. Ich beschrieb ihnen ganz genau, was ich beobachtet, und erklärte, daß nach meiner Meinung keine Gefahr vorhanden sei, und daß aller Wahrscheinlichkeit nach der Ausfluß der Lava ohne Explosion stattfinden werde.

Zufrieden gestellt mit meinen Berichten, kehrten alle Personen am folgenden Tage nach Colima zurück, um ihren Geschäften nachzugehen, vertrauend auf meine ihnen dargelegten Gründe, welche ihnen annehmbar schienen.

Den vulkanischen Ausbrüchen gehen fast immer starke, sich oft wiederholende Erdbeben, unterirdische Donner, Erschütter, Senkungen u. s. w. vorher, wovon man diesmal nichts verspürt hat. Die Explosion entsteht durch die bestige Ausdehnung der flüssigen Massen, welche, zusammengebrüht, plötzlich entweichen und zwar an den Stellen, wo sie am wenigsten Widerstand finden. Der

gegenwärtige Ausbruch hat sich nach meiner Ansicht unter günstigen Umständen gezeigt. Die Lage des neuen Kraters stellt ein leichtes Herabfließen der Lava in Aussicht; denn da er an den Abhängen des alten Kraters liegt, geschah die Ausdehnung der Gassen im Zustande der Verbrennung sehr reichlich, und es setzte sich derselben kein Hinderniß entgegen. In Folge dessen ist es unzweifelhaft, daß die Lava, welche gegenwärtig noch das Feuer bedeckt, ohne Verpuffung und Convulsionen herunterfließen werde; es sei denn, daß ein unvorhergesehenes Ereigniß eintrete, welches die gegenwärtige Lage der Dinge veränderte. So könnte es z. B. geschehen, daß der obere Theil des Kraters einsinkte, und daß dadurch der neue nach der ersten Eruption verstopft, also der Lavaström gehemmt würde und die Reaction mit einer starken Explosion endigte. Doch es ist eher wahrscheinlich, daß ein mehr ruhiges und leichtes Herabfließen der Lava stattfinden werde, die, wie gesagt, Niemand Schaden zufügen wird.

Nach späteren telegraphischen Berichten war seit dem 20. Juli die Luft in der Umgebung des Vulkans mit überirdischen, erstickenden Dünsten erfüllt; mehrere Thiere waren auf dem Felde gestorben, und die Bewohner der nächst umliegenden kleinen Höfe hatten sich mit ihrem Vieh weiter zurückgezogen.

Die letzten Nachrichten bestätigen die Meinung des Ingenieur Drosco, daß kein gewaltsamer Ausbruch stattfinden werde. Der Vulkan fährt fort starke Rauchsäulen und Asche auszuwerfen.

## Auch eine Plage.

Von Paul Hammer.

Das Vieh der glockenläutenden Herde, das alte Hochwild, das sich am Waldrande rubelweise sammelt — als das Bild einer Zügel, ohne Sorge und Harm grasen sie umher.

So muthen sie uns an, und wir ahnen es nicht, daß sie auch Leiden haben, recht arge Qualen, ganz abgesehen von dem unnatürlichen, gewaltsamen Ende, welches das Vieh des Jägers oder das Messer des Schlägters ihnen bereitet. Sie haben ihre natürlichen Leiden, die sich Mancher nicht träumen läßt, der ihnen zuschaut, wie sie friedlich äßen und in munteren Sätzen sich tummeln. Ihre schlimmste Qual hat freilich nur eine recht kleine Ursache, so daß Mancher lächelt, als ob eine so kleine Ursache der Grund arger Leiden werden könne. Diese Ursache ist die Fliegenplage.

Der Leser stimmt zunächst wohl nur halb zu, daß das eine doch zu veranschlagende Plage sei, indem er bloß der „Bremfen“ gedenkt, von deren blutigen Stichen das Weidvieh oft freilich schon wie rasend umherbraust, und

das Pferd vor unser Kutsche in wildem Carrière ausgleist.

Wenn es das bloß wäre, wenn bloß die bekannte Bremse gemeint wäre, die Jeder kennt, der in brennender Sommerhitze einmal über die Landstraße fuhr und auf die mächtig großen Fliegen achtete, deren Stichen die edle Rosinante ausgekostet war, die vor seiner Chaise wacker einhertrabte! Aber eine noch ganz andere Gattung sind für die Einhufer wie für die Vierbeiner die sogenannten „Dasselfliegen“ — der Naturforscher nennt sie „Destridenten“ und untercheidet mehrere Gattungen dieser Fliegenfamilie, — welche sich mit den bloßen stichtigen Stichen nicht begnügen.

Diese zartbeschwingten Daffeln stechen überhaupt gar nicht. Sie sehen überhaupt ganz harmlos aus. Im Sonnenschein schweben sie, gleich vielen andern Gattungen, in der Luft, setzen sich am Boden oder auf Blüthen zu kurzer Rast nieder und leben als ausschließliche Vegetarier nur von Blumenstäuben. Was können so kind-

liche, blumenfreundliche Geschöpfchen mit der Dual jener Thiere zu thun haben!

Dem Leser, der nicht Dipterolog ist und sie nicht kennt, seien sie zunächst kurz vorgestellt.

Gesehen hat sie vor Allem der Städter sicherlich noch nicht, denn es sind äußerst selten zu findende Fliegen, die obenein den ländlichen Natursaufenthalt so leicht nicht verlassen. An Größe, Gestalt und Sammetbekleidung ähneln sie für einen flüchtigen Blick etwa einer recht kleinen, braunen Hummel oder einer Biene. Ihr charakteristisches Merkmal ist aber das breite, blasse Culengesicht, dessen Augen zwar sehr klein sind, dessen schwarze, kurze Fühler aber wie Culenaugen in Gesichtsvorfällen liegen. Rüssel und Laster sind ganz unmerklich, fehlen scheinbar gänzlich. Hat man so das Thierchen einmal schief beobachtet, so erkennt man es auch ferner durch die eigenthümliche Gestalt, die Flugweise, kurz an dem ganzen Habitus auf den ersten Blick wieder. Auf kahlen Berggipfeln schwärmen sie im Sonnenschein einzeln herum. Dasselbst pflegt sie der Dipterolog zu fangen, und manche Arten sind einzig da gefunden worden. Aber auch in der Ebene ist uns ihre merkwürdige Bekannthschaft vergönnt. Auf staubigen Landstraßen im Sonnenbrande habe ich vielfach eine Art „Winderdasseln“ im hurtigen Fluge vor mir her huschen, sich wieder im Staube setzen und immer wieder aufschlagen sehen. Wegen ihrer Schnelligkeit gelang es mir doch aber nur selten, sie zu fangen. Andere, besonders die „Schafdasseln“, sind um so träger und vertriehen sich dauernd zwischen Steinen und Gemäuer in der Nähe von Schafställen, wo sie sich ohne Fluchtversuch mit den Fingern aufnehmen lassen. Sie da zu finden und aufzugreifen fällt aber nur dem Naturforscher ein; denn wer sonst kümmert sich darum, diese seltenen Gäste heraus zu kennen aus den Tausenden von Fliegenarten, welche groß und klein Luft und Erde bevölkern! Selbst der Landmann unverschämter diese „Dasseln“ nicht, deren Korben sein Vieh quälen. Den Namen kennt er wohl, aber er versteht darunter nur die Beemsen, diese gelbbraune, gebänderte Gattung, und die fast kollangen Tabakarten, wie jene Bremien wissenschaftlich heißen, die das Vieh mit blutigen Stichen umschwärmen, aber ihm weiter nichts thun und ihre Eier ruhig in die Erde legen.

Das Eierlegen aber ist die interessanteste, doch für das liebe Vieh eben höchst uninteressante Seite an den „Dasseln“. So phlegmatisch, so indolent die einen Dasselarten sind, so harmlos idyllisch wieder andere über grasigen Hügeln schwärmen und an den Blüten saugen, so voll satanischen, mütterlichen Instinktes wissen sie, wenn es gilt, ihre Eier — winzig blasse gartenförmige Eierchen — abzusetzen. Das liebe Vieh ahnt es im Momente nicht, was da geschieht, geschweige denn, welches Unheil ihm wiederfährt. Die Destride setzt sich auf den Rücken eines Thieres und kriecht mit ihnen dazu langen Beinen

zwischen die Haare des Rückens, der Schultern und Schenkel, — aber ohne Stich und Blutvergießen! Dazu fehlt schon der nöthige Stachel. Gewiß bis dahin ist Alles harmlos, das weidende Klauenvieh kann zu ihnen sprechen, wie in der Fabel zu jener Mücke, die sich prophetisch auf eins der Hörner gesetzt hatte: ich wußte gar nicht, daß du daselbst sitzt.

Aber teife fangen bekanntlich die meisten Uebel dieser Welt an. Teife wird nun mit dem Legestachel eine Haarwurzel im Felle etwas auseinander geschoben, und die Eier werden dazwischen abgesetzt. Und nun gut Glück, das Uebrige wird sich von selbst machen!

Und es macht sich auch. Die Eier kommen aus, und die ausschließenden Maden, welche mit berrigen Nagehaken versehen sind, heben sich ungehindert und mit leichter Mühe in die Haut ein, als wären sie darauf abgerichtet. Immer tiefer nagen sie sich in die Haut, und in Folge davon bald eine Eiterung eintritt. So entsteht eine kirsch- bis pfaumengroße Eiterbeule, die sogenannte Dasselbeule, welche das Fell verdirbt und dem Thiere selbst arge Schmerzen verursachen muß. Es ist ein natürliches Fontanelle, mit dem das Vieh der Weide, wie Hirsch und Reh im Walde und die Gemse, die der Schütze auf ihrem Felsgrat der Alpen erlegt, sich nur zu häufig behaftet findet.

Haben sich die Maden darin dick und groß gestressen, so öffnet sich diese Beule. Das fatale Genuß fällt zur Erde und sucht sich da ein Versteck auf, wo es sich verpuppt. Aber es macht sich auch dessen Lebensweise etwas anders durch eigenthümliche Umstände, und zwar speciell bei den Pferden macht es sich anders. Man findet die Maden oft in Unmenge nämlich in deren Magen! Wie ausgepflastert davon sieht derselbe häufig aus. Auf welche wunderliche Weise können sie aber in den Magen kommen, und gerade bei einem so edlen und reinlichen Thiere? Die Sache ist einfacher, als man denken möchte. Gerade wegen des Reintlichkeitssinnes dieser edlen Tiergattung kommen sie dahin. Die Pferde lecken nämlich von den Schultern und Vorderextremitäten das daselbst ausgebrochene hautigende Geschmeiß ab und schlucken es hinunter. Es sind das speciell die Maden der Destride-Gattung *Gastrophilus*, welche mit ihren mehreren Arten einzig die Pferde auffucht. Die noch kleinen Maden gelangen so in das Maul und von da in den Magen. Mit kleinen Dornengürteln ausgestattet und mit kräftigen Nagehaken versehen, haben sie sich in der inneren Magenwand fest und entwickeln sich da ruhig und gebiethlich weiter.

So machen die Thierchen, ganz wie im Märchenlande der Däumling durch den Darm einer schwarzen Kuh, ihre Wanderung durch den Magen und Darm des stätlichen Einhuferes. Wohigenährt kommen sie am Ziele ihrer

Reise an. Die Fliegenlarve halt sich Ende August in dem Verwessein los, daß ihre Ausbildung vollendet ist, und wird durch den Darm hindurchbefördert, endlich ausgeschieden. So gelangt sie zur Erde, groß, gestaltet und gefärbt wie ein Dattelflecken, woher die Fliege wohl auch ihren Namen Dattelfliege hat.

Neben diesen wenig liebenswürdigen Hautdasseln und Magen dasseln gibt es nun noch unliebenswürdigere Kopfdasseln. Die Stienhöhle des geduldigen Schafes und des tropigen Büffels nämlich ist die gastliche Aufenthaltsstätte für die Waden und Fliegen-Gattung Oestrus. Indem sie daseibst wohnen und auf Gehirns-kosten dieser schon nicht gerade mit Gehirns überreich gesegneten Thiere schmausen, verleiht das Schaf wirklich einmal seine Geduld und dreht sich vor Verzweiflung im Kreise herum, und der Büffel wird noch ungesümmter, als sein unliebsamer Charakter es schon ist. Freilich auch ihre Aufenthalt ist nur ein Wandern. Zur Zeit der Reise haben auch sie sich los und werden auf dem Wege, auf dem sie kamen, wieder ausgestoßen. Die Waden vertriehen sich zwischen Steinen und Erde. Aber sie sind nun durch die Gehirnnahrung nicht etwa besonders geistvoll geworden. Vielmehr eine recht träge, plumpe Fliege schlüpft nach ungefähr einem Monat aus der eingepuppten Larve hervor.

Kopfdasseln einer anderen Pestilenzart sind es, welche nun aber selbst das geweihte und durch seine Schnelligkeit scheinbar gesegnete Rothwild behelligen, — auf eine zwar andere, aber nicht minder fatale Weise. — Die Fliege umschwärmt das auserkorene Reh, den Hirsch, selbst im hohen Norden das Renthier des armen Lappens. Das Wild merkt die Fliege, die es umkreucht, seiner Nase, seinem Munde sich naht. Es läßt das summende Geschöpf nicht aus den Augen und verfolgt, wie man mehrfach beobachtet hat, ängstlich dessen schwirrenden Flug. Es bläst aus den Nüstern und wirft das edle Haupt zurück, um durch die Flucht sich zu entziehen. Aber der winzige, beschwingte Feind ist nicht minder schnell. Ein günstiger Augenblick ist wahrgenommen, — und das schon im Körper der Fliege ausgekommene Madengeschmeiß wird im Nu in Maut oder Nüster des gejagten Thieres eingespriht.

Prun ist's geschehen. Im Nacken, in der Nase haften und entwickeln sich die ekelhaften Kleingäste, und die Beschwerden des sie beherbergenden Wirththieres werden oft selbst äußerst bedenklich, wenn jene den Athmungs- oder Schlingorganen allzu nahe kommen. Freilich ist auch

ihre Zeit gemessen. Nicht nur, daß sie endlich ausgereift herausfallen, um sich zu kaffeebohnenförmigen Tönnchen zu verpuppen; oft auch werden sie vor der Zeit durch Niesen oder Husten mit ausgeworfen.

Wo Mistfütterung stattfindet, wie ja in den meisten deutschen Forsten, sind sie früh Morgens im Heu oft zahlreich zu finden. Denn gerade den Winter über, wo es sich kontrolliren läßt, entwickeln sie sich, und im Frühling erst wird das Wild das widerlich dicke Gewürm völlig los. Ende Frühling, dann schwärmen im Sonnenschein die ausgekommenen Dattelfliegen.

Man hat wohl die Sache milder anzusehen gesucht und gemeint, das Thier, welches es auch sei, sei schon krank vor dem Fliegenbesuche, und durch den Krankheitsstoff würden die Fliegen angelockt.

Das ist aber schwer festzustellen, denn durch jene Dattelfliege ist das Thier eben krank. Und wenn man ein solches Thier nun von derselben heimgesucht findet, so ist schlecht zu ermessen, ob es auch vorher schon krankte.

Uebrigens hat diese ganze bizarre entopathische Heimsuchung für den Forscher viele Schwierigkeiten. Nur glückliche Augenblicke gie und da haben die bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen zumeist gebracht; und nur den Mühen der Entomologen, welche die vorgundenen Larven unter ihrer Aufsicht auskommen lassen, ist es zu danken, daß über die Entwicklungsweise dieser Schmarroper und über die Fliegen selbst, von denen sie den Husten und Wiederläuren injicirt werden, theilliche Klarheit herrscht.

Unklar wird es freilich ewig bleiben, wie „in dieser besseren Welt“ das eine Geschöpf dazu verpflichtet sei, unter so arger Qual die Existenz und Ausbildung von andern, die weit geringer sind, zu ermöglichen.

## Literarische Anzeige.

Die Verlagsbuchhandlung Fr. Kortkamp in Berlin empfiehlt nachstehende werthvolle naturwissenschaftliche Werke zu den beifügigen ermäßigten Preisen.

**Humboldt, A. v.** Fragmente einer Geologie u. Klimatologie Asiens. A. d. Franz. mit Anmerk. etc. v. Jul. Löwenberg. Mit 1 Karte u. 1 Tab. 8. 1832. (2 $\frac{1}{2}$  Thlr.) — 1 $\frac{1}{2}$  Thlr.

— Central-Asien. Untersuchungen über d. Gebirgsketten u. d. vergl. Klimatologie. A. d. Franz. übers. v. Dr. W. Mahlmann. Mit 1 Karte u. 14 Tabellen. 2 Bde. 8. 1841. (10 $\frac{1}{2}$  Thlr.) — 3 $\frac{1}{2}$  Thlr.

**Lowenherg, Julius**, mittlere Jahres- und Jahreszeiten-Temperaturen etc. Beilage zu obigen, fol. 1832. 5 Sgr.

**Kliden, A. P.** Ueber die Gestalt u. Umrisslinie der Erde. 2te Auflage. Mit 8 Kupfern. 8. 1829. (3 $\frac{1}{2}$  Thlr.) — 20 Sgr.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 3 Sgr. (1 fl. 30 Kr.) Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.



# Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des „Deutschen Humboldt-Vereins“.)

Herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle.

**N<sup>o</sup> 52.**

[Achtzehnter Jahrgang.]

Halle, C. Schwetfchke'scher Verlag.

**29. December 1869.**

**Inhalt:** Ein rechter Witterungs-Kalender, von Heinrich Becker. — Vom Monatsblanc zum Monatsreflex, von Otto Ule. 13. Wanderung durch die Seracs des Glacier du Géant.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt **durch die Post** beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das **Abonnement für das nächste Vierteljahr** (Januar bis März 1869) **ausdrücklich bei den Postanstalten** erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für diejenigen, welche unsrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1869, in gefälligen Umschlag gebunden, noch zu haben sind.

Halle, den 29. December 1869.

## Ein rechter Witterungs-Kalender.

Von Heinrich Becker.

Am Kalender kann man sehen, wie weit ein Volk in der Kenntniß der Natur vorgeschritten ist. Die alten Ägypter und Chaldäer hatten nach vielen Beobachtungen mit Mühe und Noth es dahin gebracht, den Anfang des Jahres, der Jahreszeiten und des Monats herauszubringen. Die Griechen und Römer kamen im Ganzen nicht viel weiter. Cäsar vermehrte die Jahreslänge, welche die Ägypter auf 365 Tage gesetzt hatten, um 6 weitere Stunden, und theilte die Monate, welche Jene auf 30

Tage bestimmt hatten, nach der jetzigen Weise. Die europäischen Völker des Mittelalters hatten viel zu viel mit weltlichen Kämpfen zu thun, als daß sie um die Zeittheilung sich kümmern konnten. Unter der Herrschaft der römischen Päpste geschah nichts, als eine etwas genauere Feststellung der Jahreslänge und eine Anordnung der heiligen Feiertage. Im Uebrigen aber ward nichts Merkwürdiges im Kalender verzeichnet.

Erst mit dem vorigen Jahrhundert begann man den



Auf- und Untergang der Sonne und des Mondes, die Stellung und den Lauf der Planeten und Kometen aufzuzeichnen. Dann wurden die Verfinsterungen der Sonne und des Mondes u. s. w. eingetragen und so allmählich die großen Ereignisse verzeichnet, die jedes Menschen Auge sichtbar sind. Die übrigen Erscheinungen, die wir unter dem Namen Wetter begreifen, sind zwar auch schon seit einer Reihe von Jahren verzeichnet worden, aber in einer so unbestimmten und unwissenschaftlichen Weise, daß sie fast mehr als Curiosa im Kalender figurirten, wie einen Anspruch auf wirkliche Geltung machten.

Seit einigen Jahren ist indeß die Wetterkunde so weit entwickelt worden, daß wir darüber manches Zuverlässige wissen. An 50—60 Orten in Europa sind Wetterstationen errichtet, die es sich zur geistlichen Aufgabe machen, Tag für Tag die sämtlichen Erscheinungen in der Luft zu beobachten; die Wärme und Kälte, Dichtigkeit und Leichtigkeit der Luft, Bildung der Wolken, Niederfallen des Regens und Schnees u. s. w. Durch den Telegraphen werden alltäglich diese Beobachtungen bei den verschiedenen Stationen ausgetauscht; kundige Männer stellen die Berichte zusammen und vergleichen die Ergebnisse der einzelnen Tage, Monate und Jahre. Aus dieser Vergleichung kann man dann Schlüsse ziehen über den vermutlichen Verlauf der nächstfolgenden Witterung.

Die Wissenschaft hat schon ziemlich viel Genaues festgestellt; der weit größte Theil des Volkes ahnt aber noch nichts davon. Die „Bauernregel“ und der „hundertjährige Kalender“ sind selbst für viele sonst geachtete Leute noch die Leitster bei ihren Wetterbeobachtungen. Das rührt allein daher, daß für diese der Kalender meist noch der einzige Rathgeber ist und die Kalenderreiber sich viel Mühe geben, mit allerhand Geschichten, Schnurren und Bildern die Leser zu vergnügen, statt ihnen das zu bieten, was ihre Pflicht wäre: Aufschluß über das Wetter und alle die Ereignisse, die für des Menschen Leben und Gedeihen von Einfluß sind.

Im vorigen Herbst hat endlich ein Mann, der seit vielen Jahren den gegründeten Ruf eines Wetterkundigen sich erworben hat, Dr. Johann Anton Heibenschreiber in Herrieden, bekannt unter dem Namen „Herrieder Wetter-Beobachter“ einen Kalender geschrieben, der jene Ergebnisse der Wissenschaft in einer allem Volk verständlichen Weise darlegt. Er führt den Titel: „Der achte Herrieder Kalender“. Er ist für 12 R. aus der Ettlinger'schen Verlagsbuchhandlung in Würzburg zu haben\*).

Dr. Heibenschreiber, praktischer Arzt in Herrieden, und sein Onkel, der gleichfalls dort wohnte, hat seit 57 Jahren (1811—1868) die täglichen Erscheinungen des Wetters genau beobachtet und aufgezeichnet. Dr. Heibenschreiber hat nun in dem Kalender diese Resultate in folgender Weise niedergelegt. Erstens gibt er einen genauen Bericht über den Verlauf des Wetters im J. 1867, woeaus wir z. B. erfahren, daß die mittlere Temperatur des ganzen Jahres 1867 in Herrieden (am oberen Lauf der Altmühl, ein paar Stunden von Nürnberg, unter 49° 15' n. Br. gelegen) 7,87° R. war, d. h. 0,3 unter dem 56-jährigen Durchschnitt; die mittlere Temperatur des Winters (December 1866 bis März 1867) 2,41° R., d. h. 2,51° über dem Durchschnitt. Die größte Wärme im Januar betrug 9,2° R., die größte Kälte —15,9° R. Aus diesen Thatfachen allein können wir schon schließen, wie bewegt und rasch wechselnd das Luftmeer gewesen sein muß. Nun werden außerdem die Beobachtungen über den Luftdruck, die Luftströmung, Regen, Schnee, Wasserstand, über den Einfluß der Witterung auf die Gesundheit der Menschen, über die einzelnen Krankheitsformen u. s. w. angegeben. Man gewinnt also daraus schon ein ziemlich vollkommenes Bild über die gesammte Witterung und deren Einfluß während eines Jahres.

Nun hat er ferner ausgerechnet, welches die durchschnittliche Temperatur eines jeden Tages seit 57 Jahren gewesen ist. Diese Durchschnittswärme ist bei jedem Tag neben dem Sonnen- und Monats-Auf- und Untergang verzeichnet. Dann hat er die mittlere Jahrestemperatur von Herrieden und die von 14 anderen deutschen und außerdeutschen Städten (London, Paris, New-York, Mexiko u. s. w.) ausgerechnet. Hieraus erfahren wir z. B., daß Herrieden im Januar (im kaltesten Monat) eine Durchschnittstemperatur von —0,8° R. hat, im April von 7,6°, im Juli von 16,8°, im October von 8,4°; daß die Temperatur alle Vierteljahre um etwa 8° steigt oder fällt und daß seine mittlere Durchschnittstemperatur vom ganzen Jahr 7,3 R. ist. In Nürnberg (49°, 27' n. Br.) ist die Durchschnittstemperatur im Januar —1,8°, im April 7,1°, im Juli 15,0°, im October 7,4°, im ganzen Jahr 7,1° R. In Karlsruhe (49° n. Br.) im Januar —0,1°, im April 8,4°, im Juli 15,8°, im October 8,3°, im ganzen Jahr 8,3° R. In Wien (48°, 15' n. Br.) ist die Durchschnittstemperatur im Januar —1,2° R., im April 8,8°, im Juli 17,2°, im October 8,6°, vom ganzen Jahr 8,6° R. In New-York (41° n. Br.) im Januar —3,4°, im April 9,8°, im Juli 18,3°, im October 9,3°, im ganzen Jahr 8,7° R.

scheut, den Namen „Herrieder“ als Ausschmückung zu mißbrauchen, sondern auch in Hunderten von Exemplen seinen Kalender auf Kosten Dr. Heibenschreiber's herauszugeben.

\*) Eine andere Würzburger Buchhandlung hat auch einen f. g. „Herrieder Raubfisch-Kalender“ herausgegeben, der nicht weiter enthält, als eine Schnurrensammlung, von wissenschaftlicher Wertes keine Spur. Der Verleger hat sich nicht bloß nicht ge-

Will man die durchschnittliche Temperatur seines Ortes wissen, so ersieht man aus der Tabelle der Mitteltemperaturen für Karlsruhe 8,3°, für Heidelberg 8,6° K., für Würzburg 8,4° K. vergehnet. Für Darmstadt kann man etwa 8,5° annehmen. Nun steht am 6. December als Durchschnittstemperatur vergehnet: „—7° unter dem Mittel“, d. h. für Darmstadt +1,5° K. An jenem Tag hatten wir in diesem Jahr (1868): +11,85°, d. h. 10,75° über der durchschnittlichen Temperatur. Aus den der Tabelle beigefügten Notizen erfahren wir, daß die größte Wärme im December 1823 war (+11,2° K., d. h. für Darmstadt 12°). In diesem Jahre hatten wir also nur 0,15° weniger als 1823.

Steht man nun die Reihenfolge der einzelnen Tage etwas genauer an, dann findet man, daß die Temperatur vom 1. bis 6. December durchschnittlich im Ganzen um 0,1°, vom 6. bis 16. jeden Tag um 0,1°, zusammen um 1°, vom 16. bis 24. um 0,8° sinkt, vom 24. bis 30. auf derselben Höhe bleibt und am 31. um 0,1° sinkt. Wir sehen also im Laufe des December ein Sinken von —6,9° bis —8,9° K. unter Mittel, d. h. für Darmstadt von +1,6° bis auf —0,4° K. In gleicher Weise finden wir in jedem Monat ein ähnliches regelmäßiges Sinken oder Steigen der Temperatur. Und vergleichen wir dieses Sinken und Steigen mit dem Sinken und Steigen der Sonne, so sehen wir, daß die Durchschnittstemperatur ganz allein durch das Steigen und Sinken der Sonne bedingt ist (d. h. das Thermometer steigt nicht sofort mit dem 21. December, weil die im Boden haftende Kälte noch nachwirkt; sie sinkt vielmehr noch bis zum 6. Januar, bleibt aber dann bis zum Januar stehen und steigt von da regelmäßig wieder.) Hieraus folgt aber der ganz sichere Schluss, daß jedes Abweichen von der Durchschnittstemperatur eine unregelmäßigkeit ist, die um so weniger anhält, als sie groß ist.

An jenem 6. December hatten wir 11,85° K., d. h. 10,75° über dem Durchschnit. In der Nacht stieg das Thermometer sogar auf 13,2°. Damit kam ein gewaltiger Sturm, der über ganz Mitteleuropa haufte und vieles Unheil anrichtete; die Wärme und der Sturm konnten nicht lange anhalten. Vom 7. bis 8. December sank das Thermometer auf 6,5°, am 9. December auf 4,2°, vom 9. bis 10. December auf —0,8°. Der Wind drehte sich dabei von SW. durch W., NW., N. nach D. Die Durchschnittstemperatur vom 10. bis 11. December war +1,65° K., d. h. 0,75° K. über dem Durchschnitt von 57 Jahren.

Es bedarf nicht viel Kunst und wenig Aufmerksamkeits, um die Wärme und die Dichtigkeit der Luft täglich zu messen und in seinem Kalender zu notiren. (Für den

Unkundigen sind in dem Kalender Anleitungen zur Behandlung des Thermometer, Thermometergraph, Barometer u. s. w. gegeben.) Die Tabelle zeigt ihm gleich die Abweichung vom regelmäßigen Zustand der Luft. Nach einiger Übung bekommt der Beobachter Geschick in der Beurtheilung des Temperaturwechsels, so daß er der Wahrheit näher rückt.

Freilich wird der Kale nicht immer zu den richtigen Schlüssen kommen. Es wäre deshalb von Gewicht, wenn auch bei uns die Wetterstationen täglich die Resultate der gesammelten europäischen und außereuropäischen Beobachtungen veröffentlichten, wie dies in Frankreich, England und Nordamerika geschieht. Es bestehen aber in Süddeutschland noch sehr wenige Wetterstationen, manche werden höchst dilettantisch betrieben. (In Karlsruhe z. B. übt das Amt der Hofgärtner.) Selbst von den preussischen Stationen werden nur alltäglich die Beobachtungen von Norddeutschland, von Nord-Frankreich, Holland und der Ostsee-Küste veröffentlicht, dagegen keine von den übrigen 20 österreichischen Stationen, dann auch keine Vergleiche gezogen. Nur die österreichische Central-Anstalt für Electricität und Magnetismus in Wien veröffentlicht täglich ihre (freilich auch nur österreichischen) Berichte und gibt daraus eine vergleichende Schilderung des gesammten Luftzustandes.

Von welcher Wichtigkeit eine solche tägliche Schilderung des Wetters für das gesammte Volk ist, leuchtet wohl Jedem ein. Nicht bloß bei der Schifffahrt, bei der Laufende von Menschen und Millionen an Werthgegenständen gerettet werden können, wäre sie ein unschätzbarer Vorthell, sondern auch für die Geschäfte des Binnenlandes. Was würde der Landmann gewinnen, wenn er in der Centegelt wüßte, daß in den nächsten 8 oder 14 Tagen unregelmäßiges Wetter herrschen werde? Wie viel würden Industrielle, wie z. B. Glanzlebers, Wachstuchs-Fabrikanten u. A., ersparen, wenn sie am Morgen wüßten, daß am Mittag ein Gewitter ihre Arbeit zerstören kann? Was gäben nicht Laufende von Menschen zum Zweck ihres Vergnügens, wenn sie bei einem Reiseplan das Wetter berechnen könnten? —

Ein Kalender ist kein Rezept, was man lösselweis einnimmt, und auch die Berichte der Wetterstationen können nicht unmittelbar verworther werden. Wer das Eine oder Andere kauft oder liest, übernimmt damit ein Stück Arbeit: er muß alle Tage aufpassen und selber prüfen. Aber für Eien, der die Dinge wissen und zu seinem Vorthell verworther will, sind jene Gegenstände unschätzbar; sie sind ein täglicher Führer und Lehrmeister, die ihm Antrieb und Anleitung bei der eigenen Beobachtung geben.

## Zum Monterosa zum Montblanc.

Von Ellis W.

### 13. Wanderung durch die Serac's des Glacier du Géant.

Einer wahren Luftwanderung hatte unser Hinabsteigen über die weiten Schnees- und Firnsflächen des Géant geglichen. Die Kälte war allerdings empfindlich, schützte aber auch den Schnee vor Erweichung. Ganz ohne Gefahr ist immerhin eine solche Wanderung über Firnsfelder nicht, denn unter der Schneedecke lauern verborgene Schlünde, in die hinabzufürzen wahrlich kein Spaß ist. Wir mußten uns daher auch zu der gewöhnlichen Vorsichtsmaßregel bequemen, dem Festbinden an ein Seil, das Jedem etwa in einem Abstände von 12 Fuß von seinem Vordermann um den Leib geschnürt wurde. Man hat allerdings gegen dieses Festbinden schon manche Bedenken erhoben und das Unglück bei Besteigung des Matterhorns ganz besonders dieser Maßregel zugeschrieben, da das Seil hier durch den Sturz eines Einzelnen die ganze Gesellschaft mit hinabriß. Bei Erstigung von vereisten Felsgipfeln oder beim Herunterklettern an schroffen Wänden mag in der That ein solches Festbinden oft sein Bedenkliches haben; bei einer Wanderung über Gletscher und Firnsfelder ist es gleichwohl unerlässlich. Davon sollten wir uns sehr bald überzeugen. Wir hatten ein sehr steil abfallendes Schneefeld zu passiren, an dessen unterem Rande der tiefe Abgrund einer breiten Firnspalte sich öffnete. Der Schnee war überdies mit einer harten Eiskeuste überzogen, auf welcher der Fuß nicht haftete. Es war daher nothwendig, mit dem Beile Stufen zu hauen, Stufen freilich nur im Sinne des Gletscherwanders, von etwa Faustgröße und nicht zu verwechseln mit Treppenstufen, wie wir sie sonst gewohnt sind. Vorsichtig folgte die Colonne dem vordanschreitenden, die Stufen hachenden Führer. Einer meiner belgischen Reisegefährten, der vierte in der Colonne, hatte schon vorher einige Male Beweise abgelegt, daß er keine übergroße Gewandtheit und Sicherheit im Bergsteigen besaß, und so war es kein Wunder, daß er schon nach den ersten Schritten auf diesen unwohnbaren Stufen ausglitt und den Schneerabhang hinabrollte. In einem Nu hatte er aber nicht allein zwei seiner Vorgänger, sondern auch seinen Hintermann, meinen Führer aus dem Jermatthal, der bei seiner tiefen Körperkraft und seiner Gewandtheit als Gensd'arm es am wenigsten erwarten ließ, mit sich zu Boden gerissen, und alle 4 rollten dem Abgrund zu. Ich war der Vorletzte im Zuge und der Nächste, der in den Fall hätte verwickelt werden müssen. Aber mich traf der Vorgang nicht ganz unvorbereitet. Ich hatte längs von meinem belgischen Freunde Kehtliches erwartet und so eben noch die selbstverständliche Mahnung an meine Gefährten gerichtet, daß Jeder das Seil fest mit der linken Hand fassen und dar-

auf achten möge, daß es immer gespannt erhalten bleibe. Ich suchte nun für meine Füße einen festen Standpunkt im Schnee, zog dann das Seil an, und im Nu war der rollenden Menschenlawine Halt geboten. Der Unfall verließ so bis auf eine zerbrochene Uhr ohne alle ernstlichen Folgen. Er hatte aber auch zur Vorsicht gemahnt, und diese wurde, der zunehmenden Beeklüftung wegen, bald sehr nöthig. Behutsam schritt der Führer voran und prüfte fast bei jedem Schritte erst die nächste Stelle der vor uns sich ausbreitenden Fienbede, ob sie uns auch zu tragen vermöge. Manche uns mit offenem Rachen ansehende Schlünde, deren Tiefe wir nicht zu ermessen vermochten, wurden mit Vorsicht umgangen, andere mit ledem Sprünge überschritten. Zuweilen versank das eine Bein eines Wanders plötzlich in einer verdeckten Spalte, deren Dasein man selbst bei der größten Aufmerksamkeit nicht ahnen konnte; aber das schüßende Seil ließ den Ueberasschten nicht weiter sinken, und er bedurfte nur geringer Anstrengung, um sich auf den sicheren Boden hinaufzuschwingen.

Die Gletscher zu beiden Seiten des ungeheuren Firnmeeres traten jetzt näher aneinander; wir befanden uns bereits auf dem Gletscher selbst, der still vor uns durch die verengte Thalschlucht hinabführte. Bevor wir aber den ersten Kampf mit seinen Schrecken aufnahmen, wurde noch einmal Halt gemacht. Es war etwa 10 1/2 Uhr Morgens, und meine Gefährten machten sich daran, ein zweites Frühstück einzunehmen. Ich selbst war thöricht genug, mich davon auszuschließen, weil ich an Appetitmangel litt, der sich in diesen Höhen häufig einstellt. Ich ahnte nicht, daß sich in den nächsten 6 Stunden kein ruhiger Augenblick für eine Mahlzeit wiederfinden werde.


Es ist jetzt wirkliches Eis, auf dem wir uns befinden, aber anderes, als unser gewöhnliches Wassereis und in ganz anderer Weise entstanden. Wie aus dem lockeren Schnee durch Eindringen von gefrierendem Wasser allmählig der körnige Firn entstand, so bildet sich durch andauernde Fortwirlung der gleichen Ursache der Firn zum eigentlichen Gletscheereis um. Der Uebergang vom Firn zum Gletscher ist darum ein ebenso unmerklicher wie der vom Schnee zum Firn. Dieser Uebergang wird ganz besonders dadurch bemerkt, daß durch das einbringende Wasser die noch im Firn vorhandene Luft ausgebrängt und dadurch die dem Eise eigenthümliche Durchsichtigkeit erzeugt wird. Nur ganz kleine, rings vom Eis umschlossene Bläschen bleiben zurück, und diese geben allerdings dem Gletscheereis eine weit größere Porosität, als sie das Wassereis besitzt. Das poröseste Eis erscheint matt und weiß.

Sind aber nur wenig Bläschen vorhanden und fast alle Hohlräume von Wasser erfüllt, ist die Masse also gleichartig, so erscheint das Gletscheris in jener prachtvoll blauen Färbung, die den Besucher des Rosenlaugletschers so zu entzücken pflegt. Was aber ganz besonders das Gletscheris von unserm Wasseris unterscheidet, das sind die feinen Haarspalten, die es nach allen Richtungen durchziehen, und die offenbar eine Wirkung des Temperaturwechsels sind. Zerschlägt man Gletscheris mit dem Hammer, so spaltet es nicht wie das gewöhnliche Wasseris in ziemlich geraden, scharfen, sondern nach dem Verlauf der Haarspalten in unregelmäßig kantige Körner. In der Kälte und an frisch gebrochenem Eise ist dieses Gletscherkorn nicht zu erkennen, wohl aber unter dem Einfluß der Wärme. Dann lockert sich die ganze Masse und zerfällt in groben Geröl. Nach der Tiefe zu werden die Gletscherkörner größer und erreichen bisweilen Durchmesser von mehr als 2 Zoll.

Es ist also wirkliches Eis und zwar in einer Mächtigkeit von mehreren hundert Fuß, welches das Thal erfüllt und durch die Schlucht hinabfließt. Worin dieses Fließen besteht, ob es das Gleiten einer starren Masse oder das Fließen einer zähen Flüssigkeit oder das Rinnen einer Körnermasse ist oder sich aus allen diesen Bewegungen zusammensetzt, immerhin ist die Schwere die treibende Kraft und die Bewegung den Befehlen des Fließens unterworfen. Der Gletscher formt sich nach den Unebenheiten seines Bettes und den Windungen seiner Ufer. Bei sanfter Neigung des Bettes und weiten Ufern wird der Gletscher darum dem Wiesenbach gleichen, der ruhig durch die Ebene schleicht; bei schroffer Neigung des Bettes wird er wie der Wildbach in Cascaden durch das Thal hinstürzen. Wer über einen der Aargletscher gewandert und dann den Rosenlaugletscher oder die Gletscher Aäse blande gesehen hat, wird diese Vergleichung berechtigt finden. Aber um den Einfluß des Bettes und der Ufer auf die Gestalt der Gletscher richtig zu würdigen, müssen wir die Verschobenheit

in's Auge fassen, die zwischen dem Fließen von Eis und von Wasser besteht.

Die Wirkung der Unregelmäßigkeiten des Bettes auf den Gletscher ist natürlich eine ganz andere als auf flüssige Ströme. Das Gletscheris bleibt bei aller Plastizität doch immer eine starre, spröde Masse, die sich nicht sofort allen veränderten Verhältnissen fügt. Wo deshalb der Gletscher eine Wendung um eine Felsenkante zu ma-



Ende des Gletscher zu Gant.

chen gezwungen ist, oder wo die größere Neigung oder eine Erweiterung des Bettes ein beschleunigteres Vorrücken des Eises bedingt, vermag die spröde Oberfläche nicht zu folgen und zerreiße deshalb, bildet Spalten oder Crevassen. Diese Spalten entstehen ganz allmählich. Die erdröhnt plötzlich unter den Füßen des Wandersers der Boden, ein donnerähnliches Krachen wird vernommen — der Gletscher brüllt — sagt man in den Alpen. Es hat sich eine Spalte gebildet, die kaum 1 bis 1 1/2 Zoll breit etc.

schneht, nach einigen Tagen aber schon zu Fußbreite angemachen ist und in ihrer völligen Ausbildung nicht selten eine Breite von 15 bis 20 Fuß erreicht. Oft entstehen mehrere solcher Risse hinter einander, oder es knüpft sich an das Ende der einen Spalte, höchstens durch eine schmale Wand von ihr getrennt, eine zweite und an diese eine dritte, vierte u. s. f. an. So entsteht ein Labyrinth von Spalten, durch welches der Weg zu finden, selbst für den erfahrensten Wanderer oft schwer hält. Die Spalten sind so vielfältig und doch wieder so ähnlich, daß jede als dieselbe und doch wieder eine andere erscheint. Man bildet sich wohl ein, ein besonderes charakteristisches Merkmal an einer solchen Spalte entdeckt zu haben, und doch wiederholt sich dasselbe vielleicht hundert Mal bis in die allernunbeachtlichste Einzelheit. Einmal vom rechten Wege abgelenkt, ist es schwer ihn wiederzufinden, weil eine falsche Wendung oft den Wanderer durch unübersehbare Spalten von der Gegend trennen kann, die er erreichen will. Selbst die besten Führer sind nicht davor sicher, irre geleitet zu werden, und sie pflegen daher an solchen Stellen, die sie oft zu passieren haben — wie am Uebergange über das Mer de glace nach dem bekannten „Jardin“ — hier und da auf dem Eise oder auf Moränenblöden kleine Stelenpyramiden zu errichten, die ihnen als Wegweiser dienen, gerade wie man es auf Mooren oder nebelreichen Hochflächen zu machen pflegt. Nichtsdestoweniger bleibet der Gletscher Jahr für Jahr eine so völlig ähnliche Oberfläche dar, daß der erfahrene Führer immer in derselben Richtung seinen Weg über das Eis nimmt, daß er alljährlich sogar dieselben Spalten zu vermeiden scheint, während er doch thatsächlich auf ganz veränderten Eise geht, auf einem Eise nämlich, welches in Folge der fortschreitenden Bewegung des Gletschers alljährlich eine andere Stelle einnimmt. Auch hierin gleicht also der Gletscher wieder dem Flusse, bei welchem dieselben Wassertheilchen nach einander den tiefen, stillen Sumpf, den schäumenden Fall und den raschen Wirbel bilden, Erscheinungs- und Bewegungsformen, die ihre Lage zu den festen Punkten der Ufer und des Bettes unverändert behaupten, während das Wasser selbst beständig vorüberweht. Nur die Jahreszeiten ändern ein wenig das Ansehen der Gletscheroberfläche. Im Winter consolidirt sich der Gletscher, die Spalten erscheinen daher im Frühling unbedeutend, öffnen sich aber mehr und mehr im Laufe des Sommers, so daß im Spätsommer der Gletscher seine größte Zerissenheit erreicht. Bei stark geneigten Gletschern kann es geschehen, daß der Wanderer im Herbst den Gletscher vom Frühjahr nicht wieder zu erkennen glaubt. Jedensfalls sind die Verschiedenheiten im Charakter des Gletschers größer zwischen Frühling und Herbst eines Jahres als zwischen zwei verschiedenen Jahren.

Wenn man die Ursachen ermägt, welche auf die Oberflächengestaltung des Gletschers einwirken, so wird man

es begreiflich finden, daß die größte Zerspaltung da eintreten muß, wo zwei Gletscherarme von verschiedener Geschwindigkeit sich mit einander vereinigen und nun gezwungen werden, ihre gesammte Eismasse durch eine verengte Thalschlucht hindurch zu führen, oder wo der Gletscher plötzlich über eine steil geneigte Terrasse abfließt. Es gibt Gletscher, deren Hauptstrom aus dem Zusammenfluß von 3, 4 und mehr Gletschern hervorgeht. Auch der große Eisfluß des Mer de glace entsteht zunächst aus zwei Hauptströmen, die aus verschiedenen Quellen entspringen. Den westlichen Arm, den Glaciar du Géant, haben wir aus dem weiten Becken an der Ostseite des Montblanc hervorkommen sehen. Der östliche Arm, der Glaciar de Rechaud, hat seinen Ursprung am Fuße der großen Jorasse, eines der höchsten Berge dieser Kette, die das Val Jéret von dem Chamounixthale trennt. Dieser Gletscher ist kleiner als sein Nachbar, obgleich er vor seiner Verbindung mit diesem durch das ihm zustießende Eis des Glaciar du Talétre vergrößert wird, der an seinem rechten Ufer einmündet und aus einem von unzugänglichen Felskinnen eingeschlossenen Becken kommt, in dessen Mitte sich der vielbesuchte „Jardin“ befindet. Der Glaciar du Géant hat nicht allein die bisweilen größere Masse, sondern bemegt sich auch am schnellsten. Der vom Glaciar de Rechaud herflammende Eisstrom ist daher nach seiner Vereinigung mit ihm gezwungen, ihm zu folgen. Da aber der verengte Strom durch einen Raum gepreßt wird, der nicht größer ist, als der vorher von jedem einzelnen Strome eingenommene, so wird er gewaltsam ausgedrückt und verzerrt, gerade wie bei der Vereinigung zweier Flüsse der schwächere durch den mächtigeren in gewaltsame Gegenströmungen hineingerissen wird. Die Folge ist eine furchtbare Zerspaltung des Gletschers, wie sie sich an der ganzen Ostseite des vereinigten Stromes des Mer de glace zeigt. Nirgends treten so zusammenhängende Spalten wie hier auf, die sich oft fast über die Hälfte des ganzen Gletschers erstrecken; nirgends zeigen sie eine so erschreckende Breite, die oft 15 bis 20 Fuß erreicht. Eine Wanderung an dieser Seite des Gletschers ist nur mit ungeheuren Umwegen möglich.

Aber wie groß auch die Zerspaltung in Folge einer solchen Vereinigung zweier Gletscherarme und der Verengung ihres Bettes sein kann, sie steht in keinem Vergleich zu der Zerissenheit, welche durch den jähen Abbruch eines Gletscherstromes über steile Terrassen bewirkt wird. Vordemwärts gedrängt auf dem ungeheuren Felsendeck, auf dem sie ruht, stürzt sich die starke Eismasse, einem Wasserfall gleich, über den Rand des Abgrundes hinab, aber nicht in zusammenhängendem Wogenenwölbe wie dieser, sondern zersplittert in zahllose, riesige Bruchstücke, in Scheiben, Säulen, Blöcke, deren Höhe der gewaltigen Dicke des Eises entspricht, während ihre Umriffe durch das Zusammentreffen der Spalten bedingt werden, aus denen

se hervorgehen. Sonne, Luft und Regen mobilicen unablässig an diesen riesigen Trümmern, scharfen ihre Spigen und wandeln sie allmählig in mehr oder weniger rohe Pyramiden um, die sich in tausend phantastischen Formen erheben, während sie an ihrem Grunde durch rauschende Gletscherbäche zu nicht weniger phantastischen Labirinth in den dunkelblauen Tiefen des Eises ausgehöhlt werden. Unablässig unterhöht, fortgeschoben von der drängenden Gewalt der Gletscherbewegung, verlieren sie das Gleichgewicht, überschlagen sich und vergößern die dem Auge sich darbietende Verwirrung, indem sie ihre Trümmer unter einander werfen. Die Moränen, mit welchen diese zerstückten Gletscherstücke beaufschlagt sind, werden natürlich gleichfalls zerstückt, ihre herabstürzenden und von dem Drucke des Eises zermalnten Massen rollen in die geöffneten Abgründe, und werden durch den ungesägten Strom, der tief unten im Gletscherhohle rauscht, auf weite Entfernungen fortgeschleudert. So entsteht jenes wilde Chaos phantastisch gestalteter Kerkelklippen und Eiseladelsgruppen, die ihre scharfkliegenden Bruchanten himmelwärts übereinander aufbauen und unter dem Namen der Gletschnadeln oder Pyramiden oder „Seracs“ bekannt sind. Prachtvoll, entzückend erscheinen sie dem Wanderer in der Ferne, furchtbar werden sie für den, der sich den Weg durch ihr Chaos hindurch bahnen soll.

Wanderungen durch solche Seracs gehören, abgesehen von den Gefahren, die sie fast immer bieten, zu den ermüdendsten, die man im Hochgebirge machen kann. Da muß man bald von Spalte zu Spalte, von Eisblock zu Eisblock springen, bald längs der gerissenen Ränder des Eises, welche die Spalten begrenzen, im Zickzack hinwandern, um Klüfte zu umgehen, die zu überspringen keine Möglichkeit ist. Bald wieder muß man an den Wänden solchen, die weniger steil und tief sind, hinabsteigen und mühsam die gegenüberliegende Wand hinaufklettern. Oft muß die Art Stufen haken, auf denen man, mit der einen Hand sich am scharfkantigen Eise haltend, mit dem Alpenstock in der andern dem über dem Abgrunde schwebenden Körper das Gleichgewicht geben, an steilen Eiswänden auf- und abklimmt. Oft muß man einem Seiltänzer gleich, auf schmalen Riff dahin schreiten, das aus unabsehbare Tiefe aufragt. Da sind Muth, Besonnenheit, Gesichtsgegenwart in jedem Augenblick erforderlich; da muß jede Muskel und Sehne angepasst, jeder Schritt überlegt, jede Stelle geprüft werden, auf die man den Fuß setzt. Da erfordert man erst, was ein guter Alpenstock und solide Bergschuhe werth sind. Wo der Fuß oft nur auf zollbreiter Eiskante haftet, da hängt das Leben von der guten Beschaffenheit der Schuhe, von der Unbegreiflichkeit der Sohlen, von der Sicherheit, mit welcher die scharfen Nägel in die glatten Eishänge eingreifen, ab.

Die Seracs des Glacier du Géant, durch welche mich meine Wanderung führte, gehören zu den wildesten und zerfressenen der Alpenwelt. Ein Blick auf den kürzlich gegebenen Querschnitt meiner Wanderung wird dem Leser zeigen, daß der Gletscher hier auf einer Strecke von ca. 2000 F. um 1000 F. abfällt, und ein Blick auf die beifolgende Abbildung wird ihm eine Vorstellung von dem Eisnadel-Labirinth geben, das durch diesen Abstieg erzeugt wird. Fast 3 volle Stunden hatten wir mit den Schreden dieser eisigen Wildnis zu kämpfen, in welcher auch den besten Führer die Erfahrung im Eise läßt. Mehr als einmal befanden wir uns in haarsträubender

Lage, rings von Klüften umgeben, von himmelhohen Eisnadeln umfarrt, gezwungen hier in rohen, faußgroßen Stufen eine senkrechte Eiswand hinabzuklimmen, um dann von schmalen Stützpunkten über eine gähnende Spalte hinweg auf den jenseitigen tieferliegenden Rand hinabzuspringen. Mehr als einmal glitt der Fuß dabei aus, und nur die Entschlossenheit, mit der man sich hinüberwarf, und die Festigkeit des Seiles schützten vor dem Sturz in die Tiefe. Einmal mußte ein wohl 20 Schritte langer, aus einer gewaltigen Kluft aufragender, kaum einige Zoll breiter Eisgarg der Länge nach überschritten werden, und beim Uebersteigen eines Eishöfers, der sich in seiner Mitte erhob, widerfuhr es mir, daß mein Fuß sich in das Eil verwickelte, das mich mit meinem Hintermann verband und bei seiner zu schnellen Annäherung diese herabging. Nur der rasche Entschluß, mich niederzulegen und mit dem einen Arm den Eishöfer zu umschlingen, rettete mich und meine Gefährten, die trotz des Seils bei der Schmalheit des Riffs, auf dem sie standen, schwerlich sich selbst im Gleichgewicht zu erhalten vermocht hätten. Die Hände bluteten von den scharfen Kanten des Gletscherseils, mit denen sie bei manchem Fall in gewaltfamer Verberührung gekommen waren, die Eisfelsen waren erfüllt von kleinen, abbröckelnden Eisteümmern, Hunger und Durst plagten mich, da ich es am Morgen versäumt hatte ein zweites Frühstück einzunehmen, das Labirinth nahm kein Ende, und die Gefahren schienen beständig zu wachsen; und doch verließ mich keines Augenblick selbst eine gewisse Heiterkeit und der Sinn für die großartige Schönheit der Scenerie. Es liegt etwas ungemein Kräftigendes in dieser frischen, reinen Vergnügen. Der Fuß hat eine Elastizität, das Herz eine Zuversicht, wie man sie unten in unserm Flachlande nicht kennt. Das mit den Abgründen vertraute Auge vergißt ihre Schreden, und Menschen, die zu Hause Seidenketten tragen würden, auf einer schmalen Mauer hinschweben, wandeln hier ruhig an Abgründen hin und schauen mit festem Blick in die unergründlichen Tiefen der Gletscherpalten hinab.

Endlich — 4 1/2 Uhr Nachmittags — hatte die abenteuerliche Wanderung durch die Seracs ihr Ende erreicht, und es konnte Halt gemacht werden, um die lange versäumte Mahlzeit einzunehmen. Wir befanden uns der Mündung des Glacier de Léchaud gegenüber und überschritten gleichzeitig die drei Arme des Gletschers, die Eisnadeln des eben durchwanderten Glacier du Géant, die beständig schneebedeckte Eisfläche des Glacier du Léchaud und das von furchtbaren Felswänden umschlossene Schneebetten des Glacier du Taléire, in dessen Mitte sich der „Jardin“ erhebt, eine große freiliegende Felsenfläche, die an ihrem unteren Theil Erde genug trägt, um einen guten Rasen zu erübrigen, der einige Wochen des Jahres hindurch mit herrlichen Alpenblumen geschmückt ist. Unmittelbar neben uns erhob sich das stolze Vorgebirge des Tacul, welches die beiden Hauptarme des Gletschers trennt, die hier in ihrem Zusammenfließen einen ungeheuren Trümmerhaufen von Eis und Felsblöcken aufgeworfen haben; weiter gegen Osten begrenzen die kolossalen Felsmauern der Jorassen den Blick, während im Westen die Aiguilles de Blaitiere und de Charmoz aufliegen, und über die Aiguille de Midi drab noch einmal der Montblanc und ein Garg zusamment. Vor uns lag das Mer de glace zum Chamounix-Thale hinab, jenseits dessen die Kette der Aiguilles Rouges und die schneebedeckte Spitze

des Biet herüberzuschauen. Der dringenden Fesseln des Eises entliet, eilten wir better und flüchtigen Fußes die verhältnismäßig gefahrlöse Eisfläche hinab. Manchmal noch benetzten Spalten unter Berdingen, manche wurde durch kühnen Sprung überwunden, manche andere wette Strecken verfolgt, bis eine Schneebürde oder ein Vorsprung den Übergang ermöglichte. Die und da stießen wir auch auf „Näbten“ oder „Moulin“, tiefe, fast zylindrische Löcher im Eise, in welche das in Böden auf der Oberfläche des Gletschers gesammelte Wasser in donnenden Cascaden hinunterfällt. Hier konnten wir uns von der gewaltigen Mächtigkeit des Gletschereises überzeugen, da der Blick die Tiefe dieser „Moulin“ vergeblich zu ergünden versuchte, die, wie Messungen ergeben haben, in der That oft mehr als 3 bis 400 Fuß betragen mag.

Der Abend begann allmählich hereinzubrechen, und das Leben des Gletschers ging zur Ruhe. Die lustig hüpfenden Bäche erstarrten, ihr Wurmeln und Rauschen, das Brüllen ihrer Fälle verstummte, und Todtenstille herrschte, während röhrlche Rinten rings um die schneebedeckten Gipfel überzogen. Es war Zeit, den Gletscher zu verlassen, dessen westliche Seitenmoräne noch überfliegen werden mußte. Mancher lose liegende Block, manches nur von schwacher Schneedecke verhüllte Fels machte zur Vorsicht; aber auch diese beschwerliche Wanderung war bald überstanden. Wir betraten das Ufer, wo die festerste Kippe des l'Angle gegen den Gletscher vorspringt. Unterhalb dieses Felsenvorsprungs hat man Gelegenheit, eine der interessantesten Wirkungen der Gletscherbewegung zu beobachten. Der in seinem Vorstreichen durch die Klippe aufgetragene Gletscher läßt nämlich hinter derselben eine Rinde, die er nicht sofort aufzufüllen vermag. Steigt man in diesen Raum zwischen Eiswand und Felswand hinab, so trifft man Granitblöcke, die von der Moräne herabgeglitten sind und nun zwischen Eis und Fels eingeklemmt, von der Wucht des Gletschers in seine fortschreitende Bewegung hineingerissen werden. In ihrem Fortrücken ziehen sie nun an der geglätteten Felswand parallele Streifen und Furchen, ganz jenen Furchen entsprechend, die man so oft hoch über den heuligen Gletschern in den Hochthälern der Alpen antrifft, und die uns dort von der Wirkung weit mächtigerer Gletscher in grauer Vorzeit erzählen.

Nur einmal noch wird die Wanderung über die Uferseifen durch eine Schwierigkeit unterbrochen, die aber für uns nach den bestandenen Gefahren kaum noch der Beachtung werth schien. Es sind zwei glatte, vorspringende Eiseisen, die ziemlich steil gerade unter das Eis des Gletschers hino' hängen. Der Übergang würde unmöglich sein, wenn er ... nicht einige rohe Stufen in den schiefligen Eiseis gehauen hätte, die fesslich oft kaum einige Zoll breit und zudem durch das beständig herabdrückende

Wasser schlüpfrig sind. Man hat diese Uebergänge, die zuweilen auch von Damen passiert werden, les Ponts genannt, und sie bilden das Gegenstück zu dem berühmtesten Mauvais pas, der auf dem entgegengesetzten Ufer überschritten werden muß, wenn man vom Chapeau zum Gletscher herabsteigt, und der übrigens jetzt mit einem eisernen Geländer versehen ist.

Endlich war der Montanvert mit seinem einfachen, vielstöckigen Pavillon erreicht, aus dessen Fenstern man eine unvergleichlich schöne Aussicht über das in der Tiefe ruhende Mer de glace genießt, das hier in der That einem im wilden Wellenkampfe erstarrten Eismeer gleicht. Meine Gefährten zogen es vor, hier zu weilen und sich von der anstrengenden Wanderung zu erholen, ich selbst eilte mit meinem Führer den sich entlos mündenden Pfad zum Chamounix-Thale hinab, dessen gastlichen Hauptort, Priouret de Chamounix, ich in tieferer Dunkelheit um 9 1/2 Uhr erreichte.

Nicht vermag ich die Gefühle zu schildern, die mich erfüllten, als ich nun in beglückter Ruhe auf welchem Ersehl am Abende die Erlebnisse des Tages an meinem Geiste vorübergehen ließ. Ein 17 1/2 stündiger Marsch lag hinter mir, dessen Anfang die Erstimung einer 5000 F. hohen Felsenstufe bildete, der dann 10 Stunden lang über Schneefelder, Gletscherspalten und Eistrümmer hinüber, und dessen Ziel nun 7500 F. unter dem höchsten erreicheten Punkte lag. Wie anders waren die Gefühle am Morgen gewesen, als ich zur abenteuerlichen Wanderung aufbrach, ganz erfüllt von der Hoffnung hoher Genüsse, aber auch von der Ahnung ernster Gefahren und Mühseligkeiten und selbst von Zweifeln des Gelingens! Jetzt, wo das angestrebte Ziel glücklich erreicht war, wo der ermüdete Körper seine Ruhe gefunden und die erregte Seele in träumerischem Nachgenusse des Erlebten schweigen konnte, wäre es wohl zu entschuldigen gewesen, wenn sich mir im Herzen ein leiser Anflug von Stolz über das bestandene Wagnis geregt hätte, vor dem vielleicht Tausende zurückgeschreckt wären; aber alle Eitelkeit und alles Träumen schwand vor den übermächtigen Einbrüchen der großartigen Natur, deren Bilder sich meiner Erinnerung unauflöslich eingeprägt hatten.

Sechs Tage wollte ich in dem schönen Thale von Chamounix, dessen erhabene Natur zu schildern, ich einer späteren Gelegenheit vorbehalte. Mit schwerem Herzen, wie aus einem lieben Freundeskreise, schied ich endlich von der wunderbaren Alpenwelt, und als zum letzten Male an den Ufern des Genfer Sees das Schneehaupt des Mont-blanc zu mir herüber winkte, da gedachte ich unwillkürlich der schönen Worte Byron's:

Wer sich des hochblauen Blau's jenseit herge geföhren,  
Wird jeden blauen Gipfel lieben.

In jedem Fels mir ein Freundes Antlitz grüßen  
Und jeden Berg im Geis an seinen Thälern schließen!

Druckfehlerverbefferung. In Nr. 40 S. 302 Z. 2 B. 14 v. o. lies: „dannach“ statt: danach S. 34 v. o. lies: „Kette“ statt: Kette.

### Hierzu Titel und Inhalt.

Jede Woche erscheint eine Nummer dieser Zeitschrift. — Vierteljährlicher Subscriptions-Preis 25 Sgr. (1 R. 30 Kr.)

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen an.

Verantwortlicher Herausgeber: Dr. G. G. G.

# Ergänzungs=Hefte

zur Zeitschrift



Zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und freier geistiger Naturanschauung  
für Leser aller Stände.

Herausgegeben

von

Dr. Otto Me und Dr. Karl Müller von Halle.

Elftes Heft.

Halle,

C. Schwetschke'scher Verlag.

1869.





## Inhalt.

	Seite
Zur Statistik von Griechenland, von D. Rind . . . . .	— 1
Die Gezeiten oder Ebbe und Fluth, von Karl Schmeling. . . . .	— 21
Der Varsch. Nach dem Holländischen des Dr. J. G. Winkler, von Hermann Meier . . . . .	— 25
Beiträge zur Kenntniß des Alters, der Kultur und Verhältnißweise der Thiere, von M. G. Grandjean . . . . .	— 27
Die Atmosphäre und das Leben, von Otto He . . . . .	— 31

---



## Zur Statistik von Griechenland.

Von P. Aind.



In der Nationaldruckerei in Athen ist im Jahre 1867 unter der Aufschrift *Ηολωτισμογραφικαί πληροφωρίαι περί 'Ελλάδος* (π' u. 211 S.) ein Werk über die Statistik von Griechenland gedruckt worden und erschienen, das nicht bloß für Griechenland von Wichtigkeit ist, sondern auch das Interesse des Auslandes mit Recht in Anspruch nimmt und verdient. Denn es behandelt einen Gegenstand, ohne dessen Kenntniß sich der Zustand Griechenlands nach seinen Hülfquellen nicht beurtheilen läßt, und man kann nicht sagen, daß, namentlich im Hinblick auf die Vergangenheit und Zukunft desselben und auf das unleugbare Interesse, das Griechenland in den verschiedensten Richtungen hat und gewährt, jener Zustand und diese Hülfquellen genügend bekannt sind. Man kann vielmehr das Gegentheil davon behaupten, ohne daß es gerade nöthig wäre, die Gründe dieser Unkenntniß nachweisen und diese selbst erklären zu wollen. Und noch dazu läßt man es trotzdem an schiefen und falschen Urtheilen über das griechische Land und Volk nicht fehlen! Um so mehr kommen jene „Statistischen Mittheilungen über Griechenland“ zu rechter Zeit. Auch haben sie schon an sich noch den besonderen Werth, daß sie eine Art officiellen Charakter an sich tragen, insofern nämlich ihr Verfasser, A. Mansolas, Finanz-Vorstand im Ministerium des Innern in Athen ist, und er seine Mittheilungen nach mehr oder weniger officiellen, theils gedruckten, theils ungedruckten Aufzeichnungen zusammengestellt hat. Inbarn er dieselben zusammenzutrag und veröffentlichte, hatte er nach seiner ausdrücklichen Erklärung die Absicht, diejenigen Elemente und Zustände zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, die allein das innere Leben des griechischen Staates, seine Hülfquellen und seine Bedürfnisse genau und klar darlegen und veranschaulichen. Zugleich wollte er damit der griechischen Regierung einen hellen und untrüglichen Spiegel vorhalten, um Alles das mit Sicherheit

erkennen zu können, was sie zur Entwicklung und Benützung der Hülfquellen des Landes gethan und — nicht gethan hat. Der Verfasser ließ sich dabei sehr zweckmäßig von dem Ausspruch eines — wie er sagt — der ausgezeichneten Finanzmänner Frankreichs leiten und bestimmen, der die Statistik das „*frons cavour*“ der Staaten“ mit Recht genannt habe.

Zu solcher Erkenntniß kann und soll aber das vorliegende Buch des Griechen Mansolas auch dem Auslande dienen, und man darf sich nach dem Obenbemerkten und nach den vorliegenden Erfahrungen zu solcher Benützung des Buches ebenso für berechtigt als verpflichtet ansehen. Indem ich mich zu diesem Zwecke zu den nachstehenden Zusammenstellungen auf Grund des Buches veranlaßt finde, bemerke ich, daß ich mich an die Ausführungen des Verfassers um so mehr gehalten habe, je mehr sie im Allgemeinen über die Gegenstände selbst aufklären, und weil sie zugleich im Einzelnen das besondere Interesse der Regierung an den Gegenständen nachweisen, auch die Wichtigkeit erkennen lassen, die sie selbst darauf legt, insofern diese Gegenstände überhaupt und namentlich in der Weise erwähnt und behandelt werden, wie der Verfasser dies thut. Seine Ausführungen und Mittheilungen haben offenbar einen doppelten Werth. Er ist theils ein objectiver, in Bezug auf Griechenland und auf die dasselbe betreffenden Gegenstände, theils ein subjectiver, in Ansehung der Stellung, welche die Regierung zu ihnen und zu Griechenland, so wie zu ihrer Pflicht einnimmt und eingenommen hat, für die Entwicklung und Benützung der Hülfquellen des Landes zu sorgen. Die gedachte Schrift ist in diesem Betracht eine Art Rechenschaftsbericht der griechischen Regierung, ein Selbstbekenntniß und ein Spiegel zur Selbstkenntniß, den sie, im Sinne des erwähnten *frons cavour*, auch Anderen zu weiteren Erwägungen vorhält. Daß diese letzteren um so fruchtbarer werden können, je mehr der Verfasser ein und

wieder vergleichende Mittheilungen über andere Staaten und Völker macht, ist einleuchtend.

Mit dieser subjectiven Seite des Buches das man es jedoch nicht zu thun, und nur der objectiv Werth desselben kann hier wesentlich in Betracht kommen. Der Verfasser behandelt seinen reichen Stoff in fünf Kapiteln, nämlich: Bevölkerung, deren Bewegung, Landbau, Industrie und Handel. Demgemäß kann es sich hier nur um ein Bild von Dem handeln, was Griechenland in diesen Beziehungen darstellt, um daraus erkennen zu lassen, was das Land ist und gilt, welche Hülfquellen es als seine ursprüngliche innere Lebenskraft, so wie welche Entwicklungsfähigkeit es besitzt, und wie es sie benutzt hat. Mögen auch die einzelnen Züge zu dem Bilde oft nur in leichten Strichen und in leisen Andeutungen bestehen: sie sind zu möglicher Vollständigkeit der Darstellung und des Bildes notwendig. Und zwar dies um so mehr, da das Bild nicht allein über die Gegenwart Griechenlands Aufschluß geben, sondern zugleich aus dieser heraus in seine Zukunft Blicke thun und die Gewähr deuten lassen soll, die Griechenland für seine weitere Entwicklung an und für sich zu bieten vermag.

Es kann bei solchem Reichthum des Stoffes und der eingehenden Behandlungswiese des Verfassers nur auf eine Auswahl des Einzelnen hinauskommen. Ich habe zu solchem Zweck nur Wesentliches und Thatsächliches zusammengestellt, was für das Aussehen von Wichtigkeit ist und für das statistische Interesse in Betracht kommt. Was der Verfasser hin und wieder über Theorien und gleichsam philosophiren und raisonniren, so wie in manchen Beziehungen über die Gesetzgebung Griechenlands bemerkt und beigebracht hat, habe ich meist ganz unberührt gelassen. Ebenso habe ich von Dem ganz abgesehen, was in dem Kapitel über den Handel von Münze, Maaß und Gewicht ausführlich bemerkt wird, da es zu sehr ins Einzelne eingeht, und nur gelegentlich habe ich davon Gebrauch gemacht, wo es gerade zur Aufklärung des Verhältnisses und zum Verständniß der Sache selbst nöthig war. An und für sich kann es hier auf diesen Gegenstand nicht weiter ankommen. Wenn übrigens in einzelnen Beziehungen, z. B. in chronologischer Hinsicht und für einzelne Jahre der im Ganzen vom Jahre 1821 ausgehenden statistischen Mittheilungen manche Lücke sich findet und manches mangelhaft ist, was auch zum Theil der Verfasser erklärt, und was in den Verhältnissen selbst liegt, so habe ich nur das thatsächlich Vorliegende berücksichtigen können und von einer jeden Kritik des Dargebotenen mich fern gehalten. Insofern die erst im J. 1864 stattgefundene Vereinigung der Ionischen Inseln mit dem Königreich Griechenland hier von Einfluß gewesen, habe ich im Einzelnen bemerkt, und ebenso habe ich auf einige Irrthümer gelegentlich aufmerksam machen zu müssen geglaubt.

Was zuerst die Bevölkerung von Griechenland anlangt, so versteht es sich von selbst, daß gewisse Einzelheiten

über diesen Gegenstand, den der Verfasser, namentlich in seinen zeitlichen Beziehungen, sehr ausführlich behandelt, für das Ausland von geringerem Interesse sind, und ich habe sie daher übergangen. Ich beschränke mich vielmehr hierbei nur auf das Allgemeine, wo es sich, historisch, chronologisch und geographisch betrachtet, für einzelne Gesichtspunkte besonders befähigt.

Im J. 1821 betrug die Bevölkerung des nachmaligen Königreichs Griechenland, also des Peloponnes, des Festlandes und der Inseln, im Ganzen 875,150 Christen und 63,615 Türken, dagegen im J. 1828 nach Beendigung des Krieges 741,950 Christen und 11,450 Türken, also 133,200 Christen weniger.

Eigentliche genaue Volkszählungen fanden erst vom J. 1836 an statt; indeß bezeichnet der Verfasser auch die Tabellen von 1836 und 1837 geradezu als unvollständig und unbrauchbar, und er führt daher für die spätere Zeit nur die Bevölkerung vom J. 1838 an auf und bis zum J. 1861 fort, in welchem die letzte, genaueste Zählung vorgenommen wurde. Darnach betrug die Bevölkerung des Königreichs im J. 1838: 752,077, dagegen 1861: 1,096,810, so daß also in 24 Jahren eine Vermehrung um 344,733 Köpfe stattgefunden hatte, im Ganzen um mehr als 45 Proc. und aufs Jahr beinahe um 2 Proc.

Diese 1,096,810 Einwohner wohnten nach den durch die griechische Regierung bewirkten Aufnahmen auf einem Flächenraume von 47,516 □ Kilometer, also 24 auf ein □ Kilometer, und Griechenland nahm sonach in Ansehung der Dichtigkeit der Bevölkerung unter allen 17 Staaten Europa's die drittletzte Stelle, vor Rußland, Norwegen und Schweden, ein.

Was die Ionischen Inseln anlangt, so betrug deren Bevölkerung im J. 1853: 230,757, dagegen im J. 1861 228,669, also um 2088 weniger, eine Verminderung, die jedoch schon 1856 und 1857 eingetreten war und sich in den folgenden Jahren wenig verändert hatte. Diese 228,669 Einwohner wohnten auf einem Flächenraume von 2696 □ Kilometer, also 93 auf ein □ Kilometer. Demnach betrug im J. 1861 die Gesamtbevölkerung des Königreichs Griechenland und der Ionischen Inseln 1,325,479 Einwohner auf einem Flächenraume von 50,212 □ Kilometer\*). Die Bevölkerungsdichtigkeit der Ionischen Inseln erreicht fast das Vierfache der des früheren Königreichs Griechenland, und in letzterem zeigte sich unter allen 10 Nomarchien (Attika und Böotien, Euböa, Phthiotie und Phocis, Aetolien und Akarnanien, Lakonien, Argolis, Elis und Achaia, Messenien, Arkadien und die Erkladen) die dünnste Bevölkerung in Akarnanien mit Aetolien, so wie in Euböa, dagegen die dichteste auf den Erkladen und in Messenien.

\*) Bei einer späteren Veranlassung gibt der Verfasser der „*ἡ ἀπογραφὴ*“ die Bevölkerung der Ionischen Inseln im Jahre 1865 zu 251,712 Einwohnern an.

Jene 1,096,810 Einwohner des Königreichs Griechenland vertheilten sich im J. 1861 auf 248,949 Familien in 225,716 Wohnungen. Das Verhältniß der Zahl der Familien zur Bevölkerung des Landes, und zwar auf 10,000 Einwohner, stellt sich für die meisten Staaten Europas, obgleich in verschiedenen Zeitabschnitten, folgendermaßen:

Frankreich	2429	Batern	2194
Sardinien	2378	Holland	2078
Griechenland	2260	Belgien	2053
Oesterreich	2251	Schweden	2027
Sachsen	2218	Preußen	1948

Das frühere Königreich Griechenland nahm also in Bezug auf das Verhältniß der Zahl der Familien zur Bevölkerung nach Frankreich und dem früheren Königreich Sardinien die nächste Stelle ein. Ebenso stellte sich das Verhältniß in Bezug der Wohnungen zur Bevölkerung in gleicher Weise auf 10,000 Einwohner so, daß Griechenland nach Portugal und Sardinien den nächsten Platz einnahm.

Nach dem Geschlecht vertheilte sich die Bevölkerung des Königreichs Griechenland im Jahre 1861 also daß es 567,334 Personen männlichen und 529,476 Personen weiblichen Geschlechts zählte, und auf 100 Einwohner etwa 52 Personen männlichen und 48 weiblichen Geschlechts kamen. Dieses Uebergewicht des männlichen Geschlechts über das weibliche, das mit Ausnahme von Belgien und dem früheren Königreich Sardinien einzig in seiner Art ist, wird theils den mühsamen und beschwerlichen Beschäftigungen, die das weibliche Geschlecht in Griechenland in vielen Gesetzen hat, theils dem Umstande zugeschrieben, daß viele Personen weiblichen Geschlechts Griechenland verlassen, um im Auslande sich ihren Erwerb zu suchen. Daher wurden diese Personen, weil sie ihrem biehenden Aufenthalt im Ausland haben, bei der Volkszählung nicht mit berücksichtigt, wogegen z. B. die außer Griechenland schiffahrenden Männer in den Tabellen mit aufgeführt wurden. Ob dies Verhältniß in Ansehung des Geschlechtsunterschiedes in der Bevölkerung Griechenlands im J. 1861 etwas Zufälliges war, oder ob es ein bleibendes ist, wußte der Verfasser der „*Μεγρολογία*“ nicht anzugeben.

Auf den Ionischen Inseln vertheilte sich die Bevölkerung im J. 1861 auf 122,403 Personen männlichen und 106,266 Personen weiblichen Geschlechts, so daß hier auf 100 Einwohner etwa 54 männlichen und 46 weiblichen Geschlechts kamen.

In Betreff des Alters der Gesamtbevölkerung des früheren Königreichs Griechenland stellt der Verfasser des gleichen Werkes folgende Tabelle auf dem J. 1861 auf. Dabei bemerkt er zunächst, daß hierin die Gesamtzahl nicht die obenangestellte von 1,096,810, sondern 12,822 weniger ausweist, indem sowohl die Militärpersonen als

die außerhalb Landes sich aufhaltenden, auf Schiffen beschäftigten Matrosen in dieser Tabelle nicht mit aufgeführt sind. Aber auch im Allgemeinen macht er die Bemerkung, daß nicht nur überhaupt eine jede Volkszählung nach dem Alter aus mehreren Gründen ebenso schwierig, als unvollständig sei, sondern daß namentlich in Griechenland die Altersangaben beim männlichen Geschlecht in Betreff des Alters vom 18. bis zum 30. Jahre immer als sehr falsch sich ausweisen. Er findet den Grund hiervon darin, daß, da alle Griechen von 18 bis 24 Jahren nach dem Gesetze zum Militärdienst verpflichtet sind, viele Familienväter in der Absicht, ihre Söhne von dieser Verbindlichkeit zu befreien, das wahre Alter derselben verschweigen und es nach den Umständen bald unter 18 Jahren, bald über 24 angeben.

Alter	männlichen Geschlechts	weiblichen Geschlechts	Gesammts betrag
bis zu 18 Jahr	256,509	244,315	500,824
von 18—25	62,615	70,225	132,840
„ 25—30	56,227	49,010	105,237
„ 30—40	66,161	61,210	127,371
„ 40—50	51,007	47,324	98,331
„ 50—60	33,486	31,315	64,801
„ 60—70	19,181	17,189	36,369
„ 70 u. darüber	9,276	8,879	18,155

Die Bevölkerungstabelle aus dem Jahre 1861 nach den Beschäftigungen umfaßt unter 24 einzelnen Abtheilungen eine Gesamtzahl von 377,659 Personen. Die oberste Stelle darunter nehmen ein:

die Landbebauer mit	147,507
Schüler . . . . .	42,680
Schülerinnen . . . . .	9,035
Hirten . . . . .	38,953
Gewerbetreibende . . . . .	32,801
Tagelöhner . . . . .	19,592
Grundbesitzer . . . . .	16,122
Kaufleute . . . . .	9452
Geistliche . . . . .	5102
Künstler . . . . .	1346
Lehrer . . . . .	1176
Großhändler . . . . .	793
Matrosen d. kgl. Flotte . . . . .	510
„ Handelsflotte	19,303
Ärzte . . . . .	398
Sachwalter . . . . .	394

Der Franzose Lezoopt („La France et l'Étranger“) nimmt nur 6 Kategorien der nach ihren Beschäftigungen verschiedenen Bevölkerung von Griechenland an, und demzufolge machen die Landbebauer, mit Einschluß der Hirten,

über 49 Proc., die Gewerbetreibenden mit den Handarbeitern über 13 Proc., die freien Künste, mit Inbegriff der Schüler, über 18 Proc., und die Handeltreibenden über 8 Proc. der Gesamtheit aus.

Auf den Ionischen Inseln gab es nach den Bevölkerungslisten des Jahres 1861:

Landbauer . . .	51,342
Gewerbetreibende . .	8,365
Handeltreibende . .	7,282

Nach dem Religionsbekenntnisse zählte die Bevölkerung des Königreichs Griechenland (mit Ausschluß der Ionischen Inseln, über welche derartige Nachrichten ganz fehlen):

Orthodoxe Christen . .	1,086,900
Andersgläubige Christen	9358
Nichtchristlichen Bekenntnisses	552

und nach der Nationalität

Eingeborene . . .	1,076,907
Ausländer . . . . .	19,992

so daß etwa ein Ausländer auf 55 Einwohner kam.

Was die Einteilung der Bevölkerung nach Gemeinden (Demen) anlangt, deren das frühere Königreich im J. 1861 280 zählte, so hatten von ihnen:

57 Gemeinden weniger als	2000 Einwohner
216 „ hatten	2—10,000 „
7 „ „ über	10,000 „

und von diesen drei Klassen betrug die Gesamtbevölkerung

der ersten . . .	78,202
„ zweiten „ . .	889,908
„ dritten „ . .	128,700 Einwohner.

Auf den Ionischen Inseln stellte sich auf Grund der Bevölkerungslisten vom J. 1865, bei einer Gesamtbevölkerung von 251,712 Einwohnern und deren Vertheilung in 68 Gemeinden, das diesfallsige Verhältniß so, daß

14 Gemeinden weniger als 2000 Einwohner	
51 „ „ 2—10,000 „	
3 „ „ über 10,000 „	

hatten, und davon war die Gesamtbevölkerung

der ersten Klasse . . .	20,244 Einwohner
„ zweiten „ . . .	175,149 „
„ dritten „ . . .	56,319 „

Die Bewegung der Bevölkerung nach den Heirathen, Geburten und Todesfällen war im früheren Königreich Griechenland in den Jahren 1860—65 folgende:

i. Jahre: Heirathen Geburten Todesfälle Mehrzahl d. Geburten

1860	6106	30,858	22,154	8704
1861	7175	32,405	22,969	9434
1864	6969	32,547	23,654	8893
1865	7687	34,871	24,191	10,680

dagegen auf den Ionischen Inseln in den beiden Jahren 1864 und 1865:

i. Jahre: Heirathen Geburten Todesfälle Mehrzahl d. Geburten

1864	1411	5991	4341	1,650
1865	1537	5581	5167	414.

Aus der Mehrzahl der Geburten im Verhältniß zu den Todesfällen ergibt sich für Griechenland eine stete Vermehrung der Bevölkerung. Für die beiden Jahre 1860 u. 61 hat sie im früheren Königreich Griechenland durchschnittlich 9428 jährlich betragen, und wenn sie in dem nämlichen Verhältniß auch ferner stattfindet, so wird sich in Folge des Uebergewichts der Geburten die Bevölkerung von Griechenland in etwa 88 Jahren verdoppelt haben \*).

Was die einzelnen Ehen, Geburten und Todesfälle in Griechenland und auf den Ionischen Inseln in den Jahren 1860—1865 anlangt, so kam in Griechenland

1860 eine Ehe auf 174 Einwohner	
1861 „ „ „ 152 „	
1864 „ „ „ 157 „	
1865 „ „ „ 142 „	

\*) Es ist von Interesse und gibt zu manchen wichtigen Folgerungen Anlaß, daß in Ansehung der türkischen Bevölkerung und der türkischen Race ein ganz anderes Verhältniß eintritt. Reisende in der Türkei, und wer sonst die Fußstapfen des Landes und Völkers aus unmittelbarer Anschauung und Erfahrung kennt, sagen geradezu, daß die türkische Race seit einiger Zeit in offenkbarer Abnahme begriffen ist. Die Ersehung dieser Thatfache ist nicht nur trotz der Polyanie nicht abzuleugnen, vielmehr ist sie einzig und allein aus demselben zu erklären. Wir wissen von Reisenden, daß in der Türkei blühende Völkern mit türkischer Bevölkerung aussterben und verschwinden. Noch vor Kurzem theilte ein Herrschevent in der „Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ vom 11. Februar 1868, S. 622 aus Pera, den St. Jan. mit: „Bezirke in Kleinasien (auf welches in Folge des falschen Regierungssystems und der Wüthung der letzten Jahrzehnte drei Viertel der ganzen Conkristianität fällt), welche vor einer Generation noch ihre türkischen Dörfer zu Dutzenden zählten, liegen jetzt entweder wüst oder sind nur von Rajah's besetzt. Zwischen Brussa und Smyrna waren zu Sultan Mahmud's Zeiten mehr als ein Dutzend Dörfer, welche ihre Bewohner nach Lausanden zählten, jetzt aber nur kümmerliche Ueberreste antreffen können. In ähnlicher Art ist in den anderen Paschaliken das türkische Element durch die Weisel der Ausbeutung auf weniger als die Hälfte seiner früheren Stärke zusammengeschrunken. Auch insoweit, als früher die Mannschaft in rühmlicher Hinsicht den ausgezeichneten Beschaftenheit war, hat sich gänzlich ein schreckenerregender Rückschritt bemerklich gemacht. Selbst die Regierung kann sich dieser Thatfache, welche den unrettbaren Verfall der Race beweist, nicht mehr verschließen.“ Schon in der „Reise in den Orient Europa's“ von B. u. P. (zwei Bände, 1861), der im Jahre 1856 die Türkei bereiste, schilberte der Verfasser in den politischen Schlussbemerkungen im zweiten Bande die tieferste wüsthede und geistige Verfalltheit der Türken, und er sagte geradezu: „Auch ob die fortwährende Verfühlung an der Humanität ihre sicherste Strafe stets mit sich herumträgt, so verschleichen sich die Osmanen gleichsam in sich. Ihre Völkzahl verringert sich von Jahr zu Jahr, und wenn es möglich wäre, ihnen jede Zufuhr neuer Lebenskraft von anderen Menschenstämmen der abzuschneiden, so würden sie in nicht zu ferner Zeit an sich verreckt und bingewelt sein.“

auf den Ionischen Inseln dagegen

1864 eine Ehe auf 167 Einwohner

1865 „ „ 153 „

In Ansehung der natürlichen Stellung der Ehegatten ergab sich folgendes Verhältnis nach hundert berechnet:

**1860 1861 1864 \*) 1865 \*)**

Lebige mit Lebigen . 88 86 87 86

Wittwer mit Wittwen 4 3 3 3

Wittwer mit Lebigen 5 6 6 7

Wittwen mit Lebigen 3 5 4 4

und es zeigte sich also auch hier, wie anderswo, daß die Ehen unter Lebigen die Mehrzahl ausmachen, und mehr Wittwer eine zweite Ehe eingehen, als Wittwen.

In Betreff des Alters der Ehegatten waren bei den im J. 1865 im ganzen Königreich Griechenland eingegangenen 9224 Ehen:

Männer: unter 20 Jahren 324

„ von 20—44 „ 8271

„ „ 44 „ u. darüber 429

Frauen: unter 16 Jahren 462

von 16—30 „ 8229

„ 30 „ u. darüber 533

Die durchschnittliche Dauer der Ehen betrug im vormaligen Königreich Griechenland 26 Jahre 4 Monat; dagegen zeigte sich ihre verhältnismäßige Fruchtbarkeit im Jahre 1860 zu etwas mehr als 5 Proc., in den übrigen Jahren 1861, 1864 und 1865 zu etwas mehr als 4 Proc.

In Betreff der Geburten zeigt sich auch in Griechenland das Uebergewicht des männlichen Geschlechts vor dem weiblichen. Es wurden geboren:

1860 männlichen Geschlechts 16,158, weiblichen 14,700

1861 „ „ 16,775, „ 15,630

1864 „ „ 17,027, „ 15,520

1865 „ „ 18,217, „ 16,654

und auf den Ionischen Inseln:

1864 männlichen Geschlechts 3239, weiblichen 2752

1865 „ „ 2986, „ 2595

und zwar zeigte sich dieses Vorherrschende des männlichen Geschlechts vorzugsweise bei der ländlichen Bevölkerung, ebenso auch weit mehr bei den ehelichen, als bei den unehelichen Geburten und bei todtten und bei Geburten von Zwillingen u.

Die Todesfälle zeigten in dem vormaligen Königreich Griechenland in den angegebenen Jahren eine auffallende Vermehrung der Sterblichkeit, die ebensowohl den epidemischen Krankheiten beigemessen werden kann, welche im Jahre 1864 in einigen Theilen von Griechenland ausgebrochen waren, als sie sich andererseits auch ganz natürlich aus der Mehrzahl der Geburten erklären läßt. War das Verhältnis in dieser Hinsicht der Art, daß dort:

1860 eine Geburt auf 33 Einwohner

1861 „ „ 33 „

1864 „ „ 33 „

1865 „ „ 31 „

auf den Ionischen Inseln aber:

1864 eine Geburt auf 39 Einwohner

1865 „ „ 42 „

kam, so fanden dagegen die Todesfälle in Griechenland in der Weise statt:

1860 männlichen Geschlechts 11,524, weiblichen 10,630

1861 „ „ 12,041, „ 10,928

1864 „ „ 12,684, „ 10,970

1865 „ „ 12,793, „ 11,398

und auf den Ionischen Inseln:

1864 männlichen Geschlechts 2350, weiblichen 1191

1865 „ „ 2603, „ 2564.

Während in andern Ländern jährlich mehr Frauen als Männer sterben, findet in Griechenland nach den vorliegenden Beobachtungen ein anderes Verhältnis statt. In Ansehung der äußeren Stellung vertheilen sich für 1865 die Todesfälle im Königreich Griechenland (mit den Ionischen Inseln), die im Ganzen 29,358 betragen, im Einzelnen in folgender Weise:

	Männer	Frauen	insgesamt
Unverheirathet .	8811	7410	16,221
Verheirathet . .	5117	4197	9314
Im Wittwenstande	1468	2355	3823

Von besonderer Wichtigkeit ist die genaue Uebersicht des Alters der Verstorbenen. Denn es läßt sich darnach die Sterblichkeit der Bevölkerung und die Zahl der am Ende eines jeden Jahres Ueberlebenden im Verhältnis zu den Geburten, sowie die durchschnittliche Dauer des Lebens der Einzelnen beurtheilen. Die nachfolgende Tabelle stellt die Todesfälle vom Jahre 1865 in der obengedachten Gesamtzahl und nach den Lebensaltern dar.

Jahrealter	Todesfälle		insgesamt
	männlichen Geschlechts	weiblichen Geschlechts	
—1	2623	2318	4941
1—5	2650	2511	5161
5—10	1086	1085	2171
10—15	548	536	1084
15—20	558	570	1128
20—25	660	593	1253
25—30	699	592	1291
30—35	589	500	1089
35—40	596	457	1053
40—45	568	430	998
45—50	631	439	1070
50—55	617	432	1049
55—60	690	567	1257
60—65	657	538	1195
65—70	626	603	1229

\*) Mit Einschluß der Ionischen Inseln.



Jahresalter	Todesfälle		insgesamt
	männlichen Geschlechts	weiblichen Geschlechts	
70—75	507	525	1032
75—80	450	495	945
80—85	267	345	612
85—90	173	215	388
90—95	110	108	218
95—100	55	51	106
100—105	12	28	40
105—110	16	15	31
110 u. darüber	8	7	15
insgesamt	15,396	13,962	29,358 *)

Nach der Bevölkerung und ihrer Bewegung kommt der Verfasser auf den Landbau zu sprechen. Er stellt an die Spitze seiner desfallsigen Mittheilungen die Bemerkung, daß die Bebauung des Bodens in Griechenland seit der Befreiung des Landes von der türkischen Herrschaft bedeutende Fortschritte gemacht habe, und daß diese Fortschritte, trotz des durch langwierigen Krieg vernünftigen Zustandes des Landes und der mancherlei Schwierigkeiten, mit denen nacheinander die Wiederherstellung desselben und die Bebauung des Bodens zu kämpfen gehabt, lediglich als eine Folge der Thätigkeit und Arbeitsamkeit des griechischen Landbauers angesehen werden müssen. Die Gesetzgebung des Staats hatte den Gegenstand noch nicht wirksam durch angemessene Maßnahmen und Gesetze regeln und ein allgemeines, durchgreifendes System der Verbesserung der Bodencultur einführen können. Manches konnte durch die Regierung nur vorbereitet werden, und zu Vielem konnte sie nur den Anstoß geben; aber doch war sie fortwährend bemüht und darauf bedacht, diesen wichtigen Zweig der Nationalindustrie zu beleben. Zu diesem Zwecke ward für Erlangung praktischer Kenntnisse vom Landbau im Jahre 1846 in Tirynth bei Nauplia eine Muster-Ackerbauschule errichtet. Die Anfänge dieser Anstalt reichen bereits bis 1829 zurück, indem schon Kapodistrias dort eine Ackerbauschule angelegt hatte. Hier

ward Ackerbaukunde theoretisch und praktisch gelehrt, allein die Anstalt erweiterte sich auf die Länge nicht, und 1865 wurde der theoretische Unterricht an derselben aufgeloben. Außerdem war für die Gemeindefschulen der Unterricht in praktischem Garten- und Feldbau, so wie der Bäume, Seiden- und Weinenzucht schon durch das Gesetz über die Volksschulen vom Jahre 1834 vorgeschrieben. Aber es hielt schwer, und Vieles war hindernd im Wege, im Ganzen und nach bestimmtem, einheitlichem Plane zufriedenstellende Ergebnisse zu erlangen, und namentlich bei der vorhandenen Beschränkung des Grundbesitzes mußte der Ackerland zunächst dem Einzelnen überlassen bleiben. Die Bodencultur in Griechenland trägt in Folge mannigfacher Verhältnisse noch gar zu ausschließlich den Charakter des Individualismus an sich, dem die Sorge dafür obliegt, und eine wahrhafte Verbesserung der bisherigen Zustände kann nur dann erlangt werden, wenn die Elemente der praktischen Landbaukunde durch die Volksschule allen zugänglich gemacht werden, und der Eifer dafür in der Ueberzeugung wurzelt, daß der Landbau nicht allein für Griechenland die nützlichste und einträglichste Industrie, sondern auch die ehrenvollste Beschäftigung ist. Auch fehlt es auf der anderen Seite in empfindlicher Weise an den erforderlichen Kapitalien zu mäßigem Zinsfuß, und noch daß es der Regierung nicht gelingen wollen, durch eine Bodencreditanstalt und Vorschuß- und Hypothekbank dem vorhandenen Mangel abzuheben.

Im J. 1861 belief sich die Zahl der Landbauer in Griechenland auf 147,507. Die meisten davon kamen auf die Nomarchien Messenien (19,585) und Akhaia mit Elis (19,555), in den andern Nomarchien war die Zahl zwischen 10,000 und 18,000, und die wenigsten fanden sich auf der Insel Kubba (9723). Dort erklärt die Beschaffenheit und Fruchtbarkeit des Bodens und in Folge dessen der größere und erfolgreichere Anbau desselben, in Kubba ist dagegen viel Waldboden. Im Einzelnen ergibt sich aus dem unveränderten Verhältniß des Bodenumfanges und der Bodencultur, daß große Strecken Landes un bebaut bleiben.

Ganz Griechenland (ohne die Ionischen Inseln) hat ungefähr 45,689 □ Kilometer \*) oder 45,689,248 Stremmen Land \*\*), theils an Cultur- und Ackerland, theils an Bergen und natürlichen Weideplätzen, an Wäldern, Sümpfen und Morästen, an Wohnungen in Städten und Dörfern, an Straßen, Flüssen u. s. w. Dieser letztgedachte, zur Cultur unfähige Boden umfaßt im Ganzen 26,505,348

\*) Ueber das hohe Alter in Griechenland will ich hier eine Mittheilung von Friedrich Thiersch aus einem Briefe aus Griechenland, und zwar aus Afrika bei Sparta, den 2. Mai 1832, beifügen (s. „Friedrich Thiersch's Leben“, Leipzig, 1866, 2. Bd., S. 261). Thiersch war damals kurz zuvor in dem Orte S. Petros in Kalonien, mit etwa 2000 Einwohnern in 300 Häusern, gewesen, wo theils die hohe Lage des Ortes, theils die vom Waldras auslaufenden Berge den dortigen Aufenthalt ausnehmend gesund machten. Ein Menschenalter von 100 Jahren ist dort keine Seltenheit. Der Kuzum war damals ein Mann in seinem 132. Jahre gestorben. Der Großvater des Thiersch, bei welchem Thiersch an dem Orte wohnte, war 112 Jahre alt; er hatte in seiner Jugend unter Orloff gegen die Türken gekämpft, in seinem 101. Jahre an der Erbärmung von Tripolizza Theil genommen u. s. w. Thiersch fand, daß auch andere Orte des lateinischen Westgriechen sich ähnlicher Vorgänge in dem Grade erfreuen, als sie hoch und gesund gelegen sind.

\*) Der Verfasser der „*Μεγεθυπολογία*“ bemerkt ausdrücklich, daß diese Zahl mit dem oben angegebenen Umfang des Königreichs (47,516 □ Kilometer) nicht übereinstimme, aber es handelte sich hier nur um die annäherungsweise Einstellung des Landes.

\*\*) Ein Stremma = 1000 □ G. = ein □ Kilometer; ein Stetar = 10 Stremmen; 100 Stetaren = 1 □ Kilometer.

Str., dagegen kommen auf Culturland 7,335,900 und auf unbebautes Saat- und Ackerland 11,748,000 Str.\*).

Das erstere, das Culturland, zerfällt in Griechischland in zwei Klassen, in Acker- und Saatland und in Baumland. Von ersterem waren im J. 1860 2,369,696 Str. zur Ausfaat verwendet worden; dagegen hatte im J. 1864 der Umfang der mit verschiedenen Getreidearten besetzten Felder einen Betrag von 2,831,762 Str. erreicht. Da jedoch in Gemäßheit des in Griechenland herrschenden Systems der Feldbestellung derselbe Acker in seiner ganzen Ausdehnung aller zwei Jahre nur Ein Mal besät wird, so läßt sich das wirkliche Acker- und Saatland zu einem Betrage von 6,076,000 Str. berechnen, wie dies in der von der Regierung veröffentlichten „Στατιστική της Γεωργίας του έτους 1864“ auch angenommen worden ist. Dagegen nahmen die mit Baumpflanzungen besetzten Ländereien im J. 1860 einen Flächenraum von 1,359,900 Str. ein.

Das System der Wechselwirtschaft findet in Griechenland noch keine praktische Anwendung; man kennt noch keine rationelle Landwirtschaft, und künstliche Weiden gibt es dort nirgend. Dagegen hat der Heidebesitz Pflug noch in den meisten Eparchien seine Geltung, und erst vor wenigen Jahren ist der europäische Pflug in einigen derselben eingeführt worden. Auch kommt letzterer seitdem immer mehr in Gebrauch. Der Ackerbesitz ist im Ganzen sehr zerstückelt, namentlich in den gebirgigen Gegenden und auf den Inseln. Hier gibt es Landbesitzer von 5—10 Str.;

\*) Das Verhältniß des Umfanges des culturfähigen Bodens zu dem übrigen stellt sich, nach 1000 Hektaren berechnet, für folgende Länder also:

Italien . . .	784	Spanien . . .	331
Dänemark . .	652	Griechenland .	249
Baiern . . .	604	Großbritannien	747
Belgien . . .	552	Rußland . . .	188
Preußen . . .	539	Schweden . . .	20
Frankreich . .	500	Norwegen . . .	5
Österreich . .	366		

Wenn in Griechenland nach Obigem 11,748,000 Stremmen culturfähigen Bodens unbenutzt bleiben, je wohl nachstrebende Herrschaft, die sich einer anderen glaubwürdigen Quelle („La Turquie ou la Grèce“, Paris, 1867) entlehnt, das diesfällige Verhältniß in verschiedenen Ländern von Europa, nach 1000 Str. der gesammten Oberfläche berechnet, nach. Unbenutzt blieben:

In Rußland: 328 auf 1000, mit den Weideplätzen 445 und mit den Wäldern 811.

In Griechenland: 267, mit den Weideplätzen 689, mit den Wäldern 842, Sumpfen 860.

In England: 265, mit den Weideplätzen 560.

Im vermaligen Königreich Neapel: 152, mit den Weideplätzen 323.

In Dänemark: 141, mit den Weideplätzen 230.

In Frankreich: 136, mit den Weideplätzen 235 und mit den Wäldern 382.

Im vermaligen Königreich Sardinien: 101, mit den Weideplätzen 193, mit den Wäldern und Sumpfen 349.

In Spanien: 21, mit den Weideplätzen 155, mit den Wäldern 384.

und diese liegen noch außerdem von einander getrennt und zerfallen oft in einzelne Theile von 1—2 Str. In den Ebenen finden sich dagegen Grundbesitzer von 50 bis 200 Str., einige sogar mit 1000 Str. Aus diesen Gründen erklärt es sich, daß theils Bodenerzeugnisse, theils vollkommene Methoden und Maschinen nur schwer und langsam eingeführt werden, auch wohl, daß sie nicht selten hier und da in Folge des Mangels an erleuchteter Einsicht sich weniger bewähren.

Zur Bearbeitung des Bodens werden im Allgemeinen Ochsen, in einigen Eparchien auch Pferde verwendet\*).

Fast in allen Eparchien herrscht das System einer Bewirtschaftung des Bodens, wie es dem kleinen Grundbesitz entspricht, nämlich durch den Eigentümer selbst, nach acht patriarchalscher Weise. Bei größerem Grundbesitz gibt es eine dreifache Art der Bewirtschaftung: 1) durch einen Inspector, aber auf Rechnung des Eigentümers, der die Ausgaben trägt und den Inspector besoldet; 2) durch Ueberlassung des Bodens an einen Andern zur Benutzung und auf Seite des letzteren gegen Gewähr eines bestimmten Geldebetrags oder eines gewissen Antheils an den Erträgen des Bodens; 3) durch Verpachtung gegen Gewähr eines nach Stremmen festgesetzten Pachtzins in Geld. Diese Verpachtung ist in der Regel einjährig, und gilt nur bisweilen auch auf zwei Jahre. Dabei kommt die Bodenart, namentlich ob ebenes oder gebirgisches Land, besonders in Betracht. Der Naturalantheil bei der zweiten Gattung der Bewirtschaftung ist nicht unter 10 und nicht über 50 Proc.

Das landwirtschaftliche Tagelohn ist in Griechenland höher, als in andern Ländern. In den Jahren 1849 bis 1852 betrug es fast 2 Drachmen, von 1853—56 über 2 bis fast 3 Dr., 1857 und 1858 über 3 Dr. und 1865 2 Dr. 85 Lepta\*\*). In Folge des vermehrten Baumvol-

\*) Friedrich Thiersch (s. dessen ebengedachtes „Leben“, Bd. 2, S. 87) fand in einem Theile von Argolis, daß der schönste und fruchtbarste Theil des Landes dem Anbau entzogen war, weil er zu spät im Jahre vom Wasser frei war. Doch fand er den Boden wie regelmäßig mit dem Karst und der Saad umgeben. Als er nach den Arbeitern fragte, die das gethan und zu welchem Zwecke, zeigte man ihm in der Ferne große Heerden schwarzer Schweine, die noch an der Arbeit waren, den Grund umzuwühlen. Dabei fielen ihm die Schweine der Neguier bei Herodot. ein, welche nach dem Zurücktreten des Nil auf die Feller getrieben wurden, um die Stelle des Pflugs zu vertreten. Dann wurden die Acker besät.

\*\*) Eine Drachme = 100 Lepta = etwa 8 Zgr. — Nach der „Statistique de la France“ von Maurice Lecl. war das landwirtschaftliche Tagelohn im Jahre 1850:

in Frankreich . .	Fr. 1. 75
„ England . . .	„ 1. 06
„ Belgien . . .	„ 1. 20
„ Preußen . . .	„ — 95
„ Spanien . . .	„ 2. —
„ Dänemark . .	„ — 56
„ Österreich . .	„ — 87

lenbau's in Griechenland stieg das Lachelohn für diesen Zweig der Bodencultur sogar bis zu 5 Dr., und zwar für die ganze Arbeitszeit bis zur endlichen Einbringung der Baumwolle. In einigen Eparchien wird das Lachelohn auch in Naturalien gewährt, und ausnahmsweise findet hin und wieder außer dem Lohne auch noch Befolgung des Lachelohners als eine Verpflichtung des Miethers statt.

Auf den Saatefeldern ist der Hauptgegenstand des Anbaues Getreide, und dasselbe wird fast in allen Eparchien gebaut. Im Jahre 1860 waren von den obengedachten 2,369,696 Str. Saatland 2,287,645 Str. zum Getreidebau benutzt worden, für alle übrigen Culturgegenstände blieben nur 82,051 Str. Unter den Getreidearten nimmt der Weizen die erste Stelle ein (über 39 Proc.), nach diesem der türkische Weizen oder Mais (über 21 Proc.), dann Gerste, weniger kommt Hafer und Roggen vor.

Gleichwohl ist Griechenland nicht im Stande, sich seinen Bedarf an Getreide zu erzeugen; vielmehr bedarf es dazu der Einfuhr von auswärt, die namentlich aus der Türkei und aus Rußland stattfindet. Der Betrag dieser Einfuhr erreichte in den Jahren 1851—64 durchschnittlich 6,286,236 Drachmen, dagegen wurde nur für 449,338 Drachmen durchschnittlich jährlich ausgeführt. Der Ertrag aller Getreidearten betrug im J. 1860 9,512,993 Kilo, während die Ausfaat 1,067,768 Kilo betragen hatte.

Den fruchtbarsten Boden in Griechenland besitzt die Nomarchie Phthiotis und Phocis. In dieser wird auch am meisten Weizen gebaut, dann in Aetika und Bötien, in Achaia und Elis, ebenso in Arkadien. Der Gesamtertrag an Weizen betrug in den Jahren 1849—1858 durchschnittlich jährlich 4,184,420 Kilo. Mais wird vorzugsweise in Achaia und Elis, dann in Akarnanien und Elis, ebenso in Messenien gebaut, am wenigsten Weizen und Mais auf den Epikladen.

Neben Getreide sind besonders Hülsenfrüchte, Tabak und Baumwolle Gegenstand der Cultur. Von den 82,051 Strecken, welche im Jahre 1860 nicht mit Getreide bestanden waren, kamen 29,172 auf Hülsenfrüchte, 23,996 auf Tabak und 21,105 auf Baumwolle. Für Tabak ist der Boden in Griechenland besonders ergäbig, und theils bei der Güte seiner Beschaffenheit, theils da der Ertrag die Bedürfnisse des Landes weit übersteigt, findet eine bedeutende Ausfuhr desselben statt. Der Ertrag an Tabak betrug im J. 1860 1,069,835 Oka, etwa 45 Oka auf 1 Str., und sein Anbau hatte sich in den letzten Jahren fortwährend dergestalt vermehrt, daß die Ausfuhr davon im J. 1864 einen Betrag von 984,210 Oka erreichte. Im J. 1852 hatte sie nur 191,596 Oka betragen.

Die Baumwollencultur war in Griechenland bis zum J. 1863 fast ganz unbekannt gewesen. Damals wurde sie in Folge des nordamerikanischen Krieges, jedoch auch

nur theilweise besonders in den Eparchien Eubadien und Phthiotis, eingeführt, aber sie ist seitdem unter Anwendung neuer Maschinen, sowie unter dem Einfluß einheimischer Concurrenz sehr gestiegen. Im J. 1860 hatte der Anbau von Baumwolle nur auf einem Flächentaume von 22,062 Str. stattgefunden, dagegen im J. 1864 auf 210,413 Str., und der Ertrag, der im J. 1860 22,435 Centner zu einem Werthe von 713,920 Drachmen betragen hatte, hatte sich für 1864 auf 193,615 Str. zu 11,843,292 Drachmen gesteigert. Im J. 1860 gewährte die Ausfuhr nur einen Betrag von 183 Str. zu einem Werthe von 12,318 Drachmen; dagegen betrug im J. 1864 die Ausfuhr 10,020 Str. und hatte einen Werthbetrag von 1,375,297 Dr.

Was die Baums und sonstigen Anpflanzungen in Griechenland anlangt, so kommen hierbei außer verschiedenen anderen Anpflanzungen dieser Art, besonders die Weinstöcke, Korinthenpflanzungen, Delbäume, Maulbeerbäume, Feigenbäume und Knopferneiden in Betracht. Im Jahre 1860 nahmen diese einen Gesammtflächeninhalt von 1,359,900 Str. ein, die sich im Einzelnen dergestalt vertheilten, daß

auf die Weinstöcke . . . . .	492,502	Strecken
„ „ Korinthenpflanzungen . . . . .	153,058	„
„ „ Delbäume . . . . .	370,000	„
„ „ Maulbeerbäume . . . . .	75,000	„
„ „ Feigenbäume . . . . .	18,000	„
„ „ Knopferneiden . . . . .	13,000	„
„ verschied. andere Anpflanzungen . . . . .	238,340	„
	1,359,900	„

kamen.

Das Weinland nimmt hierunter die erste Stelle ein, und es gibt dessen in allen Nomarchien, vorzugsweise jedoch in Achaia und Elis, auf den Epikladen, in Arkadien, in Aetika und Bötien, in Argolis und Korinthien, am wenigsten in Akarnanien und Aetolien. Im J. 1821, beim Beginn des Unabhängigkeitskrieges, ward in ganz Griechenland der Weinbau auf etwa 25,000 Str. betrieben, die einen Ertrag von höchstens 5 Mill. Oka gewährten; gegenwärtig ist dagegen der Jahresertrag 1,850,679 Barik (\*), zu einem Betrage von 10,778,154 Drachmen.

Der Weinbau hat in Griechenland einen hohen Grad der Entwickelung erreicht, aber seine Cultur ist gleichwohl noch sehr mangelhaft. Zwar gehört er zu den wichtigsten Nahrungszweigen Griechenlands, und die griechischen Weine sind das wichtigste und ausgezeichnetste Naturerzeugniß des Landes, allein die Bereitung des Weines geschieht in den meisten Eparchien ohne alle Methode und besondere Sorgfalt, und nur in wenigen Theilen des Landes wird besonderer Fleiß darauf verwendet. Namentlich ist dies auf der Insel Ebera (Santorin), Tinos und Naxos der Fall, indem man dort vorzugsweise bemüht ist, gute und reine, von fremden Bestandtheilen freie Weine zu erzeugen.

\*) Ein Kilo = 22 Oka u. 1 Oka = 2½ Pfd.

\*) Ein Barik = 50 Oka.

In diesem Zwecke waren vor einigen Jahren zwei Gesellschaften mit bedeutenden Kapitalien in Patras und in Athen zusammengetreten, welche eine bessere Weinbereitung nach bewährter europäischer Methode, unter Leitung erfahrener französischer Weingärtner, erzielten. Die weinbauende Gesellschaft in Patras erreichte ihren Zweck nicht, dagegen erzeugt die in Athen seit längerer Zeit eine beträchtliche Menge ausgezeichneten Weins, die bereits mit denen Frankreichs wetteifern, und wovon sie auch seit einigen Jahren nicht unbedeutende Beträge ausführt.

Im J. 1864 betrug die gesammte Weinausfuhr in Griechenland 5,085,127 Ofla, zu einem Werthbetrage von 1,204,984 Dr., wovon der größte Theil, nämlich 4,786,315 Ofla, nach der Türkei und Rußland, und zwar fast zwei Drittel in die Türkei und ein Drittel nach Rußland gingen. Daneben fand jedoch auch eine Weineinfuhr aus dem Auslande statt, die im J. 1864 im Ganzen 149,564 Ofla betrug, wovon allein aus der Türkei 117,981 Ofla kamen.

Auch einige Branntweinfabriken wurden vor mehreren Jahren in Griechenland, jedoch ohne besondere Erfolge, errichtet, und nur die in Kephisia (bei Athen) führt verschiedener Gattungen von Branntweinen aus, die sich den meisten der in Europa bereiteten zur Seite stellen. Ebenso wird auch Raki ziemlich allgemein in Griechenland bereitet, und bereits seit längerer Zeit wird er vielfach in besserer Weise gewonnen. Neben seinen Weinen führte Griechenland auch geistige Getränke in nicht unbedeutlicher Menge aus, die im J. 1859 den Betrag von 163,660 Ofla erreichten und meist nach der Türkei gingen, aber es führte sie auch in beträchtlichen Quantitäten ein, und zwar im J. 1864 zu einem Betrage von 354,359 Ofla und einem Werthe von 724,365 Drachmen.

Der Korinthenbau beschränkte sich vor dem griechischen Unabhängigkeitskriege im J. 1821 nur auf die Eparchien Patras, Argialia und Korinthien, aber auch hier wurden die meisten Pflanzungen während des Krieges verwüstet, und nur die in Argialia blieben verschont, die einen Ertrag von etwa 5 Mill. Pfund gewähren. Nach Wiedereherstellung der Ordnung, besonders von den Jahren 1846 und 1847 an, erlangte der Korinthenbau eine auffallende Ausdehnung und Entwicklung, welche durch die in den J. 1852—1856 herrschende Traubinkrankheit eine nur vorübergehende Störung erfuhr. Im J. 1866 nahmen die Korinthenpflanzungen, deren sich in allen Nomarchien, mit Ausnahme von Attika und Böotien, Euböa und den Egeaden finden, einen Flächenraum von 153,058 Stremmen ein (in Argiala und Elis allein 87,033, in Messenien 36,159, in Argolis und Korinthien 24,378 Etr.), und der Ertrag, der im J. 1851 57,662,756 Pfd. betragen hatte, war im J. 1866, mit Einschluß der Jonischen Inseln, bis zu 125,573,717 Pfd. gestiegen. Die Ausfuhr fand vorzugsweise nach England, sodann nach Deutschland und Oesterreich statt. Die Grundsteuer, die bei diesem Naturerzeugnisse

XL

als Ausfuhrzoll erhoben wird, war für das J. 1866 zu 800,000 Dr. veranschlagt worden.

Auch die Delbäume sind ein wichtiger Gegenstand des Landbaus in Griechenland. Im J. 1834 besaß das Land kaum 2,300,000 Delbäume, deren Ertrag ungefähr 200,000 Baris betrug; dagegen hatte es 1860 auf einer Ausdehnung von etwa 370,000 Stremmen und in allen Nomarchien 7,500,000 Delbäume mit einem Ertrage von 5,812,315 Ofla Del. Den höchsten Ertrag (1,467,900 Ofla) gewährte die Nomarchie Lakonien, dann Messenien, Attika und Böotien, und sogar Akarnanien und Aetolien mit 110,590 Ofla. Die Ausfuhr davon betrug im J. 1860 nur 67,745 Ofla, dagegen 1861 521,336, und 1862 sogar 1,209,732 Ofla mit einem Werthbetrage von 1,503,807 Dr., die zum größten Theil nach Oesterreich und der Türkei ausgeführt wurden. Daneben fand jedoch auch eine nicht unbedeutende Einfuhr von Del statt. Ebenso bildeten auch die Oliven fortwährend einen Gegenstand der Ausfuhr (im J. 1858 152,199 Ofla), der in den Jahren 1861—1864 stets über 100,000—150,000 Ofla betrug. Der Ertrag an Del würde größer sein, wenn bei Auspressung der Oliven mehr Sorgfalt angewendet würde, und es hat sich in Folge der Benutzung besserer Maschinen, die an einigen Orten angewendet worden, ergeben, daß bisher etwa der achte Theil verloren gegangen war. Die Seidenbau-Gesellschaft in Athen hatte bereits im J. 1857 eine Dampf-Spinnmühle errichtet, die während ihrer Thätigkeit täglich sechs Arbeiter beschäftigte und 100 Ofla geringstes Del gewann.

An Maulbeerbäumen besaß Griechenland bei Errichtung des Königreichs im J. 1833 kaum 380,000, dagegen hatte es 1860 etwa 1,500,000 auf einem Flächenraume von 75,000 Stremmen. Die Kultur dieser zur Ernährung der Seidenraupen wichtigen Baums hat sich über alle Nomarchien erstreckt. Die meisten (537,930) gibt es in Lakonien, sodann in Messenien, auf den Egeaden und in Arkadien (130,850), die wenigsten in Argolis und Korinthien (9365) und in Attika und Böotien (7075).

Ähnlich ist es mit den Feigenbäumen. Davon hatte man im J. 1834 etwa 50,000; gegenwärtig gibt es deren 360,000 auf einer Ausdehnung von wenigstens 18,000 Stremmen, im J. 1860 mit einem Ertrage von 111,845 Centnern aus den Nomarchien von Messenien, den Egeaden, Euböa, Lakonien, Arkadien und Phthiotis, denn in den übrigen ist ihre Kultur ohne Bedeutung. Unter den erwähnten 111,845 Etrn. ist allein Messenien mit 87,048 Etrn. aufgeführt. Die Ausfuhr betrug in dem genannten J. 111,784 Etr. zu einem Werthe von 1,729,422 Dr., und sie hat auch in den Jahren 1861—1864 zu einem Betrage von über 84,000 Etr. bis zu 109,163 Etr., die meist nach Deutschland und Oesterreich, dann nach den Donaufürstenthümern und Rußland gingen, stattgefunden.

Die Zahl der Knoppere- oder Gerbereien betrug im J. 1860 etwa 110,000 auf 13,000 Etr. zu einem Ertrage

von 93,819 Etrn. und einem Werthbetrage von 938,190 Dr. Sie finden sich in allen Nomarchien, zumest in Karna-  
nien und Aetolien, wo der Ertrag in dem genannten Jahre  
die Höhe von 53,210 Etr. erreichte, dann auf den Ekla-  
den und in Akhala und Elis, am wenigsten in Arkadien  
Euböa, Argolis und Korinthien, Phthiotis und Phocis.  
Die Ausfuhr der Knospen, die besonders nach Oesterreich  
stattfindet, betrug 1858 88,088 Etr. zu einem Werthe von  
674,848 Dr., dagegen 1861 107,771 und 1862 119,151  
Etr. zu einem Werthe von 1,364,889 und 1,381,666 Dr.  
Im J. 1864 war der Betrag der Ausfuhr 97,093 Etr.  
und deren Werth 1,102,044 Dr.

Unter den anderen Kultur- und Nutzpflanzen, die  
zufolge des Obenbemerkten im J. 1860 nach einem Flä-  
chenraume von 238,340 Stremmen berechnet waren, füh-  
ren die „*Λαγογόμια*“ in eigenthümlicher Zusammenstel-  
lung theils Heu und Klee, theils Gartenland, namentlich  
Frucht-, besonders Mandelbäume auf. Sie nehmen jährlich,  
nach der weiteren Angabe des Verfassers, einen Flächenraum  
von etwa 38,650 Etr. Land ein. Was sonst noch über sie  
im Einzelnen und über die Ausdehnung gesagt wird, in  
der sie in verschiedenen Jahren kultivirt worden sind, ist  
nicht recht verständlich.

Getrennt von den erwähnten Baumpflanzungen an  
Weinstöcken, Korinthen, Delbäumen, Maulbeerbäumen,  
Feigenbäumen, Knospenreihen u. s. w. behandelt der Ver-  
fasser des vorliegenden Buches theils verschiedene Baum-  
arten und andere Gewächse, theils die Wälder Griechenlands.  
In Betreff der ersteren bemerkt er, daß dergleichen Baum-  
gattungen und Gewächse von verständigen Landwirthen und  
andern Bewohnern aus fremden Ländern in Griechenland  
eingeführt worden sind, besonders Ankos dazu habe jedoch  
die Anlage des königl. Gartens in Athen und die Er-  
richtung der öffentlichen Baumschule dorthin gegeben. Aus  
letzterer werden solche Bäume und Gewächse auf Verlan-  
gen und gegen Bezahlung abgegeben. Mit Leidenschaft  
— heißt es a. a. O. — haben es viele Griechen unternom-  
men, besonders schöne und seltene Gewächse zu kultiviren,  
und in dessen Folge trifft man in vielen Gärten von Athen  
die prächtigsten Arten von Gewächsen an, die nicht selten auch  
einen Handelsgegenstand ausmachen. Besonders gehören da-  
hin die verschiedenen Gattungen der sogenannten Hesperide-  
ae, die Portogalli, Älmenen, Citronen, Drangen u. s. w.,  
von denen es dort gegen hundert Arten gibt, und welche  
sich in den Gärten auf den Inseln und an den Meeres-  
küsten, sowie an der Südküste der Hügel und Schluchten  
des Landes finden. Die Früchte, die davon besonders auf  
den Inseln Paros, Naxos und Andros, in Karpsos auf  
Euböa, in Messenien, Sparta, Argolis und Leontidi in  
Arkadien gewonnen werden, sowie der Verkauf junger Bäume  
sind bereits ein wichtiger Handelsartikel geworden. Früher  
lieferte besonders Genua diese Arten von Bäumen und versorgte  
damit Griechenland und den Orient; gegenwärtig hat dieser

Handel aufgehört, und Karpsos, Poros, Andros und Naxos  
haben ihn übernommen.

Außerdem werden in Gärten und auf verschiedenen an-  
deren stückhändigen Gebleten auch noch andere Gewächse in  
Griechenland gezogen, die sich dort erst neuerdings einge-  
bürgert haben, so z. B. Reis, namentlich in Evbalia,  
Kartoffeln und alle Arten Gurken, ferner von Dolden-  
gewächsen Anis, Koriander, Sellerie, Petersilie, Mohrrüben,  
ebenso auf vielen Inseln und an manchen Küstenpunkten  
in großer Menge Krapp, verschiedene Gattungen Zwiebeln  
und Knoblauch, Mohr, Hanf und, jedoch seltener, auch  
Flachs, endlich mancherlei Küchengewächse. Ueber die Ein-  
zelheiten ihrer Kultur fehlt es jedoch an genauen Nach-  
richten.

Die Wälder nehmen in Griechenland eine Ausdehnung  
von etwa 5,419,660 Stremmen Landes ein. Sie sind zum  
großen Theil Staatseigenthum und machen einen besonders  
werthvollen Bestandteil und Besitz des Landes aus, weshalb  
sie auch seit dem Jahre 1833 der Gegenwart der Geset-  
gebung desselben gewiesen sind, die sich ihre Erhaltung und  
Kultur angelegen sein ließ. Aber gleichwohl ist die Ver-  
waltung dieses wichtigen Kulturzweiges eine sich mangel-  
hafte geblieben, da es noch zu sehr an der Beobachtung  
wissenschaftlicher Grundsätze gebricht, und außerdem fügt  
die Nachlässigkeit der Hirten und Kohlenbrenner, sowie die  
unmuthwillige Gewinnung des Harzes eben so den alten  
Bäumen der griechischen Wälder wie den jungen An-  
pflanzungen die wesentlichsten Nachteile zu.

Die Nutzung des Holzes ist besonders in waldbreichen  
Gegenden von bedeutender Wichtigkeit. Das Holz der ver-  
schieden Bäume dieser Waldungen dient theils zu Drech-  
sel- und Tischlerarbeiten, theils zu Schiffsbauten und zum  
Häuserbau. Im Ganzen gefallen diese Waldbäume in  
Nadel- und Laubholz (Konophoren und Julophoren). Zu  
den ersteren gehören namentlich mehrere Arten Fichten. Die  
Apollonische Fichte, die sich in ganz Griechenland findet und die  
größten Wälder bildet, erreicht eine Höhe von 60—70 Meter  
und gedeiht in einer Höhe von 3000—7000 Fuß. Die  
cephalonische Fichte bedeckt vornehmlich das Kinoss-Gebirge  
auf der Insel Cephalonia. Als verschieden von dieser be-  
trachten die meisten Botaniker die arkadische Fichte, die auch  
nach der Königin Amalia genannt wird und von eigenthüm-  
licher Bildung ist. Die Aleppo-Fichte wächst an den nie-  
deren Abhängen und erhebt sich vom Meeresufer bis zu  
3000 Fuß Höhe. Man trifft sie in allen Theilen von  
Griechenland an, und sie ist die einzige Fichtensart, die sich  
auf den Inseln findet. Von ihr wird namentlich Harz in  
großer Menge gewonnen. Die Lärchen-Fichte und die Stran-  
den-Fichte sind seltener, aber wo sie sich finden, bilden sie häufig  
ausgedehnte Wälder. Vom Wacholderbaum gibt es mehrere  
Arten (*Juniperus phoenicea*, *rufescens*, *foetidissima*,  
*Sabinoides*, *Drupacea*), und sie werden zum Theil viel-  
fach an der Meeresküste und auf den Inseln gefunden, zum

Theil wachsen sie auf einigen Bergen, z. B. auf dem Par-  
naß und Malebos-Gebirge (im Peloponnes). Auf letzterem  
gehört auch die Juniperus Drupacea (*Αγνόςος* *Αγνόςος*), eine sonst im Orient seltene Baumart, die auf  
dem Taurus und Libanon wächst, und man entdeckte sie in  
Griechenland erst vor wenigen Jahren auf dem Malebos,  
und zwar an seinen südöstlichen Abhängen.

Unter den Laubbolzbäumen zeichnen sich besonders die  
verschiedenen Arten der Eiche und die Kastanien aus, welche  
letzte sich gewöhnlich am Fuße der Berge finden und aus-  
gedehnte Wälder bilden. Dies gilt vorzugsweise von der  
gewöhnlichen Kastanie; aber man hat auch vor einigen  
Jahren in vielen Theilen des Landes angefangen, sie durch  
kretische Pflanzensorten zu veredeln, und zwar zunächst in  
Kastanien in der Eparchie Konurta (im Peloponnes), wo  
sie für die Gebirgsbewohner bereits eine reiche Einnahmequelle  
geworden ist.

Die schon erwähnte, so einträgliche Knoppereiche  
(*Quercus Aegilops*) findet sich besonders auf der Insel  
Kos, in der Maina, in Attika und einigen anderen Epar-  
chien, und sie ist im Verein mit der immergrünen Eiche  
(*Quercus Coccifera*, *Ναυράκι*) für die griechische Vegeta-  
tion von vorzugsweise charakteristischer Bedeutung. Diese  
letzte Eichenart ist sehr gewöhnlich und bedeckt weite Flächen.  
Sie bildet zugleich mit dem Delbaum, Mastixbaum und  
Erdbbeerbaum die eigentliche Grundlage der griechischen Vegera-  
tion, aber sie nimmt nicht weite Ausdehnungen ein, weil  
sie häufig von den Ziegen abgefressen wird. Von ihr wird  
die sogenannte Scharlachbeere gewonnen. In andern Gat-  
tungen der Eiche hat Griechenland noch die Stachel- oder Stachel-  
eiche (*Qu. ilex*), die levantische Eiche (*Qu. escula*),  
die Stiel- oder Sommer-Eiche (*Qu. pedunculata*), die  
Kerrie-Eiche (*Qu. Cerris*) und die weichhaarige Eiche (*Qu.*  
*pedunculata* \*).

Die Weiden, deren es in Griechenland fünf Arten  
gibt, finden sich jedoch nicht in großer Menge beisammen;  
vielmehr stehen sie nur einzeln an den Ufern der Bäche  
und Flüsse. Von der einen Gattung derselben, *Salix Cyl-*  
*lenea*, hat die Wissenschaft erst vor wenigen Jahren Kennt-  
nis erhalten. Sie findet sich in der Eparchie Korinthien in  
der Nähe von Trikala und in den Schluchten von Kalavrita  
im Kylene-Gebirge.

An andern Baumarten besitzt Griechenland verschiedene,  
die es zum Theil nach ihrer ersten Einführung und weiteren  
Verbreitung im Lande der schon erwähnten königlichen  
Pflanzen- und Baumschule in Athen verdankt. Andere sind  
ihm eigenthümlich und im Lande vielfach heimisch. Dazu  
gehören in der einen und andern Beziehung: Buchen,

Pappeln (*populus alba* und *nigra*), Linden, Johannisbrot-  
baum, Terentibus, Lorbeer, Elea, Platanen, Zedern-  
baum, Lentiskus (*Pistacia Lentiscus*) u. s. w. Mit letz-  
terem sind wiederholte Versuche auf vielen Inseln gemacht  
worden, um durch Anzucht der Rinde Mastix zu gewinnen,  
und die Versuche sind in einem solchen Grade gelungen, daß  
der dadurch erlangte Mastix es mit dem besten von der  
Insel Chios aufnehmen kann. Dies eine Beispiel lehrt,  
welchen werthvollen und einträglichen Baumeichthum Grie-  
chenland noch immer besitzt, auch wenn in andern Betracht  
und im Großen durch mancherlei Verwüstungen seinen  
Waldungen unersetzliche Nachteile zugefügt worden sind und  
noch fortwährend zugefügt werden.\*) Uebrigens stehen diese  
Baumgattungen, so wie die verschiedenen Straucharten mehr  
oder weniger dicht in großer Menge beisammen oder auch  
einzeln mit andern verstreut. Einzelne Gattungen finden sich  
jedoch auch in ausgedehnten Wäldern.

Die Viehzucht ist in Griechenland im Ganzen noch  
sehr vernachlässigt und trägt noch sehr den Charakter des  
Nomadenlebens an sich. Es fehlt fast ganz an künstlicher  
Weide, und nur in geringer Anzahl wird Vieh auf Ge-  
meinplätze getrieben. Der Hauptbestandtheil der Viehzucht  
sind Ziegen und Schafe (im J. 1865 gab es nach den Ab-  
gaberegistern, insofern überhaupt diese Thiere der Besteuerung  
unterliegen, an Ziegen 2,289,123 und an Schafen 1,778,729),  
außerdem, jedoch in beträchtlicher Minderzahl, Pferde, Esel,  
Schweine, Kühe und Oesen. Die Ziegen und Schafe ge-  
währen einen guten Dünger für die Felder, aber er geht  
in Griechenland verloren. Ihre Heerden leben im Sommer  
auf den Bergen, wo sie ihre natürlichen Weideplätze finden,  
und im Winter in der Ebene. Es ist erklärlich, daß sich

\*) Ueber diesen Gegenstand spricht sich das Buch des Griechen  
Manjolas nicht weiter aus. Ich will daher diese Lücke durch  
eine Mittheilung des genannten deutschen Reisenden ergänzen, der  
1853 in Griechenland war und auch die nördliche Insel Euböa  
besuchte. Er bemerkt von dem dortigen Ackerbau, daß, so  
reichlich er auch die Weide besahnte, er doch noch in einer „sehr  
primitiven Weise betrieben werde.“ Nach seiner Beschreibung wurden  
zwei große, mit Wald bedeckte Thäler des Landes zu Ackerfeld aus-  
geschieden, und nun wurden sie abwechselnd mit Getreide und Mais so  
lange bepflanzt, bis nach einigen Jahren das außerordentlich frucht-  
bare Land vollständig ausgezehrt war. Dann ließ man diese Strecken  
brach liegen und redete ein neues Stück Wald aus, mit dem man auf  
gleiche Weise verfuhr. Auf jenem ausgezehnten Boden wuchs nun  
zwar allmählig wieder Gestrüpp, aber kein Schwamm, wie vorher, und  
so ward „nach und nach das herrliche Land zu Grunde gerichtet.“  
Man sagte dem Reisenden, „eine andere Bewirthschaftung sei unthun-  
lich, weil es durchaus an Dünger fehle.“ Die Ackerbauweise, die  
diesen allein liefern könnte, sei einmühsam durchaus nicht möglich,  
weil „man das Feld nicht verwerten könne.“ Weist diese Wirth-  
schaft lange fort, sagte der Reisende hinzu, so wird zuletzt auch der  
einzige, in den Niederungen reich bewaldete Theil von Griechenland,  
das nördliche Euböa, in den gleichen Zustand gebracht, wie die übr-  
igen Gegenden. Man sieht, wie „nicht nur verheerende Kriege,  
sondern die Civilisation selbst das Land ruiniert.“ S. Wischer,  
a. a. D. S. 670.

\*) Dem Prof. Wischer in Basel, der im Jahre 1853 in Grie-  
chenland war, sagte der Schlossgärtner Schmid in Athen, daß es  
allen dreizehn Arten Eichen in Griechenland gebe. S. Wischer,  
Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland“ (Basel, 1867) S. 228.

fremdes Vieh in Griechenland schwer acclimatist, doch waren in der Ackerbauschule in Tirynth unter andern auch Mreinoschafe zur Veredlung der einheimischen Schafe mit gutem Erfolge eingeführt worden.

Ziegen und Schafe finden sich in allen Nomarchien, am meisten in Akarnanien und Aetolien (1860 947,187), in Achaia und Elis, Phthiotis und Phocis. Der Hauptvorthail, den sie gewähren, besteht, neben der Milch, in der Wolle. Diese betrug im Jahre 1860 von den Schafen 2,296,000 Okka, dagegen von den Ziegen 556,000. Der Preis für die Okka schwankte zwischen 80—130 Lepta. Uebrigens wird sie fast ausschließlich im Lande selbst und zwar zu verschiedenen Zwecken, zu Kleidern, Dröden, Teppichen u. s. w., verwendet, aber gleichwohl war sie auch Gegenstand der Ausfuhr, die im Jahre 1858 3,803, dagegen im Jahre 1862 6,583 Centner betrug. Der Nutzen der Ziegen und Schafe berechnet sich in Griechenland zu acht Drachmen auf das Stück.

An Rindvieh besaß Griechenland im Jahre 1865 im Ganzen 57,910 Stück, nämlich 51,994 Kühe, 5,205 Ochsen und 711 Büffel, die einer Abgabe unterliegen, außerdem gab es jedoch auch noch Pflugochsen, die im J. 1860 die Zahl von 168,927 erreichten und sich auf alle Nomarchien vertheilten. Gleichwohl ist hier vorzugswelse die Rindviehzucht noch sehr vernachlässigt, und man weiß namentlich aus den Ochsen den möglichen und nöthigen Vorthail für den Landbau noch nicht zu ziehen. Daber berechnet sich auch der Nutzen der Ochsen in Griechenland nur zu 32 Dr. auf das Stück, während er z. B. in England gegen 100 und in Frankreich 70 Dr. beträgt.\*)

Die Zahl der Pferde in Griechenland betrug im J. 1865 69,787, die der Maulesel 29,637 und der Esel 64,051, und sie fanden sich in allen Nomarchien. Die Veredlung der Pferde hatte sich die Regierung besonders angelegen sein lassen und zu diesem Zwecke vom J. 1846 an in der Ackerbauschule in Tirynth eine besondere Anstalt errichtet, die jedoch im J. 1863 wieder aufgelöst wurde.

Die Zahl der Schweine hat sich in Griechenland seit dem J. 1860 in auffallender Weise fortwährend vermehrt. Damals waren es 122,929, im J. 1865 dagegen betrug die Zahl nur 55,776. Der durchschnittliche Ertrag derselben berechnete sich zu 14 Drachmen auf das Stück.

Dagegen war die Zahl der Bienenstöcke, deren es im J. 1852 in Griechenland 255,948 gab, im J. 1860 bis auf 280,090 gestiegen. Ihr jährlicher Ertrag an Honig und Wachs ward für jenen zu 407,170 Okka, für dieses

zu 86,255 Okka berechnet und deren Werth ungefähr zu 550,000 Dr. angenommen.

Der Viehhandel in Griechenland bildet noch keinen besonderen Industriezweig, aber er ist gleichwohl Gegenstand der Ein- und Ausfuhr. Man unterscheidet daher dort nur großes und kleines Vieh. Von erstem waren im J. 1863 20,763, von letzterem 30,871 (1862 38,194) Stück eingeführt, dagegen von erstem im J. 1860 6,102 und von letzterem 18,288 (1861 24,564) Stück ausgeführt worden.

Am Schluß der Abtheilung über den Landbau in Griechenland kommt der Verfasser der „*Μεγεροποιεας*“ noch auf die Seen, Sümpfe und Moräste des Landes zu reden. Dieselben stehen mit jenem insofern in Zusammenhang, als dadurch ein Theil des Landes der Kultur entzogen wird. Ihr Gesammtumfang beträgt ungefähr 833,448 Streemmen, und sie finden sich fast in allen Nomarchien, mit Ausnahme der Ekladen. Für die Trodenlegung dieser Seen, Sümpfe und Moräste hat die griechische Regierung von Anfang an Sorge getragen, es waren zu diesem Zwecke manche Arbeiten unternommen worden. Allein sie blieben meist nur vorbereitender Art, da die Regierung, außer Kanälen und unzureichenden Abzugsgräben, wesentliche Maßregeln nicht ergreifen konnte, weil es an den nöthigen Kapitalien, besonders zur Anschaffung hydraulischer Werke, fehlte. Noch kürzlich hat die griechische Regierung, in der Voraussetzung, daß dergleichen Unternehmungen zweckmäßiger durch Privatgesellschaften ausgeführt werden können, die Austrocknung des Kopais-See's einer französischen Gesellschaft überlassen, und Aehnliches wird auch in Betreff anderer stehenden Wasser dieser Art beabsichtigt.

Die hierbei zunächst in Betracht kommenden Seen sind folgende: Der Kopais-See in der Eparchie Livadien, von mehr als 210,000 Streemmen Ausdehnung, mit den in seiner Nähe gelegenen beiden Seen, dem Ekeiri und der Paralimni, mit 6000 Str.; der See von Phonia oder Pheneos im Peloponnes, 70,000 Str.; der symphalische von 5000 und der See Ekeotini von 2000 Str., sämmtlich in der Nomarchie Argolis und Korinthien; der See von Agri-nion, etwa 75,000 Str., der von Angelokastron gegen 10,000 Str., und der von Dyros von fast 5000 Str., insgesammt in der Nomarchie Akarnanien und Aetolien, und der See Sudena in der Eparchie Kalavryta in Achaia, etwa 4000 Str.

Außerdem giebt es auch noch kleinere Seen, so wie Sümpfe und Moräste im Gesammtbetrage von fast 200,000 Str., deren Austrocknung an und für sich und theils im Interesse der Bevölkerung, theils zum Vorthail der Kultur des Landes wichtig und nöthwendig ist.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Industrie. Der Verfasser bemerkt im Allgemeinen, daß sich bisher in Griechenland die Industrie und Fabricthätigkeit um so weniger erfolgreich habe entwickeln können, je weniger noch der Landbau entwickelt sei, daß außerdem auch die Bevölkerung

\*) Ramentlich scheint man den Nutzen der Milchkühe in Griechenland nicht besonders hoch anzuschlagen. Der obengenannte Prof. Vischer erzählt aus dem Jahre 1853 von einem Gute der Königin Amalia in der Nähe von Athen, das sie Maullertrube benannt hatte, und das, fast der einzige Ort in Griechenland war, wo Milchkühe gehalten und aus Kuhmilch Butter bereitet ward.“ Sonst hatte man in der Regel im ganzen Lande nur Ziegen- und Schafmilch.

noch zu dünn, und eben so theils die Geldmittel im Lande, theils die Bedürfnisse der Einwohner zu beschränkt seien. Gleichwohl hat sich seit Errichtung des Königreichs die industrielle Thätigkeit nach und nach von der das Land bebauenden Bevölkerung geschieden, und verschiedene industrielle Unternehmungen sind im Lande begründet worden. Der Associationsgeist ist erwacht und entwickelt sich, die nöthigen Kapitalien werden flüssiger, wissenschaftliche und technische Kenntnisse vermehren und erweitern sich. Die Geseßgebung hat auch auf diesem Gebiete thätig eingegriffen und vielfachen Anstoß gegeben. Manches blieb dem Interesse, so wie dem nationalen Patriotismus Einzelner, theils im Lande selbst, theils im Auslande, überlassen. Bereits giebt es in Griechenland zweihundzwanzig Fabriken, die unter Anwendung der Dampfkraft eine Thätigkeit von 296 (nach einer andern Mittheilung von 338) Pferdekraft entwickeln. Kam auch die von der Regierung zur Belebung der Nationalindustrie beabsichtigte jährliche Ausstellung neuer landwirthschaftlicher Werkzeuge und Maschinen, so wie inländischen oder erst neu eingeführten fremden Viehes, nebst Vertheilung von Belohnungen, niemals zu Stande, so find doch auf Veranlassung und auf Kosten eines patriotischen Griechen, Emmanuël Zappas, alle Jahre stattfindende industrielle und landwirthschaftliche Ausstellungen unter dem Namen: *Dipsipien* eingeführt worden, auf denen alle Erzeugnisse der griechischen Thätigkeit, namentlich der Industrie, der Landwirtschaft und Viehzucht, ausgestellt werden sollen. Die erste Ausstellung dieser Art fand im October 1859 statt. Auf derselben erschienen 947 Aussteller aus dem freien Griechenland mit den Erzeugnissen ihrer Fabrikthätigkeit, des Landbaues und der schönen Künste. Es konnten von ihnen 424 mit goldenen, silbernen und Kupfer-Medaillen und 274 mit Belohnungen ausgezeichnet werden. Eine zweite Ausstellung im Jahre 1863 unterließ in Folge der politischen Ereignisse und ist auch bisher noch nicht abgehalten worden.

Eine Kunstschule (*Σχολή των Πολυτεχνικών*) hatte die Regierung bereits im Jahre 1837 in Athen ins Leben gerufen, an welcher in verschiedenen Handwerken und in den schönen Künsten Unterricht erteilt wurde. Indes ward sie nach und nach ausschließlich zu einer Schule der schönen Künste, an welcher die Malerei, Sculptur, Holzschnitzkunst und Ornamentik gelehrt wurden, und sie blieb dies bis zum Jahre 1863. Während dieser Zeit ward sie jährlich von etwa 500 Schülern besucht und gewährt in gleicher Weise den Einzelnen für ihre persönliche Fertigkeit und für ihre technische Ausbildung, so wie für ihr weiteres selbstständiges Fortkommen alle Vortheile, wie sie andererseits auch die verschiedenen künstlerischen Beschäftigungen selbst verwohlfommen half. Im Jahre 1863 leitete sie zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück und berückichtigte seitdem die Ausbildung zu industrieller Thätigkeit und zu den schönen Künsten. Neuerdings ist auch diese Anstalt mit einer

Dampfmaschine bereichert worden. Neben ihr ist seit dem Jahre 1866 eine „Gesellschaft der Volkserfreuer“ in Athen ins Leben getreten, die durch Unterricht in den nöthigen Gegenständen die sittliche Bildung und materielle Verbesserung der Arbeiterklassen begünstigt. Die Lehgegenstände waren im letztvergangenen Jahre: Sitten- und Christen-Lehre, praktische Geometrie, Handelsrecht, Staats- und Industrie-Wirtschaft, Geschichte des alten Griechenland, physisch-politische und industrielle Geographie, technologische Chemie, Anfangsgründe der Botanik, Rechtslehre.

Was die einzelnen Industriezweige anlangt, so gab es seit dem Jahre 1836 eine Seidenfabrik auf der Insel Hydra, eine Fabrik von sogenannten Fess in Athen und eine Zuckersfabrik in der Eparchie Lokris. Auch geschah Manches für Glasfabrikation u. s. w., und die Regierung gewährte allen diesen Unternehmungen verschiedene Vorrechte und Geldunterstützungen; allein sie entsprachen nicht den gegebenen Ermächtigungen, und einige davon sind spurlos wieder verschwunden.

Dagegen haben einzelne industrielle Privatunternehmungen günstige Erfolge gehabt. An der Spitze derartiger Fabriken steht die Werkskatt der griechischen Dampfschiffahrtsgesellschaft in Spira zur Anfertigung, Reinigung u. s. w. von Dampfschiffen der Gesellschaft. Sie hat sich soweit vervollkommen, daß sie den Bedürfnissen der Gesellschaft in Bereitung von Dampfsesseln, ganzen Maschinen u. s. w. nach Art der europäischen Werksstätten dieser Gattung vollständig genügt. Zugleich ist sie praktische Lehranstalt für Arbeiter in diesem Fache.

In der Hafenstadt Piräus besteht seit dem Jahre 1860 eine Möbelfabrik und Eisengießerei zur Anfertigung von landwirthschaftlichen Werkzeugen, Ackergeräthschaften, Bewässerungsmaschinen, Drelpressen und dergl., wo auch mancherlei Gegenstände zur Schifffahrt, zur Vervollständigung von Häuserbauten, wie Eisengitter u. s. w., anfertigt werden, und die Möbelfabrik liefert besonders gepolsterte Stühle u. dergl. Die letztere versorgt nicht bloß das Inland, so daß die fremde Einfuhr derartiger Gegenstände fast ganz aufgehört hat, sondern ihre Fabrikate gehen auch nach der Türkei, wogegen die Eisenfabrikate fast ausschließlich für Griechenland bestimmt sind (im Jahre 1864 allein 750 Pflüge) und nur noch eine geringe Ausfuhr nach der Türkei stattfindet. In beiden Abtheilungen waren 180 Männer und 110 Mädchen beschäftigt.

Von großer Bedeutung für Griechenland war früher und seit langer Zeit die Seidenfabrikation, und sie stand dort sogar in hoher Blüthe, indem sie Jahrhunderte lang Europa mit seidenen Gewändern und noch bis zum vorigen Jahrhunderte die europäischen Fabriken, namentlich die von Lyon, mit großen Quantitäten Seide versorgte. Aber nach und nach, besonders nachdem Europa die Ernährung und Behandlung der Seidenraupe kennen gelernt hatte, verfiel dieser Industriezweig immer mehr und mehr, und die griechische Seide gerieth mit der Zeit in einen so kläglichen Zu-



stand, theils der Quantität, theils der Qualität nach, das sie endlich ganz und gar unbekannt wurde. Dies blieb so bis zum Jahre 1837.\*) In dieser Zeit wurden zuerst wieder Seidenfabriken in Griechenland errichtet, und zwar in Sparta, in Nissi in Messinien und später auf Andros, in Lamia und in Piräus. Jetzt giebt es deren sieben, je eine in Athen, Piräus, auf Andros, Sante und Hydra und zwei in Kalamata, aber sie erlitten für ihre Fabrikate mancherlei Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten theils durch Ausfuhrzölle, theils trafen sie große Nachteile durch die Krankheit, welche die Seidenraupe heimsuchte. Bis zum Jahre 1859 nahm der Gegenstand dieser Industrie unter den griechischen Ausfuhrartikeln die zweite Stelle ein. Die beiden Seidenfabriken in Athen und Piräus entwickelten eine besondere Thätigkeit. Namentlich die erstere, welche im J. 1855 begründet und nach dem Muster der vollkommensten Seidenfabriken von Europa eingerichtet worden war, setzte 236 Kessel in Bewegung und beschäftigte gegen dreihundert Arbeiter, unter denen allein 260 Mädchen. Sie verarbeitete jährlich bis zu einer Million Drachmen und erzeugte 5—10,000 Olla reiner Seide. Die Ausfuhr von Seide und Cocons fand besonders nach Frankreich, namentlich nach Lyon, statt. Ueberhaupt weisen die Ausfuhrregister vom J. 1858 folgende Beträge an Seide auf:

1858	11,805 Olla	zum Werthe von	515,605 Dr.
1859	7,007 „	„	709,980 „
1860	10,548 „	„	680,720 „
1861	8,746 „	„	751,974 „
1862	6,159 „	„	364,365 „
1863	2,571 „	„	103,470 „
1864	2,919 „	„	207,686 „

Was dagegen die Ausfuhr von Cocons anlangt, welche vom J. 1867 an von jeder Abgabe frei ist, so war das diesjährige Verhältniß folgendes:

1857	1,493,934 Olla	
1858	121,120 „	zum Werthe von 1,783,257 Dr.
1859	75,292 „	„ 1,872,459 „
1860	77,090 „	„ 1,548,158 „
1861	52,572 „	„ 963,610 „
1862	47,063 „	„ 771,789 „
1863	38,024 „	„ 575,452 „
1864	32,263 „	„ 631,725 „

\*) Der Begründer der Seidenweberei in Athen ist der Grieche Konstantin Durutis, der während eines längeren Aufenthalts in Italien die Seidenweberei und namentlich die Behandlung der Seidenraupe kennen gelernt hatte. Er hat sich um die Belebung der Industrie in Griechenland, vorzüglich um die Seidenfabrikation große Verdienste erworben, und er hat dafür eine sehr einflußreiche Thätigkeit entwickelt. Er ließ Arbeiter und Maschinen aus Italien kommen und benutzte sie zu Produktion der Seide; er verbesserte die Behandlung der Seidenraupe und suchte die griechische Seide zu dem Range der italienischen zu erheben und die Preise der ersten emporzubringen. Seine Bemühungen sind auch nicht erfolglos geblieben.

Dabei hatte die griechische Seide auf den Märkten in Frankreich, namentlich in Lyon, nach den Büchern des genannten Durutis folgende Preise:

1855 v. Drachm.	84,70	Rept. die Olla bis	Drachm.	90,80	2.
1856	„	„	„	147,90	„
1857	„	111,20	„	151,00	„
1858	„	103,60	„	118,75	„
1859	„	118,75	„	138,95	„
1860	„	129,85	„	151,00	„
1861	„	104,90	„	„	„
1862	„	113,75	„	„	„
1864	„	113,75	„	113,05	(7)
1865	„	126,35	„	„	„

Dagegen ist die Fabrikation von Seidenwebereien in Griechenland von keiner besonderen Wichtigkeit. Zwar gab es in Athen vor vielen Jahren auch eine Seidenweberei, aber sie mußte wegen Mangel an den nöthigen Betriebskapitalien ihre Thätigkeit bald wieder einstellen. Auch die übrigen Seidenwebereien, welche in Hydra, Kumi, Kalamata und Sante seit längerer Zeit bestehen, haben aus gleichem Grunde und wegen des geringen Verbrauchs ihrer Fabrikate nur geringen Fortgang. Wodurch die in Kalamata übertrifft die andern durch größere Vollkommenheit ihrer Erzeugnisse und durch die größere Zahl der in ihr beschäftigten Arbeiter. Dies sind hier nur Frauen. Auch an anderen Orten fertigen die letzteren nach landesüblicher Weise Seidenfabrikate zu beschränktem persönlichen Gebrauche.

Die Baumwollenweberei ist in allen Eparchien verbreitet, aber sie ist ohne Bedeutung und wird eigentlich nur von den Dorfbewohnern zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse betrieben. Indes bestehen jetzt zwei Fabriken dieser Art in Patras, eine in Livadien und drei in Argos, deren Erzeugnisse neben denen der diesfälligen häuslichen Industrie einen beschränkten Absatz im Lande selbst haben. Sie sind, auch ohne von der Vollkommenheit, Feinheit, Mannigfaltigkeit und Wohlfeilheit dieser Fabrikate in Europa zu sein, gleichwohl von größter Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Wie schon erwähnt, bewirkte der nordamerikanische Krieg und in dessen Folge die hohen Preise der Baumwolle und baumwollenen Waaren auch in Griechenland eine ausgedehntere Kultur der Baumwolle, aber sie kam hier mehr dem Inlande für die einheimischen Bedürfnisse zu gute. Noch im Jahre 1860 bezahlte Griechenland für eingeführte baumwollene Stoffe 6,862,846 Drachmen, während die Ausfuhr an Baumwolle in dem nämlichen Jahre kaum 183 Centner zu einem Werthe von 12,348 Drachmen betrug.

Die Teppichs- und Wollenweberei ist im Lande sehr verbreitet, aber sie wird nicht nach einer bestimmten Methode, auch nicht nur von denen betrieben, die sich mit diesem Industriezweige ausschließlich beschäftigen, sondern meist im Hause und von Frauen. Die von ihnen gefertigten Erzeugnisse dieser Art zeichnen sich durch die Robustheit der Farben und durch ihre Dauer aus. Dieser Industriezweig

kann sich zum Vortheil des Landes heben, wenn auf die Wolle größere Sorgfalt verwendet wird und deshalb die notwendigen Maschinen zur Anwendung kommen. An der Menge der gewonnenen Wolle liegt es nicht. Noch im Jahre 1862 wurden davon 6593 Centner, meist nach Italien, zum Werthe von 318,400 Dr. ausgeführt; dagegen betrug die Einfuhr, und zwar meist zu feineren Handarbeiten, nur 16,587 Okka zum Werthe von 27,252 Dr.

Das Gerberhandwerk war in Griechenland schon vor dem Jahre 1821, wenn auch sehr unvollkommen, betrieben, und seine Erzeugnisse dienten nur den Bedürfnissen der Arbeiterklasse und der Landbewohner. Seit einiger Zeit gibt es jedoch mehrere Gerbereien im Lande, welche nach den in Europa üblichen Methoden verfahren. Zwei davon in Spira, welche zuerst errichtet wurden, arbeiten mit Dampf und beschäftigen täglich 150 — 200 Arbeiter, und ihre Fabrikate zeichnen sich vor den meisten europäischen vorthellhaft aus. Jetzt gibt es deren in Spira noch 3, in Athen 2, in Korfu 7, und je eine in Chalkis und Rauplia. Außerdem wird jedoch dieser Industriezweig auch noch in der früheren Weise und nicht ohne Vortheil für das Inland betrieben. Bei dem großen Reichthum an verschiedenen Gerbstoffen, den Griechenland in seinen Gebirgseichen, Galläpfeln, Baumrin den und Blättern gewisser Bäume besitzt, die schon jetzt vielfach Gegenstand eines nicht unbedeutenden Ausfuhrhandels, so wie einer sorgfältigen Kultur sind, kann auch dieser Industriezweig eine besondere Ausdehnung und Entwidlung erlangen. Die Ausfuhr an ungererbten Fellen in den J. 1857—1864 betrug selbst in ihrem niedrigsten Betrage im J. 1857 355,152 und im J. 1858 nicht unter 140,261, und eben so erreichte sie, was gegerbte Felle anlangt, in dem niedrigsten Betrage im J. 1863 die Höhe von 434,675, dagegen in den J. 1857, 1858, 1860, 1861, 1862 und 1864 die Höhe von 2,682,027, — 1,663,592, — 1,124,432, — 1,699,820, — 2,329,612, und 1,215,429 Stüd. Meist fand diese Ausfuhr nach der Türkei statt. Was dagegen die Einfuhr in den Jahren von 1857—1864 anlangt, so betrug sie an ungererbten Fellen in ihrem niedrigsten Betrage im J. 1857 1,103,456, dagegen in ihrem höchsten im J. 1863 5,521,897, und an gegerbten Fellen in ihrem niedrigsten Betrage im J. 1861 537,961, in ihrem höchsten dagegen im J. 1858 784,747 Stüd. Die große Menge der eingeführten rohen und die geringe Zahl der eingeführten gegerbten Felle beweist in gleicher Weise, wie das umgekehrte Verhältnis bei der Ausfuhr, daß, wenn es erst an hinreichenden Kapitalien nicht fehlen wird und erfahrene Arbeiter und vollkommene Werkzeuge vorhanden sind, auch dieser Industriezweig ein wichtiger Gegenstand des Ausfuhrhandels und eine bedeutende Quelle des Reichthums für Griechenland werden kann.

Eben so könnte die Färberei einem ausgedehnten Umfang gewinnen, da das Land an Färbemitteln und den zur Färberei nöthigen Erzeugnissen so reich ist, sofern erst die

Kunst der Weberei mehr ausgeübt würde. Noch zur Zeit beschäftigt man sich bloß mit dem Färben theils von Kleiderstoffen für die Landbewohner und Arbeiter, theils von Nähseide und wollenen, so wie baumwollenen Garnen, aber zu beschränktem Gebrauche und nur zur häuslichen Beschäftigung. Die Färbestoffe sind Gegenstand einer beträchtlichen jährlichen Ausfuhr, meist nach der Türkei, wo die Industrie der Färberei einen hohen Grad der Entwidlung erreicht hat und auch von den christlichen Einwohnern Thebaisiens, Macedoniens und Thraciens nach eigenthümlicher Weise mit Glück geübt wird.\* Im J. 1862 wurden für 260,353 Drachmen und im J. 1864 für 276,961 Drachm. Färbestoffe ausgeführt. Dagegen bilden letztere auch einen beträchtlichen Einfuhrartikel, jedoch meist nur zum Anstreichen der Wohnungen und Häuser, und zwar zum größten Theile aus England. Im J. 1862 wurden dergleichen Stoffe zu einem Werthbetrage von 669,455 und im J. 1864 von 396,170 Dr. eingeführt.

Das Schneiders- und Schuhmacherhandwerk versorgt mit ihren Fabrikaten fast ausschließlich die gesammte Bevölkerung. Die Einfuhr auswärtiger Kleider und fremden Schuhwerks, besonders für das weibliche Geschlecht, regte die einheimische Concurrenz an und wirkte auf die Weiterentwicklung der Industrie, so wie auf die Verbesserung der Fabrikate. Einige inländische Fabriken, die für Fabrication europäischer Kleider und Schuhe begründet wurden, liefern bereits gute Waare, die es wenigstens theilweise mit den beschafflichen Erzeugnissen der Einfuhr aufnehmen kann. Gleichwohl nimmt die Einfuhr derartiger europäischer Industrieerzeugnisse alljährlich zu, und während im J. 1859 die Einfuhr fremder Kleiderstoffe den Betrag von 6,465 Okka zu einem Werthe von 166,497 Dr. erreichte, war er im J. 1864 bis zu 19,056 Okka und einem Werthbetrage von 401,053 Dr. gestiegen. Zwar hat sich in Griechenland die Anfertigung griechischer Kleidungsstücke vervollkommenet, aber sie hat sich immer mehr auf die gewöhnlichste Kleidertracht zu beschränken angefangen, da nicht allein in

\*) Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts verarbeitete die Stadt Turnovo in Thessalien jährlich vierhundert Ballen baumwollenen Garn zu feinen Zeugen und sechstausend Ballen Seide zu Seidenstoffen, besaß auch Webereien u. s. w. Noch um das J. 1810 bego man für ansehnlich Mühen Pflaster Kalken und baumwollenen Tücher, sowie dreißigtausend Stüd Marquin aus den Fabriken von Turnovo. In noch höherem Grade war dieß der Fall in der nur von Griechen bewohnten thessalischen Stadt Ambelakia in der Nähe des Peneusflusses. Das in den dortigen Fabriken gefärbte Baumwollengarn wurde nicht nur in großer Menge bis nach Leipzig und Hamburg versandt, sondern es erstreckte seine Wirkungen bis nach England, so daß die dortigen Fabriken die Concurrenz nicht aushalten konnten. Ueber zwölftausend Arbeiter waren in den Fabriken von Ambelakia beschäftigt, deren es damals vierundzwanzig gab, und wo jährlich dreißigtausend Ballen Baumwollengarn mit sogenanntem Türkisch-rot gefärbt wurden. S. Men, „Zeitschrift“. 1825. Band 1. S. 205 f.

den Städten und bei den Wohlhabenderen, sondern auch in den Arbeiterklassen die Nationaltracht immer mehr verschwindet.

Neben den erwähnten Industriezweigen werden auch sogenannte Fes und andere Kopfschäfte in Griechenland gefertigt. Für den erwähnten Gegenstand gibt es allein in Athen 3 Fabriken, und die Erzeugnisse derselben übertreffen an Farbe und in der Arbeit die von Tunis. Gleichwohl ist ihre Ausfuhr in den J. 1860—1864 höchst unbedeutend gewesen, vielmehr hat die Einfuhr dieses Artikels aus der Türkei in der nämlichen Zeit zum Theil den Betrag von 600—700 Oßka erreicht, zu einem Werthbetrage von 17,000 bis 52,000 Dr.

Für die Seifenfabrikation bestehen seit mehreren Jahren einige Fabriken in Piräus und Syra. Sind auch ihre Erzeugnisse nicht von ausgezeichneter Güte, so hat sich doch die Einfuhr dieses Artikels aus dem Auslande bedeutend vermindert. Während im J. 1858 noch 4264 Ctr. Seife zum Werthe von 225,712 Dr. eingeführt wurden, hatte sich dieser Betrag im Jahre 1862 auf 2857 Centner und 161,254 Dr. verringert. Dagegen war auch in den J. 1860—1864 die Ausfuhr, die meist nach der Türkei stattfand, bedeutend gestiegen. Während im J. 1860 nur 119 Ctr. Seife zu einem Werthbetrage von 8260 Dr. ausgeführt wurden, betrug die Ausfuhr im J. 1863 4823 Centn. zu 331,228 Dr. und 1864 3625 Ctr. zu 156,881 Dr. Auch in Korfu gibt es acht Seifenfabriken, die im J. 1862 1484 Ctr. zu 71,148 Dr. Werth nach Griechenland einfuhrten.

Das Töpferhandwerk wird hier seit langer Zeit betrieben, namentlich zur Verfertigung von Dachziegeln. Nachdem vor einigen Jahren in Athen eine Töpferwerkstatt errichtet worden war, hatte sich dieser Industriezweig mehr entwickelt, und er lieferte bessere Fabrikate, besonders auch viele Arten von Gefäßen zum häuslichen Gebrauche, die früher vom Auslande bezogen wurden. Auch in andern Theilen des Landes, namentlich auf den Inseln Siphanto (Siphnos), Aegina und in Xerohori auf Euböa wird dergleichen Töpferwaare gefertigt. Eine Ausfuhr dieser Thonwaaren fand nur nach der Türkei statt; indeß hatte sich der Betrag von 292 Ctr. zum Werthe von 3697 Dr. im J. 1860 im J. 1863 auf 17,278 Ctr. zu 208,004 Dr. und 1864 auf 7322 Ctr. (?) zu 6208 Dr. (?) gesteigert.

Zur Mehlfabrikation dienen seit einigen Jahren in Athen und Piräus fünf Dampfmaschinen, die zusammen 117 Pferdekraft haben und mit gutem Erfolge arbeiten, indem sie jährlich über zehn Millionen Oßka gereinigtes Mehl liefern. Auch in Syra gibt es vier Dampfmahlmühlen, und an andern Orten werden Wind- und Wasserkraft, auch Pferde zu diesem Zwecke benützt. Besondere Mädel- und ähnliche Fabriken bestehen auch in Athen Syra, Patras und Korfu. Eine Ausfuhr von Mehl fand vorzüglich nach der Türkei statt, und im Allgemeinen erhob sie sich z. B. im Jahre 1861 auf 42,971 und 1864 auf

34,406 Oßka. Dagegen wurden in den J. 1859—1864 auch beträchtliche Quantitäten Mehl besonders aus Oesterreich, Frankreich und der Türkei eingeführt, die im J. 1860 859,672 Oßka zu 434,112 Dr., 1863 501,477 Oßka zu 279,776 Dr. und 1864 435,818 Oßka zu 271,034 Dr. betrugen.

Wachsfabriken gibt es in Athen fünf, in Piräus eine und in den Hauptstädten der übrigen Nomarchien bis zu drei, im ganzen ungefähr dreißig. Sie verwenden ein Drittheil Wachs und zwei Drittheile Spermaceti, was dann, in Linsen gegossen, meist im Inlande Verwendung findet. Die Ausfuhr war in den Jahren 1859—1864 unbedeutend, dagegen stieg die Einfuhr im J. 1863 bis zu 80,663 und 1864 bis 70,616 Oßka zum Werthe von 333,087 und 290,433 Dr.

Die Topographie wurde bald nach dem Ausbruche des Unabhängigkeitskriegs in Griechenland zu öffentlichen Zwecken, Bekanntmachungen der Regierung u. s. w. eingeführt, und es gab Buchdruckerien seit 1821 in Kalamata, später in Missolonghi, Nauplia, Korinth, Epibaurus, Hydra und Athen (auch in Aegina), neben lithographischen Anstalten. Gegenwärtig bestehen in Athen gegen vierzig Buchdruckerien; auch gibt es deren in einzelnen Hauptstädten der Nomarchien und Eparchien. Die Nationaldrucker in Athen, die mit den vorzüglichsten Druckerpressen versehen ist, auch Dampfpressen und eine eigene Zopengießerei besitzt, beschäftigt täglich sechzig Arbeiter. Außerdem befinden sich dort noch fünf andere Zopengießereien mit Matrizen griechischer und lateinischer Buchstaben. Die Holzschnelldruckerei und der Stein- und Kupferdruck sind bereits seit längerer Zeit in Griechenland eingeführt, und besonders erstere wird in der Politechnischen Schule vorzugsweise gelehrt. Auch die Buchbinderei hat seit den ersten Jahren des Unabhängigkeitskrieges nicht unbedeutliche Fortschritte gemacht, und in Athen gibt es deren nicht weniger als zehn. Ebenso ist die Photographie in Griechenland eingeführt, wo allein in Athen gibt es sechs photographische Anstalten.

Die Fabrikation von Möbels ist im Lande sehr verbreitet, und nur in Athen befinden sich über zwölf Tischlerwerkstätten, in denen auch Arbeiten dieser Art gefertigt werden. Gleichwohl werden Erzeugnisse fremder Industrie noch in bedeutender Menge eingeführt, wofür im J. 1858 415,419 und noch im Jahre 1863 245,351 Dr. bezahlt wurden.

Was die Fossilien Griechenlands anlangt, so will ich nur Einiges davon anführen, um dadurch Gelegenheit zu geben, die reichen Schätze kennen zu lernen, die sein Boden auch unter der Erde besitzt, denn im Uebrigen erschwert die griechische Nomenclatur der Fossilien, ohne die besonderen technischen Kenntnisse, gerade hier das Verständniß in hohem Grade.

Braunkohlen (*καυράνθρακες*) finden sich an verschiedenen Orten von Euböa, sowie in den Eparchien Phthiotis, Akar-

nanien und Böotien. Die besten sind die von Kumi an der Mündung des Euböas. Bei ihrer Verwendung auf den Dampfschiffen hat sich ergeben, daß ihr Verhältniß zu den englischen in Ansehung des Hitzegrades wie 2 : 1 ist. Anthracit wird in geringer Ausdehnung bei den Thermopolen, dagegen Torf bei Theben gefunden. Auf Steinkohlen (*Ανθρακας*) ist man beim Graben eines artesischen Brunnens in Piräus gestoßen. Thonschiefer findet sich im Peloponnes in der Eparchie Kalavrita, sowie in Kalkanien, Schwefel in großer Menge auf der Insel Milo, desgleichen auf Ikra (Santorin), in Attika beim Dorfe Eusali und im Peloponnes in Apparisia und Elis.

Gold ward im Alterthum auf der Insel Siphnos (*Σιφναντος*), ebenso auf Naxos gefunden; heutzutage hat man nur auf der Insel Steros reinen Goldsand im Sande eines Baches gefunden.

Kupfer gibt es, theils rein und für sich bestehend, theils mit anderen Metallen vermischt, auf den Inseln Skopelos, Zinos und Milo, ebenso in Euböanien, Karpstien und Olompiä.

Schwefelhaltiges Blei (Weiglantz) wird gefunden auf den Inseln Kos, Sciphos, Anaphe und Zinos, sowie im laurischen Gebirge (in Attika).

Eisenhaltige Metalle kommen in großen Massen auf dem Festlande, im Peloponnes und auf den Inseln, einzeln und gestreut oder in ganzen Lagern, in Adern und in verschiedenem Zustande der Oxidation, vor. Schwarzbraunstein findet sich auf Milo, Syra und im laurischen Gebirge, Kalk auf Syra, Paros und Euböa.

Von Marmor gibt es in Griechenland an vielen Orten verschiedene Arten. Weißer, durchsichtiger, feinkörniger findet sich auf Paros, der sich leicht bearbeiten läßt, ebenso daselbst auf in Naussa grobkörniger; verschiedene Marmorbrüche mit weißem, rothlichem, schwarzweißem und blauweißem Marmor, auch Serpentin (*Opbit*) hat Zinos; schönsten feinkörnigen Marmor liefert Paros, weißer mit grünem und rothen Streifen findet sich im Pentellongebirge, schwarzer, rothger, grauer und grünlicher in Racedämon, weißer auf Steros.

Weitere Arten von Mineralien und Gestein sind: Braunkain auf Euböa, rothweißer und feinkörniger Granit auf Sciphos, Trachyt auf Ikra und Milo, Glimmerschiefer auf Andros und Zinos, Schiefersteine in Phytotis, lithographischer Kalkstein in Messenien, auf der Inselgruppe der Makren bei Paros, in Monemvasia im Peloponnes und auf Leutadien, dessen Güte der der schönsten lithographischen Tafeln Europa's gleichkommt, Mergel auf Euböa in der Nähe von Kumi, Tuffstein auf Ikra, Milo und Kimo, Marmor-Steinplatten auf Sikinos, Glimmerschieferplatten auf Andros, Thonschieferplatten auf Amorgos, Kalksteinplatten in Kumi. In Messenien werden Platten von ähnlicher Beschaffenheit wie auf Malta gefunden.

XL.

Mühlsteine gibt es auf Milo und Kimo, Schmelgel auf Paros \*), Paros und in Lakonien, Feuersteine auf Siphantos, Paros, Syros und in Kalkanien, Sandstein im Hafen von Phaleron, auch an anderen Orten, Magnetstein bei Patras, Halbsopal bei Theben, auf Milo und an anderen Punkten, Zaspis, rothen und grünen in Lakonien, von verschiedenen Farben in Argolis, auf Milo, Kimo u. s. w., Obsidian und Bimsstein auf Milo, Aetzel auf Euböa, Amiant ebenfalls, auf Anaphe und Andros, Zeibspath auf Anaphe, Paros, Paros und an anderen Orten, Gyps auf Milo, in Sparta, Arkadien u. s. w., Meerchaum in Theben.

Bei Aufzählung des fossilen Reichthums Griechenlands und seiner Verwerthung zu industriellen Zwecken kommen auch die umfangreichen Schladenbergsteine der laurischen Gebirge besonders in Betracht. Die Aufschmelzung derselben hat die griechische Regierung einer französischen Gesellschaft überlassen, die vor etwa zwei Jahren mit beträchtlichen Kapitalen ihre Arbeiten begann. Sie hat im laurischen Gebirge (in der Landschaft Lauriotte) im Dorfe Ergasteri 12 künstliche Schmelzöfen errichtet, die durch drei Dampfmaschinen von 22—30 Pferdekraft in Thätigkeit gesetzt werden, auch viele Fabrik-, Wohn- und Wirtschaftsgebäude zur Verrichtung des Unternehmens, nebst verschiedenen Niederlagen, Eisengießereien, Holzwerkstätten u. s. w. aufzuführen lassen, nicht minder für den Bau von Hafendämmen, Fährstraßen und steinernen Brücken, für Wasserbehälter und Wasserleitungen Sorge getragen, Brunnen graben lassen und Moräste ausgetrocknet. Beim Ausgraben, Reinigen, Fortschaffen und Schmelzen der Schlacken sind täglich gegen 1200 Arbeiter gegen ein Tagelohn von 2½ bis 4 Dr. beschäftigt, wobei noch außerdem gegen 400 zweirädrige Karren für ein Tagelohn von 6 Dr. zur Fortschaffung der Schlacken vom Orte ihrer Ausgrabung bis zu den Schmelzöfen verwendet werden. Nach den Büchern der Gesellschaft waren auf das Unternehmen bereits 3,444,053 Dr. verwendet worden, und der Gesamtbetrag der aufgeschmolzenen Schlacken berechnete sich zu 80,408,200 Tonnen (1 Tonne = 800 Pfla), in denen 5,298,148 Tonnen reines Blei gewonnen worden waren, die Tonne zu 455 Drachmen. Zum Zwecke der Aufschmelzung werden jährlich gegen 15,000 Tonnen Coaks und gegen 5000 Tonnen Steinkohlen aus Newcastle verwendet.

Die an verschiedenen Stellen aufgeschauften Schlacken des laurischen Gebirges sind zu einem Gewicht von 1,474,699,641 (Tonnen?) berechnet worden, und ihre Aufschmelzung würde, bei vorausgesetzter Thätigkeit von 15 Schmelzöfen, in etwa 10 Jahren vollendet sein können.

\*) Noch im November 1868 ward das siebenjährige Renouvel der Aukende des so wichtigen und massenhaft vorhandenen Schmelzgel auf der Insel Paros unter sehr günstigen Bedingungen an das garantierende Bankierhaus Erlanger von der griechischen Regierung genehmigt.

Der daraus zu gewinnende reine Meiertrag soll zu etwa 120,000 Tonnen berechnet sein; aber entweder ist dies irrig, oder es hat sich in Ansehung der obengedachten 5,298,148 Tonnen ein Irrthum in den Angaben des Verfassers der in Rede stehenden „*Μετρηγορία*“ eingeschlichen.

Bei dieser Gelegenheit bemerkt übrigens Letzterer am Schlusse seiner Mittheilungen über die Industrie in Griechenland, daß die im lausischen Gebirge entwickelte industrielle Thätigkeit nicht bloß der Gewinnung der in den alten Silberbergwerken zurückgelassenen Schätze zu gute gegangen sei und zu gute gehe, sondern daß diese ganze Unternehmung, aus dem rein gesellschaftlich-industriellen Gesichtspunkte betrachtet, den großen Vortheil gewähre, daß, indem es jenen von Alexander eben und unfruchtbaren Strich Landes zu einem Herde industrieller Thätigkeit und Nützlichkeit umgewandelt, der nun von Fahrstraßen durchschnitten ist und von seinen dürren Meerestüften aus seine reichen Schätze als wichtigen Gegenstand des Handels ausführt, dieser Landstrich mit der Zeit zum Mittelpunkt eines bedeutenden Handels werden und hier einer der blühendsten griechischen Handelsplätze entstehen könne, deren die neue Civilisation auch in Griechenland in's Leben zu rufen verheißt.

Auf den griechischen Handel kommt der Verfasser im letzten Kapitel zu sprechen, und er ist über diesen Gegenstand am ausführlichsten (von S. 129—208). Die denselben regelnde Gesetzgebung beruht auf dem Grundsatze einer wohlverstandenen Handelsfreiheit, den bereits im zweiten Jahre nach der politischen Erhebung Griechenlands die erste Nationalversammlung von Epidaurus im Januar 1822 aussprach, und den die späteren Nationalversammlungen, so wie die nachfolgenden Regierungen bestätigten. Der Handelszweigende und die Handelsbegleitungen unterliegen in Griechenland keiner Beschränkung und genießen jeden Schutz und jede Unterstützung. Die bestehende Gesetzgebung gewährt der Handelsseelschaft und den Handelsinteressen alle Sicherheit und bezweckt ihre freie Entwicklung und jeden Fortschritt des Handels. Sie erleichtert die Gewährung von Darlehen zum Besten der Schifffahrt und sichert die Interessen der Versicherungsgesellschaften. Die Zollgesetzgebung befolgt die Grundsätze des Freihandels, sie schützt die internationalen Handelsbeziehungen des griechischen Volkes und leistet der inländischen Produktion den erforderlichen Schutz auf der Grundlage der wohlverstandenen Handelsinteressen.

Der inländische Handel unterliegt in Griechenland nur der Entrichtung der gesetlichen Gemeindeabgaben für die innerhalb der Gemeinde zum Verbrauch eingeführten Waaren. Diese Abgabe übersteigt nicht den Betrag von 2 Proc. des Werths, und sie betrug im J. 1859 843,699, dagegen im J. 1865 945,408 Dr. Davon kamen die höchsten Sätze im erstgenannten Jahre auf die drei Nomarchien der Epiladen, Euböa, Attika und Böotien, im zweiten auf die der Epiladen (saß die Hälfte des Gesamtbetrags) und At-

tika mit Böotien, die niedrigsten Sätze dagegen in beiden Jahren auf Lakonien und Arkadien.

Es gibt in Griechenland seit 1836 zehn Handelskammern: in Nauplia, Patras, Spira, Athen, Kalamata, Larnia, Chalkis, Korfu, Zante und Cephalonia. Eine jede besteht aus sechs ordentlichen und drei außerordentlichen Mitgliedern, die von der Regierung aus einer vom Handelscollegium der einzelnen Stadt aufgestellten dreifachen Candidatenliste gewählt werden. Sie haben im Wesentlichen die Pflicht, die Regierung über die einzelnen Gegenstände aufzuklären, die sich auf den Handel beziehen und von Wichtigkeit für ihn sind. Sie haben daher der Regierung ihre Ansichten, ihre Wissenschaft und Erfahrungen über die Handelsinteressen zu eröffnen, die Ursachen darzulegen, welche die natürliche Entwicklung des Handels verhindern, und die Mittel und Wege zu bezeichnen, wie letzterer nach Maßgabe der allgemeinen Finanzgrundsätze aufzuheben sei. Ebenso sind sie berufen, theils über die öffentlichen Arbeiten und Anstalten, welche den Handel betreffen, z. B. die Reinhaltung und Erhaltung der Häfen, Kanäle, Lazaretts, Dämme, Eisenbahnen (?), ferner über die Handelsseelschaft und die Handelskassen, theils über die Ausführung der Zollgesetz und diesfälligen Verordnungen zu wachen.

Was in Griechenland die Handelswissenschaft und den Unterricht in ihr anlangt, so ist sie seit den Jahren 1856 und 1857 als Unterrichtsgegenstand in den beiden Gymnasien in Spira und Patras, diesen beiden besonders wichtigen Handelsplätzen des Landes, eingeführt, und es werden daselbst zu diesem Zwecke die wesentlichen Handelslehren, die Elemente des Handelsrechts, die doppelte Buchführung und Handelsgeographie gelehrt.

Handels(Jahr)märkte sind durch ein Gesetz der Regierung schon seit längerer Zeit in einzelnen Städten und Landgegenden eingeführt worden, die in der Regel 3—8 Tage, ausnahmeweise jedoch auch 9, 10 und 12 Tage dauern. Seit dem Jahre 1847 bis 1867 sind deren an 29 verschiednen Orten eingeführt und abgehalten worden.

Von besonderer Wichtigkeit für den Handel sind die beiden Creditanstalten, welche Bankseine ausgeben, die Nationalbank in Athen und die Ionische Bank in Korfu. Namentlich über erstere, über ihre Verfassung, ihre Geschichte und Ergebnisse ist der Verfasser des griechischen Buches sehr eingehend (S. 141—167). Die Nationalbank in Athen begann ihre Thätigkeit bereits im Januar 1842 und setzte sie ungehindert bis zum J. 1848 fort. Die politischen Ereignisse dieses Jahres wirkten auch auf Griechenland nachtheilig und gefährdeten die Existenz der Bank; aber sie hat sich gleichwohl mit den günstigsten Erfolgen fortwährend zu behaupten gewußt. Ihre Dividende ist nie unter 7 Proc. gewesen, vielmehr hat sie meist mehr betragen, und namentlich seit 1860 ist dieselbe stetig gestiegen,

trogdem, daß das Actienkapital bedeutend vermehrt worden war.

Die Ionische Bank ward im Jahre 1840 errichtet, aber es fehlt an den nöthigen Mittheilungen zur Uebersicht und Beurtheilung der Erfolge, die sie gehabt hat.

Für die Errichtung von Handelsgesellschaften und Vereinen in Griechenland sind die Verhältnisse nicht besonders günstig gewesen. Der alte, im Wesen der Gesellschaft und eines jeden Staats begündete, aber in neuerer Zeit durch die Verhältnisse und Interessen der Kultur, sowie durch die Bedürfnisse und Fortschritte der Gesellschaft in seinen Zwecken und Richtungen erweiterte und tiefer, gegründete Associationsgeist ist in Griechenland noch nicht sehr entwickelt, obgleich seine Nothwendigkeit anerkannt ist. Auch sind seit dem J. 1836—1837 58 solcher Handelsgesellschaften entstanden, von denen jedoch außer der Nationalbank und der Dampfschiffahrtsgesellschaft in Syra nur noch 29 bestehen. Die meisten derselben waren (14 u. 11) und sind noch jetzt (12 u. 6) in den beiden ersten Handelsstädten Griechenlands, nämlich in Hermupolis auf der Insel Syra und in Patras. Von jenen 27 eigentlich nur Versicherungsgesellschaften gegen Gefahren zur See, aber einige davon gewähren auch Schiffsdarlehen und discontiren Handelspapiere; die beiden andern sind die Feuer- und Seeschäden-Versicherungsgesellschaft in Athen unter dem Namen „Phönix“ und die „Gesellschaft der griechischen Weinfabrikation“ in Patras (3). Erstere hat ein Actienkapital von 3 Mill., die andere von 2 Mill. Dr., auf welche letztere jedoch erst 566,000 Dr. eingezahlt sind. Was die übrigen 25 Actiengesellschaften betrifft, deren Actienkapitale über 17 Mill. Dr. betragen, so sind auch auf diese im Ganzen nur etwas über 2 Mill. eingezahlt worden.

Auch der auswärtige Handel beruht ebenso auf dem Grundsatze der Handelsfreiheit, wie die Handelsverträge, welche Griechenland mit 14 Staaten in Europa (unter denen jedoch noch zur Zeit Frankreich und Oesterreich fehlen), mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika und mit Persien abgeschlossen hat, und welche den allgemein anerkannten Grundfragen der Staatsökonomie und Handelsgesetzgebung entsprechen, namentlich die unbeschränkte Gegenseitigkeit und Gleichheit der fremden Unterthanen und Schiffe mit den eigenen anerkennen und aussprechen. Nur die Küstenschiffahrt macht davon eine Ausnahme und bleibt, in Gemäßheit der internationalen Verträge auch der am besten geordneten Staaten, lediglich den Eingeborenen vorbehalten.

Ueber die Bewegung des Handels von Griechenland in den einzelnen Jahren, theils in Betreff der Einfuhr und Einfuhr und der diesfälligen Gegenstände beider, theils in Ansehung der dabei in Betracht kommenden Länder, sind die Mittheilungen des griechischen Reichs ebenso speciell und ausführlich, als von besonderem Interesse. Es ergibt sich aus den Bemerkungen des Verfassers, in Verbindung

mit den dazu gegebenen Handeltabellen, daß Einfuhr und Ausfuhr in den Jahren 1858 bis 1864 sich fortwährend bedeutend vermehrt haben, und er hält sich im Allgemeinen zu der Erklärung für berechtigt, daß „trotz aller Gegenwirkungen der internationalen Interessen das kleine Königreich Griechenland nicht aufhören werde, jeder Kultur und Civilisation, deren alleiniger Heerd es für das Morgenland ist, auch ferner Nahrung zu liefern“. Die gedachten Tabellen über die erwähnten sieben Jahre legen in der klaren und unmissherrlichen Weise die Fortschritte und die Entwicklung des auswärtigen griechischen Handels dar.

Der Werth der Einfuhr des Gesamthandels erreichte im J. 1858 eine Höhe von über 44 Millionen Dr., und er war im J. 1864 fast beinahe auf 61 Millionen Dr. gestiegen. In gleicher Weise wies die Ausfuhr im ersten J. einen Werthbetrag von mehr als 28 Millionen und im letzten Jahre von mehr als 31 Millionen Dr. aus, und demnach war die Einfuhr fast um 40, die Ausfuhr dagegen ungefähr um 10 Proc. gestiegen. Die meiste Ausfuhr fand in den J. 1859 und 1864 (worüber allein hier Tabellen vorliegen) nach England, der Türkei, Frankreich und Oesterreich statt, und ebenso war auch die höchste Einfuhr aus diesen Staaten.\* Dagegen kam auch nach und aus diesen Staaten der Ausfuhrhandel Griechenlands dem Einfuhrhandel ziemlich gleich.

Als der wichtigste Gegenstand der Ausfuhr nach England erscheinen hier die Korinthen; nach der Türkei gingen meist Kupfer, Gell und Öl, nach Frankreich Tabak, Cocos und Seide, nach Oesterreich Krapp, Feigen und Getränke, außerdem nach Amerika Korinthen und Feigen, letztere, so wie Weine auch nach Rußland, nach Italien Knopfern und nach Belgien Schmelz.

Was die Ionischen Inseln und deren auswärtigen Handel anlangt, so finden sich darüber genauere Angaben nur aus den Jahren 1861, 1862 und 1863. Die Einfuhr betrug im ersten und letzten J. gegen 31 Millionen und im J. 1862 gegen 32, dagegen die Ausfuhr im J. 1861 über 22, im J. 1862 über 27 und im J. 1863 über 23 Millionen Franken. Die meiste Einfuhr fand aus Rußland (fast ein Drittel des ganzen Einfuhrhandels), der Türkei, England, Oesterreich und Frankreich statt, und ein gleiches Verhältniß ergiebt sich auch, mit Ausnahme von Rußland, für die Ausfuhr.

\*) Aus der mit vorliegenden Schrift: „La Turquie ou la Grèce“, pag. 52 bemerkt ich ergänzend, daß im Jahre 1862 Griechenland vom Rußland Waaren im Werthe von 41,123,473 Dr. erhielt und im Werthe von 23,029,048 Dr. ausfuhrte. Von der Einfuhr kamen auf England 10,518,752, auf Frankreich 9,928,018, auf Oesterreich 7,069,716 und auf Rußland 1,888,270 Dr. Dagegen bezog England für 13,403,589, Oesterreich für 3,402,483, Frankreich für 1,265,062 und Rußland für 365,840 Dr. Waaren aus Griechenland.

Von hoher Bedeutung für Griechenland und für seinen Handel ist seine Handelsmarine. Der auswärtige Handel wird hier fast nur zur See betrieben und zwar größtentheils durch eigene inländische Fahrzeuge. Mit ihm beschäftigt sich ein großer Theil der Insularischen Bevölkerung und der Bewohner der Küstengegenden des Landes, und diese nationale Handelschiffahrt begreift zugleich die mächtigste und werthvollste Industrie des Landes in sich, welche im gleichen Grade die inländische Produktion kräftigt und unterstützt, wie sie zur Entwicklung des Nationalhandels beiträgt.

Für den Unterricht in der Handelschiffahrt ward von der Regierung gebührend Sorge getragen, indem sie bereits im J. 1837 an den hellenischen Schulen von Syra und Nauplia die Theorie der Schiffahrtskunde unter die Lehrgegenstände mit aufnahm und noch im April 1867 die Errichtung von fünf Schiffahrtsschulen in Syrakus (auf der Insel Syra), in Hydra, Spessa, Salaziti (an der Nordküste des ionischen Meerbusens in der Nomarchie Phthiotis und Phocis) und Argosoli auf Cephalonia anordnete.

In gleicher Weise sorgte die Regierung für die Reinigung und Ausbesserung der vorzüglichsten Häfen des Königreichs, sowie für den Bau neuer. Solcher bereits seit 1833 vorhanden gewesen und neuerrichteter Häfen von einiger Bedeutung zählt Griechenland, mit Ausschluß der Ionischen Inseln, folgende fünfzehn: Piräus, Spessa, Nauplia, Koron, Apparisi (in Lakonien), Katakolon und Kalamata (beide in der Eparchie Elis an der Westküste der peloponnesischen Halbinsel), Patras, Neu-Korinth, Syra, Andros, Stavrós (auf der Insel Euböa), Naxos, Thera (Santorin) und Chalkis. In Ansehung des Hafens von Chalkis kam besonders auch die Regelung und Öffnung der schmalen Meerenge des Euripus für die größeren Schiffe in Betracht, und es handelte sich dabei um Eröffnung eines sichern und kürzeren Seeweges, ohne zugleich in Folge der Verbreiterung der Meerenge die Verbindung zwischen Euböa und dem Festlande zu stören. Wiewohl ward für letztere durch eine eiserne Drehbrücke gesorgt, und das ganze, so wichtige Unternehmen mit einem Kostenaufwande von 952,000 Dr. durchgeführt.

Eine große Menge von Leuchttürmen und Küstenfeuern, die an geeigneten Punkten über ganz Griechenland verbreitet sind, leisten der großen Schiffahrt aller Nationen wie dem einheimischen Küstenhandel wesentliche Dienste.

Was den Zustand und Umfang der Handelschiffahrt Griechenlands anlangt, so besaß letzteres im Jahre 1834 2745 Handelsfahrzeuge, die sich bereits im J. 1838 bis zu 3269 zu einem Tonnengehalt von 85,502 vermehrt hatten. Im J. 1858 betrug ihre Zahl 3920 zu einem Tonnengehalt von 268,600, und seitdem ist sie bis zum J. 1866 bis zu 5156 Schiffen zu einem Tonnengehalt von 297,424 gewachsen. Die Zahl der auf diesen Fahrzeugen beschäftigten Mannschaften betrug im letzten J. 24,049. Griechen-

land nimmt daher unter allen schiffahrenden Nationen nach den nordamerikanischen Freistaaten, England, Frankreich, Schweden und Norwegen, Dänemark und Spanien die nächste Stelle ein.

In Betreff sämmtlicher in den griechischen Häfen in den J. 1859—1864 eingelaufenen und ausgelassenen Schiffe bringt der Verfaßter der „*Μαργογίου*“, zugleich unter Angabe ihres Tonnengehalts, genaue Tabellen bei, und daneben stellt er dann eine Tabelle der darunter befindlichen Schiffe unter griechischer Flagge. Aus der Vergleichung der Angaben beider Tabellen ergibt sich zwar eine Abnahme der Schiffe unter griechischer Flagge im J. 1864 (36,354) gegen 1859 (81,176), aber der Tonnengehalt der im J. 1864 eingelaufenen Schiffe (2,187,264) übertrifft den aus dem J. 1859 (1,539,991) um ein Bedeutendes, und jedenfalls beweist dieser Umstand, mit Hinsicht auf den Bau größerer Schiffe und die innere Entwicklung der griechischen Marine, die Wichtigkeit der griechischen Schiffahrt. Dagegen hatte sich unter den in der Zeit von 1859 bis 1864 eingelaufenen und ausgelassenen Schiffen unter griechischer Flagge die Zahl der Dampfschiffe vermehrt, indem theils im ersten Jahre 1499 Dampfschiffe zu einem Tonnengehalt von 161,377, im letzten dagegen 1973 Dampfschiffe zu einem Gehalt von 1,019,176 Tonnen in griechischen Häfen eingelaufen, theils im Jahre 1859 1501 Dampfschiffe zu 363,930 Tonnengehalt, im J. 1864 aber 1984 Dampfschiffe zu 990,295 Tonnengehalt aus griechischen Häfen ausgelassen waren. Aus andern Staaten waren im J. 1864 im Ganzen 14,344 Segel- und Dampfschiffe zu 1,418,664 Tonnengehalt in griechischen Häfen eingelaufen, dagegen 12,134 zu 1,559,159 Tonnengehalt aus griechischen Häfen ausgelassen. Die meisten davon kamen aus und gingen nach der Türkei, dann einerseits aus Italien, andererseits nach Frankreich, Oesterreich und England.

In Ansehung der Schiffahrt der Ionischen Inseln enthält das fragliche Werk nur kurze Mittheilungen aus den J. 1862 und 1863. Darnach waren im ersten Jahre 988 Schiffe zu 127,763 Tonnengehalt und im andern 1096 zu 145,251 Tonnengehalt eingelaufen, 1006 aber zu 130,308 Tonnengehalt waren im J. 1862 und 1134 zu 150,809 Tonnengehalt im J. 1863 ausgelassen. Die lebhafteste Verbindung fand hier zwischen der Türkei, Griechenland, Oesterreich, Italien und England statt.

Bedeutend war namentlich in den J. 1859—1864 die Küstenschiffahrt zwischen den einzelnen Häfen Griechenlands. Die aufgestellte Tabelle weist aus dem Jahre 1859 eine Zahl von 79,532 eingelaufenen Schiffen zu 1,375,759 und aus dem J. 1864 56,354 Schiffe zu 2,186,553 Tonnengehalt, dagegen an ausgelassenen Schiffen im ersten J. 79,405 zu 1,352,964 und im letzten 47,780 zu 1,880,891 Tonnengehalt nach. Insofern diese Küstenschiffahrt durch Dampfschiffe ausgedehnt wurde, war besonders die Errichtung der griechischen Dampfschiffahrtsgesellschaft von großem Ein-

fuß. Sie begann im J. 1857 ihre Thätigkeit mit vier Dampfschiffen und brüstet gegenwärtig deren elf, von denen sieben Schraubendampfer sind. Im ersten Jahre ihres Bestehens machte sie 49 Fahrten, auf denen sie 15,167 Reisende beförderte, und im Jahre 1865 betrug die Zahl der

Fahrten 456 mit 126,180 Reisenden. Sie beförderte das bei, nach Angabe der schon erwähnten Schrift: „La Turquo ou la Grèce?“ pag. 49, im letzten Jahre 106,692 Waarenballen, 6073 Pakete, und hatte eine Einnahme von 2,398,477 Drachmen.

## Die Gezeiten oder Ebbe und Fluth.

Von Carl Sameling.

„So wahr der Mond am Himmel steht, kommt er einst auf die Erde herab!“ soll ein bewährter Astronom, — ich weiß nicht gleich wer, — ausgerufen haben, und dies wäre in Umschreibung ein weitgreifendes Zeugniß für die Anziehungskraft, welche die Erde auf ihren Trabanten ausübt.

In Wirklichkeit ist der Mond auch in den letzten zweitausend Jahren der Erde um 180 Fuß näher gerückt, und die Verengung seiner Bahn um die Erde beträgt gegenwärtig alljährlich 1 Zoll.

Doch die Erde wirkt nicht allein anziehend auf den Mond, sondern dieser wiederum im Verhältnis zu seiner Größe auf die Erde. Die Wirkung ist eine gegenseitige, und da die des Mondes um ein Bedeutendes geringer als diejenige der Erde sein muß, hat man ihm hauptsächlich das Flügge auf der Erde überlassen und ihm erlaubt, die Bewegung desselben, welche wir Ebbe und Fluth nennen, ausschließlich hervorzurufen.

Es gibt aber im Weltall kein Ereigniß und keine Erscheinung, welche für sich allein und ohne Verbindung mit andern dastände. Jede Erscheinung entspringt einer andern und entbitt in einer dritten, während in ihrem Verlauf noch unzählige andere eingreifen, wie sie selbst auf solche demselben oder fördernd wirkt. Ebbe und Fluth gehören aber gerade zu den complicirtesten Erscheinungen in den Verhältnissen unserer Erde und sind dabei von bei weitem größerer Wichtigkeit für dieselbe, als ein erster oberflächlicher Blick erkennen läßt.

Seit Kopernikus die Erde sich um die Sonne drehen ließ und Galilei sein ebenso berühmtes als sagenhaftes, „Und sie dreht sich doch“, sprach, kam man endlich auf die Spur der Verhältnisse, welche dem Weltall Bestand geben.

Man überließerte der Sonne ihre Planeten, so weit sie bekannt waren, und wies diesen ihre Bahnen um die Sonne an; man entdeckte mehr der Planeten, immer entferntere, größere, sonderbarer gestaltete, mit halben Duzenden von Neben-Planeten oder Monden, bis erst vor nicht zu langen Jahren auch der Neptun entdeckt ward, welcher, nur die Kleinigkeit von 620 Millionen Meilen von der Sonne im Mittel Laufe seiner Bahn entfernt, diese Bahn von

3800 Millionen Meilen in 166 Erdjahren zurücklegt. Ob aber damit bereits der entfernteste von den Planeten unserer Sonne aufgefunden worden, das ist sicher fraglich.

Längere Zeit blieb man jedoch der Ansicht, daß die Sonne als Centralpunkt ihres Systems feststehe, höchstens sich um sich selbst drehe und dadurch ihre Planetenschar, vermöge vereiniger Schwingung und Anziehungskraft in Bewegung setze.

Doch auch dies bewies sich als ein Irrthum; man erkannte, daß sich die Sonne ebenfalls in weitem Bogen fortbewege, und seit man herausgerechnet, daß sie ihre Bahn erst in 1166 Millionen Jahren zurücklegt, seit man erkannt, daß die Erscheinung, welche wir Milchstraße nennen, eine linsenförmige Anhäufung solcher für uns unzählbarer Sonnensysteme ist, es außer derselben aber noch viele andere dergleichen gibt, hat man zwar nicht gerade einen Begriff von der Größe des Weltalls, aber doch einen Vorgeschmack von Ewigkeit in der Zeit und Unendlichkeit im Raume bekommen.

Indessen haben wir es hier nicht mit dem ganzen Weltall, sondern nur mit unserm Sonnensystem und auch mit diesem nur theilweise für unsere Zwecke zu thun.

Auch dies System hat die Form einer Linse, da die elliptischen Bahnen der Planeten, so ziemlich in derselben Ebene liegen und in dieser Weise von der Sonne, die alle unwandelbar zusammenhält und lenkt, fortgeführt werden. Die Anziehungskraft der Sonne muß also jede andere in diesem Raume vorkommende überreffen und eine sehr bedeutende sein.

Demnachtrachtet macht sich auch die Anziehung der Planeten auf einander geltend und bewirkt ein Schwanken in den Bahnen, das zum Theil schon durch die Verschiedenheit des Abstandes derselben von der Sonne hervorgerufen wird, und welches nicht ohne Einwirkung auf die planetarischen Erscheinungen, besonders diejenigen unserer Erde bleibt, welche ohnehin schon in stetem häuslichen Kriege mit dem Monde liegt, der sie irritirt, wie sie ihn allerdings noch bei weitem mehr beunruhigt.

Deshalb taumeln beide schwankend um die Sonne fort, wobei die Erde in der Sonnennähe im Winter gelinde zu eilen anfängt und im Salopp vorwärts geht, ohne sich



viel an den Mond zu kehren, mit dem sie ein halbes Jahr später, im Sommer, ihren Strauß heftig auskämpft, indem sie ihn so weit zu sich heranholt, daß wir seine Annäherung schon mit unbewaffneten Augen an der großen erscheinenden Scheibe desselben zu erkennen vermögen.

Es sind nur drei Planeten, um deren auf die Erde einwirkende Anziehungskraft wir uns hier kümmern wollen, nämlich die beiden unteren, Merkur und Venus, und der zur unteren Gruppe gehörige, aber weiter als die Erde von der Sonne entfernte Mars, die sämmtlich in ihrem Bau mit der Erde eine gewisse Ähnlichkeit haben, wie sie auch dieselbe Dunsthülle oder Atmosphäre zu haben scheinen.

Die Begegnung mit diesen Planeten vermehrt, wie bemerkt, das Hin- und Wieder-Schwanken der Erde auf ihrer Bahn, und dieser wechselnde Taumel kann ebenfalls nicht ohne Einfluß auf die nachbigigen Gesamtmassen derselben, also Wasser und Luft, bleiben.

Mit der momentan ausgeübten Anziehungskraft übt die Einwirkung der Planeten auf die Erde jedoch zu Ende, da ihr Licht wegen zu großer Entfernung keine Bedeutung für dieselbe hat. Doch man sieht, daß der frühere Wahn, wonach die Planeten auf das Leben der Individuen einwirkten sollten, weniger ein krasser Aberglaube, als vielmehr ein instinktives Gefühl gewesen zu sein scheint, welches nur im Gegenstande irrte.

Der Mond wirkt außer seiner Anziehungskraft auch noch durch sein Licht auf die Erde und zwar so bedeutend, daß man ihn, nachdem ihm früher eine zu große Wichtigkeit beigelegt worden, später lediglich zum Lebelaternenträger der Erde machen wollte, was denn doch zu wenig war. Auch auf ihn stützen Wahn, Aberglaube und Betrug allerlei Luftgebilde, die jedoch eben so thöricht waren, wie die angeblichen Beziehungen der einzelnen Menschen zu gewissen Planeten oder umgekehrt.

Die Einwirkung der Sonne auf die Erde geschieht durch nicht weniger als vier Factoren direct und durch eine Anzahl indirecter, die wir noch lange nicht alle kennen. Jene ersten sind: Anziehungskraft, Schwerkraft, Licht und Wärme. Zu den andern gehören vermuthlich das Zodiacallicht, die Zuführung von Kometen oder Meteoriten, die Berührung mit Kometen u. s. w.

Die Rotation der Sonne steht jetzt ebenfalls fest; sie bewirkt die Drehung um ihre Axe in 25 Tagen 14 Stunden, und diese Axe hat eine geringe Neigung gegen die Ekliptik, die Ebene, in welcher die Planetenbahnen liegen, nämlich eine Neigung von nur  $7\frac{1}{2}^{\circ}$ .

Diese Drehung um die eigene Axe ist auch allen Planeten eigen und bedingt bei ihnen den Wechsel von Tag und Nacht. Nur der Mond — und vermuthlich auch alle Monde — darf der Rotationsneigung aller Himmelskörper nicht nachgeben, so viel Luß er auch dazu zeigt, sondern kehrt, wie ein gut gezogener Diemer seiner Perzin, der Erde stets sein Gesicht zu. Dazu zwingt ihn die Anzie-

hungskraft der Ersteren, und dies mag uns einen Beweis liefern, wie bedeutend stärker diese als die des Mondes gegen die Erde ist.

Daß der Mond Wirkungen auf die Erde ausübt, ist ganz unleugbar; ja sogar auf gewisse Konstitutionen und Zustände der Menschen scheinen sich dieselben auszudehnen. Die Erscheinung der Monatsüchigen und die Verschlimmerung gewisser Krankheiten bei zunehmendem Monde scheinen das für zu sprechen. Wir sehen ihn den trüben Himmel klären und Wollen zertheilen. Auch bei Frostmettern soll die Kälte mit seiner Hülfe strenger werden. Wo sein erborgtes Licht senkrecht auf die Erde fällt, sollen gewisse Blumen, besonders in den Tropenländern, schneller erblühen. In Afrika wirkt das Lesen bei seinem hellen Lichte leicht erblindend, und es soll eben diesen Erfolg haben, wenn man unbedecktes Gesicht in seinem Scheine schließt. Die Neger verdecken sich vor diesem Scheine, und ihre Jubelnächte sind diejenigen, welche vom glänzenden Sternennichte erhellt werden. Fische, welche seinem Strahl ausgesetzt sind, sollen schneller faulen und, ehe sie noch in Fäulniß übergehen, Gifstoffe entwickeln. Namentlich soll es der Mond sein, welcher die schnelle Fäulniß der vegetabilischen und thierischen Stoffe in den Gewässern veranlaßt, so daß deren Genuß wie die von ihnen ausströmenden Miasmen jene gefährlichen und leicht tödtlichen Krankheiten hervorruft, welche man mit dem allgemeinen Namen der Malaria bezeichnet. Ob der Mond wirklich aller dieser Missethaten schuldig ist, lassen wir dahingestellt sein.

An einer Erscheinung ist er jedoch sicher nicht ganz unschuldig; doch müssen wir zum Verständnis derselben uns erst einige Zustände und Verhältnisse auf unserer Erde vergegenwärtigen.

Die Erdoberfläche besteht hauptsächlich aus drei verwandten Materien, dem Starren, dem Flüssigen und dem Dunstkreis. Alle drei sind durch vermehrte Wärme dehnbar und werden durch vermehrte Kälte zusammengezogen, und zwar im Verhältnis ihrer Dichtigkeit, so daß diese Veränderlichkeit beim Starren am geringsten, bei dem Dunstkreis ober der Atmosphäre am bedeutendsten hervortritt und beim Flüssigen zwischen Weiden liegt.

In ähnlichem Verhältnis stehen auch die Massen der wahrnehmbaren Theile der Materien; die Oberfläche des Starren ist gleich 1, die des Flüssigen gleich 2, die Atmosphäre oder Luft hat jedoch bisher Niemand gemessen und dürfte auch nie Jemand messen können. Ob jenes Verhältnis zwischen dem Starren und dem Flüssigen nur scheinbar oder auch in Wirklichkeit stattfindet, hat für uns keine Bedeutung, desto mehr jedoch, daß Massenbewegungen des Starren nur durch besondere Gewaltakte entstehen, das Flüssige und die Luft dagegen durch leichtere Anstöße in Bewegung kommen und letztere Beide in bei weitem innigerer Wechselwirkung zu einander stehen, als zu dem Starren.

Die Vertheilung des Starren und Flüssigen auf der Oberfläche der Erde ist ebenfalls eine verschiedene, so daß die Erdtheile größtentheils auf der Nordhälfte, die größeren Massen des Flüssigen dagegen auf der Südhälfte sich befinden. Auf Beide aber übt die Atmosphäre eine Wirkung aus, welche man den Luftdruck nennt, und die schwächer wird, je höher die Luft über dem Erdball steht.

Die Verschiebbarkeit ist eine besondere Eigenschaft des Flüssigen und dadurch die Neigung bestimmt, stets das durch atmosphärische und andere Einwirkungen gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen, da es nicht, wie die Luft, elastisch und zusammenzupressen ist. Diese Eigenschaft veranlaßt nun zunächst die verschiedenen Strömungen in der großen Masse des Flüssigen, welche ein eigenes System bilden; jedenfalls aber bewirkt auch der Umformung der Erde, der sonder ihr unregelmäßiger Lauf, eine Neigung zu anderen Bewegungen des Flüssigen, welche nur des requirirenden Factors harren und ihm gern folgen.

Eine unleugbare Thatfache in der Erscheinung unsrer Erdverhältnisse ist der Umstand, daß alle Massenanhäufungen stark nach Kermehrung ringen. Da nun aber das Starre auf der Nordhälfte in ihrem Wachen begriffen ist, so muß demselben die Zunahme des Flüssigen im Süden gegenüberstehen, und Beides kann nur dadurch statthaben, daß die größere Masse des Flüssigen die geringeren Theile derselben zu sich heranzieht, was eine dritte allgemeine Bewegung des Flüssigen bedingt, die besonders bewegten regelnder Factor bedarf, damit sie nicht zu mächtig werde und plötzlich alle bestehenden Erdverhältnisse über den Haufen werfe, sondern einen langsamen Verlauf nehme. Die Wirkung dieser Factoren aber sehen wir in der Wechselbewegung der Gewässer, der Ebbe und Fluth oder den Gezeiten. Die Hauptfactoren bilden jedoch die Sonne und der Mond.

Die Erde vollbringt bekanntlich ihren Lauf um die Sonne in etwas mehr als 365 Tagen; ihre Axe steht nicht senkrecht auf der Erdbahn, und ihre Apendrehung findet in 23 Stunden 56 Minuten 4 Sekunden in der Richtung von West nach Ost statt; der Sonnentag hat jedoch volle 24 Stunden. Der Mond bewirkt seinen ebenfalls elliptischen Lauf um die Erde von Ost nach West in 27 Tagen 7 Stunden 43 Minuten 11 $\frac{1}{2}$  Sekunden; die Mondphasen (Vollmond, erstes Viertel u. s. w.) dauern jedoch 29 Tage 12 Stunden. Seine Bahn verläuft sowohl von der Erdbahn wie von der Richtung der Erdbaxe ab und liegt ungefähr im Zenith von Neu-Holland auf der einen Seite und dem Zenith eines Punktes zwischen Amerika und Europa auf der andern Seite der Erde, wonach man sich dieselbe leicht construiren kann.

Die frühere Annahme ging nun dahin, daß der Mond in directer Anziehung, indem er durch die Drehung der Erde und den eigenen Lauf dieselbe ebenfalls in 24 Stunden ein Mal umkreist, eine kleine Flutwelle im Stillen Ocean hebe und sie zwingen ihm zu folgen. Diese Fluth-

welle soll nicht durch dasselbe Wasser, sondern durch immer neu gehobenes wachsen und sich verstärken, während der Mond selbst über den Stillen Ocean, Afrika, den Atlantischen Ocean, Amerika, bis zum angenommenen Ausgangspunkte zurückgeht. Sie soll ferner durch Widerstand erhöht und gewaltiger werden, von Südafien um Afrika und am Atlantischen Ocean hinaufgehen.

Wichtig ist hierbei der Lauf der Fluth, welche, sich aus dem Stillen Ocean auf Asien werfend, zuerst nach nordwärts weiter zwischen Asien und Amerika den großen Ocean hinauffröme, so daß sie im Allgemeinen auf der nördlichen Halbkugel auch in nordwestlicher Richtung geht.

Nun zieht diese Fluth allerdings ein Mal mit dem Monde oder ihm folgend um die Erde. Sie dauert aber von ihrem Eintritt bis zur Ebbe nur 6 Stunden, und die Ebbe nimmt nur ebensov viel Zeit in Anspruch; Beide zusammen eigentlich währen 12 Stunden 23 Minuten 14 Sekunden, und dann tritt eine neue Fluth ein, ganz wie die erste beschaffen. Wo ist aber inigmis der Mond geblieben? Er weilt entfernt auf der andern Seite der Erde, und somit muß diese zweite Fluth andere Gründe als die Anziehungskraft des Mondes haben. Diese finden wir ein Mal in dem Streben des Flüssigen nach Gleichgewicht, welches die Gewässer auf der dem Monde abgewandten Erdhälfte die frühere Bewegung noch ein Mal, aber schwächer durchmachen läßt, so lange es nur allein wirkt. Das ist jedoch selten der Fall, weil die Sonne häufig an die Stelle des Mondes tritt und die Neigung zur Wiederholung des Phänomens unterstützt, um ebenfalls an Erzeugung von Ebbe und Fluth ihren Antheil zu haben.

Erzeugung von Fluth und Ebbe ist übrigens kein richtiger Ausdruck in diesem Falle; denn die Momente zur Bewegung der Gewässer sind, wie bemerkt, bereits vorhanden; namentlich aber muß wegen der Drehung der Erde von West nach Ost schon der Luftdruck dem Flüssigen eine Neigung, von Ost nach West zu ziehen, verleihen. Später tritt das Ausgleichungsbestreben der großen Masse des Flüssigen, die kurz zuvor durch die letzte Ebbe gehoben ist, hinzu, und dies sind die ersten Ursachen zur wachsenden Verstärkung der Fluth während ihres Ganges von SO. nach NW. auf beiden Seiten der nördlichen Erdhälfte.

Freig ist es nun aber, der Sonne wie dem Monde von vorn herein eine unmittelbare Einwirkung auf die Gewässer, beziehungsweise auf die Hebung des Flüssigen beizumessen. Es ist auch dazu noch erst die Vermittelung eines andern Factors nötig und zwar der Atmosphäre, welche denn doch nicht ganz umsonst die Erde umgibt; denn alle von außen auf die Erde wirkenden Kräfte müssen zuerst auf sie treffen und sich zunächst mit ihr abfinden.

Als gefügigste der drei genannten Materien des Erdballs unterliegt sie denn auch überhaupt den bedeutendsten Einwirkungen von Sonne und Mond, die sie, in Verbindung mit der Erdbewegung, bald dorthin, bald dorthin

treiben, stoßen, jagen und in unruhiger Beweglichkeit erhalten, welche Unruhe wir unter der Bezeichnung von „Winden“ als Luftströmungen hinlänglich kennen und jeden Augenblick wahrzunehmen Gelegenheit haben. Außerdem sind die Sonne wie der Mond noch im Stande, eine Verdünnung und Verdichtung der Luft hervorzurufen.

Der zertheilenden Einwirkung des Mondes auf die Atmosphäre ist bereits Ermähnung geschehen. Er vermag diese verdünnende Zertheilung so wenig durch Wärme wie durch sein Licht hervorzubringen, sondern nur, indem er sie stellenweise an sich zieht, also hebt und damit zugleich ausdehnt, dadurch aber den Druck der einzelnen Luftsäulen auf die Gewässer verringert.

Die Sonne wirkt dagegen außer durch die Anziehungskraft auch noch durch die Wärme auf den Dunstkreis, um ihn zu erleichtern, und das Wasser demüthet sie ihm momentan vergönnte Freiheit nachzulassen und einen erfolgreichen Gegendruck auszuüben. Die Schwere der in Bewegung gerathenen Masse ist hinlänglich, die elastische Luft zusammenzupressen, und dies kommt dem entstehenden Proceß ebenfalls noch zu Hülfe.

Erst nach Ueberwindung des Widerstandes der Atmosphäre tritt eine direkte Anziehung des auf und entgegenstrebenden Flüssigen ein, wodurch es sich denn auch erklärt, daß die Fluth erst ihre volle Höhe erreicht, wenn Sonne oder Mond bereits den Meridian, unter welchem sie steigt, mehrere Stunden vorher passiert haben.

Je nach den verschiedenen Einwirkungen von Sonne und Mond und je nach dem Zusammenfallen ihres Einflusses, treten Ebbe und Fluth verschieden auf. Zur Zeit der Voll- und Neumonde gibt es die höheren Springsfluthen, zur Zeit der Mondviertel die geringeren Nuppsfluthen; von besonderer Höhe sind die Fluthen zur Zeit der Aequinoctien oder Tags- und Nachtgleichen. Gefährlich können fast alle Fluthen werden, die letzteren jedoch hauptsächlich, wenn Stürme sie begleiten, und in Europa haben die Nordsees Küsten darunter besonders damals schrecklich zu leiden gehabt, als die Fluthen noch höher stiegen als heute.

Es ist nämlich schon seit langer Zeit eine allmähliche Verminderung der Fluthhöhen auf der Nordhälfte der Erde bemerkt worden, und dies führt uns auf die allgemeine Abnahme der Gewässer derselben zurück.

Was hier unterseische Strömungen thun, können wir natürlich nicht beurtheilen; daß solche vorhanden sind, ist ganz gewiß. Die Ebbe scheint aber im Norden verhältnißmäßig, wenn auch langsam, stets weiter zurückzuweichen, als die Fluth vorzubringen, und jene daher einen Theil der Gewässer richtwärts anderen Factoren zur weiteren Beförderung nach der Südhälfte der Erde zuzuschieben. Die Ebbe wäre dadurch also der sichtbarste Vermittler dieser Erscheinung.

Schließlich noch ein Wort über den Charakter oder die Prognose der Ebbe und Fluth an den verschiedenen

Küstenformationen, welche das Gebahren während ihres Anbringens und Abzuges bedingen.

Auf flachem, allmählich verlaufendem Sandstrande gleichen Fluth und Ebbe einem riesigen Athem der See; vor- und rückwärtend, nehmen sie Besitz von dem Strande oder geben ihn in dieser Weise wieder auf; manchmal schieszen die Wogen, die eigentlichen Fluthwellen, gleich plötzlich und schnell weit vor, und deshalb ist ein Wellen auf dem Strande nach dem Momente des Eintretts der Fluth nicht ratsam.

Liegen Sandbänke oder Steiriffe vor dem Strande, so geben sich die Gewässer schon milde, bilden Brandungen und stürmen kraus und schäumend heran.

Durchbrochene Felsengesteine lassen sie in ihrer größten Kraft und Wildheit, aber auch Schönheit auftreten, ebenso steile Felsenriffe mit davor liegenden Klippen; keine Ufer ohne diese sehen den ganzen Proceß bei ruhigem Wetter ohne bedeutenden Ungeßüm verlaufen.

An gewissen Stellen bilden Ebbe und Fluth Wirbel, die sogenannten Meeresstrudel, wie den Marz- oder Moskelenstrudel bei den norwegischen Fjorden; doch werden nicht alle Wirbel dieser Art von Ebbe und Fluth, sondern viele auch von den Meeresströmungen oder von diesen und jenen zusammen gebildet. Verwandte Erscheinungen sind die Porroca im Amazonenstrom, der Bore im Fugah, die Wassertratte in der Dorboane, die Strudel der Seinemündung u. s. w.

Die Höhe, bis zu der die Fluthen unter Umständen steigen, ist sehr verschieden, ganz wie die Heftigkeit ihres Andranges. Im Biskajischen Meerbusen gibt es vier Fluthwellen in der Stunde, ebenso viel noch am Anfange des Kanals; doch hier vermehren sie sich schnell und steigen bei Ostende bis auf 12; bei Brigoland gibt es 11, und die Wirkung der Fluth ist in der Elbe bis auf 20 Meilen von der Mündung zu spüren.

Die Aequinoctial-Fluthen erreichen die Bawone eine Höhe von 9 F., bei Briss 20 F., bei St. Malo 36 F., in London 18 F., an der Elbe 12 F., in der Fundan-Bai, zwischen Neu-Scottland und Neu-Braunfchwelz sogar 80 F.

In Europa bietet St. Malo in der Bretagne das reichste und großartigste Bild des Wechsels von Ebbe und Fluth dar.

Zur Ebbezeit liegt die Stadt, von wild zerrissenen Felsen umgeben, weit entfernt vom Meere da; zwischen jenen Felsen erstreckt sich fester, sandiger Boden, auf dem sich Wasserlachen mit Krebsen, Seeakern u. s. w. befinden; auch Muscheln und Seegras sind in Haufen vorhanden. Kurze Zeit später rauscht jedoch die Fluth heran, und die Wogen umfassen die Mauern, ihre Schaumspitzen bis zur völligen Höhe derselben sendend. St. Malo scheint dann eine Insel zu sein, nur durch einen Damm mit dem Lande verbunden, den die wüthenden Wogen jeden Augenblick zu durchbrechen drohen und einzelne Wellen überfluthen. So

ruhig das frühere Bild erschien, so wild und fast Grauen erregend ist jetzt die Scenerie, und von den früher frei gelegten Klippen ragen einzelne mit ihren Spitzen über dem Wasser empor, um durch ihren Bogen entgegengesetz-

ten Widerstand die Wasseroberfläche nur noch ärger tosen und wirbeln zu machen.

Das ist der Unterschied zwischen Ebbe und Fluth bei St. Malo.

## Der Barsch.

Nach dem Holländischen des Dr. J. C. Winkler.

Von Hermann Meier.

Es ist für den sinnigen Naturfreund gewiß ein Augenblick reinen Genusses, wenn er an einem sonnigen Sommermittag am Ufer eines klaren Gewässers sich niederlassen darf. Ueberall Leben, sowohl animalisches als vegetabilisches: hier das gediehene Rohr, die hellgrünen Binsen, die bereichen Wasserrosen, den Kalmus, das Entengrün; dort Wasserinsekten, Raupen und Schmetterlinge, Käfer und Schnecken. Plötzlich erscheint ein Fisch an der Oberfläche des klaren Wassers und bleibt unbeweglich stehen, um nach kurzer Zeit ebenso plötzlich wieder zu verschwinden. Sein Rücken ist goldgrün und dunkelbraun, sein Bauch ist silberweiß, und sein Schwanz und die Flossen sind roth. „Ein Barsch!“ wer kennt ihn nicht? Kein Wunder, daß er allgemein bekannt und beliebt ist; ist er doch der schönste aller inländischen Fische und zugleich auch einer der schmackhaftesten! Fast alle unsere Leser werden ihn kennen, ihn in seinem Element, auf dem Fischmarkt oder auf dem Teller betrachtet haben. Trotzdem glauben wir, daß Einiges über diesen Fisch, über seine Lebensweise, seinen Gang und seine Stellung zum menschlichen Haushalt nicht überflüssig sein wird.

Wir haben bereits angedeutet, daß der Barsch auf dem Rücken grünlich-braun gefärbt ist, während er an den Seiten und am Bauche gelblich silberfarbig glänzt. Nur über seinen Rücken laufen gewöhnlich sechs dunkle, ziemlich breite Streifen oder Bänder, die an den Seiten spitz auslaufen; zuweilen findet man Barsche mit fünf, aber auch mit sieben solchen Bändern an, wiewohl höchst selten, einzelne ganz weiße. Seine Gestalt ist nicht ungeschicklich, kurz und breit; der Kopf ist mäßig groß, der Mund ziemlich geöffnet und der Schwanz sehr beweglich. Schon die Griechen kannten den Barsch und liebten ihn; denn Aristoteles spricht lobend vom Barsch, und Plinius und Oppianus erwähnen seiner. Auch der Römer Aufonius nannte den Barsch *delicia mensarum*. Wenige Fische sind so allgemein verbreitet und zugleich von den Menschen so allgemein geschätzt, als dieser. Auch ist sein Name in allen Sprachen germanischen oder lateinischen Ursprungs fast gleichlautend, so daß der Barsch zu einer Zeit, als die Sprachen noch in der Kindheit sich befanden oder vielleicht nur eine Sprache bildeten, seinen Namen erhalten zu haben scheint.

XL

In Europa findet man den Barsch allgemein; auch in einem großen Theile Asiens wird er angetroffen. Er lebt in der Türkei sowohl, wie in Lappland, in Deutschland und Holland, wie in Sibirien, in den Flüssen Englands und in denen Spaniens. Der Russe fängt den Barsch in den Flüssen, die nordwärts münden, und in denen, die im kaspiischen See und im schwarzen Meere ihr Ende finden. Er ist in den Steppengewässern des asiatischen Russlands ebenso, wie im Rhein und in der Seine zu Hause. In Großbritannien ist er sehr häufig; nur in einem sehr kleinen Theile Europa's — auf den arkadischen Inseln nämlich — hat man ihn noch nicht gefunden, wenigstens schweigt deren Fauna über ihn. Wiewohl unser Barsch in Nordamerika noch nicht angetroffen wurde, so lebt doch in den Gewässern jenes Erdtheils ein näher Verwandter von ihm, der nur so unbedeutend sich von ihm unterscheidet, daß sogar Naturforscher an einem Unterschiede zweifeln.

Der Barsch lebt in jeglichem Wasser, doch am liebsten im süßen, besonders wenn es hell, strömend und nicht gar zu tief ist; doch findet man ihn auch im salzigen Wasser und sogar zuweilen im Meere, an den Flussmündungen und in den Schären an der schwedischen Küste. Seine liebsten Aufenthaltsorte sind Gräben oder Kanäle, die an ihren Ufern mit Rohr und Binsen bewachsen und 3 bis 4 Fuß tief sind; im Winter sucht er tieferes Wasser auf. Im kaspiischen Meere sind zuweilen Tausende zu finden, die aber immer stromaufwärts schwimmen.

Wir werden uns bei einer anatomischen Beschreibung nicht lange aufhalten, weil fast Jeder, der nur will, Gelegenheit hat, den Barsch zu zerlegen. Er hat zwei deutlich von einander getrennte Rückenfloßen; die Strahlen der ersten sind stachelartig und hart, die der zweiten sanft und weich. Die Zunge ist sanft; in beiden Kiefern befinden sich Zähne, auch auf dem vorderen Theile des Kieferbeins und im Gaumen. Die Schuppen sind weich, hart und nicht leicht von der Haut zu trennen.

Der Barsch ist ein ungeschickliches Thier und schwimmt nie in Gesellschaft; nur zur Laichzeit sucht er seines Gleichen auf, während er sonst einsam und abgesondert lebt. Noch mehrere in einem abgeschiedenen Teiche Jahre lang leben, schwimmt doch stets jeder für sich. Seine Art des

Schwimmens weicht von dem anderer Fische ab und ähnelt dem des Hechtes. Der Barsch schießt plötzlich gerade aus, bleibt dann einen Augenblick in vollkommener Ruhe und wiederholt sodann seine frühere Bewegung: er schwimmt also sprunghaft.

Wenn im Sommer viele Larven von *Upulac* und *libellulae* auf dem Wasser schwimmen, und die *Culex pipiens* über dem Wasser tanzt, springt der Barsch aus dem Wasser, sich dieser Thiere zu bemächtigen. In dieser Thätigkeit versteckt er sich unter das Blatt einer Wasserpflanze oder zwischen das Röhricht und schießt dann plötzlich auf seine Beute los. Die Schweden sagen dann vom Barsch: han stinnar er, der Deutsche: er drängt sich; und da der Barsch bei diesem Sprünge aus dem Wasser zu gleicher Zeit mit dem horizontal gerichteten Schwanz auf die Oberflache des Wassers schlägt, so daß es klingt, als ob Jemand auf das Wasser spiege, so schlagen die schwedischen Liebhaber des Barfsch mit dem Finger auf das Wasser, wodurch dieser, im Glauben, einen seiner Kameraden thätig zu hören, sich losen läßt.

Die gewöhnliche Nahrung des Barfsch besteht aus Würmern, Insekten, kleinen Fischen; ja er schont sogar die Jungen seiner eigenen Art nicht. *Harrell* fand in einem Barsch von 10 Zoll Länge zehn andere kleine Barfsche. Er ist im höchsten Maße gefräßig und verursacht dadurch oft selbst seinen Tod. Die von ihm verschluckten Stacheln (*Gasterosteus trachurus*) strecken nämlich ihre Stacheln aus und bleiben ihm dadurch in der Kehle oder im Schlunde stecken, so daß sein Tod herbeigeführt wird. Nach *Lacépède* frist er auch junge Schlangen, Frösche und sogar junge Wasserratzen.

Erst im dritten Jahre laicht der Barsch, und er hat alsdann seine Größe auf 10 — 12 Zoll gebracht.

Wie lange der Barsch fortwächst, ist nicht bekannt. Sowohl in Deutschland, wie in Frankreich und in der Schweiz erreicht er eine Länge von 14 bis 18 Zoll und wiegt dann ungefähr 3 Pfund. England scheint das günstigste Land für die Entzwickelung des Barfsch zu sein; denn in den Gewässern des Richmondparkes hat man Barfsche von vier Pfund und in dem Balameer einen von 5 Pfd. gefangen. Hunt hat einen im Birminghamkanal gefangenen Barsch gesehen, welcher 6 Pfd. wog, und Montague einen solchen von 8 Pfd., der im Avon in Wiltshire mittelst einer Hechtangel gefangen war. Pennant will vernommen haben, daß im Hedepark sogar ein neunpfündiger Barsch gefangen sei, und nach Bloch bewahrt man in der Kirche zu Luchsh in Lapland den Schädel eines Barfsch auf, der von der Nase bis zum Ende des Kiemendeckels 12 Zoll lang ist.

In Frankreich laicht der Barsch im April, in Holland und Deutschland im Mai und Juni. Die Eierstöcke sind um diese Zeit sehr groß, und es ist begreiflich, daß der Fisch von diesem Gewicht viel zu leiden und das Verlangen hat, sich davon zu befreien. In einem Barsch von zwei

Pfund wiegt der Laich etwa 330 Gramm und enthält nach *Harmer* 281,000 Eier, welche die Größe eines Mohndornkorns haben. Je größer und älter der Barsch ist, desto größer ist die Anzahl der Eier wie begreiflich ist, da die Eier von großen Barfschen nicht größer, als die von kleineren sind; in großen Fischen will man bis 500,000 gefunden haben. Um von den Eiern befreit zu werden, reibt der Barsch den Laich gegen Steine und preßt so die Eier heraus. Wenn dies nicht gelingt, soll er sich einen abgebrochenen Schiffsstengel in den Eiersack schieben, um diesen mittelst des leimigen Stoffes, welcher die Eier umgibt, daran fest zu kleben. Auch will man gesehen haben, daß er einen Theil des Laichs an einen Stein befestigt und sich dann durch Biegeugen und Windungen seiner Eier entledigt. Er verfertigt auf diese Weise einen Steng von 6 Fuß Länge, der aber im Wasser zusammengerollt liegt. Wenn man diese Masse unter dem Mikroskop betrachtet, bemerkt man, daß 4 oder 5 Eierchen durch ein gallertartiges Häutchen zu einem Knäuelchen vereinigt sind; auf diesem Knäuelchen ruht wiederum ein anderes und sofort, wodurch sie gleichsam quadratische oder hexagonale Zellen bilden. Bei dieser Menge von Eiern müßte die Anzahl der Barfsche unendlich viel größer sein; doch findet man nach der Aussage der Pariser Fischverkäufer unter 20 Barfschen kaum ein Männchen, und da bekanntlich die Eier erst dann befruchtet werden, wenn sie den Laich der Mutter verlassen haben, so darf man annehmen, daß viel Laich verloren geht. In Holland müßte inbeß die Männchen viel häufiger sein. Zur Zeit, als das Haarlemer Meer noch ein Aufenthaltsort für Hechte und Barfsche war, war das daran gelegene Dorf Kisse eines gewissen Leckerbissens wegen, der aus Barfschmalz bereitet wurde, berühmt.

Zu den zufälligen Verschiedenheiten, unter denen wir bereits der ganz weißen Barfsche erwähnt, rechnet man auch die mit Höfchen, die man dann und wann in England findet. Zu Elen Raithlen in Schottland wird ein solcher aufbewahrt; auch *Linne* sah einen buckeligen Barsch zu Zablin in Schweden, und *Cuvier* hat einen solchen in das Museum des Jardin du Roi gebracht, der ihm aus Lincolnshire zugesandt worden war. Eine andere Verschiedenheit bieten die Barfsche mit durchscheinenden Kiemenfilamenten, durch welche man nicht bloß die Kiemen, sondern sogar den Blutumlauf wahrnehmen kann. Man findet solche im Brandenburgerischen, und die dortigen Fischer behaupten, daß diese Barfsche die Führer eines Schwarmes waren und durch ihre Voranschwimmen mehr mit Felsen und Steinen in Berührung gekommen, wodurch die Kiemenfilamente dünn gescheuert seien. Da aber der Barsch nicht in Gesellschaft schwimmt und also keines Anführers bedarf, muß die Erscheinung eine andere Ursache haben.

Der Barsch gehört zu den Fischen, die gegen feindliche Angriffe gut bewaffnet sind. Die weißen Fische lassen ihn in Ruhe, sogar der Hecht, der junge Barfsche zu Tausenden

jährlich verschlingt, nimmt sich wohl in Acht, sich an solche zu wagen, die bereits 3—4 Zoll lang sind. Doch fällt der Barsch häufig in die Gewalt anderer Feinde, denn Reiher, Störche, Enten und Möven machen fleißig auf ihn Jagd. In seinem eigenen Körper hat er nicht weniger als 8 Arten von Eingeweidenwürmern, die ihm das Leben sauer machen. Auch der Frost läßt ihn häufig sterben, und sein größter und listigster Feind, der Mensch, spart keine Mühe, sich seiner zu bemächtigen. Uebrigens hat er ein züdes Leben; Pennant sagt, daß man einen Barsch, in trockenem Stroh gewickelt, 60 Meilen weit versenden könne, ohne daß er stirbt; auch in Paris kommt er lebendig an, trotzdem er in den 50 Meilen entfernten Gewässern von la Bourbonnais gefangen wird.

Der Barsch gehört zu den Fischen, deren Farbe dem Wasser gleicht, in welchem sie leben, oder dem Boden, über welchem sie schwimmen, wie dies in hohem Maße bei der Schleie der Fall ist. Die Farbe seines Rückens und seiner Flossen ist weniger hell auf Torkboden als auf Kleinkoben und am meisten entschieden auf hartem, weißem Sand. Hier zeigt er die ganze Pracht seines Farbenschmucks; denn der grünlliche Rücken hat dann einen goldenen und der weiße Leib einen silbernen Widerschein; dann ist das Weiß der ersten Rückenflosse braun mit schwarzen Flecken; dann sind die zweite Rücken- und die Brustflossen hellbraun, aber die Bauch- und Afterflossen, sowie der Schwanz glänzen in tausend Farben. — Die Schuppen des Barfches verdienen nicht weniger unsere Aufmerksamkeit. Sie sitzen in längswelken Reihen, von denen jede ungefähr 70 Schuppen enthält, während sich von der Rückenflosse bis zur Mittellinie des Bauches 30 solcher Reihen finden, wonach jede Seite also etwa 2000 und der ganze Fisch etwa 4000 Schuppen hat. Diese Schuppen enden in fünf, sechs oder sieben fingerförmige Auswüchse und enthalten eine große Quantität jenes silberfarbtgen Stoffes, der so häufig im Reiche der Fische gefunden wird.

Wir haben bereits gesagt, daß der Barsch viel vom Frost zu leiden hat und deshalb im Winter tiefere Gewässer aufsucht. Deshalb findet man ihn denn auch nach

Jurins im Winter in großen Mengen in der Tiefe des Genfer See's. Doch, wie sicher er dort auch vor dem Frost ist, ihm drohen andere Gefahren von nicht geringerer Größe; man sieht ihn dort nämlich nicht selten auf dem Wasser treiben, während ihm Magen und Schlingdarm aus dem Munde hängen. Um dieses zu erklären, muß man wissen, daß der Barsch eine sehr große Schwimmblase hat, welche vollkommen geschlossen ist und nicht, wie bei vielen anderen Fischen mit dem Schlunde dem Magen oder den Gedärmen mittelst des ductus pneumaticus in Verbindung steht. In jenen tiefen Gewässern hat die Schwimmblase den Druck von 11 Atmosphären zu tragen, und wenn nun dieser Druck plötzlich fast aufhört, z. B. dadurch, daß der Fisch mittelst der Angel rasch heraufbefördert wird, dann kann die Luft der Schwimmblase und die der Außenwelt sich nicht ausgleichen; die Blase berstet oder ist doch dem Bersten nahe und treibt die vor ihr liegenden Theile hinaus. Sehr geringe Ursachen, z. B. das Schwimmen gegen die Laue eines Netzes, können für den Barsch schon dieses Unglück herbeiführen.

Das Fleisch des Barfches ist weiß, fest, leicht verdaulich und von angenehmem Geschmack. Man kann wochenlang täglich Barsch essen, ohne daß er anwidert, wie dies bei vielen anderen Fischen der Fall ist. Alle Völker, die den Barsch in ihrem Lande haben, lieben ihn. Er wird meistens frisch gegessen, weil man höchst selten so viele zu gleicher Zeit fängt, daß es sich der Mühe des Salzens und Trocknens lohnte. Alle Völker essen die kleineren gebraten und die größeren gekocht. — Die Kapländer befreien den Barsch nicht nur von seinen Schuppen, sondern ziehen ihm auch die Haut ab, von welcher sie einen ausgezeichneten Fischleim machen.

Man fängt den Barsch sowohl mit der Angel, wie mit dem Netz. Sobald er in letzteres hingerathet, „versängt er sich“, d. h. er schwimmt auf dem Rücken und scheint tot zu sein; doch erholt er sich bald wieder. Dies ist keine List, sondern rührt wahrscheinlich von der Erschütterung her, die er erleidet, wenn er durch seinen schnellen Stoß gegen das Netz fährt.

## Beiträge zur Kenntniß des Alters, der Kultur und Verstandnißweise der Thiere.

Von M. C. Grandjean.

Aus einer Urkunde des Klosters Kornersdorf bei Neuwied vom J. 1264 ist ersichtlich, daß damals sämtliche wilde Pferde in den Besigungen der Dynasten von Saen, Mosberg und Isenburg diesem Gotteshaufe gehörten. Es führt mich dieses zu einigen Bemerkungen über die höhere Thierwelt, welche Deutschland oder vielmehr das

mittlere Europa seit der sogenannten Diluvial- oder Nachtertiärzeit bewohnt hat.

Um bei dem Pferde anzufangen, so wissen wir, daß dasselbe schon in den frühesten Zeiten, wovon wir Nachricht haben, als Wildling in den Wäldern diesseits der Alpen heimisch war. Es müssen aber struppige, ungeschlachte

„Klepper“ gewesen sein; denn sie waren ursprüngliche Bewohner dieser Wälder und nicht, wie die Auslänger Amerikas, die Abstammlinge lange kultivirter Racen. In den Kaltblut-Deutschlands und Belgiens, sowie in den alten Eisablagernngen verschiedener Flüsse, finden sich zahlreiche Reste von Pferden, mit denen nachtertiäre Thiere vermisch, welche darauf schließen lassen, daß die lebenden Inhaber derselben von dem jetzigen Pferde nicht wesentlich verschieden waren. Es ist daher mehr als wahrscheinlich, daß wir es mit den Pferden, welche zur Zeit der Römer in Germanien wild herumstreiften und auch noch, wie aus der erwähnten Urkunde erhellt, im Mittelalter vorhanden waren, als mit Thieren zu thun haben, welche von jenen der Tertiarzeit abstammen, also sich, wie der *Auroch* (Wisent), das kreistänigste ausgeföhrte Kind Dänemarks, der Riesenhirsch Irlands und das Eicntbier (Eich), in die Jetztzeit gerettet haben.

Tacitus berichtet von den Pferden Germaniens, daß sie weder an Wuchs noch an Geschwindigkeit sich auszeichneten. Auch seien sie im Kriege nicht sehr gebräuchlich, was auch durch den Umsand bestätigt wird, daß die Deutschen erst verhältnißmäßig spät sich der Reiterei im Felde bedienten. Heinrich I. oder der Finkler scheint der eigentliche Schöpfer der Kriegstreiter oder Ritter zu sein; denn er war es, welcher — um den Einfällen der Ungarn und anderer Völker, die ihre Kriegszüge stets brüthen ausföhrten, zu begegnen und um sie bezwingen zu können — diesen Zweig der Kriegskunst besonders in den Grenzmarken mit großem Erfolge auszubilden suchte. Es läßt sich indessen voraussetzen, daß zur Zeit Heinrich's die Pferde in Deutschland, welche zur Heilbenzeit als geheiligte Thiere galten, schon in Vereidung begriffen waren; denn die Züge der Franken nach Gallien und Spanien mußten sie schon mit eilenden Pferde-Kagen in Veröhung bringen. Durch die Kreuzzüge und den im Mittelalter fortwährenden Verkehr mit Italien wurden die Deutschen aber noch mehr mit vorreiten Pferden bekannt, und sie haben mittelst Kreuzung oder besonderer Gessüß, wie z. B. das uralte der Senner, eine höhere Pferdekultur einzuföhren gesucht.

Das Pferd hat da, wo die Bodenverhältnisse sein Fortkommen und seine Brauchbarkeit begünstigten, eine sehr abweichende Behandlung von Seiten des Menschen erfahren, — und ganz dieser angemessen waren auch die Fortschritte, welche es in körperlicher und intellektueller Beziehung machte. Es zeigte sich überall gelehrt und dankbar für die Wohlthaten, d. h. für die Sorgfalt und Zuneigung, welche ihm der Mensch widmete. Bloß der sorgfältigen Kultur haben wir unsere jetzigen Pferde-Racen, sowie die der andern Hausthiere zu verdanken. Hierbei fordert nichts mehr unsere Verwunderung heraus, als die Zümmung und erbliche Kultur des Hundes, welcher, ursprünglich von einem reißenden Thiere abstammend, dieselbe wilde Natur gehabt haben muß, wie der Wolf und Schakal, deren nächster Verwand-

ter er ist. Dem listigen oder vielmehr vorsichtig-scheuen Fuchs, der senkrecht stehende Pupillen nach Art der Katzen hat, steht er jedenfalls entfernter. Es ist sehr schade, daß fast sämtliche Uruppen unserer Hausthiere sich nicht in ihrem Naturzustande erhalten haben. Der Hund scheint indessen eines der wenigen Thiere zu sein, welche sich, wie das Pferd, in die Nachwelt retteten; denn sowohl in den Höhlen von Lütlich, wie von Lunel-Viel und Steten an der Rhod, kommen Reste von Hunden vor, die dem Canis familiaris sehr nahe stehen oder gar mit ihm identisch sind. Ebenso sind die fossilen Reste des Höhlenwolves (Canis [Lupus] spelaeus), welche sich in diesen Höhlen und zu Galtienreuth fanden, mit unserm jetzigen Wolfe nahe verwandt oder von derselben Art.

Die Kultur des Wolfes und des Fuchses scheint nie ernsthaft und auf die Dauer versucht worden zu sein — und wohl nur deshalb, weil der Hausbund die guten Eigenschaften Wilder in sich vereinigte, ohne die Lüste mit ihnen zu theilen.

Der Mensch hat schon als solcher eine große — man könnte sagen — moralische Macht über die höheren Säugethiere. Sein Blick, seine Sprache und seine ganze Erscheinung imponiren selbst den wilden und erwecken in ihnen das Gefühl der Oberherrschast des Menschen über sie; wenn er aber die künstlichen Mittel, welche ihm seine überlegenen geistigen Fähigkeiten darbieten, zu Hilfe nimmt, so ist seine Herrschast — wenn auch unter körperlichem Zwange — eine für jedes Thier unübersteigliche. Unsere Hausthiere, seien sie nun Säugethiere oder Vögel, bedürfen indessen — wenn ihnen von Jugend auf mit Liebe und Sorgfalt für ihre Bedürfnisse begegnet wird — kaum eines körperlichen Zwanges, und es ist nur zu debauern, daß die meisten Menschen sich immer noch nicht zu der Ansicht bekennen wollen, daß sie bei gütigem Benehmen gegen die Thiere (so lange sie nicht widerspenstlich auf ihren wilden Capricen beharren) viel mehr ausrichten, als durch Schläge und rohe Begegnung.

Ich kenne ein einfaches Mädchen, welches sich mit großer Liebe aller Creaturen, die ihm in den Wurf kommen, annimmt. Sie bringt es mit den verschiedensten Thieren so weit, daß sie ihr wie Hunde nachlaufen und freudfertig aus einer Schüssel fressen. Eine Schleier-Gule, gewiß ein ungeschlossenes, scheues Vieh, die in einem dunklen Winkel hauset, kommt am hellen Tage auf ihren Ruf hervor und setzt sich ihr auf die Schulter. Vier oder fünf Kagen haben einen gemeinschaftlichen großen Korb, in dem sie ihre Wohnbetten halten und in einer geistlichen Jungen ohne Bevorgung ihrer Leibesfrüchte abwechselnd mit der größten Zärtlichkeit stillen. Die Vögel, deren sie in mehreren Käfigen und in einer großen, sogenannten Hofe wohl an zwanzig verschiedene singende Arten hält, kennen sie und ihre Stimme auf das Genauere und verstehen es sehr wohl, wenn sie gelobt oder gescholten werden. Man

kann sich nicht anders denken, als daß ihre Stimme und die verschiedenen Modulationen derselben von den Thieren nach ihrem Werthe für ihr Benehmen erkannt sind. Sie spricht aber auch fortwährend mit ihren Lieblingen und zeigt den nicht eingesperreten ihre Gnuß oder ihr Mißfallen durch Püße und Streicheln.

Der mitunter etwas beschwerliche Lärm und das scharfe Geschrei mancher Vögel, welche sich ein Vergnügen daraus zu machen scheinen, das Concert ihrer lieberrischen Mitgesangsener zu hören oder gar zu verurtheilen, führte mich durch die Vergleichung der Schalläußerungen sämtlicher zwei- und vierfüßigen Lieblinge meiner Freundin auf die Idee, der Bedeutung dieser Äußerungen nachzugehen, d. h. die sogenannte Sprache der Thiere etwas näher zu studiren.

Ich bin dabei auf die Vorstellung gekommen, daß man die sogenannten Sprachäußerungen der Thiere ebenso klassificiren müßte, wie die der Menschen. Haben doch z. B. kleine Kinder und junge Hunde oder Katzen sehr ähnlich klingende Schmerzens- oder Freuden-Laute. Sie sind zusammen noch im Zustande der tierischen Unvollständigkeit, und wenn man auch sagt, daß das Kind nur allein lachen oder weinen könne, so ist das doch nur mit Vorbehalt aufzunehmen; denn wir wissen ja recht gut, ob ein Thier freudig oder schmerzlich bewegt ist, um wie viel mehr müssen es aber die Individuen seiner Gattung wissen! Je mehr sich aber der Mensch, d. h. sein Geist, entwickelt, je größer wird die Kluft, die ihn von den Thieren scheidet.

Wenn nun auch zwischen der geistigen Entwicklung eines einer hochcivilisirten Gesellschaftsstufe angehörigen Menschen und eines Austral-Neeger-Abkömmlings in Bezug auf diese Kluft ein großer Unterschied ist, so bleibt sie doch so weit, als überhaupt der Mensch von dem Thiere, mit dem er in Parallele gestellt wird, entfernt steht. Ebenso kann aber auch ein Thier, wie z. B. der Hund, welcher seit unvorstelllichen Zeiten unter dem Einfluß der Menschencultur gestanden hat, sich von seinem Urtypus entfernen und sich anscheinend dem auf der ersten Kulturstufe stehenden Menschen nähern. Das ist aber kein eigenes Verdienst, wie beim Menschen, sondern ein Produkt der Sorgfalt und Mühe, welche der Mensch auf ihn verwendet. Denn der Hund und jedes andere Thier, welches unter dem Einfluß des Menschen körperlich und geistig zurecht wurde, setzt diese Kultur nicht aus eigenem Antriebe fort, sondern fällt dann, wenn es sich selbst überlassen wird, schnell oder allmählig wieder in seinen Urzustand zurück. Aber ganz abgesehen von den sogenannten Kulturthieren ist doch der Verlauf der sogenannten Sprachäußerungen zwischen Menschen und Thieren sehr wesentlich unterschieden. So nahe nämlich auch die Töne des Schmerzes und der Freude verwandt sein mögen, welche von Thieren und Menschen bei gewissen Gemüths-bewegungen oder körperlichen Leiden ausgesprochen werden, so bleibt doch das Thier in allen Zuständen dem Khythmus und Tone des Naturzustandes treu, während der Mensch

sie je nach dem Grade seiner Kultur oder Erziehung modificirt.

Prüft man z. B. die Erschelnungen, welche mit dem Fortpflanzungsgeschäfte, das sowohl das Thier wie den Menschen in den höchsten Grad der Erregtheit versetzt, verbunden sind, so ergibt sich gerade dabei in der höheren und niederen Thierwelt eine auffallende Entfaltung der Sprachfähigkeiten, welche den verschiedenen Gattungen eigenthümlich sind. Ob aber all das Gejauchze, Geschrei, Schmettern, Trompeten, Gesumme, Geispr, Geschnur u. s. w. mit organisierten Sprachmitteln etwas zu thun hat, ist wohl sehr zu bezweifeln. Es scheint vielmehr, daß diese Äußerungen je dem Thiere eigenthümliche Laute sind, welche ihm unwillkürlich im Laufe der geschlechtlichen Liebe entströmen und einen Theil des Fortpflanzungsgeschäftes, d. h. eine Vorbereitung dazu, ausmachen. Diese gewaltigen Anstengungen der Thierwelt in der Brunstzeit, ihre Stimme geltend zu machen, daß etwas außerordentlich Veranlaßtes mit den parallelen Erschelnungen beim Menschen. Warum sollte es auch nicht so sein? Ist nicht der Mensch in Bezug der Fortpflanzung an dieselben Naturgesetze gebunden, wie das Thier, und wird er, wenn er noch unverbunden, und die Zeit der Mannbarkeit gekommen ist, nicht von denselben mächtigen Gefühle ergriffen, wenn er auch, je gestörter er ist, dasselbe zu begreifen versteht und in höheren Gestaltungen zur Erscheinung zu bringen weiß?

Wer kennt nicht den jauchenden Naturschrei der Bauernbursche oder Jägersknechte, der auf dem Lande durch die stille Nacht erschallt, wenn sie, von ihren Mädchen kommend oder dahin gehend, ihr volles Herz ausschütten? Die höherstehenden Menschen machen der Fülle ihrer Gefühle, durch einen harmonischen Gesang Luft oder bringen ihren Schönen Sirenen, Ständchen u. s. w. Da ist dem Wesen nach kein Unterschied — es ist überall das süße Gesäusel der Liebe, die in Töne gekleidete Sehnsucht nach dem vollen Besitze des geliebten Gegenstandes —; es sind alle die Schalläußerungen, welche die Thiere und Menschen in dieser Zeit ausstoßen, Lieber ohne Worte, welche die weiblichen Individuen, an die sie gerichtet sind, auch ohne diese vollständig verstehen.

Was nun die Sprache der Thiere, wenn man ihre Laute und Warnetöne so nennen will, angeht, so sind sie gewiß nicht weiter entwickelt, als es ihre Lebensbedingungen, die mit ihrer körperlichen Organisation im Einklange stehen, erheischen. Das ist aber sowohl im Naturzustande, wie unter der Hand des Menschen gleich bleiben, so können sie im letzten Falle, da sie für Nahrung und Sicherheit nicht mehr zu sorgen brauchen, nur verlieren; während sie dagegen für die Kultur oder Dressur, welche ihnen der Mensch angedeihen läßt, desto empfänglicher werden. Es ist dieser letztere Zustand den Thieren, aber keineswegs angenehm; sie sehnen sich, wenn sie auch durch Gewohnheit oder Furcht dem Menschen folgsam sind, immer wieder in den Naturs-



zustand zurück. Wenn daher Freund Caro, der Hühnerhund, vor Freude aus der Haut springen will, wenn er sieht, daß sein Herr sich zur Jagd rüftet, wobei er in voller oder nach Dressur gemäßigter Naturweise eine Rolle zu spielen hat, während er traurig im Eckenwinkel liegen bleibt, wenn sein Herr den Hut zur Hand nimmt und die Glacehandschuhe anzieht, so ist das keine Erscheinung, die aus einem complicirten Ueberlegungsproceß hervorgeht, sondern einfach eine Gefühlsäußerung, die er — aus Gewohnheit bestimmt — deshalb fund gibt, weil sie eintheils die Befriedigung eines Naturtriebes, der dem Hunde angeboren ist, verspricht, andernteils aber einer getäuschten Erwartung gleich zu stellen ist. Die Katzen würden wahrscheinlich dasselbe thun, wenn sich der Mensch mehr mit ihrer Dressur zur Jagd abzugeben hätte und ihre Art zu jagen liebte, die in Geduld und hinterlistigem Ueberfall besteht und dem Jäger, wenn er nicht sofort bei der Hand ist, nur das Nachsehen läßt. Man kann aber auch die Katzen leicht dahin bringen, daß sie ihre Jagdbeute, wenn sie nicht zu schwer und es nicht zu weit ist, ihrem Herrn zutragen, wenn man ihnen jedesmal einen guten Bissen, und wenn er noch so klein wäre, zur Belohnung reicht. Sie haben dabei, wie auch der Hund und jedes andere Thier, kein Berechnungsgeistesvermögen, sonst würden sie es gewiß bleiben lassen. Ein treffender Beleg, daß das Ueberlegungsvermögen der Thiere nicht weit geht, ist z. B. der Umstand, daß sie sehr häufig ihnen untergeschobene Jungen von den übrigen, und wenn sie von anderer Art sind, nicht unterscheiden können.

Es bleibt also immer, wenn der Mensch sich nicht hinein mischt, bei den niedrigsten Graden der Vernunftäußerung, und es ist kein Thier fähig, weiter zu denken. Von der Natur ist aber auch sein Organismus gar nicht dazu eingerichtet, daß.. es höhere Geistesgaben zu seinem Vortheile nützlich machen könnte; denn es müßte dann nothwendig, wie der Mensch, aufrecht gehen und die Arme und Hände frei und so oder doch ähnlich gebildet haben, wie sie bei demselben gebildet sind. Was sollte es dem Thiere nützen, wenn es Fellen und Schlingen zu stellen oder zu schießen verstände? Es könnte ja keinen Gebrauch davon machen.

Wenn also ein unter dem Einfluß des Menschen befindliches Thier anscheinend höhere Vernunftäußerungen kundgibt, deren Anwendung in seiner Organisation nicht vorgegeben ist, so gehören sie nicht ihm, sondern dem ersten. Ich habe vor einiger Zeit durch ein Fernrohr ein Wiesel (Mermelin) auf einer Wiese vor meinem Hause beobachtet, welches sich eifrig mit dem Mäusefang beschäftigte. Es schlüpfte aus einem Mausloche in's andere. Es ist das ein allerliebster Anblick, so ein gleiches, gewandtes Thierchen um seiner Nahrung willen arbeiten zu sehen, — und wenn es an's Tageslicht kommt, wie sehr es sich so anmuthig auf die Hinterläufe und schaut sich so munter nach allen Seiten um! Plötzlich bemerkte ich, während das Wie-

fel wie ein Blig in ein Mausloch fuhr, einen dunklen flatternden Gegenstand vor dem Objectivglaste, und dann sah ein prächtiger Falke vor demselben, der sich ganz verwandelt, den Kopf von einer zur andern Seite drehend, umschaute. Es war nach seinem Gebahren offenbar, er konnte nicht begreifen, daß das Wiesel, worauf er gestoßen, verschwunden und von der Erde verschlungen werden konnte. Das ging über seinen Horizont, und er flog — einen Schrei getäuschter Erwartung ausstößend — beschämt von dannen.

Wie es mit den Handlungen der Thiere ist, so ist es auch mit ihrer Sprache. Was sollte ihnen eine ausgebildete, nach unserm Begriffen gebaute Sprache nützen? Sie haben für ihren beschränkten Thätigkeitskreis auch eine entsprechende Sprache und müssen dieselbe haben, aber auch nichts weiter. Selbst das Sprachorgan ist bei den Thieren hiernach eingerichtet und keiner Vervollkommnung aus sich selbst fähig, und wenn es der Mensch dahin bringt, daß einzelne Thiere, wie z. B. verschiedene Vögel, einige Worte oder geordnete Töne ziemlich deutlich sprechen oder pfeifen lernen, wie es der Mensch thut, so geschieht das deshalb, weil derselbe ihnen zu Hülfe kommt und ihren Nachahmungstrieb, sowie ihr mitunter sehr biegsames Stimmorgan hierzu benutzt.

Die Sprache der Menschen, wenn man sich im Allgemeinen so ausdrücken darf, ist ein Product der Anlage unseres Stimmorgans in dem Kreis unsrer Thätigkeit. Sie richtet sich genau nach unserm Bedürfnis, und wie sehen auch in der That, daß das menschliche Vocabularium diesem angemessen entwickelt erscheint. Die Sprachfähigkeit der Thiere zeigt aber einen von der des Menschen sehr abweichenden Charakter; denn sie hat bei derselben Gattung überall dieselbe unabänderliche, allen Individuen ihrer Art gegenwärtige Ausdrucksweise, während sich die menschliche Sprache in so verschiedenen Richtungen ausbilden kann, daß dieselbe Begriff unter tausend verschiedenen Ausdrucksweisen zu erscheinen fähig ist. Die Sprache der Thiere, wenn man ihre Stimmäußerungen so nennen will, ist demnach mit dem Begriff, der ausgedrückt werden soll, fest verbunden und unabänderlich, die der Menschen aber bei gleichen Entwicklungsstufen der Kultur dennoch so verschieden ausgebildet, daß sie sich, oft nahe zusammenwohnend und einem Volksstamm angehörig, nicht verstehen können.

Wir stoßen bei der Thiersprache, wie bei allen übrigen körperlichen und geistigen Eigenschaften der Thiere, im Vergleich zu denen des Menschen immer auf die grund- oder naturgesetzliche Verschiedenheit; denn das Thier hat einen in beiden Beziehungen strengen, streng abgegrenzten Charakter, während der Mensch unter allen lebenden Thieren nur allein die Fähigkeit besitzt, sich aus sich selbst heraus zu immer höheren Kulturstufen, die ihn hoch vom Thiere immer mehr scheiden werden, zu entwickeln.

Der Begriff vom Fertigen, Gestaltbegrenzten oder Unabänderbaren führt auch ganz naturgemäß (was dasselbe ist) zum Infiniten. Es ist daher schwer zu begreifen, wie sich manche Naturforscher noch darin gefallen können, die Handlungen mancher Thiere, wie der Ameisen, Bienen etc., welche von jeher dieselben waren und immer dieselben bleiben werden, einem Ueberlegungsproceß im Sinne der menschlichen Vernunft zuzuschreiben. Und wenn die Handlungsweise dieser Thiere eine noch zehnmal verwickeltere und auf Anwendung großer Geisteskräfte hindeutende wäre, so handeln sie doch nach einem unabänderlichen Schema, welches ihnen ebenso von der Natur eingeplant ist, wie ein Künstler einem Uhrwerke die Fähigkeit einpflanzen kann, die geistvollen Operationen vorzunehmen, ohne daß dieses der Maschine, die nach einer bestimmten, in sie gelegten Gesetzmäßigkeit handelt, zugeschrieben werden könnte. Das Verdienst hierbei gehört allein dem Künstler, wie es bei den Ameisen der Natur oder dem Schöpfer gehört.

Wir haben gewiß keine Ursache, daran zu zweifeln, daß die Natur dieses kann und wirklich thut. Denn wir brauchen nur die Entwicklung einer Pflanze, der wir doch keinen Geist und Willen zuschreiben können, zu beobachten, so werden wir sehen, wie alle Kräfte in ihr zu einem gewissen unabänderlichen, aber den wissenden Plan verrathenden Zwecke hinarbeiten. Es ist deshalb gerade der Schematismus, welcher sich in den Handlungen der Bienen, Ameisen, Wiber und vielen anderer Thiere offenbart, ein sicherer Beweis, daß sie nach einem unabänderlichen Naturtrieb und nicht nach Ueberlegung im Sinne der menschlichen Vernunft handeln.

Man könnte nun auch sagen, daß es bei dem Menschen — wenn auch in einer anderen und ausgedehnteren Richtung — gerade so, wie bei der Pflanze und dem Thiere sei. Allerdings ist es in gewisser Beziehung so, denn die körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Menschen sind ihm gleichfalls verliehen worden; es wurde ihm aber auch zugleich die Eigenschaft gegeben, diese Fähigkeiten nach eigener Wahl und seinen wechselvollen Bedürfnissen angemessen anzuwenden und im Interesse seiner selbst und einer größeren oder kleineren Gemeinschaft, in welcher er lebt, sowie zum Vortheile der ganzen Menschheit zu entwickeln oder vielmehr zu vervollkommen. In Folge dieser Eigenschaft hat denn auch der Mensch, mit Hilfe der von ihm erzeugten Kulturmittel, die Schöpfung in die Hand genommen und wird unter Benützung der Naturkräfte die Erde nach und nach zu einem Werke seines Geistes, zu einem Kunstwerke umgestalten, in dem ein Theil seiner Bestimmung, nämlich der der sittlichen Kultur oder Civilisation, wie dieses schon theilweise geschehen, zur realen Erscheinung gebracht wird.

Der große Unterschied zwischen den Produkten der menschlichen Vernunft und des Instinktes der Thiere besteht darin, daß bei dem Menschen die Mittel zur Erreichung eines bestimmten Zweckes in unendlicher Mannigfaltigkeit und nach sehr von einander abweichenden Plänen zur Anwendung kommen können, wie es gerade der Wille und der Vortheil des Menschen erheischt; während die Thiere ihren Plan und die Ausführung desselben nie ändern, sondern höchstens wegen örtlicher Hindernisse quantitativ modificiren.

## Die Atmosphäre und das Leben.

Von Otto Lil.

Es gibt nichts Interessanteres, als die Geschichte einer großen Entdeckung von ihren ersten Anfängen und durch ihre verschiedenen Verzweige zu verfolgen. Mögen die Thatfachen uns heute auch noch so klar, die Erklärungen noch so selbstverständlich erscheinen, immer gab es eine Zeit, wo Alles dunkel und verworren erschien, immer mußten lange, oft wieder unterbrochene Anstrengungen vorangehen, ehe nur einzelne zerstreute Wahrheiten festgestellt werden konnten, und ganze Generationen mußten ihre Arbeiten häufen, die größten Geister ihre Kraft auf den Gegenstand vereinigen, ehe ein klares und festes Licht sich über das einstige Dunkel ausbreitete. So verhält es sich auch mit der Entdeckung der wichtigen Beziehungen, welche zwischen der Atmosphäre und dem Leben auf unsrer Erde bestehen, deren Geschichte ich hier an der Hand des berühmten französischen

Physikers Jamin in ihren Hauptzügen darzustellen versuchen will.

Das Luftmeer, auf dessen Boden die Pflanzen und Thiere der Erde leben, besteht bekanntlich aus zwei verschiedenen Gasen, einem ziemlich trägen und kaum einen merklichen Einfluß auf die Naturerscheinungen ausübenden, dem sogenannten Stickstoff, und einem andern von außerordentlicher Thätigkeit, der die bedeutendste Rolle in der Unterhaltung des Lebens spielt, dem Sauerstoff. Der Letztere besitzt insbesondere die Eigenschaft, sich mit der Kohle oder dem Kohlenstoff zu verbinden, und bei dieser Verbindung entsteht bekanntlich Wärme und Licht. Die Kohle verbrennt, sagt man; sie wird verlichtet, dachte man früher. Aber in Wahrheit wird sie nur in ein Gas umgewandelt, das sich mit der atmosphärischen Luft vermischt, und aus wel-

dem der Chemiker nicht nur die Kohle wieder ausscheiden kann, die er verbrannte, sondern auch den Sauerstoff, mit dem sie sich bei der Verbrennung verband. Man nennt daher dieses Gas in Erinnerung an seinen Ursprung Kohlenäure.

Holz, das im Wesentlichen aus Kohlenstoff und Wasser zusammenge setzt ist, verbrannt in ähnlicher Weise wie Kohle; das Wasser wird in Form von Dämpfen ausgeschleudert, die Kohle durch Vereinigung mit dem Sauerstoff der Luft in Kohlenäure umgewandelt. Früchte, Blätter, unser Brod, all unsere Nahrungsmittel überhaupt haben eine ähnliche Zusammensetzung wie das Holz und können ebenso verbrannt werden, und schon Lavoisier hat nachgewiesen, daß sie in dem Respirationssystem der Thiere, welche sie verzehren, eine ähnliche, wenn auch langsamere Verbrennung erleiden. Jedes Thier ist also gleichsam ein Ofen, jedes Nahrungsmittel ein Brennstoff. Der Sauerstoff der Luft wird bei der Athmung verbraucht und durch Kohlenäure ersetzt, während das Wasser durch die natürlichen Ausscheidungen und die Athmung entfernt wird.

Wenn aber Kohlenäure durch das thierische Leben erzeugt wird, so muß sie auch einen wesentlichen Theil unserer Atmosphäre ausmachen, und in der That findet sie der Chemiker darin, wenn auch freilich in dem fast verschwundenen Verhältniß von 4 bis 5 Theilen auf 10,000 Theile Luft. Nun ist Kohlenäure ein Gas, das weder Leben noch Verbrennung unterhalten kann, da sie im Gegenstand ein Produkt dieser Prozesse ist. Thiere, die unter Glasglocken abgesperrt werden, vergehen darum sehr schnell den Sauerstoff der eingeschlossenen Luft und sterben in der kohlenäurereichen Atmosphäre, nicht in Folge einer giftigen Wirkung dieses Gases, sondern nur weil die Möglichkeit einer Athmung fehlt. Man sollte nun meinen, daß durch das Athmen so vieler Thiere allmählig auch die ganze Atmosphäre so mit Kohlenäure erfüllt werden müßte, daß dem Thierleben ein Ende gesetzt würde, wenn es nicht ein Experiment gäbe, das die Natur ohne unser Wissen beständig im großartigen Maßstabe vor unsern Augen ausführt, das in der Wissenschaft eine berühmte Rolle gespielt hat, und das doch so einfach ist, daß es Jeder mit großer Leichtigkeit nachmachen kann. Man nimmt zu diesem Zwecke einen gesunden und frischen Zweig irgend einer Wasserpflanze, wie sie in unsern Teichen oder Bächen wachsen, und bringt sie in eine Glasflasche, die man mit Quellwasser oder noch besser mit einem kohlenäurehaltigen Mineralwasser bis an den Rand füllt und dann umgekehrt mit der Öffnung nach unten in ein mit Wasser gefülltes Becken stellt, wobei bekanntlich in Folge des äußeren Luftdrucks das Wasser aus der Flasche nicht ausfließt. Setzt man nun diese Flasche dem vollen Sonnenlicht aus, so sieht man sich sofort die Blätter der Pflanze mit Bläschen bedecken, die sich schnell vergrößern, zusammenfließen und in der Flasche emporsteigen. Sobald man den Zutritt der Sonnenstrahlen durch

einen Schirm verhindert, so hört auch die Bläschenbildung auf, und man kann diese geradezu selbst aus einiger Entfernung ganz nach Belieben durch abwechselnde Beschattung und Bestrahlung hemmen und wiederherstellen. Nach einigen Stunden ununterbrochener Bestrahlung wird man die Flasche mit einem Gas erfüllt sehen, das allem äußeren Anschein nach zwar der atmosphärischen Luft gleicht, gleichwohl aber ganz andere Eigenschaften besitzt, da ein glimmender Holzspahn, den man hineintaucht, sich sofort darin entzündet und mit ungewöhnlichem Glanze fortreißt. Das Gas ist also nicht gewöhnliche Luft, sondern Sauerstoff. Mit Wasserpflanzen angestellt, ist dieses Experiment wahrhaft überraschend, da die Entwicklung des Sauerstoffgases in diesem Falle ungemein schnell erfolgt. Aber man kann es auch mit jeder andern Pflanze anstellen, der Erfolg wird nur langsamer eintreten. Immer wird, selbst wenn man die Flasche vorher mit Kohlenäure gefüllt hätte, nach einer gewissen Zeit die Kohlenäure verschwunden und Sauerstoff an ihre Stelle getreten sein. Die Erklärung dieser Erscheinung ist einfach. Die grünen Pflanzentheile zerlegen die Kohlenäure, nehmen den Kohlenstoff auf und verarbeiten ihn und lassen den Sauerstoff frei. Im Dunkeln und in der Nacht kehrt sich der Vorgang um. Statt Kohlenäure aufzunehmen, gibt die Pflanze solche ab. Aber da die nächtliche Thätigkeit schwächer ist als am Tage, spielt die Pflanze im Ganzen doch eine Rolle, welche der des Thieres gerade entgegenge setzt ist; sie verzehrt die Kohlenäure, welche jenes ausathmet, und gibt der Atmosphäre den Sauerstoff zurück, den das Thier verzehrt. Das sind die einfachen Thatfachen, so einfach, daß man meinen sollte, es hätte kaum einer besonderen Entdeckung bedurft. Und doch waren lange, geistreiche Untersuchungen nöthig, um sie zu Tage zu fördern.

Der Erste, der sich mit einer experimentellen Untersuchung der Beziehungen zwischen Pflanzentheilen und Atmosphäre beschäftigte, war der Genfer Naturforscher Charles Bonnet. Zu seiner Zeit, der Mitte des vorigen Jahrhunderts, bildete die elternlose Zeugung, die sogenannte generatio aequivoca, den Hauptgegenstand des wissenschaftlichen Interesses. Auch Bonnet beschäftigte sich mit dieser unfruchtbaren Frage, wandte ihr aber schließlich den Rücken, um eine andere aufzuwerfen, von deren weittragender Bedeutung er freilich noch keine Ahnung hatte, die Frage nämlich: wovon nähren sich die Blätter unserer Pflanzen? Er stellte zu diesem Zwecke zwei Experimente an, die gewissermaßen einen klassischen Charakter erlangt haben. Zunächst bewies er, daß das Licht auf die grünen Pflanzentheile eine so kräftige Anziehung ausübt, daß sie im Dunkeln sich gegen die kleinsten Oeffnungen hinwenden, die dem Lichte den Eintritt gestatten. Sodann zeigte er, daß unter Wasser getaucht, die Pflanzen im Sonnenlicht große Mengen von Luft entwickeln. Dabei blieb er freilich stehen; denn was das für eine Luft war, wußte er nicht und konnte er

bei dem damaligen Zustande der Chemie, die sogar noch an eine Verwandlung des Wassers in Erdb glaubte, nicht wissen.

Priestley, der Rival und in mancher Beziehung der Vorgänger Lavoisier's, wurde durch seine Entdeckungen gleichfalls dahin geführt, das Verhalten der Pflanzen gegen die Atmosphäre zu studiren. Es war ihm die Isolirung jenes merkwürdigen Gases gelungen, welches so kräftig die Flamme einer Lampe und die Atmung der Thiere unterhält, und er hatte dieses Gas Lebensluft genannt. Er hatte ferner nachgewiesen, daß, wenn man kleine Thiere in verschlossene, mit solcher Luft oder auch mit gewöhnlicher atmosphärischer gefüllte Gefäße brachte, die Eigenschaften dieser Luft sich veränderten, die Thiere starben und die Flamme erlosch. Allerdings kannte Priestley die wahre Natur des Sauerstoffs noch nicht und wies sogar, von Eifersucht verblindet, bis zuletzt die von Lavoisier aufgestellte Athmungstheorie zurück. Aber er verstand es doch, aus seinen Experimenten Folgerungen von höchster Wichtigkeit zu ziehen. Aus der Thatfache, daß jene kleinen Thiere die eingeschlossene Luft durch ihre Atmung verderben, schloß er, daß alle Glieder des gesammten Thierreichs dieselbe Wirkung beständig in der Atmosphäre ausüben müßten, und daß sie daher nothwendig sterben müßten, wenn es nicht irgend eine andere Thätigkeit der Naturkräfte gäbe, die gerade umgekehrt die Luft in denselben Verhältniß wieder zu reinigen vermöge sei, wie sie durch die thierische Atmung verderbt werde. Er suchte diese wiederherstellende reinigende Gegenkraft und fand sie in den Pflanzen. Er brachte ein Thier und eine Pflanze unter eine Glasglocke. Das Thier verdaute die Luft und starb, aber die Pflanze stellte nach einiger Zeit die zur Erhaltung des tolerischen Lebens nothwendige Reinheit der Luft wieder her. Seitdem konnte es als unzweifelhaft gelten, wenn auch manche Einzelheiten noch unbekannt blieb, daß Thiere und Pflanzen entgegengesetzte Thätigkeiten ausüben, die einen die Eigenschaft der Luft, das Leben zu unterhalten, aufheben, die andern sie wieder herstellen. Als die königl. Gesellschaft in London im J. 1773 Priestley die Coplen-Medaille verlieh, charakterisirte der Präsident derselben seine wichtige Entdeckung mit folgenden Worten: „Die Pflanzen wachsen nicht umsonst; jedes Glied des Pflanzereichs von der Eiche des Waldes bis zum Gras der Wiese nützt der Menschheit. Alle Pflanzen tragen dazu bei, unsere Atmosphäre in der für das thierische Leben nothwendigen Reinheit zu erhalten. Selbst die Wälder ferner Länder tragen zu unser Erhaltung bei, weil sie aus den Ausdünstungen unseres eigenen Körpers Nahrung geben, die uns selbst verderblich werden würden.“

Aber auch an dem Ruhmesbimmel Priestley's zogen Wolken herauf. Als Priestley seine Experimente, die so glänzende Gesichtspunkte eröffnet, ihm so reiche Ehren eingetragen hatten, wiederholte, erhielt er ganz entgegenge-

setzte Resultate: Statt die Luft zu reinigen, schienen die Pflanzen sie jetzt zu verderben. Ueberrascht von diesem unerklärlichen Widerspruch, vermehrte er seine Versuche; aber Alles, was er feststellen vermochte, war, daß die Pflanzen zu einer Zeit die Eigenschaft besäßen, die Luft zu reinigen, zu einer andern die, sie zu verderben. Das Geseh, welches ihm die Coplen-Medaille eingetragen hatte, war also kein allgemeines, und die Folgerungen, die er daraus gezogen hatte, waren nicht unbestreitbar. Priestley starb im J. 1804, ohne das Verhältniß seiner glänzenden Entdeckungen in der Chemie, ohne die Lösung der Widersprüche in seinen pflanzenphysiologischen Versuchen gefunden zu haben.

Priestley hatte sich in der That nicht geirrt. Die Pflanzen üben wirklich die beiden Thätigkeiten, die er ihnen zugeschrieben hatte. Das Einzige, was er nicht zu entdecken vermocht hatte, war die Bedingung, unter welcher einmal die wiederherstellende, ein andres Mal die zerstörende Thätigkeit eintritt; eine Bedingung, welche Sonnenet bereits geahnt hatte, welche Ingenhousz aber erst in ihr volles Licht stellte. Ingenhousz war im J. 1730 in Dordrecht geboren und kam als Arzt nach England, um die Pockenimpfung kennen zu lernen, die man damals dort einführte. Bei dieser Gelegenheit erfuhr er von den Arbeiten Priestley's, und es gelang ihm, die darin enthaltenen Widersprüche zu lösen. Er selbst sprach sich im J. 1779 über seine Entdeckung folgendermaßen aus.

„Kaum hatte ich diese Untersuchungen begonnen“, schreibt er, „als sich mir die interessantesten Thatfachen enthüllten. Ich erkannte, daß die Pflanzen nicht nur die Eigenschaft besäßen, im Verlauf von 6 und mehr Tagen die verdorbene Luft zu reinigen, wie es Priestley's Experimente lehrten, sondern daß sie dieses wichtige Geschäft vollkommen schon im Verlauf weniger Stunden vollbringen; daß diese überraschende Wirkung keineswegs der Vegetation an sich, sondern dem Einfluß des Sonnenlichts auf die Pflanzen verbandt wird; daß sie erst einige Zeit nach Sonnenuntergang beginnt und im Dunkel der Nacht vollständig ruht; daß von Gerbüden oder Bäumen beschattete Pflanzen diese luftreinigende Thätigkeit nicht entfalten, sondern im Gegentheil eine schädliche Luftart aushauchen und ihre Umgebung wahrhaft vergiften; daß die Erzeugung gesunder Luft sich gegen das Ende des Tages verlangsamt und mit Sonnenuntergang ganz aufhört; daß nicht alle Pflanzentheile an dieser Luftreinigung theilnehmen, sondern nur die Blätter und grünen Zweige; daß bittere, überlebensende und selbst giftige Pflanzen diesen Dienst ebenso verrichten, wie die, welche die süßesten Düfte ausatmen, und die heilreichsten Kräuter.“

Ingenhousz war es also geglückt, die Quelle der Kraft, welche die Atmung der Pflanzen veranlaßt, zu finden. Diese vorher ungeahnte Kraft ist keine andere, als das Licht der Sonne. Dieses Licht verbreitet sich über die Blätter, wird von ihnen verschluckt und vollzieht nun

das große Reinißungswerk der Atmosphäre. Insofern war der wichtigste und schwierigste Theil der Frage entschieden, aber noch blieb Manches zu thun übrig. Die Wissenschaft gleicht dem Siebe der Danaiden; Jeder versucht es zu füllen, Keinem gelingt es, weil jede Entdeckung einen neuen Gesichtskreis eröffnet und neue unerreichte Ziele darbietet. Nach Ingenhousz blieb vor Allem noch die Frage zu beantworten, worin denn eigentlich die Veränderung bestesse, welche die Luft durch die thierische Athmung erleidet, und die Wiederherstellung, welche die Pflanzen bewirken. Die Chemie nur konnte diese Frage beantworten, und Lavoisier that es, obgleich er sich nicht speciell mit dem Gase selbst beschäftigte. Er that es an jenem Tage, wo er zeigte, daß die Thiere Sauerstoff aufnehmen, die organischen Nahrungstoffe langsam verbrennen und in der Athmung mit der Kohlenäure alle den Kohlenstoff, welchen sie verzehret hatten, wieder ausgeben. Die verdorbene Luft, wie sie Priestley und Ingenhousz nannten, ist folgerichtig nur eine des Sauerstoffs beraubte und mit Kohlenäure beladene Luft, und wenn die Pflanzen sie reinigen, so heißt das nur, daß sie die Kohlenäure zerlegen, den Kohlenstoff zurückhalten und den Sauerstoff an die Atmosphäre zurückgeben.

Man sollte fast meinen, daß selbst bei dem damaligen Zustande der Chemie Jeder auf diese Erklärung hätte kommen müssen. Dennoch geschah dies nicht, und es bedurfte neuer Experimente, um sie zu entdecken. Wie es ein Fenster war, der die Untersuchung dieses wichtigen Gegenstandes begann, so war es wieder ein Fenster, der sie zum Abschluß brachte. Sennedier, der Freund und Nachfolger Charles Bonnet's war es, welcher, nachdem er festgestellt hatte, daß die Pflanzen in abgekochtem Wasser kein Sauerstoffgas am Licht entwickeln, wohl aber und zwar in reichem Maße in einem mit Kohlenäure gesättigten Wasser, daraus den Sauerstoff zog, daß dieses Gas zur Athmung der Pflanzen notwendig sei und von den Pflanzen zerseht werde. Die Frage selbst konnte damit als gelöst gelten; aber während des halben Jahrhunderts, durch welches sie die gelehrte Forschung beschäftigt hatte, waren mit den gewonnenen Wahrheiten auch manche Irrthümer aufgetaucht und manche Einzelheiten durch widersprechende Behauptungen in Zweifel gestellt worden. Es bedurfte einer wiederholten Prüfung der gesammelten Entdeckungen, und Thomas de Saussure war es, der diese unternahm, und der, ohne zwar irgend eine neue Theorie hinzuzufügen, eine experimentelle Bestätigung der Theorie gab, die bis auf den heutigen Tag noch nicht angefochten worden konnte.

Seitdem hat Ruhe auf diesem Gebiete geherrscht. Die Naturforscher schienen diese Frage für erschöpft zu halten und wandten sich anderen Gegenständen zu, die sie für fruchtbarer hielten. Nichtbedeutender haben die neueren Arbeiten von Daubigny, Cibois, Gratiot und namentlich Boussingault noch manche schwierige Punkte kennen gelehrt, die der Aufklärung bedürfen. Doch wird die Theorie im Ganzen dadurch nicht berührt. Wir können uns daher einer andern nicht minder wichtigen Frage zuwenden: Was wird aus dem Kohlenstoff, der in den Pflanzen nach der Zersetzung der Kohlenäure zurück bleibt? Während die Atmosphäre die Blätter mit Kohlenstoff versorgt, führen die Wurzelsästen der Pflanze Wasser aus dem Boden zu, und es läßt sich voraussetzen, daß diese beiden Stoffe in Beziehung zu einander treten. In der That verbinden sie sich mit einander und zwar in sehr verschiedenen

Verhältnissen, unter denen wir nur ein paar herausgreifen wollen. Wenn sich 12 Äquivalente Kohlenstoff mit 10 Äquivalenten Wasser verbinden, so bilden sie entweder Cellulose (Pflanzenfaser), aus welcher die Zellwände und das ganze Skelett der Pflanze besteht, oder das bekannte Stärkemehl oder endlich das lösliche Dextrin. Aber je nach den Umständen und dem Organen kann sich dies Verhältniß und damit das chemische Produkt ändern. So geben 12 Äquivalente Kohlenstoff mit 12 Äquivalenten Wasser den Fruchtzucker oder die Glucose, mit 11 Äquivalenten Wasser dagegen den bekannten Rohrzucker. Endlich aber bilden Kohlenstoff und Wasser durch unbekannte chemische Proceß in ihrer Vereinigung noch eine Menge andrer nach Stand: ort, Organ, Alter, Natur und manchen äußeren Bedingungen verschiedener Produkte.

Außer diesen gewissermaßen aus Kohlenstoff und Wasser zusammengesetzten Substanzen gibt die Pflanze noch einer andern Klasse von Stoffen das Gesein, die sich durch einen Ueberschuß von Wasserstoff auszeichnen, Oelen, Harzen, Balsamen u. s. w. Woher rührt dieser Wasserstoff und woher der Stickstoff, der gleichfalls in diesen Körpern als vierter Bildungsbestandtheil auftritt? Ist es die Atmosphäre oder der Boden, der sie liefert? Diese den Aerdaus so nahe angehenden Fragen konnte wieder nur die Chemie beantworten. Boussingault war es, der sich damit zuerst beschäftigte, und der zugleich besonders dafür befähigt war, da er einerseits an der Spitze eines großen landwirthschaftlichen Unternehmens stand, andererseits mit den feinsten und schwierigsten Arbeiten der chemischen Analyse vertraut war. Seine Methode war folgende: In einer im Voraus analysirten Erde wird eine kleine Anzahl Samen gesät, deren chemische Zusammensetzung gleichfalls festgestellt ist, und diese werden mit reinem Wasser besgossen. Dieses Wasser verschwindet fast gänzlich durch die Verdunstung, und nur ein kleiner Theil wird in den Pflanzen fixirt. Die Pflanze wächst und nimmt an Gewicht zu, weil sie aus der Luft und dem Boden Nahrung empfängt. Nach Verlauf einer gewissen Zeit wird sie geerntet, und nun durch neue chemische Analysen festgestellt, einmal, wie viel Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff sie gewonnen hat, dann, wie viel der Boden an diesen Substanzen verloren hat; das Fehlende muß von der Luft oder dem Wasser herrühren. Man gewinnt so eine genaue Bilanz zwischen Einnahme und Ausgabe.

Das Resultat dieser ebenso scharfsinnigen, als fleißig in der Ausführung schwierigen Methode war die Bestätigung eines ähnlichen Vorganges, wie wir in der Zersetzung der Kohlenäure kennen lernten. Alle Pflanzen haben einen Ueberschuß von Wasserstoff erlangt, der nicht aus dem Boden oder der Luft, da ihn beide nicht besitzen, sondern nur aus dem Wasser herrühren kann. Die Pflanzen scheiden also nicht bloß Sauerstoff und Kohlenstoff, sondern auch Sauerstoff und Wasserstoff, behalten den letztern zurück und geben den ersteren frei. Das Wasser aber ist verbrannter Wasserstoff, gerade wie die Kohlenäure verbrannter Kohlenstoff; in beiden Fällen hebt also die Pflanze die Wirkungen der Verbrennung auf und stellt den brennbaren Körper in seinem ursprünglichen Zustande wieder her. In welcher Zeit der Pflanzentwidelung und in welchen Organen dieser Vorgang stattfindet, das fleißig ist noch nicht entschieden.

Ein zweites Ergebnis der Boussingault'schen Untersuchungen war, daß jede Pflanze in der Zeit ihrer Reife

Stickstoff gewonnen hat, der hauptsächlich in ihren Samen abgelagert ist. Da dieser Stickstoff sowohl aus der Luft, die ihn in freiem Zustande enthält, als aus Düngestoffen des Bodens herkommen kann, so waren besondere Versuche erforderlich, um darüber zu entscheiden. Boussingault säete deshalb Klee in einen aus reinem Kalksand bestehenden Boden, der keine Spur von Stickstoff enthielt, so daß der Pflanze aus ihm und dem Wasser nur die mineralischen Nährstoffe zugeführt werden konnten. Der Klee gedieh und zeigte schließlich einen kleinen, aber entschiedenen Zuwachs von Stickstoff, der nothwendig aus der Luft gekommen sein mußte. Noch günstiger war der Erfolg bei der Artischoke, die in der Keife zwei Mal soviel Stickstoff enthielt, als der Same, aus dem sie hervorgegangen. Bei den Cerealien, namentlich beim Weizen, dagegen ergab sich stets, daß genau der Stickstoff des Samenkorns demahrt worden war und keine Zunahme stattgefunden hatte.

In allen diesen Fällen war die Vegetation außerordentlich beeinträchtigt; keine Pflanze zeigte das gesunde Aussehen, wie sie es auf gutem Boden erlangt; die Artischoke litt allerdings weniger wie Klee, dieser weniger als Weizen, der nicht einmal seine Körner reifen konnte. Die Ursache dieses Krankens war offenbar der Mangel an Stickstoff; alle Pflanzen bedürfen desselben, sie verkümmern, wenn sie ihn im Boden nicht finden, und sterben selbst dämelen. Um dies zu bestätigen, trachtete Boussingault drei Exemplare der bekannten Sonnenblume in drei genau gleiche Töpfe, die mit reinem Sande gefüllt und mit reinem Wasser angeseucht wurden. Der erste erhielt gar keine Düngung, der zweite 8, der dritte 16 Centigramme Kalisalpetes. Schon nach den ersten Tagen zeigten die Pflanzen in ihrem Verhalten die Folgen dieser verschiedenen Behandlung. Die erste sickte und starb, die zweite vegetirte, blieb aber schwach, die dritte entwickelte sich in voller Gesundheit. In der Keife hatte die zweite 4, die dritte 8 Centigramme des Kalisalpetes dem Boden entzogen. Was aber besonders merkwürdig war, die letzte Pflanze hatte während ihres Wachstums auch 2 Mal so viel Kohlensäure zerlegt, als die zweite. Der Stickstoff bedingt also auch theilweise die Ausübung der übrigen Funktionen der Pflanze und namentlich ihre Einwirkung auf die Atmosphäre.

Nun besteht die Pflanze aber zu mehr als der Hälfte ihres Gewichtes aus Kohlenstoff und nur zu einigen Tausendtheilen aus Stickstoff. Was ist das nun für ein Dienst, den dieser so unentbehrliche und doch in so geringen Mengen vorhandene Stoff der Pflanze in ihrem Leben erweist? Pflanz hat uns die Antwort gegeben. Alle pflanzlichen Organe beginnen mit der Bildung eines stickstoffreichen Fibrins oder Faserstoffs, dem sich erst nach und nach Zellstoff und Zellgewebe anschließen. Dieses Fibrin wird nie zerstört, man findet es in allen Organen, es bildet die Grundmasse aller Pflanzentheile, die ohne dasselbe, also auch ohne Stickstoff sich nicht entwickeln können. Während aber der Kohlenstoff in reichlichem Maße von der Atmosphäre Wasser, d. h. Wasserstoff und Sauerstoff, durch Regen und Thau geliefert werden, kann die Pflanze den wichtigen Stickstoff nur aus dem Boden erhalten, und diesem muß er, da er nur spärlich darin vorkommt, in Gestalt von Düngern zugeführt werden. Die Düngung ist darum eine der wichtigsten Aufgaben des Landwirthes.

So erfreulich unsere heutige Kenntniß von den Beziehungen des Pflanzenlebens zur Atmosphäre auch sind, so dürfen wir uns doch nicht verhehlen, daß wir über Vieles

noch recht unwissend sind. Das Unerklärliche bleibt für uns noch immer die große physiologische Thatfache selbst, von deren Entdeckungsgeschichte hier die Rede ist. Die Oeriker kennen die Kohlensäure sehr genau, wissen im Voraus, welche Reactionen erfolgen müssen, wenn gewisse Bedingungen eintreten, wissen genau, unter welchen Umständen sie entsteht oder zerstört wird; und doch können sie nicht ausführen, was das kleinste von der Sonne beschienene Blatt in wunderbarer Schnelligkeit und Unerforschlichkeit verrichtet. In 10 Stunden liefert eine Wasserpflanze das 15fache ihres eignen Volumens an Sauerstoff, und ein einziges Blatt der Wasserlilie baucht in jedem Sommer 300 Liter derselben aus. Als Boussingault in ein mit Weinblättern gefülltes Gefäß am Sonnenlicht einen Strom von Kohlensäure einführte, erhielt er beim Austritt desselben reinen Sauerstoff. Unsere bewunderte Chemie vermag einen so alltäglichen Vorgang nicht nachzuahmen.

Noch beschämter stehen wir mit unser Wissenschaft jenen chemischen und physiologischen Erscheinungen gegenüber, die aus jenem einfachen Vorgange hervorgehen. Wir sehen 3, dochmals 4 einfache Stoffe sich in unendlich mannigfaltigen Verbindungen verbinden und zahllose Gebilde in's Leben rufen, Holz, Stärkemehl, Zucker, Gummi, Oele, Harze, Säuren, brennend und scharf, lieblich duftend und von köstlichem Geschmack, giftig oder heilkräftig, farblos oder farblos. Unsere Phantasie erlahmt gegenüber diesem Reichthum; aber unsere Wissenschaft vermochte noch nichts von den Geheimnissen dieses natürlichen Laboratoriums zu erschöpfen. Es gibt zwar Leute, die Alles erklären wollen und das am liebsten, wozu sie am wenigsten wissen. So hat man gesagt, daß die Pflanzen wahrscheinlich gewisse Zusammenfassungen von Kohlensäure und Stickstoff enthalten, die sich in der Nacht bitheten und am Tageslicht zerfielen. Man hat auch von einer Art von Fermentation gesprochen, die durch das Sonnenlicht in den grünen Blättern eingeleitet werde. Erklärt ist damit nichts, und nicht einmal richtig sind solche Erklärungen; denn die zerfallenen Blätter zeigen ihre Funktionen nicht fort, was sie doch nach diesen Erklärungen müßten. Zu einer sogenannten Lebenskraft seine Zussucht zu nehmen, ist vollends sinnlos und nicht mehr werth, als wenn man sagt, Gott schaffe das Alles. Man lehre uns erst, worin diese Kraft besteht, und mit welchen Mitteln sie arbeitet. Man verporete wenigstens der wissenschaftlichen Forschung nicht die Wege und setze nicht an Stelle des Unbekannten, aber zu Erforschenden Nichts erklärende Hypothesen und unerklärbare Kräfte!

Was uns in unserer Unwissenheit einigermaßen trösten kann, ist die Bedeutung, die schon jetzt den uns bekannten Thatfachen zukommt. Die Pflanze baucht den Sauerstoff aus, das Thier verzehet ihn. Bringt man eine Pflanze oder ein Thier einzeln unter eine Glasglocke, so stirbt die eine wie das andere. Bringt man beide mit einander im Dunkeln unter die Glocke, so machen sie einander das Dasein streitig, statt einander zu heilen. Nur im Sonnenlicht unterstützt das Leben des einen das des andern. Eine solche Glasglocke bietet also gleichsam ein Bild der Welt im Kleinen dar, wie schon Priestley meinte. Nur in einer Hinsicht verhält es sich in der großen Welt doch anders. In der kleinen Glocke kann das geringste Uebermaß in der Atmung des Thieres oder die geringste Störung in der Wirkung des Sonnenlichtes eine solche Anreicherung von Kohlensäure bewirken, daß zuerst das Thier, dann die Pflanze dem Tode verfällt. In der großen Welt haben wir der

gleichen nicht zu fürchten; wir sterben nicht gleich, wenn auch alles Pflanzenleben einmal aufhörte. Nehmen wir die Zahl der Menschen auf der Erde zu 1000 Millionen an und setzen wir die gesammte atmende Thierwelt 3000 Millionen Menschen gleich, so können wir berechnen, was all dieses atmende Leben an Sauerstoff verbraucht. Es ist eine erstaunliche Menge, es sind mehr als 100,000 Millionen Kubikfuß täglich. Aber der Reichtum der Atmosphäre an Sauerstoff ist noch größer. 8000 Mill. Jahre würden nöthig sein, wenn die Thier- und Pflanzenwelt all diesen Sauerstoff vergehen sollte, und mindestens zwei Jahrtausende müßten vergehen, ehe die feinsten chemische Analyse auch nur die Spur einer Verminderung in der Mischung der Atmosphäre nachzuweisen vermöchte.

Allerdings mag es in der Uebersichte unsrer Erde Zeiten gegeben haben, wo die Atmosphäre eine andere war, als heute, und Bronzianer hat es versucht, aus ihrer damaligen Beschaffenheit den Ursprung der gewaltigen Kohlenmassen abzuleiten, die den Boden Englands, Belgiens, Amerika's und anderer Länder bedecken, und die offenbar, Steinkohlen, wie Anthracite, Braunkohlen, wie Torf, nur die Ueberreste einer abgestorbenen Pflanzenwelt sein können. Als die Erde noch glühend war, sagt Bronzianer, mußte aller Kohlenstoff auf Erden in Form des Verbrennungsproduktes, der Kohlen säure vorhanden sein. Als sie sich daher abkühlte, war ihre Atmosphäre für das thierische Leben ungeeignet; denn es fehlte an Sauerstoff und Kohlenstoff, und Stickstoff hatten die Herrschaft. Um so günstiger waren die Verhältnisse für das Gedeihen der Pflanzenwelt; mächtige Wälder bedeckten die Erde, deren Ueberreste unsere Kohlen säure liefern. Aber diese Pflanzenwelt bereite allmählig unter der Einwirkung des Sonnenlichts den Sauerstoff, und bereitete so die Erde für das Erscheinen der Thierwelt vor. Den Anfang bildeten die kaltdulstigen Thiere, die nur geringer Sauerstoffmengen bedürften, und erst, als die Kohlen säure fast völlig aus der Atmosphäre verschwunden war, konnten die Säugethiere auftreten.

Wir können die Rollen, welche in der Gegenwart Pflanze und Thier im großen Haushalt der Natur spielen, in folgender Weise charakterisiren. Die Pflanzenwelt bildet gleichsam ein großes Laboratorium zur Erzeugung von Stoffen, die der Thierwelt zur Nahrung dienen. Sie nimmt unmittelbar Kohlen säure und Wasser, also Produkte einer Verbrennung auf und befreit den Sauerstoff von dem Kohlenstoff und Wasserstoff, welche letztere sie fähig macht, wieder verbrannt zu werden. Diese chemische Thätigkeit findet in den Organen der Pflanze statt, aber die Ursache kommt von außen, sie geht von der Sonne aus. Die Thierwelt hat eine entgegengesetzte Aufgabe. Sie verbrennt die von der Pflanze erzeugten Produkte, gibt der Atmosphäre Kohlen säure zurück und versorgt den Boden mit stickstoffreichen Produkten, die der Pflanzenwelt wieder das Leben möglich machen. So besteht ein ewiger Kreislauf wechselnder Wandlungen und gegenseitiger Hilfsleistungen zwischen Thier- und Pflanzenwelt. Was aber Allem Nahrung, Leben und Kraft gibt, ist die Sonne. Die wunderbar schnellen Schwingungen ihrer Lichtstrahlen sind Bewegung, sind Kraft. Von der Pflanze wird diese Kraft gleichsam verzehrt, aber nicht, um für immer zu verschwinden, sondern nur um in ent-

sprechende Arbeit verwandelt zu werden. Diese Arbeit ist die Befruchtung der Kohlen säure. Wird der dadurch geschaffene Kohlenstoff wieder verbrannt, so wird die ganze von der Sonne gespendete und gleichsam nur aufgespeicherte Kraft wieder frei, und wenn wir sie dann benutzen, um unsere Zimmer zu erleuchten oder unsere Maschinen zu betreiben, so ist es die Sonne, die wir uns dienbar machen, die Sonne, die vielleicht in unvorstellbaren Zeiten durch die Wälder der Vorwelt uns diese Arbeitsschäfte bereitete. Und wenn wir mit der gesammten Thierwelt von den Erzeugnissen der Pflanzenwelt uns nähren, dann ist es ebenso nur die Sonnenkraft, die sich in uns in Bewegung und Kraft umwandelt.

Noch haben wir die Pflanze in zwei Augenblicken ihres Lebens zu betrachten, wo sie ihre Eigenthümlichkeit, die Gase der Atmosphäre zu zerlegen und feste Stoffe in sich anzuhäufen, verliert und sich dem Thiere nähert, indem sie ihren eigenen Leib verbrennt. Es sind der Anfang und das Ende der Pflanze, der Keim und die Blüthe. In dem Samenkeim gleicht die Pflanze dem Thiere im Ei. Die keimende Pflanze ist ganz auf sich selbst angewiesen; sie lebt von dem Nahrungsvorrath, den die mütterliche Fürsorge ihr in dem Samenkeim mitgegeben. Aus dem einen Theile dieses Vorraths schafft sie sich ihre Organe, den andern verbrennt sie in einer Art von Athmung. Boussingault fand bei einer Erde nach vollendeter Keimung mehr als die Hälfte des ursprünglich vorhandenen Kohlenstoffs vergeht und als Kohlen säure in die Luft geäußt. Erst wenn die eigentlichen Athmungsorgane der Pflanze sich entwickelt haben, bedarf sie des Lichts, und am Lichte beginnt sie dann ihre eigenthümliche Thätigkeit, Kohlen säure zu zerlegen und kohlenstoffreiche Produkte in sich anzuhäufen.

In der Blüthe entfaltet die Pflanze eine ähnliche Thätigkeit wie im Keim. Schon Priestley bemerkte, daß alle Blumen des Tages und in der Nacht, am Lichte und im Dunkeln eine giftige Luftart ausbauchen, Sauerstoff lehrt diese Luft als Kohlen säure kennen. In der Befruchtung vergeht sich die Pflanze selbst, sie verbrennt einen Theil ihres eignen Leibes. Eine Blume unter einer Glasglocke vergeht wie ein atmendes Thier außerordentlich schnell den vorhandenen Sauerstoff. Aber mit dieser Verbrennung ist auch, wie mit jeder andern, Wärmeerzeugung verbunden. Man entdeckt diese Thatfache zuerst an den Blüthen des Kürbiss; aber am auffallendsten zeigt sie das bekannte Arum maculatum, indem zugleich die rutenförmige Blüthenstiel, welche die Blumen umschließt, eine zu schnelle Zerkleinerung der Wärme verhindert. Nach den Angaben zuverlässiger Beobachter übersteigt die Temperatur dieser Pflanze bisweilen um 7 bis 8 Grad die äußere Lufttemperatur, und zwar entwickelt die männlichen Befruchtungsorgane stets mehr Wärme als die weiblichen.

Nach der Befruchtung scheint die Pflanze keine andere Aufgabe mehr zu kennen, als die Frucht zu ernähren. Alle Vorräthe, die sie in der Jugend gesammelt, wendet sie dies her jetzt zu; sie selbst verarmt. Die Zuckerrübe und das Zuckerrohr enthalten keinen Zucker mehr, wenn sie ihre Samen gereift haben. Die Pflanze verrottet oder sinkt in winterliche Ruhe mit Vollendung der Frucht, der sie sich selbst zum Opfer brachte.

# Naturwissenschaftliches Literaturblatt.

Beilage zur „Natur“.

N 2.

Halle, G. Schwesfche'scher Verlag.

17. Juni 1868.

1. Nord- und Mittel-Deutschland's Juncaceen und Cypereen (Heilgräser). Ein Herbarium für Freunde der Botanik, wie auch für Landwirthe, von C. Baenig in Königsberg i/Pr. Lieferung 1—III. (Nr. 1—165), im Buchhandel 6 Thlr., im Selbstverlag 4 1/2 Thlr.
2. Herbarium norddeutscher Pflanzen für angehende Lehrer, Pharmaceuten und alle Freunde der Botanik. Von Demselben. IV. Lieferung: Flechten (37 Arn.). 2. Auflage. Im Buchhandel 24 Sgr., direct vom Selbstverleger 18 Sgr.
3. Nord- und Mittel-Deutschland's Gramineen (Gräser). Für Freunde der Botanik, wie auch für Landwirthe. Von Demselben. I.—V. Lieferung (Nr. 1—174), im Buchhandel 6 Thlr., direct bezogen 4 1/2 Thlr.

Wir haben schon öfters (Literaturblatt 1862. S. 23, 1863. S. 7. u. 1864. S. 23) die eifrig fortgesetzten Sammlungen deutscher Pflanzen des Herrn Lehrer Baenig in Königsberg in Pr. in diesen Blättern angezeigt und empfohlen. Es bedarf folglich auch nur vorüberender Erinnerung, um die früheren Abonnenen auf die Fortsetzung, jenen Andern aber auf die Gültigkeit dieser Sammlungen hinzuweisen. Sie verdienen ihre weitere Verbreitung durch die kritische Sorgfalt, mit welcher der Herr Herausgeber die einzelnen Arten behandelt. Unter den uns vorliegenden Lieferungen erweist Nr. 1 selbst bei dem Botaniker von Fach ein hohes Interesse durch die Menge seltener Arten, die sich Herr Baenig zu verschaffen gewußt hat. Da auch der Preis der einzelnen Art (2 Sgr. im Buchhandel, 1 1/2 Sgr. direct vom Herausgeber bezogen) kein hoher ist, wenn Pflanzen einzeln bestellt werden; da sich dieser Preis aber in ganzen Sammlungen, wie die obersiehenden Preise zeigen, trotz der kostspieligen Ausstattung, kaum 1 Pfennig höher stellt: so spricht auch dies wesentlich zu Gunsten der Sammlungen. Die Pflanzen sind sämmtlich aufgetrocknet und können somit als Muster Sammlung für jede weitere Belehrung dienen.

Angelegen beschäftigt Herr Baenig, ein Herbarium meist seltener und kritischer Pflanzen Nord- und Mitteldeutschlands herauszugeben. Von demselben sind bisher bereits 2 Lieferungen (Nr. 1—170) mit nicht aufgetrockneten Pflanzenarten erschienen, welche entweder durch die Remy'sche Buchhandlung in Berlin (8 1/2 Thaler) oder direct vom Herausgeber (5 1/2 Thaler) zu beziehen sind. Nach den oben angegebenen Pflanzen und nach dem Prospectus zu urtheilen, enthalten sie eine Fülle gut getrockneter und charakteristischer Arten unter Flor, weshalb wir auch auf sie aufmerksam machen. Jedenfalls drängt unsere Zeit immer mehr darauf hin, durch die Erkenntniß der Formen hindurch in das innere Vertriebe der Natur vorzuschreiten. Von diesem Standpunkte aus, von rein utilitarischen abgesehen, kann man sich nur freuen, wenn sich Männer, wie Herr Baenig, finden, die sich dem gescheiterten, kostspieligen und mühevollen Werke mit voller Hingebung zuwenden.

R. W.

1. Gartenbotanik für Schulen, insbesondere solche größerer Städte, angeknüpft an die am leichtesten zugänglichen Gartengewächse. Von Hermann Wagner. I. Cursus. Mit 246 in den Text gedruckten Abbildungen und 1 Uebersichtstafel. Bielefeld und Leipzig. Verlag von Velhagen & Klasing. 1868. 8. 288 S.
2. Betrachtungen der Pflanzen und ihrer einzelnen Theile. Von Dr. Wilhelm Reubert. Mit 10 Tafeln Abbildungen. Stuttgart, bei Gustav Besse 1867. Gr. 8. 58 S. Preis 10 Sgr.
3. Das Buch für Gartenbesitzer. Neues und Nützlich für den Garten, die Küche und den Haushalt der Frauen. Ein Beitrag zur Garten- und Pflanzenkunde. Anleitung zur Förderung der Cultur neuer oder doch wenig bekannter Nutzpflanzen, vermehrter Anwendung und Vertheilung der Heil- und Nahrungskräfte der Pflanzen im Allgemeinen, sowie insbesondere zur Begründung neuer Industriezweige. Herausgegeben von Heinrich Graichen, Pflanzenzüchter in Leipzig. Mit 33 Holzschnitten. Leipzig, Theodor Thomas. 1868. 8. 348 S.
4. Die Baumschule. Anleitung zur Anzucht der Obstkäume, zum Betriebe der Baumschulen im Großen und Kleinen, sowie zur Gewinnung neuer Obstsorten aus Samen. Mit Benutzung der neuesten Quellen bearbeitet von H. Jäger. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 87 in den Text gedruckten Abbildungen u. s. w. Leipzig, bei Otto Spamer, 1868. 8. 223 S. Preis 25 Sgr.

Dem hohen Aufschwunge eines Industriezweiges pflegt eine Erweiterung der in dieses Gebiet einschlagenden Literatur auf dem Fuße zu folgen, belehrend, anregend oder fortbildend. Es ist aber auch ein Glück, daß es so ist. Denn durch die Presse mehr, als durch die mündliche Uebersetzung, erweitert sich der Kreis der Theilnehmenden, der Liebhaber, der Fortbildner, und so wird dafür gesorgt, daß nichts zu einem Monopole, daß vielmehr Alles bald Gemeingut Aller wird. So erklären wir uns die Urmasse von Schriften, welche gegenwärtig über Gartengegenstände in die Öffentlichkeit dringen. Von diesem Standpunkte aus begrüßen wir es aber auch immer als einen Gewinn, daß unsere Garten-Literatur sich gerade so mehrt, wie die Gärtnerei sich ausdehnt. Trotz ihrer großen Fortschritte ist sie doch noch lange nicht in alle Kreise einge drungen; und das ist um so mehr zu beklagen, als die Gärtnerei für beide Geschlechter des Volkes nicht allein eine angenehme, sondern auch eine nützliche Beschäftigung bietet. Man sieht wohl mit Vergnügen überall, selbst im höheren Gebirge, selbst in den entlegensten Ortstäthen, allmählig einen neueren Geist in die früher so kahlen Gärten eintreten; allein es fehlt eben noch viel, daß man von ihnen sagen könnte, sie hätten sich bereits aller Vortheile bemächtigt, die der Mensch aus solchen Kulturen allerorten zu ziehen vermag.



Aus diesem Grunde begrüßen wir auch die vorliegenden Schriften als belehrende und anregend mit Freuden.

Nr. 1 füllt ihren Gegenstand ächt pädagogisch beim rechten Zügel an und verlegt ihn sogleich in die Schule, um von da aus die Liebe zur Gärtnerei zu pflanzen. Zwar hat der Vf. den Hauptzweck vor Augen, daß er den Kindern größerer Orte die Natur zugänglicher durch die Gartend Blumen machen will, da diese ihnen oft leichter erreichbar sind, als die Feldwachsenden; allein wir glauben von seinem Büchlein nicht zu viel zu behaupten, wenn wir annehmen, daß die Art und Weise, wie er seinen Gegenstand behandelt, auch für jede andere Schule geeignet sei, die Liebe zur Gärtnerei schon in die Kindesbrust zu verpflanzen. Wie in einer seiner früheren Anleitungen, schlägt er auch diesmal den Weg der Jahreszeiten ein und theilt die Zeit der Schulbotanik in 3 Abtheilungen: von Oestern bis Pfingsten, von Pfingsten bis zu den Hundstagen, von diesen bis Michaelis. Für jede Zeit gibt er 24 verschiedene Sectionen, je nachdem die Gartenblumen aufstehen. Indem er ihre Betrachtung ganz dem Fassungsvermögen der Kinder anpaßt, kommt es ihm in diesem ersten Course, pöologisch vollkommen richtig, wesentlich auf Formenlehre und Terminologie an, ohne doch die Entwicklungs Geschichte und Physiologie zu vernachlässigen. Im zweiten Course will er dagegen tiefer auf die anatomischen Verhältnisse eingehen, nachdem er die Schüler genugsam vorbereitet glaubt. An seinen 24 Pflanzen entwickelt er nun ihre eigenen Formen, wie die ihrer Verwandten, indem er jede einzelne Art gleichsam als Mittelpunkt eines größeren Kreises betrachtet, gibt, wo es angebracht ist, die Geschichte ihrer Einführung in die Gärten, ihre Kultur und ihre sonstigen Schicksale in den Gärten, dann die systematischen Formenkreise. Somit erhält der Schüler ein umfassendes Lebensbild der Pflanze, die er nicht allein als Individuum, sondern auch als ein lebendiges Glied eines größeren Ganzen, oft tieferbedeutend in die Schicksale des Menschen eingedrungen, auflassen lernt. Ausreichende Querschnitte unterstützen den Inhalt des Buches. Ein Rückbild faßt alle betrachteten Blumen am Ende jedes Zeitabschnittes noch einmal übersichtlich zusammen, um aus dem Einzelnen das Besondere, Allgemeine hervortreten zu lassen. Diesen beiden ersten Rückbildern folgt aber ein Gesamtübersichtsbild, der seinerseits alle behandelten Pflanzen, auf einer Steinplatte übersichtlich mit ihren Organen zusammengestellt, noch einmal nach ganz allgemeinen Eigenschaften und Ideen zusammenfaßt und damit den Course als ein in sich abgerundetes Ganzes würdig schließt. Auffassung, Sprache, Entwicklung des Gegenstandes, Alles ist so pädagogisch klar und trefflich gehalten, daß das Büchlein nicht allein in der Schule, sondern auch außer derselben ein wirksamer Lehrer sein muß. Der Lehrer selbst wird jedenfalls an ihm einen Begleiter haben, der ihm eine solche Menge von Material für jede einzelne Section überliefert, daß er dadurch seiner Schule ein vortheilhaftes lebendiges Bild wird entwerfen können. Aus diesem Grunde empfehlen wir das Buch als einen willkommenen Beitrag zu den Aufgaben, die wir oben in unsern Einleitungsworten skizirten.

Nr. 2 stellt sich von vornherein auf einen praktischen Standpunkt. Denn obwohl die kleine Schrift im Grunde nichts, als eine Organologie der Pflanze ist, so hat sie doch immer ein Gärtner-Publikum vor Augen, dem sie das Wesen der in den Gärten gezeigten Pflanzen oder das Wesen mancher in den Gärten gezeigten Verrichtungen (z. B. künstliche Befruchtung) zum Bewußtsein zu bringen sucht. Die Zelle, die Gefäße, das Zellgewebe, die Oberhaut, die Wurzeln, Zwiebeln,

Knospen, der Stamm, die Blätter, Blumen und Befruchtungsorgane, der Befruchtungsvorgang und die künstliche Befruchtung, die Frucht, das Samenrohr und die Keimung — das sind ihre Gegenstände, deren wissenschaftliches Wesen der Vf. seinem Publikum kurz, faßlich, und immer mit dem Hinblick auf das Praktische, vor die Augen führt. Zehn Steinplatten veranschaulichen in klaren, aber genügenden Abbildungen das Vorgetragene derart, daß man wohl begreift, wie die Schrift, ursprünglich nur ein Artikel des „Deutschen Magazins“, auf vielseitigen Wunsch nicht absonnirter Leser selbständig an die Öffentlichkeit trat. Sie ist geradezu gehalten, als ob der Vf. einmal einigen Freunden im Garten selbst binnen wenigen Stunden kurz und übersichtlich ihre beibringen wollen, wie man wissenschaftlich betrachtet, womit sich der Gärtner täglich beschäftigt, um sie zu befähigen, auch ihrerseits in Ausdruck und Einsicht an dem Fortbau der Wissenschaft Theil zu nehmen. Die wenigen Grobchen, welche die Schrift kostet, wird sie dem betreffenden Leser für reichlich und überreichlich einbringen durch gezeigerte Erkenntnis des Pflanzenlebens, auf welcher doch schließlich alle Praxis beruht. Würde es dieses Publikum nur auch so beherzigen, zumal es im großen Ganzen noch so unwissenschaftlich bei ihm ausseht!

Nr. 3 tritt sogleich an den praktischen Sinn des Gärtners heran, ebenso anregend, wie es der Titel verspricht, als belehrend, und dieses so frisch, so heiter, daß es selbst der Kate gern zur Hand nimmt, um sich einmal in den neuen Fortschritten der Gartenkunst zu unterrichten. Da wir den Vf. schon lange in der Gartenliteratur kennen, und zwar als einen strebenden, rührigen und experimentell-unternehmenden Liebhaber der Gärtnerei, der schon manche neue Form durch Kultur zog, so freut es uns doppelt, vorliegendes Werkchen aus seiner Feder zu erhalten; weil wir ihm überzeugt sein durften, daß hier ein Mann auftaucht, der sich nicht nur in der Gartenliteratur, sondern auch in der Natur selbst wader umgesehen. — Er theilt sein Buch in zwei Abtheilungen, von denen die erste den Gemütharten behandelt, während die zweite sich über Pflanzungen oder sonstige Anpflanzungen verbreitet. In erster Beziehung hat der Vf. sichtlich die Frauen vor Augen. Denn nicht allein, daß er seinen Leser über Abkammerung und Kultur der Pflanzen unterrichtet, gibt er auch oft werthvolle Winke über die Zubereitung und den kulinarischen Werth der Gemüse. Nicht, daß er eine erschöpfende Geschichte der Gartengewächse bräute, gibt er nur eine Auswahl des Besten, Wertvollsten, namentlich in der zweiten Abtheilung. Er begleitet diese sogar mit einer Menge von manchmal schonen Querschnitten, durch welche er auf neue Blumenformen oder gänzlich neue Pflanzungen aufmerksam machen will. So sind z. B. die verschiedensten Aker- und Ballastformen, *Bocconia frutescens* und *Japonica*, *Lilium tenuifolium*, *Mussaia Wollastonii* und *Hepatica angulosa* wahre Herkuler seines Buches, die man mit Vergnügen betrachtet, auch wenn man sie schon oft in der Natur sah. Sie geben vielleicht darum auch Anlaß zu einer weiteren Verbreitung dieser prächtigen Pflanzen, die man leider noch viel zu wenig in unsern Gärten antrifft, obgleich z. B. die *Mussaia*, diese herrliche baumartige Glodenblume, zu dem Schönsten gehört, was neuerdings bei uns an Pflanzen eingeführt wurde. Wer sich an den Titel des Buches hält, empfängt sogleich ein volles Bild seines Inhaltes, das den Leser nicht täuscht; und damit wollen wir auch dieses hübsche Buch auf's Wärmste empfehlen haben.

Nr. 4 bedarf dieser Empfehlung nicht mehr. Denn eine dritte Auflage eines Buches von einem Vf., den die ganze

Gartenwelt kennt, spricht zu sehr für sich selbst, als daß wir es noch nötig haben sollten, es zu empfehlen. Nur Konstantin wollten wir hiermit das Dasein der neuen Auflage und bemerken, daß der Abschnitt über Vredungs-Unterlagen gänzlich umgearbeitet, aber dadurch auch das Vollständige wurde, „was die Literatur bisher darin besitzt“, wie der Vf. sich selbst ausdrückt. Unsere Leser kennen den Vf. schon so lange und auf dem speziellen Gebiete durch dessen Werk: „Der Baum in der Schule des Menschen“ in dem laufenden Jahrgange der „Natur“, so daß wir nichts für ihn hinzuzufügen finden. Jedenfalls nimmt das Buch unter den vorliegenden Schriften den bedeutsamsten Platz ein, insofern es eine Monographie seines Gegenstandes ist, der man das Gebotene auf jeder Seite ansieht.

R. R.

**Der Orient und seine kulturgeschichtliche Bedeutung.** Von August Wilhelm Ritter v. Zerbani di Sposetti. 888, 4. Hartleben's Verlag, 1868.

Bei der Wichtigkeit und hohen Bedeutung des Orients und bei dem Interesse, das Europa an der Entwicklung der orientalischen Frage hat (auch wenn es die Wichtigkeit dieser Frage oft nur nach seinen eigenen Interessen, nicht nach denen des Orients selbst, beurtheilt), kann vorliegendes Buch, wenn es in die rechten Hände kommt, über alle diese Gegenstände um so mehr aufklären, je größer in gewissen Beziehungen und Kreisen die Unwissenheit darüber noch zur Zeit ist. Der Vf., der den Orient aus eigener Anschauung kennt, legt darin seine kulturgeschichtliche Bedeutung dar, und er nimmt dazu aus erhabenen Standpunkten auch weite Gesichtspunkte für Betrachtung und Lösung „des großen Problems der Menschenaufkunft“, die er zunächst in dem Lande erwartet, welches die Wiege der Menschheit ist. Zwar werden nicht alle Leser gleichmäßig jene Stand- und Gesichtspunkte des Vf.'s sich ebenfalls aneignen, und noch weniger werden sie mit allen Anschauungen, Behauptungen und Schlussfolgerungen desselben sich einverstanden erklären, aber jedenfalls können sie darnach ihre eignen Ansichten aufklären und berichtigen, und sie würden für sich auch aus den Irrthümern des Vf.'s Vieles lernen können. Kann man auch in seinen eignen Anschauungen und Combinationen eine gewisse Schwärmeri, Ueberhöhungsreiz und einen idealen Euforismus für seine Ansichten über jene kulturgeschichtliche Bedeutung des Orients und über die Lösung jenes großen Problems nicht ganz verlernen, so gibt dies doch kein Recht, weder die leitenden Grundideen des Vf.'s, noch die Zielpunkte, die er verfolgt und zu denen er gelangt, als irrig zu bezeichnen. Gewiß hat er Recht, wenn er davon ausgeht, daß die alten primitiven Kulturvölker Asiens, „dem im Oriente unwiderstehlichen Walten der Naturkräfte und ihren allmählichen Einflüssen auf das menschliche Individuum erlegen sind“, und daß der Orient eines neuen Kulturlebens bedarf. In der geistigen Auferstehung Asiens, in der Erweckung dieses neuen Kulturlebens steht der Vf. die Aufgabe unsrer Zeit und den innersten Kern der orientalischen Frage, und er ist der Meinung, daß unser geistlich-germanische Weltkultur in ihrer wesentlich kosmopolitischen Haltung und Richtung, so wie unter dem Einfluß freier, kosmopolitischer Ideen und aus einer für die Gestaltung der Zukunft sicher gewonnenen Basis geschieht und berufen sei, jene Erweckung des Orients zu neuem Kulturleben und seine geistige Auferstehung herbeizuführen. Ueber diese Gegenstände verbreitet sich der Vf. ausführlich, und er weiß nicht nur im

Einzelnen die Lebensfähigkeit der europäischen Kultur und ihre Lebenskraft an und für sich, sondern auch die Einflüsse nach, die sie dafür bereits geltend gemacht haben. Wenn er dabei von der christlich-germanischen Weltkultur spricht, so meint er doch nicht ausschließlich die deutsche, sondern die europäische Kultur, aber von dieser breiten Oberfläche der allgemeinen Kulturanschauungen des Vf.'s lösen sich dann gleichsam in einzelnen Richtungen und in schärferer Fassung gewisse Auenen ab, die jene Anschauungen erst in ihrem wahren Lichte erkennen lassen. Zunächst handelt es sich selbstverständlich nur um die genannte christlich-europäische Kultur, und in dieser Hinsicht hebt der Vf. alles das hervor, was die europäischen Emporien des Orients an bereits gewonnenen Einflüssen auf die Eingeborenen und auf die Verhältnisse des Volkes und Landes darbieten. Denn diese Emporien — sagt er — sind nicht ausschließlich einer Nation, sondern gemeinschaftlich der europäischen Kultur überhaupt angehörende Colonien; aber im Einzelnen bilden doch die Griechen überall den zahlreichsten Theil der Bevölkerung, neben denen dann wieder besonders die deutschen Niederlassungen eine hervorragende Rolle spielen und mächtigen Einfluß üben. Diesen entscheidenden Einfluß des germanischen Elements und der deutschen Gesellschaft, sowie die Anerkennung, die sie damit bei den Türken u. s. w. finden, hebt der Vf. vor allem hervor und weist ihn in einzelnen Thatfachen nach, namentlich in Konstantinopel, Smyrna, Beirut und in Aegypten. Er rühmt die Mäßigkeit und Selbständigkeit der dortigen Deutschen, ihr persönliches Selbstbewußtsein, den richtigen Blick in die Dinge, und er bemerkt, der größte Gewinn hierbei sei, daß der Deutsche (er spricht zunächst von der deutschen Gesellschaft in Konstantinopel), „seiner Schwerfälligkeit, die ihm durch die Institutionen seiner Heimat erzeugen ist, hier los wird und praktisch frei zu sein, sich frei zu bewegen und dabei seiner Bude nichts zu vergeben lernt.“ Er wird mit einem Worte „ein Mensch der That“ (S. 49). Der Haupt-einfluß geht freilich an den einzelnen Orten von den europäischen Colonien überhaupt aus, die sich dort zahlreich an der Meeresküste finden; aber außer Konstantinopel und Aegypten zieht dies europäische Kulturleben in den anderen Handelsstädten und im Innern des Landes doch nur langsam ein. So ist z. B. in Smyrna der einzelne Europäer nicht so sicher, wie in Konstantinopel und Aegypten, und gerade in Smyrna ist das Volk viel förmiger, feindseliger und unbilliger als anderswo. Dagegen macht sich in Beirut, diesem vorzüglichsten Sitz der europäischen Handelswelt, der deutsche Einfluß besonders bemerkbar und geltend. Es besteht dort ein deutscher Verein, in welchem namentlich zweimal geistliche und naturwissenschaftliche Vorträge gehalten werden; eine Bibliothek wird ange schafft, und die besseren deutschen Zeitschriften liegen zur Benutzung für die Mitglieder vor. Ebenso ist in Cairo ein deutscher Gewerbeverein, wo unter Ausfluß des Kaufmannslandes, und nachdem sich der Handwerkerstand von letzterem getrennt, seine Kaufleute, wohl aber Aerzte und Professoren Aufnahme finden. Die dem Kaufmannslande angehörenden Mitglieder sind dort mit anderen Nationalen, meist Franzosen, zu einem „kosmopolitischen Verein“ zusammengetreten. Ähnlich nur es in Konstantinopel. Dagegen ist in der deutschen Colonie in Smyrna, mehr als in irgend einer anderen europäischen Niederlassung im Oriente, die Stillschlichkeit zu Hause, was der Vf. als eine Folge des dortigen geselligen Familienlebens betrachtet. Es gibt in Smyrna auch Privatvortragsschulen, die in der Levante einen gewissen Ruf haben, und wohin selbst aus Konstantinopel und aus Orie-

denland Kinder beiderlei Geschlechts zur Erziehung geschickt werden. Die Kolonie ist hier auf ihrem erglühenden Terrain nahe zusammengedrückt und gleichsam abgeflacht; dabei steht sie von außen unter einem gewissen sittlichen Einfluß, die sinnlichen Elemente haben auf sie eine tiefgreifendere Wirkung, die Begleitungen zu den Konsulaten sind inniger, die Gegenseitigkeit ist größer, und somit zeigt sich auch das europäische Bewußtsein in ihr lebendiger. Außerdem herrscht auch zwischen den verschiedenen Nationalen ein freundliches und heiliges Einvernehmen, und die dortigen Deutschen sind unstreitig die gemüthlichsten der ganzen Levante (S. 82). Anderwärts spielen dagegen, z. B. in Aegypten, die Franzosen und neben ihnen die Engländer die Hauptrolle, und auch sonst treten bald die Franzosen, bald die Engländer besonders hervor, entweder neben einander, oder die eine Nation und Rationalität vor der anderen. Indem sich im Orient die verschiedenen Nationen begegnen, stehen sich auch die einzelnen National-elemente mehr oder weniger feindlich entgegen: das germanische, romanische und slavische Element, zunächst vertreten durch die englische, französische und russische Regierung und wurzelnd in den einzelnen Rationalitäten. Dabei treibt freilich eine jede dieser einzelnen Regierungen auch ihre besondere Politik, die hin und wieder zugleich confessionelle Interessen und Zwecke verfolgt. England hat im Oriente den Schutz und die Propaganda der protestantischen Kirche auf seine Fahne geschrieben und sucht, eifrigst auf den Einfluß Frankreichs, dieser Schutzmacht der katholischen Kirche stets Verlegenheiten zu bereiten. So kämpft der germanische Stamm mit dem romanischen (und slavischen) um den Primat im Orient, und es berühren sich dabei in besonders feinseltiger Haltung das kosmopolitische Germanenthum und das exklusive Slawenthum. Mit Recht sagt der Vf., daß der Orient nur mit geistigen Waffen, nicht aber mit roher Gewalt erobert und behauptet werden soll, und ein bewaffneter Einbruch würde, nach seiner Meinung, namentlich auch die europäischen Kolonien im Oriente bedrohen und gefährden; dagegen ist und bleibt es unter allen Umständen ein gefährlicher Irrthum der europäischen Mächte, die einsig und allein „durch ihre Eifersucht die türkische Macht aufrecht zu erhalten.“ Es ist in der That unbegründlich, was auch der Vf. durch Thatfachen bekräftigt, wie in dieser Hinsicht der französische und englische Einfluß sich gegenseitig in ihrem egoistischen Interesse bekämpfen, statt im wahren Interesse des Orients eine klare, aufrichtige und entscheidende Politik ihrer Regierungen zu befolgen und daß der Willkürherrschaft der Türkei gegenüber, „die dort trotz aller Datt's noch immer zu Hause ist“, diese christlichen Regierungen eine ähnliche, vielleicht noch gefährlichere Willkür üben. Dem crassen Aberglauben und einer wahren Verhöhnung des Volke gegenüber (vgl. S. 88) hätten hier die christlichen Mächte Europa's eine andere Stellung einzunehmen ebenso das Recht als die Pflicht! In allem diesem Wirrwarr tritt nun auch noch besonders der Einfluß des griechischen Elements deutlicher hervor. Zwar nennt der Vf. die Griechen „das turbulenteste Volk der Erde“, und er sagt ihnen auch sonst viel Nachtheiliges und Widerliches nach. In ihrem überprübelnden kindlichen Uebermuth und in ihrer ausgefallenen Weise freuen sie sich des Lebens, schlagen dabei nach allen Seiten aus, machen jedem ein Schnippschen und untereinander halten sie innig zusammen, und bei aller ihrer

Unnatur verleugnen sie nicht ihren angeborenen aristokratischen Charakter. Sie haben allerdings — sagt er — einen harten asketischen Selbstgenuß, sind in grober Sinnlichkeit und im crassen Aberglauben befangen und in einem gewissen Grad der Verwilderung versunken. Aber daneben rühmt der Vf. vor allem ihre Jugend, die ihnen „die Vermischung mit dem slavischen Blute gewährt hat“, und in dieser Jugend nicht nur ihre hohe Empfanglichkeit, sondern auch „einen gewissen Anstrich von der altellenischen, anmutigen Phantase“, ihre Lebendigkeit, ihr hohes Selbstbewußtsein, das, „von einer seltenen Geistes- und Sinnesstärke gehoben, jeder einzelnen Minute der Gegenwart irgend eine Bedeutung abzugewinnen weiß und jede zu einer praktischen Combination zu vertheilen versteht.“ Nach der Ansicht des Vf.'s haben die Griechen „noch ein ganzes Leben vor sich“, in der Elastizität ihres Geistes, in dem Gefühl der Unabhängigkeit und Freiheit, in der unbeugsamen Beharrlichkeit und Ausdauer, womit sie, in beständiger Betätigung ihrer Geisteskräfte, ihre Zwecke verfolgen. Liegen auch im Charakter dieses Volkes „eine Menge Gegenstände unvermittelt, so liegen sie doch nicht todt neben einander“, und es wird deshalb „seiner Zukunft unaufhaltsam entgegengetrieben und fühlt es in sich, daß es diese Zukunft erst aus sich selbst herauszugestalten hat. Für die europäischen Kolonien des Orients erklärt der Vf. die Griechen nicht nur für ungemein brauchbar, sondern für eine „unbeziehbare Nothwendigkeit.“ Auf diese Weise haben sie auch im Oriente, für Lösung der orientalischen Frage und der kulturgeschichtlichen Aufgabe Europa's im Oriente, wie der Vf. sie fordert, ihre eigene Stellung und besondere Aufgabe. Die unersättliche Lebensfülle des neugriechischen Volkes — bemerkt er — „wird sich in neuen Formen über Asien auszuweiden verbreiten, und das Neugriechenthum wird für die alte, die asiatische Welt wieder das werden, was das Altgriechenthum einst für Europa gewesen.“ R.

## Literarische Anzeige.

Verlag von Scheitlin & Zollikofer in St. Gallen.

# Wanderungen in Australien und Polynesien.

Von

O. Nietmann.

Mit 2 Karten.

1 Thlr. 15 Ngr. 2 fl. 35 fr. 5 Kr. 40 Cent.

Der Herr Verfasser, Professor der Naturgeschichte in St. Gallen, schildert mit anschaulicher Lebendigkeit seine mehrjährigen Wanderungen in Australien und nach Inseln der Südsee, die zum Theil noch nie vorher von einem Europäer besucht worden waren. Die einfache, anspruchsvolle, durchweg den Stempel strengster Wahrheit tragende Erzählungsweise des Herrn Verfassers wird dem gebildeten und dabei sehr interessanten Buche viele Freunde erwerben. Die beiden Karten bilden eine werthvolle Beilage.





